

الباب الثالث :

تطبيقات على قياسات القوة الدافعة الكهربائية Applications of E. M. F Measurements

أولاً: تعين كميات ثرموديناميكية

ثانياً تعين ثوابت الاتزان

ثالثاً: معايرات قياس الجهد الكهربائي

(أ) معايرات حامض - قاعدة

(ب) معايرات أكسدة - اختزال

تطبيقات عملية للخلايا الكهروكيميائية

1- البطاريات

2- خلايا الوقود

3- الفولتية الإضافية

قياس الجهد الإضافي عملياً

أمثلة محلولة

الأسئلة

الباب الثالث :

تطبيقات على قياسات القوة الدافعة الكهربائية

Applications of E. M. F Measurements

تستعمل الخلايا الكهروكيميائية كأساس في تحديد مجموعة واسعة من الحسابات والقياسات في الكيمياء وستطرق هنا إلى بعضها :

أولاً : تعين كميات ثرموديناميكية :

تعتبر قياسات القراءة الدافعة الكهربائية مصدراً مناسباً لمعلومات عن تغير الطاقة الحرية المولارية لجس ΔG وتغير الانثالبي المولاري ΔH وتغير الانتروبي المولاري ΔS لتفاعل ما . كما أن قيم القياسية لهذه الكميات (ΔS° , ΔH° , ΔG°) هي القيم التي ذاتاً نعنيها عملياً فالنسبة في الطاقة القياسية ΔG° يمكن إيجاده من القراءة الدافعة الكهربائية القياسية المعينة عملياً . أما العلاقة بين E°_{cell} , ΔG° :

$$\Delta G^\circ = - nF E^\circ_{\text{cell}} \quad \dots\dots (78)$$

أما علاقة ΔG° بـ ΔG (انظر معادلة 55) بالمعادلة التالية :

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln [\prod_i (a_i)^{v_i}] \quad \dots\dots (79)$$

وعند تعويض معادلة (78) في معادلة (79) ومن ثم ربط المعادلة الناتجة مع معادلة

نيرست :


$$E_{\text{Cell}} = E^\circ_{\text{Cell}} - \frac{RT}{nF} \ln [\prod_i (a_i)^{v_i}]$$

فستحصل على :

$$\Delta G = -nFE$$

مثال (5) :

احسب قيم ΔG , ΔG° عند درجة حرارة 25°C لتفاعل التالي :



حيث لهذا التفاعل تكون $\text{pH} = 4$

الحل :


نكتب أولًا تفاعلات الأقطاب ونستعين بالجدول لإيجاد القطب الاختزالي القياسي :



$$E^\circ_R = 1.68 \text{ V}$$



$$E^\circ_L = -0.4 \text{ V}$$



$$E^\circ_{\text{Cell}} = E^\circ_R - E^\circ_L = 2.08 \text{ V} \quad , \quad \Delta G = -nFE^\circ_{\text{Cell}}$$

$$= 2(96493 \text{ C mol}^{-1})(2.08) = -403 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$E_{\text{Cell}} = E^\circ_{\text{Cell}} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[a(\text{PbSO}_4)]^2 [(a(\text{H}_2\text{O}))^2]}{[a(\text{Pb})][a(\text{PbO}_2)][a(\text{SO}_4^{2-})]^2 [a(\text{H}^+)]^4}$$

$$= E^\circ_{\text{Cell}} + \frac{RT}{2F} \ln \{ ([a(\text{H}^+)]^4 [a(\text{SO}_4^{2-})]^2 \}$$

والأآن نحن نحتاج أن نعرف $a(\text{SO}_4^{2-})$ وللوصول إلى هذا نستخدم ما يلي :

$$a(\text{SO}_4^{2-}) = \gamma_\pm m(\text{SO}_4^{2-}) \quad , \quad a(\text{H}^+) = \gamma_\pm m(\text{H}^+)$$

$$m(\text{SO}_4^{2-}) \approx \frac{1}{2} m(\text{H}^+)$$

ومنها نحصل على :

$$a(SO_4^{2-}) \approx \frac{1}{2} \gamma_{\pm} m(H^+) = \frac{1}{2} a(H^+)$$

وهكذا نكتب :

$$E_{Cell} = E_{Cell}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \{ [a(H^+)]^4 [\frac{1}{2} a(H^+)]^2 \}$$

$$= E_{Cell}^{\circ} + \frac{3RT}{F} \ln \frac{a(H^+)}{4}$$

$$= E_{Cell}^{\circ} - \frac{3RT}{F} \ln 4 + 2.303 \left(\frac{3RT}{F} \right) \log a(H^+)$$

$$= E_{Cell}^{\circ} - \frac{3RT}{F} \ln 4 - 2.303 \left(\frac{3RT}{F} \right) pH$$

$$= 2.08 - 3(0.02569) \ln 4 - 2.303 (3 \times 0.02569) \times 4$$

والآن تعطي ΔG كالتالي :

$$\Delta G = -2F E_{Cell} = -246 \text{ kJ mol}^{-1}$$

إن قيم دالة جبس القياسية ΔG° (أو ما تعرف بالتغيير في الطاقة الحرية القياسية لجبس) لتفاعلات أيونية في محلول يمكن الحصول عليها من جداول دالات جبس لتكوين الأيونات الداخلة في التفاعل . أما كيف تم الحصول على القيم الموجودة في الجداول فهو باختيار دالة جبس قياسية لأيون على أساس أنها تساوي صفرًا وبالاعتماد على هذه القيمة الاختيارية ثم تدوين القيم لجميع الأيونات الأخرى .

ومن قياسات E_{Cell}° يمكن تعين دالة جبس لتكوين الأيونات الأخرى فمثلاً يمكن تعينها لتكوين أيون Ag^+ في الماء من دالة جبس القياسية " ΔG " للتفاعل التالي :



حيث تكون ΔG° لهذا التفاعل :


$$\Delta G^{\circ} = \Delta G^{\circ}(H^+, aq) + \Delta G^{\circ}(Ag_s) - \Delta G^{\circ}(Ag^+, aq) - \frac{1}{2} \Delta G^{\circ}(H_2, g)$$

$$= \quad 0 \quad + \quad 0 \quad - \quad \Delta G^\circ (\text{Ag}^+, \text{aq.}) \quad - \quad 0$$

إذن :

$$\Delta G^\circ = - \Delta G^\circ (\text{Ag}^+, \text{aq.}) \quad \dots \dots \quad (81)$$

إن التفاعل المعطى في معادلة (80) يحدث في الخلية التالية :



حيث تمتلك هذه الخلية قوة دافعة كهربائية قياسية E°_{cell} كالتالي :

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_R (\text{Ag}^+, \text{Ag}) - E^\circ_L (\text{H}^+, \text{H}_2) = E^\circ_R (\text{Ag}^+, \text{Ag})$$

ومن الجدول نأخذ جهد القطب (الاحتزالي) القياسي لقطب Ag^+ , Ag وهو يساوي

$$G^\circ = - nF E^\circ_{\text{cell}} \quad (78) \quad 0.7996 \text{ V}$$

$$= - (96493 \text{ C mol}^{-1}) (0.7996 \text{ V}) = - 77.1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

وإذن معادلة (81) تعطي :

$$\Delta G^\circ (\text{Ag}^+, \text{aq.}) = 77.1 \text{ kJ mol}^{-1}$$

وهكذا فقد بينا كيف يمكننا إيجاد ΔG , ΔG° من قياسيات القوة الدافعة الكهربائية .

أما الآن فتطرق إلى كيفية إيجاد التغير في الانترودي ، والاتسالبي من قياسات القوة الدافعة الكهربائية بواسطة المعادلة التي توضح اعتقاد ΔG° على درجة الحرارة T عند ثبوت الضغط . وهو :

$$\left(\frac{\partial \Delta G^\circ}{\partial T} \right)_P = - \Delta S^\circ \quad \dots \dots \quad (82)$$

نعرض هذه المعادلة في معادلة (78) لنحصل على :

$$\Delta S^\circ = nF \left(\frac{\partial E^\circ_{\text{cell}}}{\partial T} \right)_P \quad \dots \dots \quad (83)$$

وبوضوح فإن قياس تغير E°_{cell} مع درجة الحرارة سيعطينا التغير في الانترودي المولاري

القياسي ΔS° لتفاعل الخلية . والآن وبعد أن عرفنا ΔG° ، ΔS° فإن ΔH° يمكن إيجادها من المعادلة التالية :

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ \quad \dots \dots (84)$$

ويمكن تطبيق نفس الطريقة على E_{cell} للحصول على ΔH . ΔS (أي سيكون) :

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S , \Delta S = nF \left(\frac{\partial E_{cell}^\circ}{\partial T} \right)_P$$

مثال (6) :



إذا كانت E_{cell} عند درجة حرارة $25^\circ C$ لل الخلية .



ΔG° هي 0.2669 V وعند درجة حرارة $30^\circ C$ تساوي 0.2699 V أوجد قيم كل من ΔH° و ΔS° عند درجة حرارة $25^\circ C$.

الحل :

نكتب تفاعلات الأقطاب وتفاعل الخلية الإجمالي كالتالي :



نستخدم معادلة (78) :

(حيث هنا n تساوي واحد) وعند درجة حرارة $20^\circ C$ تكون ΔG°_1 كما يلي :

$$\Delta G^\circ_1 = - (96493 \text{ C mol}^{-1}) (0.2699 \text{ V}) = - 2604 \text{ kJ mol}^{-1}$$

وعند درجة حرارة $30^\circ C$ تكون ΔG°_2 كالتالي :

$$\Delta G^\circ_2 = - (96493 \text{ C mol}^{-1}) (0.2669 \text{ V}) = - 25.75 \text{ kJ mol}^{-1}$$

أن معدل قيمتي ΔG°_1 , ΔG°_2 سيعطينا ΔG° عند درجة حرارة 25°C أي أن :

$$\Delta G^\circ(298\text{ K}) = \frac{(26.04) + (-25.75)}{2} = -25.90\text{ kJ mol}^{-1}$$


والآن نستخدم معادلة (82) من أجل الحصول على ΔS° عند درجة حرارة 25°C :

$$\begin{aligned}\Delta S^\circ &= -\left(\frac{\partial \Delta G^\circ}{\partial T}\right)_P \\ &= -\frac{[(25.75) - (26.04)]\text{kJ mol}^{-1}}{(303 - 293)\text{K}} - 29.0 \times 10^{-3}\text{ kJ K}^{-1}\text{ mol}^{-1}\end{aligned}$$

ونستخدم معادلة (84) من أجل الحصول على ΔH° عند درجة حرارة 25°C :

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ &= \Delta G^\circ + T \Delta S^\circ \\ &= (-25.9\text{ kJ mol}^{-1}) + (298\text{ K})(-29.0 \times 10^{-3}\text{ kJ K}^{-1}\text{ mol}^{-1})\end{aligned}$$

وإذا أردنا حساب التغير في الطاقة الحرارية والانثالي والانتروبي القياسي لتفاعل الخلية الذي يتضمن انتقال الكترونين أي :



ففي مثل هذه الحالة نضرب قيم ΔG° , ΔH° , ΔS° (المحصل عليها أعلاه بـ 2 وعندئذ) سيكون عند درجة حرارة 25°C :

$$\Delta G^\circ = -51.80\text{ kJ mol}^{-1} \quad \Delta S^\circ = -85.00\text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H^\circ = -69.18\text{ kJ mol}^{-1}$$

ومن الجدير ذكره هنا أيضاً هو أنه قد جرى الاتفاق على اختيار الانتروبي القياسي للبروتون المائي قيمة متساوية لصفر . أي : $S^\circ(\text{H}^+, \text{aq}) = 0$ وعلى ضوء هذا الافتراض فقد تم الحصول على قيم الانتروبي القياسي للأيونات . وقائمة للانتروبي القياسي للأيونات في الماء .

ثانياً : تعريف ثابت الاتزان Determination of Equilibrium Constants

إن معرفة E_{cell}° خلية يساعدنا في إيجاد ΔG° وثابت التوازن K_a لتفاعل الخلية الكيميائي ،

حيث أن :

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K_a \quad \dots \dots \quad (85)$$

وعند ربط هذه المعادلة مع معادلة (78) $\Delta G^{\circ} = -nF E_{cell}^{\circ}$ يتبع لنا :


$$\ln K_a = -\frac{nF E_{cell}^{\circ}}{RT} \quad \dots \dots \quad (86)$$

أو بصيغة أسيّة :

$$K_a = \exp(nF E_{cell}^{\circ} / RT) \quad \dots \dots \quad (87)$$

ولقد ذكرنا من قبل أن تفاعل الأنود في خلية هو تفاعل أكسدة وتفاعل الكاثود هو اختزال ، ولكن ليس ضروريًا أن يكون تفاعل الخلية الكلي تفاعل أكسدة - اختزال وهذا يعني أن معادلة (86) هي ليست محددة فقط لتفاعلات أكسدة - اختزال .

أما أنواع ثابت الاتزان التي يمكن تعريفها من قياسات القوة الدافعة الكهربائية للخلية فتتضمن ثابت اتزان تفاعلات أكسدة - اختزال K_a ، وحاصل الإذابة (Solubility Product) K_{sp} وثابت تأين الماء K° وثابت تأين الحوماض K° والقواعد K° فمثلاً لتفاعل أكسدة - اختزال التالي :



نعطي E_{cell}° كما يلي :

$$E_{cell}^{\circ} = 0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$$

وعند تعويض هذه القيمة في معادلة (86) يتبع لنا :

$$\ln K_a = \frac{2(96493 \text{ Cmol}^{-1})(1.10 \text{ JC}^{-1})}{RT} = 85.6 \quad , \quad K_a = 1.5 \times 10^{37}$$

(حيث أن: $1V = 1J/C$) وهذا يعني أن:

$$K_a = \left(\frac{a(Zn^{2+})}{a(Cu^{2+})} \right)_e = 1.5 \times 10^{37}$$

وتبيّن أن أكسدة معدن الزنك واحتزاز أيونات النحاس ستستمر إلى أن تصبح النسبة $\frac{a(Zn^{2+})}{a(Cu^{2+})}$ في محلول تقريرًا 10^{37} . عندئذ سينخفض جهد الخلية E_{cell} إلى صفر بسبب وصول التفاعل إلى حالة الاتزان التام فإذا كان جهد احتزاز لقطب أو بالأخرى لنصف خلية: $M^{2+} + z_+ e \rightleftharpoons M$ أكبر ساليه أي له قيمة سالبة عالية، فسيكون هناك ميل أكبر للنصر M لأن يتأكسد وهكذا فإن عنصرًا سيحل في محلول محل تلك العناصر الواقعه تحته في الجدول، فالعناصر الواقعه فوق قطب الهيدروجين في الجدول ستزيح H^+ من محلول وستذوب مباشرة في الماء مولدة بذلك غاز H_2 .

مثال (7):

هل يمكن إزاحة النحاس والمغسيوم في محلولي $MgSO_4$, $CuSO_4$ المائين.

الحل:

من الجدول نحصل على:

$$E^\circ (Cu^{2+}, Cu) = -0.337 V, E^\circ (Mg^{2+}, Mg) = -2.37 V$$

$$E^\circ (Zn^{2+}, Zn) = -0.763 V$$

من هذه القيم يتضح أن قطب الزنك الاحتزالي لقياس أكبر ساليه من جهد قطب النحاس الاحتزالي القياسي وأقل ساليه من جهد قطب المغسيوم الاحتزالي القياسي، أي أن:

$$E^\circ (Zn^{2+}, Zn) > E^\circ (Cu^{2+}, Cu)$$

$$E^\circ (Zn^{2+}, Zn) < E^\circ (Mg^{2+}, Mg)$$

وبذل فإن الزنك يزكي النحاس ولا يمكنه ذلك مع المغسيوم. ولذلك يتم تعين حاصل



الإذابة K_{sp} للح AgCl عند درجة حرارة 25°C فإننا نحتاج خلية تفاعلها كالتالي :



ويمكن كتابة الخلية كما يلي :



ولها نكتب تفاعلات الأقطاب كالتالي :



حيث عند الأنود أي القطب الأيسر ، تأكسد الفضة ، وعند الكاثود أي القطب الأيمن فإن الفضة أي الموجودة في AgCl قد اخترلت ، ولذا فإن تفاعل الخلية الكلي هو ليس تفاعل أكسدة - اختزال . وبالاستعانة بالجدول نأخذ :

$$E^\circ_L (\text{Ag}^+, \text{Ag}) = 0.799 \text{ V} . E^\circ_R (\text{Cl}^-, \text{AgCl}, \text{Ag}) = 0.222 \text{ V}$$

وعندئذ ستكون E°_{cell} :

$$E^\circ_{cell} = E^\circ_R - E^\circ_L = 0.222 - 0.799 = - 0.577 \text{ V}$$

ولإيجاد K_{sp} نستخدم معادلة (86) :


$$\ln K_{sp} = \frac{1(96493 \text{ C mol}^{-1})(-0.577 \text{ V})}{(8.314 \text{ JK}^{-1})(298 \text{ K})} = -22.5 , \quad K_{sp} = 1.76 \times 10^{-10}$$

ويمكن تعريف الأحماض والقواعد حسب برونستد - لوري Bronsted - Lowry على أساس أن الحامض (HA) يعتبر مانح للبروتون والقاعدة (B) مستقبل للبروتون ولنأخذ التوارنات التالية :




حيث اعتبرت فعالية الماء = K_w^0 وقد أدخلت ضميناً في الثابت K_{a1}^0 . K_{a2}^0 وهذه الثوابت تعرف بثوابت التفكك .

وفي حالة الأحماض المتعددة البروتونات الحامضية مثل حامض H_2SO_4 الذي يمكنه منح أكثر من بروتون إلى مستقبل البروتونات ، فإن من الضروري التمييز بين ثابت التفكك الأول والثاني و..... الخ فمثلاً :



وبصورة عامة تكون $K_{a1}^0 > K_{a2}^0$ بسبب صعوبة إزاحة البروتون الثاني من HA^- وإن قوة حامض أو قاعدة في وسط ما يشار إليها من قيمة ثابت تفككه فالاحماض القوية هي المانحة القوية للبروتون وهذا تكون K^0 كبيرة والقواعد القوية هي المستقبلة القوية للبروتون وهذا تكون K^0 كبيرة .



منحازاً بصورة شبه كاملة نحو اليمين ($K_{a1}^0 \approx \infty$) ولكن حامض الخليل عند درجة حرارة $25^\circ C$ يكون $K_{a1}^0 = 1.8 \times 10^{-5}$ أمّا لقاعدة الأمونيا في الماء فيكون $K_{a2}^0 = 1.77 \times 10^{-5}$. وصحّيّ أنّ هذا الثابت ليس كبيراً لكنه أكبر بكثير من قيمة ثابت تفكك اليوريا في الماء ($K_{a1}^0 = 1.5 \times 10^{-14}$) وهي قاعدة أضعف بكثير من الأمونيا . كما إن المدى الواسع لقيم K_{a1}^0 ، K_{a2}^0 جعل من استعمالها بشكلها الحالي غير مرغوب به وقد تمكن التغلب على عدم الملاءمة هذه وذلك باستعمال الكمبتين التاليتين PK_{a1}^0 ، PK_{a2}^0 وهما محددان كما يلي :

$$PK_{a1}^0 = -\log K_{a1}^0 , \quad PK_{a2}^0 = -\log K_{a2}^0$$

ومن المعروف أن الماء يسلك حامض وقاعدة لذلك فإنه يوجد اتزان لتفكك بروتوني ذاتي **Autoprptolysis** أي :



حيث أن فعالية الماء تساوي واحد وقد أدخلت ضممتها في الثابت K_w° وعند درجة حرارة 25°C وجد أن $10^{-14} \times K_w^{\circ} = 1.008 \text{ mol kg}^{-1}$ ومنه نستنتج أن جزءاً صغيراً جداً من الماء قد تفكك وطالما أن تركيز الأيونات منخفضة فإننا نستطيع استخدام مولارية الأيونات بدلاً من فعاليتها، وسيكون :

$$K_w^{\circ} \approx \left(\frac{m(H^+)}{m^{\circ}} \right) \left(\frac{m(OH^-)}{m^{\circ}} \right), \quad (m^{\circ} = 1 \text{ mol kg}^{-1})$$

ونظراً لكون السائل متعادلاً كهربائياً فإن $m(OH^-) = m(H^+)$ وهكذا ستكون مولارية البروتونات بالماء النقي وعند درجة حرارة 25°C كالتالي :

$$m(H^+) \approx (K_w^{\circ})^{1/2} = 1.004 \times 10^{-7} \text{ mol kg}^{-1}$$

وتلعب مولارية البروتونات أو بالأخرى فعالية البروتونات دوراً أساسياً في العديد من العمليات الكيميائية وإن مقاديرها ضمن مدى واسع فمثلاً: نجد إن وجود حامض قوي عند مولارية تساوي 1 mol kg^{-1} يعطي بروتونات ذات مولالية تساوي 1 mol kg^{-1} تقربياً وفي الماء النقي تكون حوالي $10^{-7} \text{ mol kg}^{-1}$. أما وجود قاعدة قوية عند مولالية 1 mol kg^{-1} سيعطي $m(OH^-) \approx 1 \text{ mol kg}^{-1}$ وستنخفض مولالية البروتون إلى حوالي

$$\frac{K_w^{\circ}}{(1 \text{ mol kg}^{-1})} \approx 10^{-14} \text{ mol kg}^{-1}$$

إن هذا المدى الواسع في القيم يمكن اختزاله إلى مدى (0-14) وذلك باستخدام التعبير pH الذي في البداية كان يعرف على أساس أنه $-\log \left(\frac{m(H^+)}{(mol kg^{-1})} \right)$ ولكن الآن يعبر عنه بدلاله الفعلية وكما يلي :

$$\text{pH} = -\log a(H^+)$$

وبهذا أن فعالية البروتونات في الماء وعند درجة حرارة 25°C تساوي $a(H^+) = (K_w^{\circ})^{1/2} = 1.00 \times 10^{-7}$ لذا فإن pH تساوي 7.00 وتعود هذه القيمة إلى حالة

التعادل عند درجة حرارة 25°C . وفي محليل الحوامض المائية تكون (H^+) a أكبر مما في حالة الماء النقي وعندئذ ستكون pH أكبر من 7.00 ولأجل تعين pH نأخذ الخلية التالية :



والتي تتكون من قطب الكالوميل القطب الأيمن وقطب الهيدروجين المغمور في محلول المائي X حيث فعالية أيونات الهيدروجين لهذا محلول هي (H^+) a_x أما تفاعل الخلية فيكتب كما يلي :



أما القوة الدافعة الكهربائية لهذه الخلية ونرمز لها $E_{\text{cell.X}}$ انظر معادلة (63) كالتالي :

$$E_{\text{cell.X}} = E_{\text{J.X}} + E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{F} [\ln a_x(\text{H}^+) + \ln a(\text{Cl}^-) - \frac{1}{2}\ln \{ P(\text{H}_2)/P^{\circ} \}]$$

حيث $E_{\text{J.X}}$ يمثل جهد التماس أو جهد الالتقاء بين محلول X والمحلول المشبع من KCl والأآن إذا حضرنا خلية أخرى مائلة للأولى ما عدا أن محلول X قد استبدل بمحلول S . عندئذ نعطي القوة الدافعة الكهربائية لهذه الخلية كما يلي :

$$E_{\text{cell.S}} = E_{\text{J.S}} + E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{F} [\ln a_s(\text{H}^+) + \ln a(\text{Cl}^-) - \frac{1}{2}\ln \{ P(\text{H}_2)/P^{\circ} \}]$$

حيث (H^+) a_s فعالية H^+ في محلول S . وعند طرح المعادلتين نحصل على :

$$E_{\text{cell.X}} - E_{\text{cell.S}} = E_{\text{J.X}} - E_{\text{J.S}} - \frac{RT}{F} [\ln a_x(\text{H}^+) - \ln a_s(\text{H}^+)]$$

وبعد ترتيبها تصبح :

$$\frac{2.303 RT}{F} [-\log a_x(\text{H}^+) + \log a_s(\text{H}^+)] = E_{\text{cell.X}} - E_{\text{cell.S}} + E_{\text{J.S}} - E_{\text{J.X}}$$

وعند درجة حرارة 25°C نكتب هذه المعادلة بالصيغة التالية :

$$\text{pH}_{(\text{X})} = \text{pH}_{(\text{S})} + \frac{E_{\text{cell.X}} - E_{\text{cell.S}}}{0.0591} + \frac{E_{\text{J.S}} - E_{\text{J.X}}}{0.0591} \quad \dots\dots (89)$$

$$(\text{حيث أن } -\log a_s(H^+) = \text{pH}_{(S)}, -\log a_x(H^+) = \text{pH}_{(X)})$$

وإذا كان محلولان X , S مشابهين بدرجة مقبولة فإن جهد التقاء السائل $E_{J,S} \cdot E_{J,X}$ وسيكونان تقريباً متساوين وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إهمال الحد الأخير من المعادلة (89) لتصبح :

$$\text{pH}_{(X)} = \text{pH}_{(S)} + \frac{E_{\text{cell},X} - E_{\text{cell},S}}{0.0591} \quad \dots \dots (90)$$

في هذه المعادلة تمثل $\text{pH}_{(S)}$ قيمة pH المحددة لمحلول S القياسي وقيمة $\text{pH}_{(X)}$ لمحلول بفر المائي من m (NaHCO_3) = 0.25 mol/kg, m (Na_2CO_3) = 0.025 mol/kg هي 10.012 عند درجة حرارة 25°C وضغط 1 atm.

إن الـ $\text{pH}_{(S)}$ المحصل عليها وفقاً لمعادلة (90) مختلف لدرجة ما عن $-\log a_x(H^+)$ وذلك لأن الفرق بين جهد التقاء السائل ($E_{J,X} - E_{J,S}$) ليس صفرًا بالضبط وكذلك إن قيم $\text{pH}_{(S)}$ المعينة لمحاليل قياسية ليس بالتمام متساوية إلى ($-\log a_s(H^+)$). لذا فإن تعريف الـ pH المعطى في معادلة (90) هو بالأساس لإعطاء كمية يمكن قياسها بسهولة. عملياً وجد أن قطب الهيدروجين لا يكون ملائماً لقياسات في أنظمة الأكسدة والاختزال. أو في عدة محاليل غروية لذا استخدم قطب الزجاج بدليلاً يمكن الاعتماد عليه. وهنا نكتب تثبيل الخلية التخطيطي :



ثم يستبدل محلول X (محلول الـ pH) في الخلية أعلاه بمحلول منظم S قياسي (محلول بفر S) أما المعادلة التي تحدد الـ $\text{pH}_{(X)}$ فهي نفسها معادلة (90) أما لإيجاد ثابت تأين الحامض (K^*) فسوف نتابعه من خلال السؤال الحسابي التالي :

مثال (8) :

إذا كان لدينا الخلية التالية .



(حيث الأيون A^- هو أيون الخلات CH_3COO^-) والمطلوب :

1- أثبت أن :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\gamma(\text{Cl}^-) m(\text{Cl}^-) \gamma(\text{HA}) m(\text{HA}) K_a^{\circ}}{\gamma(\text{A}^-) m(\text{A}^-) m^{\circ}}$$



2- وعندما تكون القوة الأيونية الكلية (I) للالكترووليت مساوية إلى صفر فقد وجد عندها أن :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{m(\text{HA}) m(\text{Cl}^-)}{m(\text{A}^-) m^{\circ}} \right] = 0.2814 \text{ V} \quad (\text{at } 25^\circ \text{ C})$$

احسب قيمة K° لحامض الخليك عند درجة 25°C .

الحل:

أولاً : تشمل الخلية على قطب هيدروجين مع قطب Ag^+ , AgCl , Cl^- الذي يمثل نصف الخلية الآخر. وتشمل على الكترووليت يحتوي على مزيج من حامض الخليك وملح الصوديوم للحامض وكلوريد الصوديوم. والتفاعل العام للخلية هو :



ومعادلة نيرنست لهذا التفاعل تكتب كالتالي :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln [a(\text{H}^+) a(\text{Cl}^-)]$$

أما ثابت تفكك K° لحامض فيكتب كالتالي :

$$K_a^{\circ} = \frac{a(\text{H}^+) a(\text{A}^-)}{a(\text{HA})}$$

$$a(\text{H}^+) = \frac{a(\text{HA})}{a(\text{A}^-)} K_a^{\circ}$$

ومنها نحصل على :

وتصبح معادلة نيرنست بالصيغة التالية :

$$E_{cell} = E_{cell}^o - \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{a(HA) a(Cl^-) K_a^o}{a(HA)} \right] \quad \dots\dots (91)$$

وبما أن :

$$a(HA) = \left[\frac{m(HA)}{m^o} \right] [\gamma(HA)] \quad a(Cl^-) = \left[\frac{m(Cl^-)}{m^o} \right] [\gamma(Cl^-)]$$

$$a(A^-) = \left[\frac{m(A^-)}{m^o} \right] [\gamma(A^-)]$$

عندئذ يمكن إعادة كتابة معادلة (91) بالشكل التالي :

$$E_{cell} = E_{cell}^o - \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{\gamma(Cl^-) m(Cl^-) \gamma(HA) m(HA) K_a^o}{\gamma(A^-) m(A^-) m^o} \right]$$

أو بعد ترتيبها تصبح :

$$E_{cell} - E_{cell}^o + \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{m(HA) m(Cl^-)}{m(A^-) m^o} \right] = - \frac{RT}{F} \ln K_a^o - \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{\gamma(HA) \gamma(Cl^-)}{\gamma(A^-)} \right]$$

ثانياً : عند $\theta = 0$ تصبح معاملات الفعالية في الطرف الأيمن من المعادلة أعلاه متساوية إلى واحد وعندئذ يكون : $E = -0.0591 \log K_a^o$ (at $25^\circ C$) ومنها نحصل على :

$$K_a^o = 1.75 \times 10^{-5}$$

ثالثاً: معايرات قياس الجهد الكهربائي Potentiometric Titrations

يعرف فرع التحليل الكمي المتضمن حساب الموارد في محلول بواسطة قياس الجهد الكهربائي بالتحليل أو المعايرة البوتاسيوميتري والتي يمكن تسميتها بالمعايرة الجهدية الكهربائية ، والمعاييرات عادة تكون مصنفة إلى عدة أنواع . سنتناول هنا بعضها :

(أ) معايرات حامض - قاعدة : Acid - base titrations :

يمكن متابعة عملية المعايرات باستخدام قطب الأتيمون أو قطب زجاجي كما هو مبين في الخلية التالية :



وقطب الكالوميل هو قطب عكسي مع أيونات OH^- ويمكن كتابة تفاعل القطب :



أما القوة الدافعة الكهربائية لهذه الخلية E_{cell} فهي :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cal.}} - E_{\text{Anti.}} = E_{\text{cal.}} - (E^{\circ}_{\text{Anti.}} - \frac{RT}{F} \ln [\text{OH}^-])$$

ويتبين أن التغير في E_{cell} خلال فترة المعايرة يعتمد على التغير في تركيز أيون OH^- .

أما عملية المعايرة فتتم بإضافة محلول القاعدي من السحاحة إلى محلول الحامضي وبعد كل إضافة صغيرة تفاصيل E_{cell} . وعند نقطة التعادل تظهر زيادة في قيمة القوة الدافعة الكهربائية للخلية وذلك بسبب الزيادة في تركيز أيونات OH^- وإذا رسم هذا التغير في E_{cell} مقابل حجم القاعدة المضاف يعطينا منحنى يعرف بمنحنى المعايرة البوتاسيوميتية وله أكبر ميل عند نقطة التعادل.

وما يجدر ذكره هنا هو أن قطب الأتيمون لا يفضل استخدامه مع محليل حامضية أو قاعدية مرکزة وذلك بسبب تأثيرها على طبقة الأوكسيد (أي Sb_2O_3) الذي يغطي الأتيمون Sb .

أما الخلية المركبة من قطبي الزجاج والكالوميل (حيث سبق وأن ذكرناها) فهي :



أما E_{cell} لهذه الخلية ستكون :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cal}} - E_{(\text{Ag}, \text{AgCl}, \text{Cl}^-)} + E_{(\text{HCl}, \text{gl}, \text{X})}$$

$$= E_{\text{cal}} - E_{(\text{Ag}, \text{AgCl}, \text{Cl}^-)} + [\vartheta(\text{gl}, \text{X}) - \vartheta(\text{gl}, \text{HCl})] + \frac{2.303 RT}{F}$$

$$[\text{pH}_{(\text{x})} - \text{pH}_{(\text{HCl})}] = E_{\text{cal}} - E_{\text{gl}} + \left(\frac{2.303 RT}{F} \right) \text{pH}_{(\text{x})}$$


حيث تكون E_{gl} ثابتة بالنسبة لقطب زجاجي معين .

ويتضح أن E_{cell} تعتمد على تركيز أيون H^+ في محلول X . وهذا يعني أن مراقبة الـ pH (بواسطة جهاز قياس الأس الهيدروجيني pH meter) . سيساعدنا في تحديد نقطة التعادل .

(ب) معايرات أكسدة – اختزال Redox – Titrations :

إن أكسدة أيون Fe^{2+} بإضافة العامل المؤكسد أيون Ce^{4+} سيكون مثالنا هنا وإن التفاعل

الكلي هو :



ويمكن التعامل مع كل نوع من الأيونات على أساس نصف خلية وكما يلي :



أما ثابت الاتزان للتفاعل الكلي عند 25°C عندئذ سيساوي :

$$E^\circ_{\text{cell}} = \frac{RT}{F} \ln K$$

ومنها نحصل على :

$$(1.61 - 0.771) = 0.0591 \log K \quad \therefore K = 1.52 \times 10^{14}$$

ومن هذه القيمة يتبين أن اختيارنا للسيروم من أجل المعايرة هو اختيار سليم بسبب كبر قيمة ثابت التوازن وتوجه التفاعل بالاتجاه الناتج Fe^{3+} . وعند نقطة التعادل فقد أضيفت كمية كافية من Ce^{4+} لإزالة Fe^{2+} وبقى علينا مراقبة القوة الدافعة الكهربائية من أجل تشخيص نقطة التعادل هذه والخلية المستخدمة هنا تتركب من قطب مرجعي ملائم وغالباً ما يكون قطب الكالوميل ، وقطب آخر يتكون من مزيج المعايرة وقد غمرنا في هذا المزيج قطب البلاتين وقد ربطنا القطبان داخلياً بواسطة جسر ملحي من قطب الكالوميل .

إن وجود أيونات الحديد ستولد جهد قطب (Fe^{3+} , Fe^{2+}) ووجود أيونات السيريوم يعطي جهد قطب (Ce^{4+} , Ce^{3+}) E ولكن بما أن هذه الأيونات جميعها تشتراك في نفس القطب وأن القطب الواحد له جهد واحد فقط لذا يجب أن يكون الجهدان المذكوران أعلاه متساوين. ويمكننا عندئذ أن نكتب جهد القطب E عند أي مرحلة من المعايرة كما يلي :

$$E = E^\circ (\text{Ce}^{4+}, \text{Ce}^{3+}) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a(\text{Ce}^{4+})}{a(\text{Ce}^{3+})} \right)$$

$$= E^\circ (\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a(\text{Ce}^{4+})}{a(\text{Ce}^{3+})} \right)$$

والآن لو فرضنا أن كمية Fe^{2+} في البداية هي c . وعند إضافة Ce^{4+} سيؤدي إلى نقصان كمية Fe^{2+} إلى $(1-x)c$ وسيتكون بالمقابل cx من Fe^{3+} (حيث x تعتمد على كمية Ce^{4+} المضافة) . وعند آلية مرحلة وسطية من المعايرة سيكون للقطب جهد مساو إلى :

$$E = E^\circ (\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{cx}{c(1-x)} \right)$$

وإذا كانت x صغيرة جداً فإن الدالة $\frac{x}{1-x}$ ستتساوي تقريباً $\ln x$ وهو عدد كبير سالب أما عند جوار $\frac{x}{1-x} = 1$ فإن الدالة $\frac{x}{1-x}$ ستتساوي صفرًا في حين تكون الدالة كبيرة ومحبطة عندما تقترب x من الواحد ($1 \rightarrow x$) إن التغير في سلوك الدالة $\frac{x}{1-x}$ هذا يشير إلى أن جهد القطب عند البداية هو سالب، وعند إضافة Ce^{4+} يزداد هذا الجهد بسرعة ليقترب من ($E^\circ (\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+})$) وعند الاستمرار في إضافة Ce^{4+} فإن جهد القطب سيرتفع ببطء في بداية الأمر ومن ثم بالارتفاع الحاد، مبتعداً بذلك عن جهد القطب من منطقة ($E^\circ (\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+})$) وهي 0.771 V .

ويمكنا معرفة كم سيرتفع جهد القطب عالياً؟ حيث نجد أنه بعد إضافة كمية كافية من Ce^{4+} لإزالة Fe^{2+} ، يكون ممكناً متابعة جهد القطب بدلالة تركيز السيريوم أو بالأخرى

فعالية السيريوم فإذا افترضنا كمية Ce^{4+} المضافة هي w فإن الكمية الموجودة في محلول ستكون $c - w$ أي: تساوي كمية Ce^{4+} المضافة مطروحاً منه كمية Ce^{4+} المستهلكة لأكسدة كمية c من Fe^{2+} . أما كمية Ce^{3+} المتكونة فتساوي c . وبذل يمكّن أن نكتب جهد القطب كالتالي:

$$E = E^\circ (\text{Ce}^{4+}, \text{Ce}^{3+}) + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{\omega - c}{c} \right)$$

فعندما تكون كمية Ce^{4+} المضافة هي ضعف الكمية اللازمة للوصول إلى نقطة التعادل أي بكلمة أخرى عندما تكون $2c = w$ فإن جهد القطب سترتفع إلى $(E^\circ (\text{Ce}^{4+}, \text{Ce}^{3+}) + 1.7 \text{ V}$ وهذا واضح من المعادلة أعلاه.

حيث عندما تكون $2c = w$ فإن $\ln 1 = 0$ وعند إضافة كمية أكثر من $2c$ فإن \ln يزداد ببطء (والسبب هو عندما تكون $c < w$ فإن $\ln \frac{\omega - c}{c} \approx \ln w$ وإن w هي دالة تزداد ببطء مع زيادة w). وكل ما نحتاج إليه في تشخيص نقطة التعادل هو بلحظة التغير السريع في القوة الدافعة الكهربائية للخلية عندما يتقلّب جهد قطب البلاتين من منطقة $(\text{Ce}^{4+}, \text{Ce}^{3+})$ إلى $(\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+})$.

تطبيقات عملية للخلايا الكهروكيميائية :


(1) البطاريات : Batteries

إن كلمة بطارية تعني إما خلية جلفانية منفردة أو عدد من الخلايا الجلفانية المرتبطة على التوالي التي لها تكون الفولتية متساوية إلى مجموع فولتية الخلايا الجلفانية المرتبطة على التوالي. ويوجد نوعان من البطاريات :


النوع الأول : هو مركم (أو بطارية) الحزن الرصاصي **Lead Storage Battery**
النوع الثاني فهو خلايا ليكلانش الجافة **Leclanche' Dry Cells**

ومركم الرصاصي يتكون من ثلاثة أو سنت خلايا جلفانية مرتبطة على التوالي معطية قوة دافعة كهربائية كلية للبطارية مقدارها 6V أو 12V. وكل خلية جلفانية تتكون من قطب

رصاص وقطب ثانى أوكسيد الرصاص مغمورين في حامض الكبريتิก :



أما تفاعلات الأقطاب فهي :




أما النوع الثاني فيمتلك فولتية حوالي 1.6V ويتركب من علبة خارصين تحتوي على قطب كربون محاطاً بثاني أوكسيد المنجنيز والجرافيت مغموراً في عجينة نشا حاوية على كلوريد الخارصين وزيادة من كلوريد الأمونيوم الصلب أما تفاعلات الأقطاب فتكسب كما يلي :



(2) خلايا الوقود : Fuel Cells


في هذا النوع من الخلايا نقوم بتغذية الأقطاب باستمرار بالمواد المتفاعلة من خارج الخلية. والشكل التالي أدناه يعطي خلية وقود هيدروجين - أوكسجين الذي يكون تمثيلها التخطيطي :



والأقطاب المستعملة هنا مصنوعة من الجرافيت المسامي Graphite والذى يعتبر موصل جيد ، أما الغازين H_2 ، O_2 ، فاستمرار يدفعان ليتشرأ خلال مسامات القطب . وإن كل قطب يكون مشرأً بادة محفزة لتسريع تفاعل الأكسدة أو الاختزال . أما المحفزات المستخدمة فهي البلاتين أو الفضة أو أكاسيد فلزية والآن ماذا يحدث عند الأقطاب ؟ ونرى أنه يحدث عند مسامات الأنود أكسدة الهيدروجين H_2 إلى أيونات H^+ وفقاً للمعادلة $2e + 2H_2 \rightarrow 2H^+$ وإن أيونات H^+ الناتجة يتم معادلتها من قبل أيونات OH^- (من الألكتروليت) أي أن :



ويكون التفاعل النهائي عند الأنود كما يلي :



وعند الكاثود يختزل الأوكسجين كما يلي :





وسيكون التفاعل الإجمالي للخلية :



والقوة الدافعة الكهربائية للخلية هي : V_1 .

وقد استخدم في بعض خلايا الوقود هيدروكربونات (مثل C_2H_6 ، CH_4 وغيرها) كوقود محل الهيدروجين . فإذا استخدما البروبان C_3H_8 محل H_2 فستكون تفاعلات الأقطاب الخلية الكلي كما يلي :



إن أكسدة الهيدروكربون يتطلب وجود Pt كعامل مساعد عفز وبسبب كلفته العالية

جعل إنتاج هذا النوع من الخلايا عملياً غير اقتصادي . أما خلايا وقود هيدروجين - أوكسجين فقد استخدمت في السفن الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية لتجهيز الطاقة للتتدفئة والإتارة والاتصالات الراديوية . كما أن الماء الناتج من تفاعل الخلية فيختبر إلى خارج الخلية ومن ثم يجري تكثيفه لأجل استخدامه للشرب من قبل الملائين .

مثال (9) :

إذا كانت القوة الدافعة الكهربائية $E_{cell.Xx}$ عند درجة حرارة 25°C للخلية التالية :



تساوي 0.612 V . وعند استبدال محلول X بمحلول بفرفوسفات القياسي (التي يمتلك pH مساوية إلى 6.86) أصبحت القوة الدافعة الكهربائية $E_{cell.S}$ مساوية إلى 0.741 V أوجد pH محلول X .


الحل :

نستخدم معادلة (90) :

$$\text{pH}_{(\text{X})} = \text{pH}_{(\text{S})} + \frac{E_{cell.X} - E_{cell.S}}{0.0591} = 6.86 + \frac{(0.612 - 0.741)}{0.0591} = 4.86$$

مثال (10) :

عندنا خلية ذات التمثيل التخطيطي التالي :



المطلوب :

أولاً: وضح أن :

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}^+) a(\text{Cl}^-)$$

ويبين أيضاً أن :

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{\gamma(Cl^-) m(Cl^-) K_w^{\circ}}{\gamma(OH^-) m(OH^-)} \right]$$

حيث $w K^{\circ}$ هو ثابت تأين الماء .


ثانياً : وعندما تكون القوة الأيونية الكلية للإلكترووليت (المكون من مزيج NaOH ، NaCl) مساوية لصفر فقد وجد عندما أن :

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{m(Cl^-)}{m(OH^-)} \right] = 0.8279 \text{ V (at } 25^{\circ}\text{C})$$

احسب $w K^{\circ}$ عند درجة حرارة 25°C .

الحل :

1) تفاعل الخلية هو :



ومعادلة نيرنست لهذا التفاعل هو :

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}^+) a(\text{Cl}^-)$$

أما $w K^{\circ}$ (الحاصل الأيوني للماء) فيعطي كالتالي : (

$$a(\text{H}^+) = \frac{K_w^{\circ}}{a(OH^-)}$$

ومنها نكتب

وتصبح معادلة نيرنست كما يلي :

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{a(Cl^-) K_w^{\circ}}{a(OH^-)} \right]$$

$$a(\text{Cl}^-) = \left[\frac{m(Cl^-)}{m^{\circ}} \right] [\gamma(\text{Cl}^-)]$$

ويآأن :

$$a(OH^-) = \left[\frac{m(OH^-)}{m^{\circ}} \right] [\gamma(OH^-)]$$

عندئذ تعيد كتابة معادلة نيرنست بالصيغة التالية :

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \left[\frac{\gamma(Cl^-) m(Cl^-) K_w^{\circ}}{\gamma(OH^-) m(OH^-)} \right]$$

(2) وبعد ترتيبها تكون :

$$E_{\text{cell}} - E_{\text{cell}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{m(Cl^-)}{m(OH^-)} \right] = - \frac{RT}{F} \ln K_w^{\circ}$$

$$- \frac{RT}{F} \ln \left[\frac{\gamma(Cl^-)}{\gamma(OH^-)} \right]$$

وعندما تكون القوة الأيونية متساوية لصفر فهذا يعني أن جميع معاملات الفعالities (γ) تكون متساوية إلى واحد وعليه تختزل المعادلة الأخيرة إلى الصيغة التالية :


$$0.8279 \text{ V} = - 0.0591 \log K_w^{\circ} \quad (\text{at } 25^\circ \text{C}) \quad \therefore K_w^{\circ} = 1.003 \times 10^{-4}$$

مثال (11) :

احسب القوة الدافعة الكهربائية E_{cell}° خلية وقود (بروبان - أكسجين) عكوسية العمل . على أن ΔG° للبروبان والأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون والماء هي $- 23.49$ ، $- 394.38$ ، 0.0 ، $- 237.19$ (وبحدات kJ mol^{-1}) على التوالي عند درجة حرارة 25°C . 1 atm وضغط

الحل :

إن التفاعل الكيميائي لهذه الخلية هو :



$$\begin{aligned} \Delta G^{\circ} &= \text{للتفاعل} = 3\Delta G^{\circ}_{(\text{CO}_2)} + 4\Delta G^{\circ}_{(\text{H}_2\text{O})} - \Delta G^{\circ}_{(\text{C}_3\text{H}_8)} - 5\Delta G^{\circ}_{(\text{O}_2)} \\ &= 3(-394.38) + 4(-237.19) - (-23.49) - 0.0 \\ &= -2108 \text{ kJ mol}^{-1} = -2108 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1} \end{aligned}$$

هذا التفاعل يتضمن انتقال 20 الكترون .

والأآن نستخدم معادلة (78) :

$$\Delta G^\circ = - nF E_{\text{cell}}^\circ$$

$$E_{\text{cell}}^\circ = - \frac{\Delta G^\circ}{nF} = - \frac{(-2108 \times 10^3 \text{ mol}^{-1})}{20 (96493 \text{ C mol}^{-1})} = 1.092 \text{ V} \quad \text{أو :}$$

(3) الفولتية الإضافية : Over voltage :

إن العمليات التي تحدث عند الأقطاب هي عمليات ديناميكية لأن الالكترونات تنتقل باستمرار في كلا الاتجاهين أي من القطب إلى محلول أو من محلول إلى القطب ، وعندما يكون القطب - محلول في حالة توازن فإن الالكترونات تستمر بالانتقال ولكن المحصلة النهائية هي صفر . وعلى النقيض من ذلك فإنه عندما تكون خلية متتجة تياراً فسيكون هناك عدم موازنة بالانتقالات ، أي سيكون هناك محصلة انتقالات من الالكترونات تتجه أما نحو محلول (مصاحبة للاختزال عند الكاثود) أو نحو القطب (مصاحبة للأكسدة عند الأنود) . ومن هذا يتضح أن انتقال التيار النهائي للقطب يعتمد على المدار الذي عنده مختلف فرق الجهد عند القطب η . هذا الفرق يعرف بالفولتية الإضافية أو الجهد الإضافي (وعادة يرمز لها η) فإذا نكتب :

$$\eta = \Delta \phi - \Delta \phi_0 \quad \dots \dots \quad (92)$$

وإذا أردنا أن نتحت تياراً للانتقال خلال خلية (وكما هو الحال عندما يراد ترسيب معدن على آخر) يجب تسلیط فرق جهد أكبر من قيمة التوازن (يعني بقيمة التوازن هي قيمة فرق الجهد عند حالة التوازن) من أجل الحصول على انتقال صاف للتيار . وإن مقدار التيار المتقل (وبالتالي مقدار ترسيب المعدن أو مقدار الغاز المتحرر) تعتمد على هذا الجهد الإضافي .

وقد استطاع بتلر Butler وفولمر Volmer من إيجاد علاقة كمية تربط التيار (أو بالأخرى كثافة التيار) بالجهد الإضافي وكما هو معبّر عنه بمعادلة بتلر - فولمر التالية :

$$j = j_e [e^{-a\eta F/RT} - e^{(1-a)\eta F/RT}] \quad \dots \dots \quad (93)$$

حيث أن :

- ٤) هي كثافة التيار النهاية أو الصافية (Net Current Density)
- ٥) هي كثافة التيار الأنودية أو التيار الأنودي (Anodic Current)
- ٦) هي كثافة التيار الكاثودية أو التيار الكاثودي (Cathodic Current)
- ٧) فتعرف بكثافة تيار التبادل (Exchange Current Density)

أما α فتدعي بمعامل الانتقال Transfer Coefficient أو عامل التمايل Symmetry Factor وقيمتها تقع ضمن المدى من صفر إلى واحد. وقد وجد عملياً أنه غالباً يكون حوالي 0.5 . ويمكن كتابة معادلة بتلر - فولمر (93) بصيغ أخرى وذلك بالاعتماد على قيمة الجهد الإضافي وكما يلي :

- إذا كان الجهد الإضافي (η) صغيراً جداً (أقل من 0.01V) فيمكن فتح الحدود الأساسية في معادلة (94) باستخدام $x \sim e^{\eta F / RT}$ وبذلذا تصبح معادلة (93) كالتالي :

$$j \approx j_e [1 - (\alpha \eta F / RT)] - [1 + (1 - \alpha) \eta F / RT] \approx - j_e \eta F / RT \dots\dots (94)$$

مثال (12) :

إذا كانت كثافة تيار التبادل للقطب $Pb | H_2$ هي 0.79 m A cm^{-2} فـما هو التيار المتقل خلال قطب قياسي مساحته الكلية هي 5cm^2 على أن فرق جهد القطب ($\Delta\theta$) يساوي 5 وفعالية أيونات H^+ تساوي واحد وإن درجة حرارة هي 25°C .

الحل :

إن فرق الجهد لقطب الهيدروجين (حيث $\alpha = 1$) عند التوازن ($\Delta\theta_e$) يساوي صفراء، عندئذ :

$$\eta = \Delta\theta - \Delta\theta_e = 5 \text{ m V} = 0.005 \text{ V}$$

والآن نستخدم معادلة (94) لإيجاد كثافة التيار النهاية j :

$$j = - (0.79 \text{ mA cm}^{-2}) (0.005 \text{ V}) \left[\frac{(96493 \text{ C mol}^{-1})}{(8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1})(298 \text{ K})} \right]$$

$$= - 0.154 \text{ mA cm}^{-2}$$

والأآن نحوال كثافة التيار j إلى تيار I وذلك باستخدام معادلة (81) :

$$= j \frac{I}{A} \quad (\text{حيث } A \text{ هي مساحة القطب})$$

$$I = jA = (-0.154 \text{ mA cm}^{-2}) (5 \text{ cm}^2) = -0.77 \text{ mA}$$

إن وجود الإشارة السالبة أمام مقدار التيار يعني أن الانتقال من القطب وليس إليه (أي بعيداً عنه) .

ثانياً : إذا كان الجهد الإضافي كبيراً (أكبر من حوالي 0.1V) فسوف تأخذ معادلة (93) الصيغة التالية :

أ- إذا كان η كبيراً وموججاً فإن الحد الأسني الأول في معادلة (93) سيكون أصغر بكثير من الحد الأسني الثاني ولذلك فسوف نهمل الحد الأول وستصبح معادلة (93) كما يلي :

$$j \approx j_e e^{(\eta F / RT)}$$

وإذا كنا نريد مقدار كثافة التيار النهائية فقط يمكننا إهمال الإشارة السالبة، أي نكتب :

$$j \approx j_e e^{(\eta F / RT)} \quad \dots \dots \quad (95)$$

وإذا أخذنا اللوغاريتم لطرفي هذه المعادلة نحصل على :

$$\ln j \approx \ln j_e + (1 - \alpha) \eta F / RT \quad \dots \dots \quad (96)$$

وإذا رسمنا لوغاريتم كثافة التيار j مقابل الجهد الإضافي η (هذا الرسم يعرف بمخطط تافيل البياني Tafel plot) سيعطي كثافة تيار التبادل j_e وذلك من تقاطع الخط البياني مع محور التيار مع معامل التكامل α فيحصل عليه من ميل الخط البياني إذا كان الجهد الإضافي كبيراً وسالباً فسيكون الحد الأسني الأول في معادلة (93) هو المهم

(ويحمل الحد الأسّي الثاني) وعندئذ تختزل معادلة (93) للصيغة التالية : $j \approx j_e e^{-\alpha \eta F RT}$ وسيعتمد خطط تafيل البيانات على :

$$\ln j \approx \ln j_e - \alpha \eta F RT \quad \dots \dots \quad (97)$$

مثال (13) :

لقطب بلاتين (مساحته 2 cm^2) مغمور في محلول Fe^{2+} , Fe^{3+} عند درجة حرارة 25°C ندون النتائج التالية :

$\eta (\text{mV})$	50	100	150	200	250
$I (\text{mA})$	8.8	25.0	58.0	131	298

أُوجد كثافة تيار التبادل j ومعامل الانتقال α للعملية التي تحدث عند القطب .


الحل :

نحوّل التيار الموجودة في النتائج المدونة أعلاه إلى كثافة التيار وذلك بقسمة كل من قيم I على مساحة القطب ($I = j A$) وكذلك نأخذ لوغاريتم وتصبح النتائج بالشكل التالي :

$\eta (\text{mV})$	50	100	150	200	250
$\ln j (\text{mA cm}^{-2})$	4.4	12.5	29.0	65.4	149
$\ln j (\text{mA cm}^{-2})$	1.50	2.53	3.37	4.18	5.00

أما العملية التي تحدث عند القطب (تفاعل تفريغ) فيمكن التعبير عنها بالشكل $\text{Fe}^{2+} + e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ وهي تتضمن انتقال أحدى الألكترون في الخطوة المحددة لسرعة هذه العملية .

والآن نستخدم معادلة (96) لرسم خطط تafيل البيانات بين $\ln j$ مقابل η وعند عمل هذا فإننا سنحصل على الرسم التالي :



وتعطي منطقة الجهد الإضافي العالية خطًا مستقيميًّا يقطع المحور العمودي عند 0.916 mA cm^{-2} أما الميل فيساوي 0.0163 (mV)^{-1} وهذا يعني أنه من المدار الأول نحصل على :

$$\ln j_e = 0.916$$

$$j_e = 2.5 \text{ mA cm}^{-2}$$

ومن المدار الثاني يكون عندنا

$$(1 - \alpha) F/RT = 0.0163$$

وعند درجة حرارة 25°C تكون قيمة α كالتالي :

$$(1 - \alpha) \left[\frac{(96493 \text{ C mol}^{-1})}{(8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1})(298 \text{ K})} \right] = 0.0163 \times 10^3 \text{ V}^{-1}$$

$$1 - \alpha = 0.42$$

$$\therefore \alpha = 0.58$$

قياس الجهد الإضافي عمليًا :

إن الطريقة النموذجية لقياس الجهد الإضافي عمليًا تتضمن استخدام الأجهزة هذه الأجهزة تحتوي على ثلاثة أقطاب، ويسمى المعنى (الذي هو تحت الدراسة) بقطب التشغيل Working Electrode . أما التيار المتقلل من هذا القطب أو إليه ف يتم السيطرة عليه من مصدر خارجي، وإذا كانت مساحة القطب A والتيار هو I فإن كثافة التيار المارة خلال سطح القطب المغمور في محلول هي $\frac{I}{A}$ أما فرق الجهد لهذا القطب فلا يمكن قياسه مباشرة وإنما يمكن تعينه نسبة إلى القطب الثالث (وهو قطب مرجعي Reference Electrode) .

وفي البداية نقيس فرق الجهد العكوسى لقطب التشغيل نسبة إلى قطب الكالوميل بواسطة جهاز مقاييس الجهد عند حالة عدم مرور تيار خلال خلية التحلل الكهربائي. وعندما نغير التيار المتنقلة خلال دائرة التشغيل الكهربائية فإن هذا سوف يسبب في تغيير جهد قطب التشغيل .

وإن فرق الجهد الجديد لهذا القطب نسبة إلى قطب الكالوميل يمكن قياسه أيضاً من البوتاسيومير. والفرق بين القيمتين يعطى الجهد الإضافي. أما عندما نستمر بالتغيير في كمية التيار فإننا سنحصل بالمقابل على قيم مناظرة لها من الجهد الإضافي. وعندئذ نستطيع رسم خطوط تأليل البيانات الذي منه حصلنا على قيم عامل التهائل α وكثافة تيار التبادل J .

ووجد أن الأقطاب التي تمتلك فروق جهد ذات قيم تعتمد اعتماداً ضعيفاً على كمية التيار المار خلال هذه الأقطاب تسمى بالأقطاب غير المستقطبة Non-Polarizable Electrodes . أما تلك المعتمدة - اعتماداً قوياً على كمية التيار فتدعى بالأقطاب المستقطبة Polarizable Electrodes . ووفقاً لمعادلة (94) التي يمكن إعادة كتابتها بالصيغة التالية :

$$\eta \approx \left(\frac{RT}{F} \right) \left(\frac{j}{j_0} \right)$$

كما يتضح أن معيار الاستقطابية المنخفضة هو كثافة تيار تبادل J_0 عال (بحيث η يمكن أن تكون صغيرة حتى ولو كانت كبيرة) والأقطاب غير المستقطبة تمتلك تركيباً يسمح بتنظيم الشحنة بسرعة كبيرة. وتعتبر أقطاب الكالوميل و H_2 / Pt أقطاب عالية الاستقطاب. وهو أحد الأسباب التي جعل استخدامها واسعاً في قياسات الكيمياء الكهربائية عند حالة التوازن .


أمثلة محلولة

مثال (14) :

لقد وجد للخلية $Cu | CuCl_2(m) | AgCl | Ag$ عند درجة حرارة $25^\circ C$ بأن القوة الدافعة الكهربائية تساوي $V = 0.191$ عندما تكون $m = 10^{-4}$ وتساوي $V = 0.074$ في حالة

$m = 0.2$ والمطلوب كتابة تفاعلات القطبين والخلية الإجمالي ثم حساب معدل معامل الفعالية
 $0.2m \text{ CuCl}_2$


الحل:



تفاعل الأنود :



تفاعل الكاثود :



تفاعل الخلية الإجمالي

ومن معادلة نيرنست تكتب :

$$E = E^\circ - \frac{0.059}{2} \log [a(\text{Cu}^{2+}) \{a(\text{Cl}^-)\}^2]$$

$$= E^\circ - 0.0295 \log (\gamma^3 [\text{Cu}^{2+}] [\text{Cl}^-]^2)$$

$$= E^\circ - 0.0295 \times 3 \log \gamma - 0.0295 \log ([\text{Cu}^{2+}] [\text{Cl}^-]^2)$$

والآن نأخذ الحالة الأولى عندما تكون $m = 10^4$ وهذا يكون مقبولاً إذا اعتبرنا γ متساوية

لوحد وعندئذ :

$$0.191 = E^\circ - 0.0295 \log ((10)^4 (2 \times 10^{-4})^2) = E^\circ + 0.335$$

ومنها نحصل على :

$$E^\circ = -0.144 \text{ V}$$

ونأخذ الحالة الثانية حيث $m = 0.2$


$$-0.074 = -0.144 - 0.0295 \times \log \gamma - 0.0295 \log ((0.2) (2 \times 0.2)^2)$$

ومنها نحصل على :

$$\log \gamma = -0.295 , \quad \gamma = 0.51$$

مثال (15) :

من النتائج المدونة أدناه احسب ثابت التوازن K للتفاعل :



Half-Cell	نصف الخلية	E°
Au	$\text{Au}^+ + e^-$	- 1.68
Au	$\text{Au}^{3+} + 3e^-$	- 1.50
Fe^{2+}	$\text{Fe}^{3+} + e^-$	- 0.77

الحل:

$$\begin{aligned} 1) \text{Au} &= \text{Au}^+ + e^- & E^\circ_1 &= - 1.68 \\ 2) \text{Au} &= \text{Au}^{3+} + 3e^- & E^\circ_2 &= - 1.50 \\ 3) \text{Au}^+ &= \text{Au}^{3+} + 2e^- & E^\circ_3 &= - (3E^\circ_2 - E^\circ_1) \\ &&&= - (3(-1.50) - (-1.68)) / 2 \\ &&&= (-4.50 + 1.68) / 2 \\ &&&= - 1.42 \end{aligned}$$

(ملاحظة المعادلة (3) أعلاه، نتجت من طرح معادلة (1) من معادلة (2) أما وزن أي من E° أعلاه فيتحدد بالاعتماد على عدد الالكترونات الموجودة في تفاعل نصف الخلية حيث ضربنا E°_1 بواحد و E°_2 بثلاثة و E°_3 باثنين).

أما الآن فلتتفاعل :



$$E^\circ = \frac{0.059}{n} \log K \quad 0.65 = \frac{0.059}{2} \log K$$

$$\log K = 22 \quad K = 10^{22}$$

مثال (16):

ما هو تركيز Ag^+ (الموجودة في محلول يجري 0.1 m Cu^{2+}) الذي عنده يتربّض المعدنان (الفضة والنحاس) سوية في عملية الترسّب الكهربائي عند درجة حرارة 25°C علىَّا بأن معامل الفعالية لـ Ag^+ , Cu^{2+} يمكن اعتبارها هما متّهاللة وتساوي 0.8 أما قيم E° فهي :



الحل:

حتى يتربس المعذنان سوية فإنه يجب أن يكون جهد الاختزال (أو الأكسدة) لكلاهما متساوين أي:

$$E_1 = E^{\circ}_{\text{Cu/Cu}^{2+}} - \frac{0.059}{2} \log a_{\text{Cu}^{2+}}$$

$$E_2 = E^{\circ}_{\text{Ag/Ag}^+} - \frac{0.059}{2} \log (a_{\text{Ag}^+})^2 , \quad E_2 = E_1$$

$$-0.345 - \frac{0.059}{2} \log a_{\text{Cu}^{2+}} = -0.80 - \frac{0.059}{2} \log (a_{\text{Ag}^+})^2$$

$$-0.345 + 0.80 = \frac{0.059}{2} \log \frac{a_{\text{Cu}^{2+}}}{(a_{\text{Ag}^+})^2}$$

$$= \frac{0.059}{2} \log ([\text{Cu}^{2+}] / [\text{Ag}^+]^2) + \frac{0.059}{2} \log \frac{1}{0.8}$$

ومنها نكتب:

$$\log ([\text{Cu}^{2+}] / [\text{Ag}^+]^2) = 15.4$$

$$[\text{Cu}^{2+}] / [\text{Ag}^+]^2 = 2.5 \times 10^{15}$$


$$[\text{Ag}^+] = 6.3 \times 10^{-9}$$

مثال (17):

أوجد للخلية $\text{Ag} | \text{Ag}_2\text{SO}_4 | \text{H}_2\text{SO}_4 (0.1 \text{ M}) | \text{H}_2 (1 \text{ atm}) | \text{Pt}$ عند درجة حرارة 25°C تساوي $E^\circ = 0.7 \text{ V}$ ، - 0.63 V - على التوالي. احسب الفرق $E^\circ - E$ عند درجة حرارة 35°C .

الحل:

نكتب أول تفاعل الخلية الإجمالي كالتالي :



ونكتب معادلة نيرنست :

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln [\prod (a_i)^{1/n}]$$

إن $\left(\frac{E}{E^{\circ}} \right)_{\text{نف}} = 1$ [نفسها لا تتغير مع تغير درجة الحرارة]

وهذا يؤدي إلى أن $E^{\circ} - E$ تغير مع درجة الحرارة T وعندئذ نكتب :


$$\frac{(E - E^{\circ})_{298}}{(E - E^{\circ})_{368}} = \frac{298}{308}$$

ومنها نحصل على :

$$(E - E^{\circ})_{368} = (-0.7 + 0.63 \times \frac{298}{308}) = -0.072 \text{ V}$$

مثال (18) :

عندنا الخلية ذات المخطط التالي :



حيث $E^{\circ} = 0.66 \text{ V}$ عند درجة حرارة 25°C لتفاعل :



والمطلوب :

أ- كتابة تفاعلات القطبين والخلية الإجمالي .

ب- حساب القوة الدافعة الكهربائية للخلية عند 25°C (وأهل تأثيرات معامل الفعالية) .

ج- إذا ازداد تركيز KCl من 0.01 m إلى 0.1 m فهل ستكون نتيجة الفقرة (ب) أعلى في زيادة أو نقصان أو من دون تغير .

الحل :

أ) تفاعل الأنود : $2\text{Sb} + 6\text{OH}^- \rightarrow \text{Sb}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} + 6\text{e}^-$

تفاعل الكاثود : $6\text{H}^+ \text{ (in m OH)} + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2 \text{ (1 atm)}$



ب) ونكتب الآن معادلة نيرنست لتفاعل الخلية الإجمالي .

$$E_{cell} = E^\circ Sb | Sb_2O_3 - \frac{0.059}{6} \log \frac{1}{(H^+)^6 (OH^-)^6}$$

أو :

$$E_{cell} = 0.6 + 59 \log K_w = - 0.17V$$

(ملاحظة: لقد عرضنا عن $(OH^-)(H^+)$ بـ H^- (الحاصل الأيوني) وهو يساوي 10^{-14}).

إن ازدياد تركيز KCl سوف (وفقاً لقانون التحديد لدبليا - هيكل):

وهو القانون الذي يوضح العلاقة بين معدل معامل الفعالية الأيونية والقدرة الأيونية) ينخفض σ ($L^- H^+, OH^-$). وعلى اعتبار أن K_w هو بالأساس ثابت الترموديناميكي عند ذلك للالكترووليت في تركيز $0.1m$ سيكون حاصل ضرب التركيزين. $(OH^-)(H^+)$ ينبغي أن تكون أكبر من 10^{-14} وهذا يتوقع الجواب في الفقرة (ب) أن يكون في زيادة (أي يكون موجباً أكثر من $-0.17V$).

مثال (19):

عندنا الخلية التالية :




(حيث يشير الخط المنقطع إلى التقاطع السائل (liquid junction

: والمطلوب

أ) كتابة تفاعلات القطبين والخلية الإجمالي.

ب) إيجاد القراءة الدافعة الكهربائية لهذه الخلية عند $25^\circ C$ إذا كان عدد الانتقال $t_e = 0.40$ لمحلوبي $NaCl$. وإن معدل معامل الفعالية لمحلوبي $NaCl$ يساوي 0.60 (ولمحلوبي $0.001 m NaCl$ يساوي واحد).

ج - كم ستكون القراءة الدافعة الكهربائية لهذه الخلية عندما يزال الجهد الناشئ من التقاطع السائل.



جـ :

أ) تفاعل الأنود :






تفاعل الكاثود :

من الانتقال :



تفاعل الخلية الإجمالي :



(ب)

$$E_{\text{cell}} = - \frac{0.059}{1} \log \left[\frac{(0.001)^2 (\gamma_{\pm})_{0.001}^2}{(0.1)^2 (\gamma_{\pm})_{0.1}^2} \right]$$

$$= - 0.059 \times 0.40 \log \left[\frac{10^{-6} \times 1}{10^{-2} \times 0.36} \right] = 0.84 \text{ V}$$

ج) وإذا أهملنا ذلك الجزء من تفاعل الخلية الناشئ من الانتقال (وهذا يمثل إهمالنا لجهد التقاء السائل) فإنه نحصل على :

$$E = - 0.059 \log \left[\frac{0.001}{0.1} \right] = 0.118 \text{ V}$$

(ملاحظة : من الضروري إهمال معاملات الفعالية هنا لأننا لا نملك قيم معاملات الفعالية

لـ أيون واحد أي لا نملك γ_+ وإنما γ_-) .

مثال (20) :

Pt | H₂ (1 atm) | NaOH (m) | HgO(s) | Hg وجد للخلية التالية :

إن القوة الدافعة الكهربائية عند درجة حرارة 25°C تساوي 0.924 V

المطلوب :

أ) كتابة تفاعلات القطبين وال الخلية الإجمالي.


ب) حساب E_{cell}° عند درجة حرارة 25°C (أو 298 K).

ج) حساب E_{cell} عند درجة حرارة 35°C (أو 308 K) إذا كانت ΔH لتفاعل الخلية تساوي - 35k Cal.


د) بين باختصار ماذا سيحدث للقوة الدافعة الكهربائية إذا أضفنا كميات صغيرة من حامض التريك لكي يعادل جزئياً القاعدة NaOH.

ملاحظة : إن E_{cell}° لـ Hg²⁺ | Hg تساوي - 0.854 V


الحل :



تفاعل الأنود :



تفاعل الكاثود



تفاعل الخلية الإجمالي

ب) كما هو واضح من تفاعل الخلية الإجمالي أعلاه بأن جميع الأنواع المشتركة فيه هي مواد نقية لها فعالية تساوي واحداً وهذا يعني أن الحد اللوغاريتمي في معادلة نيرنست سيساوي صفرًا، أي أن :

$$E_{cell}^{\circ} = E_{cell} = 0.724 \text{ V at } 25^\circ\text{C (or 298 K)}$$

$$\Delta H = -35 \text{ kcal} = 35000 \text{ cat} = -147000 \text{ J} \quad \text{(ج)}$$

(حيث أن $1J = 0.23g \text{ cat}$:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$- nFE = \Delta H - T\Delta S$$

عند 25°C

$$- 1 \times 96500 \times 0.924 = - 147000 - 298 \times \Delta S$$

ومنها نحصل على :

$$\Delta S = - 195 \text{ J}$$

أما الآن فعند 35°C :

$$\Delta G = - 147000 - 308 \times (- 195) = - 87500 \text{ J}$$


$$\Delta G = - nFE, - 87500 = - 1 \times 96500 \times E, E = 0.91 \text{ V at } 35^\circ\text{C}.$$

د) طالما أن HgO_2 بقي ثابتاً، فإن التعادل الجزئي ل hidroxid الصوديوم NaOH سوف لا يؤثر في تفاعل الخلية الإجمالي.

(لاحظ أن $[\text{OH}^-]$ لا تظهر في تفاعل الخلية الإجمالي).

مثال (21) :

عندنا الخلية التالية :



وإن $E^{\circ}_{\text{Cd}/\text{Cd}} = 0.4 \text{ V}$ عند درجة حرارة 25°C تساوي 0.4 V

والمطلوب :

أ) كتابة تفاعلات النطرين والخلية الإجمالي.


ب) حساب حاصل الإذابة K_{sp} لـ Cd(OH)_2 .

ج) حساب ΔH لتفاعل الخلية $^1 \text{K}^\circ$.

الحل :



: أو



ب) والآن نكتب معادلة نيرنست عند درجة حرارة 25°C لهذه الخلية كالتالي :

$$E_{\text{cell}} = 0.0 = E^{\circ}_{\text{Cd/Cd}^{2+}} - \frac{0.059}{2} \log \frac{[\text{Cd}^{2+}]}{[\text{H}^+]^2}$$

أما حاصل إذابة (K_{sp}) هيدروكسيد الكادميوم (Cd(OH)_2) فيعبر عنه كالتالي :

$$K_{sp} = [\text{Cd}^{2+}][\text{OH}^-]^2 \quad \text{or} \quad [\text{Cd}^{2+}] = K_{sp}/[\text{OH}^-]^2$$

وبذل نكتب معادلة نيرنست أعلاه بالصيغة التالية :

$$0.0 = 0.4 - \frac{0.059}{2} \log \frac{K_{sp}}{[\text{H}^+]^2 [\text{OH}^-]^2}$$

$$0.0 = 0.4 - \frac{0.059}{6} \log \frac{K_{sp}}{K_w^{sp}} \quad \text{أو :}$$

ومنها نحصل على :

$$\frac{K_{sp}}{K_w^{sp}} = 3.5 \times 10^{13} \quad \text{or} \quad K_{sp} = 3.5 \times 10^{-15} \quad , \quad \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\cdot nFE = \Delta H - T \left(nF \left(\frac{dE}{dT} \right) \right)$$

$$0 = \Delta H - 298 (2 \times 96500 \times 0.002)$$


$$\Delta H = 115000 \text{ J}$$

ومنها نحصل على :


مثال (22):

أُوجد للتفاعل $\text{Ag} + \text{I}^- = \text{AgI} + \text{e}^-$ عند درجة حرارة 25°C أن $E^\circ = 0.152 \text{ V}$ وللتفاعل $\text{Ag} = \text{Ag}^+ + \text{e}^-$ تساوي 0.80 V فاحسب حاصل إذابة K_{sp} لورديد الفضة AgI .

الحل:




وبطريق المعادلين من بعضهما البعض نحصل على :



$$-0.952 = \frac{RT}{F} \ln K_{sp} = 0.059 \log K_{sp} \quad K_{sp} = 1.2 \times 10^{-17}$$

الثالثة

(1) عندنا الخلية التالية :




التي تمتلك E_{cell}° عند 25°C مساوية لـ 0.627 V - والمطلوب :

- أ - كتابة تفاعلات القطبين والخلية الإجمالي .
- ب - احسب E_{cell}° ، عند درجة حرارة 25°C إذا كانت $m = 0.1$
- ج - أعد طريقة حساب E_{cell}° المتبعة في الفقرة (ب) ولكن هنا استخدم معدل معامل فعالية لـ $0.1 \text{ m H}_2\text{SO}_4$ مساوياً لـ 0.70 .

(2) عندنا الخلية التالية :




وإن جهد ي نصفي الخلية عند 25°C هما :



المطلوب :


- أ-) كتابة تفاعلات القطبين والخلية الإجمالي .
- ب - حساب E_{cell}° عند 25°C
- ج - إيجاد ثابت توازن عند 25°C لتفاعل الخلية الإجمالي
- د - إذا كانت E_{cell}° لا تتغير مع درجة الحرارة . فهل تصبح E_{cell} للخلية أعلى أو أكبر أو أصغر أو لا تتغير عند 35°C .

(3) عندنا خلية التركيز التالية :



- أ) كتابة تفاعلات القطبين والتغيرات جراء الانتقال وتفاعل الخلية الإجمالي .
- ب) حساب E_{cell}° إذا كان t تساوي 0.18 لمحمل H_2SO_4 (أهم تأثيرات معامل النكالية)

(٤) عندنا الخلية التالية :





والمطلوب :

أ) بعد إهمال التأثيرات الانتقالية انظر فقط في تفاعلات القطبين واحسب القوة الدافعة الكهربائية المنشورة لها (الجواب: $E_{\text{cell}} = 0.0$).ب) ادخل التغيرات الناشئة من الانتقال واحسب القوة الدافعة الكهربائية العائدية بهذه التغيرات (أي حساب جهد التقاء السائل) أخذًا بـ مسار 0.80 (ودرجة الحرارة هي 25°C). (الجواب: 0.035V) .(5) من الناتج التالي عند درجة حرارة 25°C .

التفاعل	E_{cell}°	$\frac{dE^{\circ}}{dE}$
$\text{Cu} = \text{Cu}^+ + e$	- 0.52	- 0.050
$2\text{NH}_3 + \text{Cu} = \text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$	0.11	- 0.003
$\text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2e$	- 0.35	- 0.0035

أوجد ما يلي :

ب) قيم ΔH° , ΔS° , ΔG° للتفاعل $2\text{NH}_3 + \text{Cu}^+ = \text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$ عند درجة حرارة 25°C .(6) إن الأيون M^+ (معدن معين) يشكل مع النترات ملحًا ذائبًا ومع الكلوريد ملحًا شحيح الذوبان . والخلية التالية

عند ذلك قوة دافعة كهربائية تساوي 0.5V - عند درجة حرارة 25°C وقد وجد عند إضافة كمية كافية من KCl الصلب لجعل محلول الخليجي محوي K^+ 0.25m MCl (مع ترسب MCl) إن القوة الدافعة الكهربائية قد تغيرت وأصبحت 0.1V - عند درجة حرارة 25°C احسب K_{sp} لـ MCl (وأهمل تأثيرات معامل التفاعلية)