

الباب الثالث

الأولمبياد في الرياضيات

الفصل الأول

المسابقات الدولية الأمريكية والأوروبية

الفصل الثاني

المسابقات في الدول العربية

الفصل الأول

المسابقات الدولية الأمريكية والأوروبية

(1) الأولمبياد الرياضية في الدول الاشتراكية:

للأستاذ / محمد محمد السيد مفتش عام سابقا بجنوب القاهرة .

جاء في التوصيات التي توج بها مؤتمر تعليم الرياضيات لمرحلة ما قبل الجامعة الذي عُقد في مصر في ديسمبر 1981م دعوة لتنظيم أولمبياد أو مسابقات رياضية (علم الرياضيات) في قطرنا المصري لطلابنا في المراحل قبل الجامعية تشجيعاً للتفوق وفرزاً للمتفوقين في هذه المادة التي تزداد حاجة منطقتنا لها في كل نواحي الإنتاج المعروفة، ويا حبذا لو أفرزت هذه الأولمبياد المصرية أو أولمبياد عربية تضم كل الدول العربية.

والمسابقات في الرياضيات ليست جديدة بالنسبة لنا. فقد عرفتها مصر، وفي عصرنا الحالي تتخذ المسابقات في الرياضيات في كل الدول المتحضرة تقريبا صفة التعميم على نطاق واسع مجهول. ويطلق على المسابقات هذه مصطلح الأولمبياد، اقتباساً من التسمية التي تطلق على المسابقات الرياضية العالمية لألعاب الكرة والجري والسباحة وغيرها (وهي امتداد لمسابقات تاريخية جديدة اعتادها الإغريق قديماً ونسبوها لجبل الأولمب عندهم) وهذه المسابقات (سواء في الرياضة البدنية أو الرياضيات الذهنية) تسبقها عادة مسابقات تمهيدية كانت تجري في مختلف الدول المشاركة فيها لاختيار الفرق التي سوف تحظى بشرف تمثيل بلادها في تلك المسابقة العالمية.

وأولمبياد الرياضيات انتشرت على نطاقات واسعة في الدول الاشتراكية وبدأت في سنة 1934م في روسيا. واقتبست دول أخرى نفس النظام. وأهم ما تهدف إليه هذه المسابقات الكشف عن نوايح الطلبة لتركيز العناية بهم وتعهدهم فمنهم يبرز القادة والمبتكرون المخترعون وقد يكون هذا الإجراء هو الذي كان وراء هذا الفيض الواسع من التقدم المذهل في رياضيات الدول الاشتراكية وغيرها، وفي

مختلف العلوم الطبيعية التي تقوم أعمدها على العقول الرياضية الناضجة. فمن بين آلاف الفائزين في هذه الأولمبيادا الروسية في موسكو ولينجراد وكيف وأوروبا.. خرج قادة وبُحاث رياضيون أثروا العلم الروسي البحت والتجريبي.

والمسابقات في علم الرياضيات في الدول الاشتراكية وغيرها لا تولد من فراغ، فلا بد أن تسبقها ويمهد لها توجيهات ودراسات يتوافد عليها الآلاف من الطلبة الذين يعدون أنفسهم لها، في فصول متجانسة. كما تتم تغذية مادتها الدسمة بمؤلفات وكتب قريبة التناول من يد كل شخص طموح يقبل تحديها. وتحتضن الدول فصول هؤلاء المتسابقين وتعد للإشراف على تغذية طموحهم أساتذة مختارين حيث يعرفون النظريات الرياضية وتطبيقاتها ومناقشة حلولها وتشجيع الحلول المبتكرة والاهتمام بالطريقة قبل النتيجة. فحتى في حالة الفشل لن يضع الدارس وقته عبثاً. وتحليل عناصر الفشل كسب له قيمته في تلمس الطريق للنجاح.

وهناك هدف جانبي يولد من هذه المسابقات لو أجريت في منطقتنا العربية. فمن المسائل التي ستطرح على النوايع الناشئين ستجمع ثروة من المسائل الجديدة المبتكرة بلغتنا العربية، لا بد أن تجد طريقها بالتدرج لمؤلفاتنا وكتبنا الرياضية التي حلها الطلاب وسئموا منها، والنظر في كتاب الرياضيات الروسية، وما تضمنته من مسائل وطرق مبتكرة كفيل بإقناعنا بوجود ثروة من الأفكار تنتظر نقلها للغتنا العربية حتى تصير قريبة التناول وتحت أنظار نوايع طلبتنا.

وفيما يلي نعطي دفعة جديدة لنفس الموضوع وذلك بتلخيص معرب لأحد تقارير المستشار الثقافي لإحدى الدول الأوروبية (مستر هلموت بوشيل الألماني) عن إحدى المسابقات الأولمبية التي اشتركت فيها ألمانيا الشرقية مع دول أخرى (أوروبية). وقد قدم التقرير إلى مكتب مستشار الرياضيات في مصر 1972م، وأغلب الظن أن أصل التقرير لا يزال قابلاً في محفوظات ذلك المكتب يتمنى لو رأى النور فربما تزيد - عندئذ - فرصة الانتفاع به.

والتقرير - كما يتضح فيما بعد - واف فمستويات المسابقة فيه تتدرج من المدرسة فالقسم فالمنطقة فالدولة عامة. وفي المرحلة الأخيرة هذه يتم اختيار الممثلين للمسابقة الدولية التي أورد أسئلتها.

المستوى الأول: (مستوى المدرسة)

المسائل للصفوف من (5) إلى (12):

لكل صف 4 مسائل يحلها الطلاب في المنزل، وله أن يساعده أي شخص إذ الغرض هو نشر الأفكار الرياضية، وخلق وعي بهذا الحقل التعليمي. ويشارك أغلب الطلبة في هذا الدور من المسابقة. وقد يجيب بعضهم بنجاح عن كل المسائل، ولكنهم أقلية والاقْتِباس التالي من مسابقة 1969م (المسابقة التاسعة) لبيان مستوى المسائل.

س1: صف (7) (13 سنة):

مجموعة من 100 سائح من جمهورية ألمانيا الديمقراطية سافروا للخارج والبيانات الآتية عنهم صحيحة.

(أ) 10 سائح لا يتكلمون الإنجليزية أو الروسية.

(ب) 75 سائحاً يتكلمون الروسية. (ج) 83 سائحاً يتكلمون الإنجليزية.

أوجد عدد السياح الذين يتكلمون اللغتين معاً.

ج1: السؤال بسيط والجواب 68.

س2: صف (8) (14 سنة):

هل يوجد مضلعات لها إحدى الخاصيتين التاليتين؟

(أ) عدد الأقطار 3 مرات عدد الرؤوس. (ب) عدد الرؤوس 3 مرات عدد الأقطار.

ج2: نفرض أن عدد أضلاع المضلع هو n

∴ القطر هو قطعة مستقيمة واصله بين كل رأسين غير متتاليين.

∴ عدد الأقطار $= n - 2$

$$\therefore 2 \cdot 2^n - n = 3n$$

$$\therefore \frac{n(n-1)}{2 \times 1} - n = 3n$$

$$\therefore n(n-1) = 8n$$

$$\therefore n^2 - n - 8n = 0$$

$$\therefore n^2 - 9n = 0$$

$$\therefore n(n-9) = 0$$

$$\therefore n = 9 \quad \text{أو} \quad n = 0$$

∴ المضلع ذو الأضلاع التسعة يحقق الخاصية (أ).

$$\text{ثانيًا: } 3(2^n - n) = n$$

$$\therefore n(3n - 11) = 0 \quad \therefore n = \frac{11}{3} \quad \text{أو} \quad \therefore n = 0$$

\therefore لا يوجد مضلعات تحقق الخاصية (ب).

س3: صف (10) (16 سنة):

$$d(x - 1) = d(x + 1) - 8x + 6 \quad \text{حيث } d(x) = 2x^2 - 3x + 4, \quad x \in h \quad \text{أثبت أن:}$$

ج3: السؤال مألوف ومباشر.

س4: صف (12) (18 سنة):

$$(i) \text{ أوجد كل الجذور الحقيقية للمعادلة: } x(x+1)(x+2)(x+3) = \frac{9}{16}$$

$$(b) \text{ أوجد العدد الحقيقي } a \text{ بحيث يكون للمعادلة: } x(x+1)(x+2)(x+3) = a$$

(1) لا توجد جذور. (2) يوجد جذر واحد فقط. (3) جذران فقط.

(4) 3 جذور فقط. (5) 4 جذور فقط. (6) أكثر من 4 جذور.

$$\text{ج4: (i) } [x(x+3)][(x+1)(x+2)] = \frac{9}{16}$$

$$\therefore (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) = \frac{9}{16} \quad \text{نضع } y = x^2 + 3x$$

$$\therefore y(y+2) = \frac{9}{16} \quad \therefore y^2 + 2y = \frac{9}{16} \quad \Rightarrow \quad y = -2\frac{1}{4} \quad \text{أو} \quad \frac{1}{4}$$

$$\therefore x^2 + 3x = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}(-3 \pm \sqrt{10})$$

$$\text{أو } x^2 + 3x = -2\frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{ للمعادلة جذور هي: } \left(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{10}\right), \left(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{10}\right), \left(-\frac{3}{2}\right)$$

(ب) كما في الجزء a نضع $y = x^2 + 3x$

$$\therefore y^2 + 2y = a \quad \therefore y^2 + 2y - a = 0 \quad \therefore y = -1 \pm \sqrt{a+1}$$

إذا كانت $a < -1$ فإن y تكون تخيلية وبالتالي x تكون تخيلية.

$$\text{إذا كانت: } a = -1 \Leftrightarrow y = -1 \quad \therefore x \text{ لها جوابان هما } -\frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{5}$$

إذا كانت $a > -1$ يكون لـ y جوابان مختلفان ويكون لـ x أربعة أجوبة فيما عدا

$$a = \frac{9}{16} \text{ فإن } x \text{ يكون لها 3 قيم مختلفة كما سبق في (أ). مما سبق يتضح أن:}$$

- (أولاً) لا توجد للمعادلة جذور عندما $a < -1$
- (ثانياً) لا يوجد قيمة لـ (a) بحيث يكون للمعادلة جذر واحد فقط.
- (ثالثاً) يكون للمعادلة جذران إذا كانت $a = -1$.
- (رابعاً) يكون للمعادلة 3 جذور إذا كانت $a = \frac{9}{16}$.
- (خامساً) يكون للمعادلة 4 جذور إذا كانت $a > -1$ ما عدا $a = \frac{9}{16}$.
- (سادساً) لا يوجد قيمة لـ a بحيث يكون للمعادلة أكثر من 4 جذور.

المستوى الثاني: (مستوى الأقسام)

س1: صف (5) (11 سنة):

أوجد عددين طبيعيين a, b بحيث $a - b = 3$ ، $ab = 120$

ج1: المسألة عادية والجواب: $a = 15, b = 12$

• ملحوظة: الأسئلة للصفوف من 5 إلى 12 موضوعة ليحلها التلاميذ. صف 11 و صف 12 يقدم لهما ورقتان ليومين متتاليتين كل ورقة 3 أسئلة وباقي الصفوف ورقة واحدة 4 أسئلة.

يوجد 215 قسماً في ألمانيا الشرقية. في هذا المستوى يتقدم أحسن التلاميذ نتيجة اختيار المدرسين والمدرسين الأوائل. كان عدد المتسابقين نحو 50 ألف. والذين يرشحون للمستوى الثالث هم الذين يحوزون أعلى الدرجات. والمسائل التالية اختيرت من المسابقة الثامنة في 17 ، 18/12/1959م

س2: صف (7) (13 سنة):

أنشئ Δabc حيث r (للدائرة الداخلة) $= 3 \text{ cm}$ ، $\bar{c} = 5.5 \text{ cm}$ ، (zc) العمود من c على $\bar{c} = 3 \text{ cm}$

ج2: المسألة مباشرة.

س3: صف (10) (16 سنة):

k نقطة داخل Δabc المتساوي الأضلاع والنقط l, m, n على الأضلاع الثلاثة برهن أن: $kl + km + kn \leq$ ارتفاع المثلث.

ج3: إذا كانت نقطة k تقع داخل Δabc المتساوي الأضلاع وكان km و kn و kl أعمدة على الأضلاع ab, bc, ca فإن:

$kl + kn + km =$ الارتفاع ad وهذه خاصية مألوفة للمثلث المتساوي الأضلاع

وبرهانها كالآتي: نفرض أن طول الضلع $x =$

$$\therefore \text{مساحة}(\Delta kca) + \text{مساحة}(\Delta kbc)$$


$$+ \text{مساحة}(\Delta kab) = \text{مساحة}(\Delta abc)$$

$$\therefore \frac{1}{2} x \times kn + \frac{1}{2} x \times km + \frac{1}{2} x \times kl = \frac{1}{2} x \times ad$$

$$\therefore kn + km + kl = ad$$

فإذا كان: kn أو km أو kl مائلاً.

فإن $kn + km + kl$ يكون أكبر من الارتفاع.



س4: صف (11, 12) (17, 18 سنة):

برهن أن: $\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}$ بدون استخدام الجذور.

ج4: لقد تم حل هذا السؤال في الباب الثاني من هذا الكتاب.

س5: صف (11, 12) (17, 18 سنة):

أوجد كل عدد أولي k حيث $k + 14, k + 10$ كلاهما أولي.

ج5: المطلوب إيجاد كل عدد أولي k بحيث $k + 14, k + 10$ كلاهما أولي.

كل الأعداد الأولية فردية ما عدا 2، وإلا كانت $k + 14, k + 10$ زوجية أولية،

وهذا محال. $\therefore k = 3$ أو $k = 3m + 1$ أو $k = 3m + 2$ ($m \in t$): حيث t مجموعة الأعداد

الطبيعية.

لو كانت $k = 3m + 1$ تكون $k + 14 = 3m + 15$ تقبل القسمة على 3 فهي ليست أولية.

لو كانت $k = 3m + 2$ تكون $k + 10 = 3m + 12$ تقبل القسمة على 3 فهي ليست أولية.

لو كانت $k = 3$ تكون $k + 14 = 17, k + 10 = 13$ ، وحيث أن الأعداد 17، 13، 3

كلها أولية.


\therefore يوجد قيمة واحدة ل k هي 3 ليكون $k + 14, k + 10$ كلاهما أولي.

المستوى الثالث: (مستوى المناطق)

كل متسابق من 12-7 يعالج 3 مسائل لكل من يومين متتاليين. المتسابقون هنا هم الفائزون في المستوى الثاني (أقسام) والمناطق عددها 15 منطقة في ألمانيا الشرقية. وعدد المتسابقين في سنة 1970م لهذا المستوى كان نحو 3000 العينات مختارة من مسابقتي 8، 9 سنة 69 وسنة 70.

س1: صف (7) (13 سنة):

3 مستقيمات m_1, m_2, m_3 في مستوى واحد تتقاطع في y ، خذ نقطة a على m_1 ، $a \neq y$ ارسم Δabc بحيث تكون القطع المستقيمة المتوسطة t_1, t_2, t_3 كلها تقع على m_1, m_2, m_3 على الترتيب.



ج1: العمل:

(1) نأخذ \bar{d} على m_1 بحيث $\bar{y}d = \bar{y}a$

(2) ننصف $\bar{y}d$ في d .

(3) نرسم $\bar{d}c \parallel m_2$ ويقطع m_3 في c

(4) نصل $\bar{c}d$ ليقطع m_2 في b وبذا يتحدد

رءوس Δabc متوسطاته تقع على m_1, m_2, m_3 واضح أن لكل نقطة a على m_1 يوجد مثلث يحقق الشروط وأن جميع هذه المثلثات متشابهة.

س2: صف (8) (14 سنة):

الأعداد a, b, c, d تخضع للشروط الآتية: $d > c$ ، $a + b = c + d$ ، $a + d < b + c$ رتبها كلها بحيث يكون الأكبر أولاً

$$d > c \quad \dots (1)$$

$$a + b = c + d \quad \dots (2)$$

$$a + b < b + c \quad \dots (3)$$

$$a + d + c < b + c + c$$

من (3)

$$\therefore a + (d + c) < b + 2c \quad \dots (4)$$

بالتعويض من (2) في (4)

$$\therefore a + (a + b) < b + 2c \quad \therefore 2a + b < b + 2c$$

$$\therefore a < c \quad \dots (5)$$

$$\therefore b > d \quad \dots\dots (6) \quad \text{من (2) ، (5)}$$

$$\therefore b > d > c > a \quad \text{من (1) ، (5) ، (6)}$$

س3: صف (10) (16 سنة):

أوجد كل أزواج الأعداد الحقيقية a, b حيث $b < a$ وحيث أن:
المجموع والفرق بين مربعين لأحدهما وحاصل الضرب متساوية.

ج3:

$$a + b = ab \quad \dots\dots (1) \quad a^2 - b^2 = a + b \quad \dots\dots (2)$$

من (2)

$$\therefore (a - b)(a + b) = a + b \quad \therefore (a - b)(a - b - 1) = 0$$

إذا كان: $a = -b$ بالتعويض في (1)

$$\therefore -b + b = ab = (-b)(b) \quad \therefore b^2 = 0$$

$$\therefore b = 0 \quad \therefore a = 0$$

$a = b$ وهذا يناقض المعطيات لأن $b > a$ $\therefore a = -b$ مرفوض

إذا كان $a = b + 1$ بالتعويض في (1)

$$\therefore b - 1 + b = b(b + 1) \quad \therefore b^2 - b - 1 = 0$$

$$\therefore b = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}, \quad \therefore a = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

\therefore أزواج الأعداد الحقيقية التي تحقق شروط المسألة هي: $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ حيث

$$a_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}, b_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, a_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, b_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

س4: صف (10) (16 سنة):

منحنى الدالة $y = x^2 + lx + k$ رسم على محاور كارتيزية. المنحنى يقطع 7 وحدات من محور السينات ويمر بالنقطة $(8, 0)$ أوجد كلاً من l, k (أعداد حقيقية)

ج4: النقطة $(8, 0)$ تحقق المعادلة: $y = x^2 + lx + k$

$$\therefore k = 8 \quad \therefore \text{معادلة المنحنى: } y = x^2 + lx + 8$$

نفرض أن المنحنى يقطع محور السينات في النقطتين $(x_1, 0), (x_2, 0)$

$$\therefore x_1 - x_2 = \pm 7$$

جذرا المعادلة: $x^2 + lx + 8 = 0$ هما x_1, x_2

$$\therefore \text{الفرق بين الجذرين} = \pm 7 \quad \therefore \frac{-l \pm \sqrt{l^2 - 32}}{2} \text{ يساوي } x_1, x_2 \therefore$$

$$\therefore l^2 = 81 \quad \therefore l = \pm 9 \quad \therefore k = 8, l = \pm 9$$

س5: صف (11, 12) (17, 18 سنة):

ما الأعداد الحقيقية a التي تجعل المعادلة: $\sin^6 x + \cos^6 x = a(\sin^4 x + \cos^4 x)$ لها على الأقل حل واحد حقيقي .. أوجد كل الحلول عندما $a = \frac{5}{6}$

ج5:

$$\sin^6 x + \cos^6 x - a(\sin^4 x + \cos^4 x) = 0 \quad \therefore \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\therefore (\sin^4 x + \cos^4 x)(1 - a) - (\sin 2x \times \cos 2x) = 0$$

$$\therefore (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = \sin^4 x + \cos^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x = 1$$

$$\therefore (1 - 2\sin 2x \cos 2x)(1 - a) - \sin 2x \cos 2x = 0$$

$$\therefore \sin 2x \cos 2x (2a - 3) = a - 1 \quad \therefore \sin 2x \cos 2x = \frac{a-1}{2a-3}$$

$$\therefore \sin^2 2x = \frac{4(a-1)}{2a-3} \quad \therefore 1 \geq \frac{4(a-1)}{2a-3} \geq 0, a \neq \frac{3}{2} \quad \dots (1)$$

$$\therefore (2a-3)^2 \geq 4(a-1)(2a-3) \geq 0 \quad \therefore 4(a-1)(2a-3) \geq 0$$

$$\therefore a \notin [1, \frac{3}{2}] \quad \dots (2)$$

$$\therefore (2a-3)^2 \geq 4(a-1)(2a-3), \quad \therefore (2a-3)(2a-3-4a+4) \geq 0$$

$$\therefore (2a-3)(1-2a) \geq 0 \quad \therefore \frac{1}{2} \leq a \leq 1 \quad \dots (3)$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq a \leq 2 \quad \text{من (2)، (3)}$$

عندما $a = \frac{5}{6}$

$$\therefore \sin^2 2x = \frac{1}{2} \quad \therefore \sin 2x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore 2x = n\pi \pm \frac{\pi}{4} : n \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} (n\pi \pm \frac{\pi}{4})$$

المستوى الرابع: (المستوى القومي)

في أولمبياد الرياضيين الناشئين الثامن بجمهورية ألمانيا الديمقراطية والذي عقد قرب العاصمة برلين في 29/3/1969 إلى 1/4/1969 وكان هناك 223 متسابقاً منهم 22 بنتاً، 13 من الفصول المنخفضة.

المسائل للصفوف 10-12 فقط ولو أنه مسموح للصفوف الأقل للناجحين بالاشتراك.

الهدف الأساسي هو اختيار أحسن المتسابقين لتمثيل البلاد في أعلى المستويات.

كل متسابق عليه 3 مسائل في كل من يومين متتاليين.

الأسئلة الآتية لإعطاء فكرة عن المستوى.

يلاحظ أنه في المسابقات القومية نحاول وضع مسائل رياضية حديثة (التراكيب

الجبرية، المجاميع، ...) بينما في المسابقات الدولية يتجنبون ذلك نظراً لأن التطوير

في مختلف الدول ليس كله في نفس الطور.

س1: صف (10) (16 سنة):

برهن ما يأتي: في المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ بمعاملات صحيحة فردية a, b, c الجذران دائماً غير قياسيين.

جاء: نفرض أن الجذرين دائماً قياسيان. \Leftrightarrow مربع كامل $b^2 - 4ac =$

b عدد فردي، $4ac$ عدد زوجي

مربع عدد فردي = مربع كامل فردي $b^2 - 4ac =$

$\therefore b^2 - 4ac = (2n + 1)^2$ حيث $n \in \mathbb{Z}$

$\therefore b$ عدد فردي $\Leftrightarrow b = 2m + 1$ حيث $m \in \mathbb{Z}$

$\therefore (2m + 1)^2 - 4ac = (2n + 1)^2$

$\therefore (2m + 1)^2 - (2n + 1)^2 = 4ac$

$\therefore (2m - 2n)(2m + 2n + 2) = 4ac$

$\therefore (m - n)(m + n + 1) = ac$ (1)

m, n إما زوجيان معاً أو فرديان معاً أو أحدهما زوجي والآخر فردي.

(أولاً) نفرض أن m, n زوجيان معاً

$\therefore (m - n)$ عدد زوجي، $(m + n + 1)$ عدد فردي

من (1) \therefore عدد زوجي \times عدد فردي = عدد فردي وهذا محال

(ثانياً) نفرض أن m, n أحدهما فردي والآخر زوجي

$\therefore (m - n)$ عدد فردي ، $(m + n + 1)$ عدد زوجي

من (1) \therefore عدد فردي \times عدد زوجي = عدد فردي وهذا محال وقد نتج هذا التناقض

من فرضنا أن الجذرين قياسيان. \therefore الجذران غير قياسيين

س3: أوجد كل الأعداد الحقيقية x التي تحقق المعادلة: $4 \log_4 x + 3 = 2 \log_x 2$

ج3:

$$\therefore 4 \log_4 x + 3 = 2 \log_x 2$$

$$\therefore 4 \log_4 x + 3 = \log_x 4$$

$$\therefore \log_4 x \times \log_x 4 = 1$$

$$\text{نفرض أن: } \log_x 4 = m$$

$$\therefore \log_4 x = \frac{1}{m}$$

من (1):

$$\therefore \frac{4}{m} + 3 = m$$

$$\therefore m^2 - 3m - 4 = 0$$

$$\therefore (m + 1)(m - 4) = 0$$

$$\therefore m = -1 \quad \text{أو} \quad m = 4$$

$$\log_4 x = -1 \quad \text{أو} \quad \log_4 x = \frac{1}{4}$$

$$\therefore x = \frac{1}{4}$$

أو

$$x = (4)^{\frac{1}{4}} = \sqrt{2}$$

(وهو المطلوب)

ثانياً: صف (12) (18 سنة):

س1: أوجد كل الأعداد الحقيقية k بحيث أن المعادلة:

$$\sin^4 x - \cos^4 x = k(\tan^4 x - \cos^4 x) \quad \text{لها في الفترة }]0, \frac{\pi}{2}[$$

(2) حل واحد حقيقي فقط.

(1) لا حل حقيقي.

(4) أكثر من حلين حقيقيين.

(3) حلان حقيقيان فقط.

ج:

$$\begin{aligned} \sin^4 x - \cos^4 x &= k \left(\frac{\sin^4 x}{\cos^4 x} - \cos^4 x \right) \\ &= \frac{k(\sin^4 x - \cos^4 x)(\sin^4 x + \cos^4 x)}{\sin^4 x \cos^4 x} \end{aligned}$$

$$\therefore (\sin^4 x - \cos^4 x) [\sin^4 x \cos^4 x - k(\sin^4 x + \cos^4 x)] = 0$$

$$\therefore \sin^4 x - \cos^4 x = 0 \quad \therefore \tan x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} \quad \therefore \text{مههما كانت قيمة } k$$

$$\sin^4 x \cos^4 x - k(\sin^4 x + \cos^4 x) = 0 \quad \text{أو}$$

$$\therefore \frac{1}{16} \sin^4 2x - k[(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x] = 0$$

$$\therefore \frac{1}{16} \sin^4 2x - k(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x) = 0$$

بوضع $\sin 2x = y$

$$\therefore \frac{1}{16} y^4 - k(1 - \frac{1}{2} y^2) = 0$$

$$\therefore y^4 = \frac{1}{2} (-8k \pm \sqrt{64k^2 + 64k}) \quad \therefore y^4 + 8ky^2 - 16k = 0$$

$$= \frac{1}{2} (-8k \pm 8\sqrt{k^2 + k}) = 4(-k \pm \sqrt{k^2 + k})$$

وحيث أن y^2 موجب دائماً.

$$\therefore y^2 = 4(\sqrt{k^2 + k} - k)$$

$$0 < 2x < \pi$$

$$\text{وحيث أن: } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 0 < \sin 2x \leq 1$$

$$\therefore 0 \leq y \leq 1$$

$$\therefore 0 < y^2 \leq 1$$

$$\therefore 0 < \sqrt{k^2 + k} \leq \frac{1}{4} \quad \dots (1)$$

وحيث أن طرفي المتباينة (1) موجبان

$$k^2 + k \leq k^2 + \frac{1}{2}k + \frac{1}{16}$$

\therefore بتربيع الطرفين ينتج أن:

$$\therefore \frac{1}{2}k \leq \frac{1}{16}$$

$$\therefore k \leq \frac{1}{8} \quad \dots (2)$$

لكي يكون $\sqrt{k^2 + k}$ عدداً حقيقياً فإن: $k^2 + k \geq 0$

$$\therefore k \text{ لا تقع بين } 0, -1 \quad \dots (3) \quad \text{في المتباينة (1)}$$

$\therefore \sqrt{k^2 + k}$ عدد موجب أو صفر

$$\therefore k + \frac{1}{4} \geq 0$$

$$\therefore k \leq -\frac{1}{4} \quad \dots (4)$$

وحيث أن: $0 < x \quad k \neq 0 \quad \dots (5)$

$$0 < x \leq \frac{1}{8} \therefore \text{من (2) ، (3) ، (4) ، (5)}$$

وعند $k = \frac{1}{8}$ حيث $x = \frac{\pi}{4}$ إذن إذا كان $0 < x \leq \frac{1}{8}$ يكون للمعادلة

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ حل ويكون للمتغير } x \text{ قيمتان بجانب } \sin^2 2x = 4 \left(\sqrt{k^2 + k} - k \right)$$

الخلاصة: إذا كان $0 < x \leq \frac{1}{8}$ يكون 3 حلول حقيقية.

إذا كان: $k > \frac{1}{8}$ أو $k < 0$ يوجد حل حقيقي واحد فقط.

ولا توجد قيمة لـ k بحيث تكون المعادلة ليس لها حل.

ولا توجد قيمة لـ k بحيث تكون المعادلة لها حلان فقط.

س2: برهن أن لكل قيم x الحقيقية المتساوية الآتية صحيحة:

$$\sin 5x = 16 \sin x \sin \left(x - \frac{\pi}{5} \right) \sin \left(x + \frac{\pi}{5} \right) \sin \left(x - \frac{2\pi}{5} \right) \sin \left(x + \frac{2\pi}{5} \right)$$

ج2:

$$\sin(x + 4x) = \sin x \cos 4x + \cos x \sin 4x = \text{الطرف الأيمن}$$

$$= \sin x(2 \cos^2 2x - 1) + \cos x \times 2 \sin 2x \cos 2x$$

$$= \sin x(2 \cos^2 2x - 1) + 4 \sin x \cos^2 x \sin 2x$$

$$= \sin x(2 \cos^2 2x - 1) + 2 \sin x (1 + \cos 2x) \cos 2x$$

$$= \sin x[2 \cos^2 2x - 1 + 2 \cos 2x + 2 \cos^2 2x]$$

$$= \sin x [4 \cos^2 2x + 2 \cos 2x - 1]$$

الطرف الأيسر:

$$= 4 \sin x \sin \left(x - \frac{1}{5} \pi \right) \sin \left(x + \frac{1}{5} \pi \right) \sin \left(x - \frac{2}{5} \pi \right) \times \sin \left(x + \frac{2}{5} \pi \right)$$

$$= 4 \sin x \left(\cos \frac{2\pi}{5} - \cos 2x \right) \left(\cos \frac{4}{5} \pi - \cos 2x \right)$$

$$= 4 \sin x \left[\cos^2 2x - \cos 2x \left(\cos \frac{2}{5} \pi + \cos \frac{4}{5} \pi \right) + \cos \frac{4}{5} \pi \cos \frac{2}{5} \pi \right]$$

$$= 4 \sin x \left[\cos^2 2x - \cos 2x \left(\cos \frac{2}{5} \pi - \cos \frac{1}{5} \pi \right) + \frac{1}{2} \left(\cos \frac{6}{5} \pi + \cos \frac{2}{5} \pi \right) \right]$$

$$= 4 \sin x \left[\cos^2 2x - \cos 2x \left(\cos \frac{2}{5} \pi - \cos \frac{4}{5} \pi \right) + \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2}{5} \pi + \cos \pi \right) \right]$$

$$\sin \frac{3}{5} \pi = \sin \left(\pi - \frac{3}{5} \pi \right)$$

نعلم أن:

$$\therefore 3 \sin \frac{1}{5} \pi - 4 \sin^3 \frac{1}{5} \pi = 2 \sin \frac{1}{5} \pi \cos \frac{1}{5} \pi$$

$$\therefore 3 - 4 \sin^2 \frac{1}{5} \pi = 2 \cos \frac{1}{5} \pi \quad \therefore 3 - (1 - \cos^2 \frac{1}{5} \pi) = 2 \cos \frac{1}{5} \pi$$

$$\therefore 4 \cos^2 \frac{1}{5} \pi - 2 \cos \frac{1}{5} \pi - 1 = 0 \quad \therefore \cos \frac{1}{5} \pi = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$$

وحيث أن: $\frac{1}{5} \pi$ تقع في الربع الأول $\therefore \cos \frac{1}{5} \pi = \frac{1}{4}(1 + \sqrt{5})$

$$\therefore \cos \frac{1}{5} \pi - \cos \frac{2}{5} \pi = \cos \frac{1}{5} \pi - (2 \cos^2 \frac{1}{5} \pi - 1) = 1 + \cos \frac{1}{5} \pi - 2 \cos^2 \frac{1}{5} \pi$$

$$= 1 + \frac{1}{4}(1 + \sqrt{5}) - 2 \times \frac{1}{16}(1 + \sqrt{5})^2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{الطرف الأيسر} = 4 \sin x [\cos^2 2x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{4}] =$$

$$= \sin x [4 \cos^2 2x + 2 \cos 2x - 1] = \text{الطرف الأيمن}$$

س 4: l مستقيم، \overline{ab} قطعة ليست في مستوى l أوجد نقطة c على l حيث محيط

الدائرة الخارجية abc نهاية صفري.

ج 4: المستقيم l والنقطة a يحددان مستويًا

وليكن x والمستقيم l والنقطة b يحددان

مستويًا وليكن y

ندير المستوى y حول المستقيم l إلى أن نأخذ

النقطة b الوضع \bar{b} حيث \bar{b} تقع في المستوى

a, \bar{b}, a يقعان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم l .

نفرض أن: c نقطة ما على المستقيم l نصل $\bar{c}a, \bar{c}b, \bar{c}b$

$$\overline{ac} + \overline{cb} + \overline{ba} = (\overline{ac} + \overline{c\bar{b}}) + \overline{ba} = \Delta abc$$

$\therefore \overline{ba}$ ثابت لأن a, b نقطتان ثابتتان


\therefore المحيط يكون أصغر ما يمكن إذا كان: $\overline{ac} + \overline{c\bar{b}}$ أصغر ما يمكن.

$\therefore \overline{ac} + \overline{c\bar{b}}$ يكون أصغر ما يمكن إذا كانت c تقع على $\overline{c\bar{b}}$ أي أن النقطة المطلوبة

هي نقطة تقاطع $\overline{c\bar{b}}$ مع المستقيم l ولتحديد موضع c في هذه الحالة نسقط من $a,$

العمودين $\overline{be}, \overline{ad}$ على المستقيم l كما في شكل (2) ونصل \overline{be} فيكون

$$(\angle \bar{b}ec) = 90^\circ$$



شكل (1)

(2) من المسابقات الأمريكية في الرياضيات 1976م

الأستاذ / بنيامين تاووروس

مدير إدارة المناهج بالتعليم الابتدائية بالقاهرة 1982م

(1) إذا كان باقي طرح مقلوب $(1 - x)$ من 1 يساوي مقلوب $(1 - x)$ فإن x تساوي

-
 (أ) -2 (ب) -1 (ج) $\frac{1}{2}$ (د) 2 (هـ) 3

ج1:

$$1 - \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-x} \quad \therefore 1 = \frac{2}{1-x} \quad \therefore x = -1$$

(2) كم عدد حقيقي x يجعل $\sqrt{-(x+1)^2}$ عدداً حقيقياً؟

(أ) لا يوجد أي عدد. (ب) واحد. (ج) اثنان.

(د) عدد محدد أكبر من 2. (هـ) عدد غير منته.

ج2: $\sqrt{-(x+1)^2} \in \mathbb{R}$ إذا كان $-(x+1)^2 \geq 0$


$\therefore -(x+1)^2 = 0$ لا يمكن أن يكون موجباً $\therefore -(x+1)^2 = 0$ إذا كان: $x = -1$

(3) مجموع أبعاد أحد رؤوس مربع طول ضلعه 2 وحدة طول عن منتصفات كل من

أضلاع المربع يساوي

- (أ) $2\sqrt{5}$ (ب) $2 + \sqrt{3}$ (ج) $2 + 2\sqrt{3}$

- (د) $2 + \sqrt{5}$ (هـ) $2 + 2\sqrt{5}$



ج3:

$$\overline{dx} + \overline{dy} + \overline{dz} + \overline{dl}$$

$$= 1 + \sqrt{5} + \sqrt{5} + 1$$

$$= 2 + 2\sqrt{5}$$

(4) إذا كان الحد الأول من متوالية هندسية = 1، وأساسها = r ، وعدد حدودها

$n =$ ، ومجموع هذه الحدود = c حيث كل من r, c لا يساوي صفرًا فإن مجموع

مقلوبات حدود هذه المتوالية يكون:

$$\frac{r^{n-1}}{c} \text{ (هـ)} \quad \frac{r^n}{c} \text{ (د)} \quad \frac{c}{r^{n-1}} \text{ (ج)} \quad \frac{1}{r^n c} \text{ (ب)} \quad \frac{1}{c} \text{ (أ)}$$

ج4: مجموع مقلوبات الحدود $\frac{r^{-n}-1}{r^{-1}-1}$

$$= \frac{r^{-n}-1}{r^{-1}-1} \times \frac{r^n}{r^n} = \frac{1-r^n}{r^{n-1}(1-r)} = \frac{c}{r^{n-1}}$$

(5) ما هو عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين عشرة ومائة، والتي كل منها،

إذا كُتِبَ في النظام العشري، يزداد بمقدار تسعة، عند عكس وضع رقميه؟

$$0 \text{ (أ)} \quad 1 \text{ (ب)} \quad 8 \text{ (ج)} \quad 9 \text{ (د)} \quad 10 \text{ (هـ)}$$

ج5: نفرض أن رقم الآحاد x ، رقم العشرات y

$$\therefore (y + 10x) - (x + 10y) = 9 \quad \therefore x - y = 1$$

\therefore رقم الآحاد يزيد واحداً عن رقم العشرات.

\therefore الأعداد هي 12، 23، 34، 45، 56، 67، 78، 89 \therefore عدد الأعداد = 8

(6) إذا كان c عدداً حقيقياً وكان المعكوس الجمعي لأحد جذري المعادلة:

$$x^2 - 3x + c = 0 \text{ هو حل للمعادلة: } x^2 + 3x - c = 0 \text{ فإن جذري المعادلة:}$$

$$x^2 - 3x + c = 0 \text{ هما:}$$

$$2, 1 \text{ (أ)} \quad -2, -1 \text{ (ب)} \quad 3, 0 \text{ (ج)} \quad -3, 0 \text{ (د)} \quad \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \text{ (هـ)}$$

ج6: $m, -m$ هما على الترتيب جذرا للمعادلتين:

$$x^2 - 3x + c = 0, \quad x^2 + 3x - c = 0$$

$$\therefore m^2 - 3m + c = 0, \quad m^2 - 3m - c = 0$$

بالجمع ينتج أن: $2m^2 = 0$

$$\therefore m = 0 \quad \therefore c = 0$$

\therefore المعادلة: $x^2 - 3x + c = 0$ هي المعادلة: $x^2 - 3x = 0$

$$\therefore x = 0 \text{ أو } 3$$

(7) إذا كانت $x \in h$ فإن المقدار $(1 - |x|)(1 + x)$ يكون موجباً إذا وفقط إذا :

$$|x| < 1 \text{ (أ)} \quad x < 0 \text{ (ب)} \quad |x| > 1 \text{ (ج)} \quad x > -1 \text{ (د)}$$

$$(هـ) \quad x < -1 \text{ أو } -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} & \text{ج7: } \therefore |x| > -1 \text{ عندما } x < 0, \quad |x| = x \text{ عندما } x \geq 0 \\ & \left. \begin{array}{l} \text{عندما } x < 0 \quad (1+x)^2 \\ \text{عندما } x \geq 0 \quad (1-x)(1+x) \end{array} \right\} = y \therefore \\ & \therefore y = 0 \text{ عندما } x = -1 \text{ أو عندما } x = 1 \end{aligned}$$

∴ النقط $-1, 0, 1$ تقسم خط الأعداد إلى 4 فترات والجدول التالي يبين إشارة y في هذه الفترات.

الفترة	$]-\infty, -1[$	$]-1, 0[$	$]0, 1[$	$]1, 0[$
إشارة y	موجبة	موجبة	موجبة	سالبة

y تكون موجبة إذا كان: $-1 < x < 1$ ، $x < -1$

وبالعكس إذا كانت y موجبة فإن: $-1 < x < 1$ ، $x < -1$

∴ y تكون موجبة إذا وفقط إذا كان: $x < -1$ ، $-1 < x < 1$

(8) سوبر ماركت به 128 صندوقاً من التفاح، وكل صندوق يحتوي على 120 تفاحة

على الأقل وعلى 144 تفاحة على الأكثر. ما هو أكبر عدد صحيح n صندوق

على الأقل يجب أن يحتوي على نفس العدد من التفاح؟

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 24 (هـ) 25

ج8: نتصور أننا وضعنا الصناديق في أكوام بحيث تكون الصناديق في أكبر

الأكوام $n =$

نفرض أن عدد الأكوام $x =$ ، عدد الصناديق في أكبر الأكوام $n =$

∴ عدد الصناديق = 128 صندوقاً

$$\therefore xn \geq 128 \quad \dots (1)$$

∴ الصندوق يحتوي على 120 تفاحة على الأقل وعلى 144 تفاحة على الأكثر.

∴ أكبر عدد من الأكوام يمكن أن يكون موجوداً في السوبر ماركت:

$$144 - 119 = 25$$

$$\therefore x \leq 25$$

∴ عدد الأكوام $x =$ فرضاً

$$\therefore xn \leq 25n \quad \dots (2)$$

من (1) ، (2)

$$\therefore 25n \geq xn \geq 128 \quad \therefore n \geq \frac{128}{25} \quad \therefore n \geq 5 \frac{3}{25}$$

$$\therefore n = 6 \text{ أو } 7 \text{ أو } 8 \text{ أو } \dots$$

أي أن عدد الصناديق في أكبر الأكوام = 6 أو 7 أو 8 أو ... أو 128

∴ أكبر الأكوام يحتوي على 6 صناديق على الأقل.

∴ أكبر عدد صحيح n بحيث n صندوق على الأقل يجب أن تحتوي على نفس العدد من التفاح = 6.

(9) إذا كانت مقادير الزوايا الداخلة لمضلع محدب في توال عددي، وكان مقدار أصغر هذه الزوايا = 100° ومقدار أكبر هذه الزوايا = 140° فإن عدد أضلاع المضلع =

$$(أ) (6) \quad (ب) (8) \quad (ج) (10) \quad (د) (11) \quad (هـ) (12)$$

ج9: ∴ مجموع الزوايا = $(2n - 4) \times 90^\circ = \dots (1)$

$$\therefore c = \frac{n}{2}(a + l), \quad : a = \text{الحد الأول}, \quad l = \text{الحد الأخير}$$

$$\therefore \text{مجموع الزوايا} = 120^\circ \times n = \frac{1}{2} n(100^\circ + 140^\circ) = \dots (2)$$

من (1) ، (2)

$$\therefore (2n - 4) \times 90^\circ = 120^\circ \times n \quad \therefore n = 6$$

(10) إذا كان باقي قسمة كل من الأعداد 2312، 1417، 1059 على m هو r حيث m عدد صحيح أكبر من 1 فإن $(m - r)$ يساوي:

$$(أ) 1 \quad (ب) 15 \quad (ج) 179 \quad (د) [m - 15] \quad (هـ) [m - 1]$$

ج10: باقي قسمة 1059 على m هو r

$$\therefore 1059 = mn_1 + r : n_1 \in y \quad \dots (1)$$

$$\therefore 1417 = mn_2 + r : n_2 \in y \quad \dots (2)$$

$$\therefore 2310 = mn_3 + r : n_3 \in y \quad \dots (3)$$

ب طرح (1) من (2)

$$\therefore 258 = m(n_2 - n_1)$$

بطرح (2) من (3)

$$\therefore 895 = m(n_3 - n_2)$$

\therefore كل $n_2 - n_1 \in y$ ، $n_3 - n_2 \in y$

\therefore عامل مشترك للعددين 358 ، 895 (4)

$$\therefore 358 = 2 \times 179, 895 = 5 \times 179$$

\therefore العددان 358 ، 895 لهما عاملان مشتركان هما 1 ، 179 (5)


من (4) ، (5)

$$\therefore m = 1 \text{ أو } m = 179, \quad \therefore m > 1 \quad \therefore m = 179$$

ويقسمة 1059 على 179 نجد خارج القسمة 5 والباقي 164

$$\therefore r = 164 \quad \therefore m - r = 179 - 164 = 15$$

(11) في الشكل المقابل: \overline{ab} يمس الدائرة



التي مركزها f في نقطة a ، النقطة d تقع داخل


الدائرة ، \overline{db} يقطع الدائرة في c فإن كان:

$$\overline{fd} = 2, \quad \overline{ab} = 6, \quad \overline{bc} = \overline{dc} = 3$$

فإن نصف قطر الدائرة يساوي

- (هـ) $\sqrt{22}$ (د) $2\sqrt{6}$ (ج) $\frac{9}{2}$ (ب) $\frac{15}{\pi}$ (ا) $3 + \sqrt{3}$

ج11: نرسم \overline{bx} يقطع الدائرة f في x ، نسقط العمود \overline{fy} على \overline{cx} ، ثم نصل \overline{fx}



$$\therefore (\overline{ba})^2 = \overline{bc} \cdot \overline{bx}$$

$$\therefore 36 = 3bx \quad \therefore bx = 12$$

$$\therefore cx = 9$$

$$\therefore cy = 4.5 \quad \therefore dy = 1.5$$

$$\therefore r^2 = (\overline{fy})^2 + (\overline{yx})^2$$

$$= (\overline{fd})^2 - (\overline{dy})^2 + (\overline{yx})^2$$

$$= 4 - \frac{9}{4} + \frac{81}{4} = 22$$

$$\therefore r = \sqrt{22}$$

(12) $\vartheta(x)$ كثيرة حدود ، فإذا قسمت على $(x - 1)$ كان الباقي 3 وإذا قسمت على

$(x - 3)$ كان الباقي 5 ، فإذا قسمت $\vartheta(x)$ على $(x - 1) \times (x - 3)$ كان الباقي:

(أ) $(x - 2)$ (ب) $(x + 2)$ (ج) 2 (د) 8 (هـ) 15

ج12: $(x - 1) \times (x - 3)$ كثيرة حدود من الدرجة الثانية

$$\therefore \vartheta(x) = (x - 1)(x - 3)e(x) + ax + b$$

حيث $e(x)$ كثيرة حدود

بوضع $x = 1$ ينتج أن: $\vartheta(1) = a + b$

$$\therefore a + b = 3 \quad \dots (1)$$

بوضع $x = 3$ ينتج أن: $\vartheta(3) = 3a + b$

$$\therefore 3a + b = 5 \quad \dots (2)$$

بحل (1) ، (2) ينتج أن:

$$\therefore a = 1, b = 2$$

\therefore الباقي $ax + b = x + 2$

(13) إذا كان كل من $a, b, x \in h - \{1\}$ فإن:

$$4(\log_a x)^2 + 3(\log_b x)^2 = 8(\log_a x)(\log_b x)$$

(أ) لجميع قيم a, b, x (ب) إذا وفقط إذا كان: $a = b^2$

(ج) إذا وفقط إذا كان: $b = a^2$ (د) إذا وفقط إذا كان: $x = ab$

(هـ) ليس كل ما سبق.

ج13:

$$\therefore (2\log_a x - \log_b x)(2\log_a x - 3\log_b x) = 0$$

$$\therefore 2\log_a x = 3\log_b x \quad \text{أو} \quad 2\log_a x = \log_b x$$

$$\therefore \log_b x = \log_a x \times \log_b a$$

من (1) ، (2)

$$\therefore 2\log_a x = \log_a x \times \log_b a \quad \text{أو} \quad 2\log_a x = 3\log_a x \times \log_b a$$

$$\therefore x \neq 1 \quad \therefore \log_a x \neq 0$$

$$2 = 3\log_b a \quad \text{أو} \quad 2 = \log_b a \quad \therefore a = b^2, a^3 = b^2$$

(14) أوجد أصغر عدد صحيح فردي n يجعل حاصل الضرب:

$$2^{\frac{1}{7}} \times 2^{\frac{3}{7}} \times 2^{\frac{5}{7}} \times \dots \times 2^{\frac{1}{7}(2n+1)} > 1000?$$

(أ) 7 (ب) 9 (ج) 11 (د) 17 (هـ) 19

ج14: مجموع الأسس $\left[1+3+5+\dots+(2n+1)\right]$

نفرض أن عدد حدود المتوالية العددية 1، 3، 5، ...، $2n+1$ يساوي m

$$\therefore (2n+1) = 1 + (m-1) \times 2 \quad \therefore m = n+1$$

$$\therefore \text{مجموع حدود هذه المتوالية} = \frac{1}{2}(n+1)[1+(2n+1)] = (n+1)^2$$

$$\therefore 2^{\frac{1}{7}(2n+1)} > 1000 \quad \therefore \frac{1}{7}(n+1)^2 \log 2 > 3$$

$$\therefore (n+1)^2 > 21 \div \log 2 \quad \therefore (n+1)^2 > 21 \div 0.301$$

$$\therefore (n+1)^2 > 69 \quad \therefore (n+1)^2 > 8^2 \quad \therefore n > 7$$

$$\therefore n = 8 \text{ أو } 9 \text{ أو } 10 \text{ أو } \dots$$

\therefore أصغر عدد فردي يحقق المتباينة هو: $n = 9$

(15) إذا أعطينا مثلثاً متساوي الأضلاع طول ضلعه l ، وأوجدنا المحل الهندسي

لنقطة s التي تقع في مستوى المثلث، والتي مجموع مربعات أبعادها عن رؤوس

المثلث يساوي عدداً ثابتاً k فإن المحل الهندسي للنقطة s :

(أ) يكون دائرة إذا كان $k < l^2$

(ب) يحوي ثلاث نقاط فقط إذا كان: $k = 2l^2$ ، ويكون دائرة إذا كان $k > 2l^2$

(ج) يكون دائرة ذات نصف قطر موجب فقط إذا كان: $l^2 < k < 2l^2$

(د) يحوي على عدداً محدوداً من النقاط لجميع قيم k .


(هـ) الجواب الصحيح ليس واحداً

من الأجوبة السابقة.

ج15: نفرض أن d منتصف bc

m مركز المثلث متساوي الأضلاع

$\therefore m$ تقسم \overline{ad} بنسبة 2 : 1



$$\overline{md} = \frac{1}{3} l \sin 60^\circ \quad , \quad \overline{ma} = \frac{2}{3} l \sin 60^\circ$$

$$\therefore (\overline{sa})^2 + (\overline{sb})^2 + (\overline{sc})^2 = k$$

$$\therefore (\overline{sa})^2 + (\overline{sd})^2 + (\overline{bd})^2 = k$$

$$\therefore [(\overline{ms})^2 + (\overline{ma})^2 \pm 2\overline{ma} \times \overline{mx}] + 2[(\overline{ms})^2 + (\overline{md})^2 \pm 2\overline{md} \times \overline{mx}] + 2(\overline{bd})^2 = k$$

$$\therefore 3(\overline{ms})^2 + (\overline{ma})^2 + 2(\overline{bd})^2 = k$$

$$\therefore 2(\overline{ms})^2 + \frac{4}{9} l^2 \sin^2 60^\circ + \frac{2}{9} l^2 \sin^2 60^\circ + \frac{1}{2} l^2 = k$$

$$\therefore 3(\overline{ms})^2 + l^2 = k \quad \therefore (\overline{ms})^2 = \frac{1}{3}(k - l^2)$$

فإذا كان: $k > l^2$ فإن النقطة θ تتحرك على الدائرة مركزها m ونصف قطرها

$$\sqrt{\frac{1}{3}(k - l^2)} \text{ يساوي}$$

(16) إذا كان: ${}_r \theta^n = \frac{|n|}{|r| |n-r|}$ حيث r, n عددان صحيحان،

فإن: $1 \leq r < n$ يكون عددًا صحيحًا.

(أ) لجميع قيم r, n (ب) لجميع قيم r, n الزوجية ولكن ليس لجميع قيم r, n

(ج) لجميع قيم r, n الفردية ولكن ليس لجميع قيم r, n

(د) عندما $r = 1$ أو $r = n - 1$ ولكن ليس لجميع قيم r, n الفردية.

(هـ) إذا كانت n تقبل القسمة على r ولكن ليس لجميع قيم r, n الزوجية.

ج16:

$$\frac{n-2r-1}{r+1} = \frac{n-2r-2+1}{r+1} = \frac{(n+1)-2(r+1)}{(r+1)} = \frac{n+1}{r+1} - 2$$

$$\therefore \frac{n-2r-1}{r+1} \times {}_r \theta^n = \left(\frac{n+1}{r+1} - 2 \right) {}_r \theta^n$$

$$= \frac{n+1}{r+1} \times {}_r \theta^n - 2 {}_r \theta^n = {}_r \theta^n = \frac{(n+1)|n|}{(r+1)|r| |n-r|} - 2 {}_r \theta^n {}_r \theta^n =$$

$$= \frac{|n+1|}{|r+1| |(n+1)-(r+1)|} - 2 {}_r \theta^n = {}_{r+1} \theta^{n+1} - 2 {}_r \theta^n$$

= عدد صحيح - عدد صحيح = عدد صحيح لجميع قيم r, n

(17) ما هو عدد الثلاثيات المرتبة (x, y, z) التي تحقق المعادلات الآتية:

$$x + 2y + 4z = 12, \quad xy + 4yz + 2xz = 22, \quad xyz = 6$$

(أ) لا يوجد أي ثلاثية (ب) 1 (ج) 2 (د) 4 (هـ) 6

ج17:

$$x + 2y + 4z = 12 \quad \dots (1)$$

$$xy + 4yz + 2xz = 22 \quad \dots (2) \quad \quad \quad xyz = 6 \quad \dots (3)$$

$$\therefore \text{من (1): } x + 4z = 12 - 2y \quad \dots (4)$$

$$\therefore \text{من (2): } y(x + 4z) + 2xz = 22 \quad \dots (5)$$

$$\therefore \text{من (3): } xz = \frac{6}{y} \quad \dots (6)$$

بالتعويض من (4)، (6) في (5) ينتج أن:

$$y(12 - 2y) + \frac{12}{y} = 22 \quad \therefore y^2 - 6y^2 + 11y - 6 = 0$$

\therefore مجموع معاملات حدود الطرف الأيمن = 0

$\therefore y = 1$ هو حل للمعادلة (7)

من السهل إثبات أن الحلين الآخرين للمعادلة (7) هما 2، 3

$\therefore y = 1$ أو 2 أو 3

عندما $y = 1$: من (4): $x + 4z = 10$ من (6): $xz = 6$

بحل المعادلتين: 4 أو $x = 6$ ، $z = 1$ أو $\frac{3}{2}$

\therefore كل من $(\frac{3}{2}, 1, 4)$ ، $(1, 1, 6)$ هي حل للمعادلات الثلاث

بالمثل عندما $y = 2$ يمكن إثبات أن: $\frac{3}{2}$ أو $z = \frac{1}{2}$ ، $z = 2$ أو 6

\therefore كل من $(\frac{1}{3}, 2, 6)$ ، $(2, 2, \frac{3}{2})$ حل للمعادلات المعطاة

وبالمثل عندما $y = 3$ يمكن إثبات أن: 1 أو $z = \frac{1}{2}$ ، $z = 2$ أو 4

\therefore كل من $(1, 3, 2)$ ، $(\frac{1}{2}, 3, 4)$ حل للمعادلات المعطاة

\therefore يوجد 6 ثلاثيات مرتبة (x, y, z) تحقق المعادلات.

(3) المسابقة الدولية للرياضيات لسنة 1969م

أرسلت الدول المتسابقة 70 مسألة للجنة المحلفين. وهؤلاء اختاروا من بينها 6 مسائل اعتبرت مناسبة لكل من الفرق المتسابقة (مثلاً روعي اختلاف المناهج من دولة لدولة). وكان آنذاك هناك جهود تبذل لإدخال رياضيات حديثة وأفكار جديدة. ولكن منظمي المسابقة رغم تحيزهم لمواضيع (متجهات - هندسية تحليلية - تفاضل - تركيبات رياضية - أعداد مركبة - احتمالات ... إلخ) إلا أنهم لا يتفقون تماماً عند التنفيذ ولكن المنظمين يضعون في بالهم الاتجاه نحو التجديد.

ومن المعلوم أن المسائل من مستوى عال جداً.

ومن بين 112 مسابقاً حصل على الدرجة النهائية ثلاثة متسابقين فقط من (المجر ، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي (السابق)).

مسألة (1): وضعتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية:

برهن أن هناك أعداداً طبيعية لا نهائية a تخضع للشرط الآتي: العدد $\theta = n^4 + a$ ليس عدداً أولياً حيث n أي عدد طبيعي.

مسألة (2): وضعتها المجر:

a_1, a_2, \dots, a_n ثوابت حقيقة، x متغير حقيقي:

$$d(x) = \cos(a_1 + x) + \frac{1}{2} \cos(a_2 + x) + \frac{1}{4} \cos(a_3 + x) + \dots + \frac{1}{n-1} \cos(a_n + x)$$

برهن أنه إذا كان: $d(x_1) = d(x_2) = 0$

فإن: $x_2 - x_1 = mt$ حيث m عدد صحيح.

مسألة (3): وضعتها بولندا:

لكل $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ حدد الشروط الضرورية والكافية التي تحقق في العدد الحقيقي a بحيث أنه يوجد هرم ثلاثي k حرفاً منه طول كل منهما a والباقي من الأحرف $6 - k$ طول كل حرف الوحدة.

مسألة (4): وضعتها هولندا:

\overline{ab} قطر لنصف دائرة $c \in y$, $c \neq b$ حيث $c \neq a$ رسم \overline{cd} عمود على \overline{ab}
 d_1, d_2, d_3 ثلاث دوائر لها \overline{ab} مماس مشترك d_1 الدائرة الداخلة للمثلث abc ،
 d_2, d_3 كل منها تماس \overline{cd} وتمس y
 برهن أن الدوائر الثلاث d_1, d_2, d_3 لها مماس مشترك آخر.

مسألة (5): وضعتها منغوليا:

أعطيت n نقطة ($n > 4$) ليس بينها أي ثلاث على استقامة واحدة وكلها في مستوى واحد.
 برهن أنه يوجد على الأقل 2^{n-3} شكل رباعي محدب رؤوسه من النقط المعلومة.

مسألة (6): وضعها الاتحاد السوفيتي:

برهن أنه لكل الأعداد الحقيقية $x_1, x_2, y_1, y_2, t_1, t_2$ حيث $x_1 > 0, x_2 > 0$ ،
 $x_2 y_2 - t_2^2 > 0, x_1 y_1 - t_1^2 > 0$ فالمتباينة الآتية صحيحة:

$$\frac{8}{(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) - (t_1 + t_2)^2} \leq \frac{1}{x_1 y_1 - t_1^2} + \frac{1}{x_2 y_2 - t_2^2}$$

بين الشروط الكافية والضرورية لصحة علامة التساوي.

الدول المشتركة 14 دولة وكل فريق دولة مكون من 8 أفراد، وكان المطلوب الإجابة في كل من يومين متتالين على 3 أسئلة والزمن 240 دقيقة في كل حالة.