

الباب الثامن

المصفوفات والمحددات

Determinates and Matrices

في هذا الباب سوف ندرس المفاهيم الأساسية في نظرية المصفوفات والمحددات وكذلك نذكر بعض العمليات البسيطة على المصفوفات مثل جمع وطرح وضرب وقسمة المصفوفات وسوف نذكر طرقاً لإيجاد معكوس المصفوفة وكتطبيق على المصفوفة سوف ندرس في الأبواب القادمة حل المعادلات الخطية سواء كانت متتجانسة أو غير متتجانسة وأخيراً سوف ندرس القيمة الذاتية (المميزة) والمعادلة المميزة للمصفوفة، ولنبدأ بتعريف المصفوفة.

(١.٨) تعريف المصفوفة وخصائصها:

المصفوفة من رتبة $m \times n$ هي ترتيب array لكميات تتسمى إلى حقل ما F في m من الصفوف، n من الأعمدة على شكل مستطيل rectangular matrix في الصورة:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

وتكتب في الصورة الرمزية الآتية: a_{ij} ، $A = [a_{ij}]$ ، $1 \leq i \leq m$ ، $1 \leq j \leq n$ ، وتسمى عناصر المصفوفة سواء كانت حقيقية أو مركبة. ومن الآن فصاعداً سوف نرمز للمصفوفة بالحروف الكبيرة ... A, B, C, D, \dots ولعناصرها بالرموز ... $a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, \dots$.

فمثلاً المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة 3×2 أي تكون من صفين

وثلاثة أعمدة والمصفوفة $A = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}]$ من رتبة $n \times 1$ أي مصفوفة ذات صف واحد، و n من الأعمدة وتسمى مصفوفة صف row matrix. وكذلك

المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ من رتبة $m \times 1$ أي لها m من الصفوف، عمود واحد

وتسمى مصفوفة عمود column matrix وإذا كانت $n = m$ أي عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة تسمى المصفوفة A مصفوفة مربعة square matrix وتنكتب

في الصورة: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ وهي مصفوفة من الدرجة $n \times n$

وتسمى العناصر a_{ij} ($i=1,2,3,\dots,n$) في المصفوفة المربعة A عناصر القطر الرئيسي أو العناصر القطرية وتسمى حاصل جمع العناصر القطرية لمصفوفة مربعة أثر المصفوفة trace ويرمز له بالرمز $\text{Tr}(A)$ أي أن:

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

العمليات الحيدرية على المصفوفات: التساوي:

يقال لمصفوفتين $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ أنها متساوية $A=B$ إذا وإذا فقط كان كل عنصر من A مساوياً للعنصر المقابل له من B أي إذا كان و كان فقط: $a_{ij} = b_{ij}, \forall i, j$

المصفوفات الصفرية Zero matrix

تسمى المصفوفة التي كل عناصرها أصفاراً بالمصفوفة الصفرية ويرمز لها بالرمز 0.
الجمع (الطرح):

يقال للمصفوفتين $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ أكما قابلتان للجمع (الطرح) إذا كان عدد
أعمدة A مساوياً عدد أعمدة B وعدد صفوف A مساوياً لعدد صفوف B أي

$$A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}] \quad \text{لهم نفس الأبعاد ويكون}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \quad \underline{\text{مثال (١): إذا كانت}}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix} \quad \text{بالمثل يكون}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \underline{\text{مثال (٢): إذا كانت}}$$

A-B & A+B

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 4 & -1 & -2 \\ 5 & -3 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A - B = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -3 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad \underline{\text{الحل:}}$$

إذا كانت C, A, B, قابلة للجمع فإنه يكون:

(i) $A + B = B + A$ خاصية الإبدال Commutative

(ii) $(A+B) + C = A+(B+C)$ خاصية الدمج Associative

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| (iii) $A + O = O + A = A$ | identity | العنصر المحادي |
| (iv) $A - A = O$ | inverse | المعكوس |
| (v) If $A + B = A + C \Rightarrow B = C$ | canciliation | |

ويُمكن للطالب برهان الخواص السابقة ومنها يمكن إثبات أن مجموعة المصفوفات ذات الأبعاد $n \times n$ تكون زمرة إبدالية مع عملية الجمع.

عملية الضرب في عدد:

إذا كان $F \in k$ أي عدد حقيقي أو تخيلي فإن حاصل الضرب kA هو المصفوفة التي عناصرها ka_{ij} أي إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = (a_{ij})$$

$$kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nn} \end{bmatrix} = (ka_{ij})$$

إذا كان c, k أي عددين، A, B مصفوفتان قابلتان للجمع فإن الخواص التالية تكون محققة:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (i) $k(A + B) = kA + kB$ | (ii) $(c+k)A = cA + kA$ |
| (iii) $c(kA) = c k A$ | (iv) $1 \cdot A = A$ |

ضرب المصفوفات

المصفوفتان A, B تكونان قابلتان للضرب AB إذا وإذا فقط كان عدد أعمدة الأولى مساوياً لعدد صفوف الثانية. أي إذا كان $A = [a_{ik}], B = [b_{kj}]$ مصفوفتان

ذات الأبعاد $m \times n, n \times s$ على الترتيب فإن

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) = (c_{ij}), c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

حيث A, B مصفوفة ذات الأبعاد $m \times s$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

مثال (٣): إذا كان

واضح أن A, B قابلتان للضرب فإن:

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{مثلاً (٤):} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

إذا كان

الحل: نلاحظ أن أعمدة A تساوي عدد صفوف B أي تكون المصفوفتان A, B

قابلتان للضرب ويكون :

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.1 + 1.5 & 2(-2) + 1.3 \\ 3.1 + 4.5 & 3(-2) + 4.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 23 & 6 \end{bmatrix}$$

الخواص التالية تعطي خواص الدمج والتوزيع لضرب المصفوفات وهذه الخواص تناظر خواص الدمج والتوزيع في حالة حقول الأعداد، ويمكن ذكر هذه الخواص كالتالي:

نفرض أن A, B, C مصفوفات متوافقة بالنسبة للجمع والضرب فإن الخواص التالية تكون محققة:

$$(i) \quad A(BC) = (AB)C$$

$$(ii) \quad A(B+C) = AB + AC$$

- (iii) $(A + B) C = A C + B C$ (iv) $A B = 0 \Rightarrow A = 0, B = 0$
 (v) $A B = A C \Rightarrow B = C$ (vi) $A B \neq B A$

ويكفي للطالب برهان الخواص (i), (ii), (iii) بسهولة.

ولتوضيح الخواص (iv), (v), (vi) نعطي الأمثلة التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

إذا كانت

$$A B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

نلاحظ أن: $A \neq O, B \neq O$ بالرغم من أن $A B = O$ وهذا يوضح الخاصية (iv).

للطالب أن يلاحظ الاختلاف الكبير بين ضرب الكميات القياسية وضرب المصفوفات فإذا كانت A, B كميتين قياسيتين فإن: $B = 0$ أو $A = 0 \Rightarrow A B = 0$.

ولتوضيح الخاصية (v) نعطي المثال الآتي:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

من السهل أن نجد أن $A B = A C$ ولكن $B \neq C$.

ولتوضيح الخاصية (vi) نعطي المثال التالي :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

إذا كانت:

$$\therefore A B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

وبالتالي فإن $AB \neq BA$ أي أن عملية الضرب لا تتحقق خاصية الإبدال.

قسمة المصفوفات:

على الطالب ملاحظة أنه لا وجود لقسمة مصفوفة على مصفوفة فإذا كانت A, B مصفوفتين فإن $\frac{A}{B}$ غير موجود ولكن إذا كانت B^{-1} موجودة فإن العملية المكافئة $A^{-1} A B^{-1}$ أو $A B^{-1}$ هي المعرفة على المصفوفات، يسمى B^{-1} معكوس المصفوفة B وسوف ندرس كيفية إيجاد معكوس المصفوفة فيما بعد.

التجزيء Partitioning

في حالة المصفوفة ذات الأبعاد الكبيرة نجزئ المصفوفة إلى مجموعة من المصفوفات

$$A = [a_{ij}] \Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} A_{11} & | & A_{12} \\ \hline A_{21} & | & A_{22} \end{bmatrix} \quad \text{الجزئية فمثلاً:}$$

$$B = [b_{ij}] \Leftrightarrow B = \begin{bmatrix} B_{11} & | & B_{12} \\ \hline B_{21} & | & B_{22} \end{bmatrix} \quad \text{وكذلك}$$

ويمكن استخدام هذا التجزيء في العمليات المختلفة على المصفوفات فعمليّة

$$A B = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & | & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ \hline A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & | & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix} \quad \text{الضرب مثلاً}$$

مثال (٥): استخدم طريقة التجزيء في حساب $A B$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{حيث}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix} : \underline{\text{الحل:}}$$

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$A = \left[\begin{array}{cc} [2 & 1][1 & 1 & 1] + [0][2 & 3 & 1] & [2 & 1][0] + [0][2] \\ [3 & 2][2 & 1 & 1] + [0][2 & 3 & 1] & [1 & 0][0] + [1][2] \end{array} \right]$$

$$= \left[\begin{array}{cc} [4 & 3 & 3] + [0 & 0 & 0] & [0] + [0] \\ [7 & 5 & 5] + [0 & 0 & 0] & [0] + [0] \end{array} \right]$$

$$= \left[\begin{array}{cc} [1 & 1 & 1] + [2 & 3 & 1] & [0] + [2] \end{array} \right]$$

$$= \left[\begin{array}{cc} [4 & 3 & 3] & [0] \\ [7 & 5 & 5] & [0] \\ [3 & 4 & 2] & [2] \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc} 4 & 3 & 3 & 0 \\ 7 & 5 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

مدور المصفوفة (المصفوفة البديلة)

إذا كانت $A = [a_{ij}]$ فإن مدور المصفوفة A هو المصفوفة الناتجة من حعمل الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف ونرمز له بالرمز A^T وتعرف كما يلي:

$$A^T = [a_{ji}]$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{فإن } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

مثال (٦) : إذا كان

ويجب على الطالب ملاحظة أنه لأي مصفوفتين A, B يمكن بسهولة إثبات صحة العلاقات الآتية:

$$(i) \quad (AB)^T = B^T A^T$$

$$(ii) \quad (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(iii) \quad (kA)^T = kA^T$$

بعض أنواع المصفوفات: المصفوفة الصفرية Null Matrix

المصفوفة الصفرية هي المصفوفة التي عناصرها أصفار أي المصفوفة التي على الصورة

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

ويرمز لها بالرمز O .

مصفوفة الوحدة (المحايدة) Identity Matrix

إذا كانت A مصفوفة مربعة وكان $a_{ij} = 0, \forall i > j$ فإن المصفوفة تسمى مثلثية عليا

وإذا كان $a_{ij} = 0, \forall i < j$ فإن المصفوفة تسمى Upper triangular matrix

مصفوفة مثلثية سفلية Lower triangular matrix أي يكون كل منهما على

الصورة

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

مصفوفة مثلثية عليا.

$$\text{مصفوفة مثلثية سفلية.} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{وتسمي المصفوفة المربعة}$$

مثلثية عليا وسفلی بالمصفوفة القطرية (Diagonal Matrix) وعادة تكتب على
الصورة : $D = \text{diag}(a_{11} a_{22} \dots a_{nn})$

أما إذا كانت $D = \text{diag}(\lambda \ \lambda \ \dots \ \lambda)$ أي $a_{ii} = \lambda, \forall i = 1, \dots, n$ فإن المصفوفة
تسمى بالمصفوفة العاملية Scalar Matrix.

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad \text{أما إذا كانت } I = \lambda \text{ فإن}$$

المصفوفات السابقة لها الخواص التالية :

(i) إذا كانت A, B مصفوفتان قطريتان لهما نفس الأبعاد فإن $A+B, A-B, AB$
 تكون مصفوفات قطرية.

(ii) إذا كانت A, B مصفوفتان مثلثياتان عليا (سفلي) لهما نفس الأبعاد فإن:
 $A+B, A-B, AB$ تكون أيضاً مصفوفات مثلثية عليا (سفلي).

المصفوفة المتماثلة Symmetric Matrix

لأي مصفوفة مربعة A إذا كان $A = A^T$ فإن المصفوفة A تسمى مصفوفة متماثلة

وعلى ذلك يكون شرط التماثل هو: $a_{ij} = a_{ji}, \forall i, j$

مثال (٧): إذا كان $A^T = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 5 & 1 & 8 \\ 7 & 8 & 2 \end{bmatrix}$ ومن ذلك تكون المصفوفة A متماثلة.

المصفوفة شبه المتماثلة Skew Symmetric Matrix

المصفوفة المرسدة A والتي تتحقق الشرط $A = -A^T$ تسمى مصفوفة شبه متماثلة أي يكون:

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad (*)$$

وعلى الطالب أن يلاحظ أن عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة شبه المتماثلة يجب أن يكون أصفاراً وذلك لأنه بوضع $j = i$ في (*) فإننا نحصل على

$$a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0, \forall i = j$$

وعلى هذا الأساس المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -3 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ تكون شبه متماثلة.

ولكن المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -3 & 1 & 1 \\ -5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ ليست شبه متماثلة.

المصفوفة الهرميتية Hermitian Matrix

هي مصفوفة مرسدة عناصرها تنتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة وتحقق الشرط :

$$A = \overline{A}^T$$

حيث (-) تمثل عملية الترافق (مرافق العدد المركبي $y = x + i z$ هو $\overline{z} = x - iy$)

أي تكون المصفوفة $A = [a_{ij}]$ مصفوفة هرميتية إذا كان

$$a_{ij} = \overline{a_{ji}}, \forall i, j \quad (*)$$

فمثلاً المصفوفة: $A = \begin{bmatrix} 5 & -1+i & \sqrt{5}-i \\ -1-i & 6 & 1+3i \\ \sqrt{5}+i & 1-3i & 7 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة هيرميتيّة.

وعلى الطالب أن يلاحظ أن عناصر قطر الرئيسي في المصفوفة الهرميّة يجب أن يكون أعداداً حقيقية (وذلك بوضع $j = i$) في (*) ومن تعريف الستراقق يتّسّع المطلوب).

المصفوفة شبه الهرميّة Skew Hermitian Matrix

تُسمى A مصفوفة شبه هيرميّة إذا تحقّق $A = -A^T$ أي يكون

$$a_{ij} = -\overline{a_{ji}} \quad (*)$$

وعلى الطالب ملاحظة أن المصفوفة شبه الهرميّة يكون عناصر قطرها الرئيسيّ كميات مركبة (وذلك بوضع $j = i$ في *) واستخدام خواص الأعداد المركبة).

فمثلاً المصفوفة $A = \begin{bmatrix} -i & 1+i & 3 \\ -1+i & i & 5-3i \\ -3 & -5-3i & 3i \end{bmatrix}$ هي مصفوفة شبه هيرميّة.

المصفوفة الدورية:

يقال أن المصفوفة A أكما دوريّة ودورتها k إذا تحقّق $A^{k+1} = A$, $k \in \mathbb{Z}^+$ وإذا كانت $A^2 = A$, A . حيث $A^2 = A$, فإننا نقول أن A متساوية القوى $k=1$ أي إذا كان $A^k = A$, $k \in \mathbb{Z}^+$ وهذا يؤدي إلى أن $A^k = A$, $k \in \mathbb{Z}^+$ Idempotent

فمثلاً المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة دوريّة لأن:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A$$

وهذا يؤدي إلى أن

$$A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$$

يقال لمصفوفة A أنها ملتفة إذا تحقق I

مثال (٨): أثبت أن A تكون ملتفة إذا كان و كان فقط $0 = (I-A)(I+A)$.

الحل: نفرض أن $0 = (I-A)(I+A)$ وبفك الأقواس نحصل على $0 = I - A^2$ أو

$A^2 = I$ أي أن A مصفوفة ملتفة.

نفرض أن A ملتفة أي $I - A^2 = I - I = 0$ فإن $A^2 = I$

كما تسمى المصفوفة A التي تتحقق الخاصية: $A^p = 0$, $p \in \mathbb{Z}^+$ مصفوفة معدومة

القوى من الرتبة p حيث p أصغر عدد صحيح موجب يتحقق العلاقة $0 = A^p$

.Nilpotent

فمثلاً المصفوفة معدومة القوى من الرتبة 3 لأن:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^3 = A^2 \cdot A = 0$$

(٢.٨) المحددات

نفرض أنه أعطى جدول مربع من تسعة أعداد $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

ومحمد الرتبة الثالثة المناظر للجدول (1) هو العدد الذي يرمز له بالرمز :

$$\left| \begin{array}{ccc} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \right|$$

ويحدد بالمتساوية

$$\left| \begin{array}{ccc} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \right| = \quad (2)$$

$$a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - c_1b_2a_3 - c_1b_2a_3 - b_1a_2c_3 - a_1c_2b_3$$

وتسمى الأعداد $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ عناصر المحدد. وتقع العناصر a_1, b_2, c_3 على القطر الرئيسي للمحدد. وتكون العناصر a_3, b_2, c_1 قطر المحدد الثاني.

ونلاحظ أن الحدود الثلاثة الأولى في الطرف الأيمن للمتساوية (2) هي عبارة عن حواصل ضرب كل ثلاثة عناصر من عناصر المحدد كما هو موضح بالخطوط المختلفة على الرسم التالي :

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

ولحصول على الحدود الثلاثة الأخرى في الطرف الأيمن للمتساوية (2) لابد من ضرب كل ثلاثة عناصر من عناصر المحدد في بعضها بالطريقة الموضحة بالخطوط المختلفة في الرسم السابق، ثم تغيير إشارة كل حاصل ضرب ينتج.

وتكفل القاعدة المذكورة الآن والتي تسمى بقاعدة المثلثات كتابة العلاقة (2) دون إجهاد للذاكرة، كما تكفل أيضا حساب المحدد من الرتبة الثالثة عندما تكون عناصره أعداد معطاة (دون كتابة العلاقة (2) مسبقاً). فعلى سبيل المثال:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 3.1.(-2) + (-2).3.2 + (-2).0.1 - 2.1.1 - 3.0.3 - (-2).(-2) = -12$$

مثال (١):

تطبق المحددات على نطاق واسع سواء في الرياضيات نفسها أو تطبيقاها المختلفة. وسنبين فيما بعد تطبيق المحددات من الرتبة الثالثة في مسألة دراسة وحلمجموعات من ثلاث معادلات من الدرجة الأولى في ثلاثة مجهيل. ولكننا سنضطر أولاً إلى التعرف على بعض خواص المحددات. وسنجري كل التوضيحات والبراهين المتعلقة بهذه الخواص آخذين في الاعتبار المحددات من الرتبة الثالثة. غير أن كل هذه الخواص إنما تتمتع بما المحددات من كل الرتب.

خواص المحددات:

١— لا تغير قيمة المحدد إذا استبدلت كل صفوفه بأعمدته، وعند ذلك يستبدل كل صف بالعمود الذي يحمل نفس الرقم، أي

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (3)$$

ويمكن أيضاً التعبير عن هذه الخاصية كالتالي: إذا تبدلت أماكن عناصر المحدد الواقعة متماثلة بالنسبة للقطر الرئيسي، لا تتغير قيمة المحدد.
ولإثبات هذه الخاصية يكفي تطبيق قاعدة المثلثات على الطرف الأيمن والطرف الأيسر للمتساوية (3) ومقارنة النتائج.

ملاحظة: الخاصية (1) تكافؤ صفوف وأعمدة المحدد، ولذا يكفي في المستقبل إثبات خواص المحدد المتعلقة بصفوفه وأعمدته لحالة صفوفه فقط أو أعمدته فقط.
٢— إن تبديل مكان عمودين أو صفين في المحدد يكافي ضربه في (-1). فعلى سبيل المثال

مثال (٢):

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (4)$$

ولإثبات المتساوية (4) يكفي تطبيق قاعدة المثلثات على طرفيها الأيمن والأيسر ومقارنة النتائج (وبالمثل تنشأ المتساويات المتشابهة في حالة تبديل أي صفين آخرين في المحدد).

٣— إذا كان للمحدد صفات متساوية العناصر الم対اظرة أو عمودان متساويا العناصر الم対اظرة يكون المحدد مساوياً للصفر.

بالفعل، نفرض أن Δ محدد ما فيه عمودان عناصرهما الم対اظرة متساوية. وإذا بدلنا مكان هذين العمودين فإن المحدد من ناحية (وفقاً للخاصية (٢)) يتغير إشارته،

ولكن من ناحية أخرى (نظراً لأن العمودين متساويان) لا يمكن أن يؤدي تبادل مكانيهما إلى تغيير قيمة المحدد. وبالتالي فإن $\Delta = -\Delta$, أي أن $2\Delta = 0$ أو $\Delta = 0$.

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & 17 \\ 5 & 5 & 8 \\ 7 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 0 \quad \underline{\text{مثال (٣)}}:$$

٤— ضرب كل عناصر عمود واحد أو صف واحد للمحدد في أي عدد k يكفي ضرب المحدد في هذا العدد k .

ويمكن التعبير عن هذه الخاصية أيضاً كالتالي: يمكن إخراج العامل المشترك لعمود واحد أو لصف واحد في المحدد خارج علامة المحدد كله. فعلى سبيل المثال

$$\begin{vmatrix} ka_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & b_2 & c_2 \\ ka_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

ولإثبات هذه الخاصية يكفي أن نشير إلى أن المحدد يصاغ على صورة مجموع يحتوي كل حد من حدوده على عنصر من كل صف ومن كل عمود (انظر الخاصية (٢)).

٥— إذا كانت كل عناصر عمود ما أو صف ما تساوي صفرًا فإن المحدد نفسه يكون مساوياً للصفر. وهذه الخاصية هي حالة خاصة من الخاصية السابقة

(عندما $k = 0$) فعلى سبيل المثال:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 7 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \underline{\text{مثال (٥)}}:$$

٦— إذا كانت العناصر المعاشرة لعمودين أو لصفين متناسبة فإن المحدد يكون مساوياً للصفر.

تنتج هذه الخاصية من الخاصيتين ٣، ٤. فبالفعل إذا كانت عناصر عمودين متناسبة فإن عناصر أحد هذين العمودين تنتج من عناصر الآخر بضربيها في معامل مشترك، وبإخراج هذا المعامل خارج علامة المحدد نحصل على محدد ذي عمودين عناصرهما المعاشرة متساوية ووفقاً للخاصية ٣ يكون هذا المحدد مساوياً للصفر. فعلى سبيل المثال.

$$\begin{vmatrix} 8 & 4 & 7 \\ 10 & 5 & 9 \\ 6 & 3 & 11 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 4 & 4 & 7 \\ 5 & 5 & 9 \\ 3 & 3 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

مثال (٦) :

٧— إذا كان كل عنصر من عناصر العمود رقم n (أو الصف رقم n) للمحدد عبارة عن مجموع حددين، فإنه يمكن التعبير عن المحدد في صورة مجموع محدددين يحتوي أحدهما في عموده رقم n (أو في صفه رقم n) على الحدود الأولى من الحدود المذكورة سابقاً، والثاني على الحدود الثانية، وتكون العناصر في باقي

الأماكن في كل المحددات الثلاثة هي نفسها، فعلى سبيل المثال

$$\begin{vmatrix} a'_1 + a''_1 & b_1 & c_1 \\ a'_2 + a''_2 & b_2 & c_2 \\ a'_3 + a''_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_1 & b_1 & c_1 \\ a'_2 & b_2 & c_2 \\ a'_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a''_1 & b_1 & c_1 \\ a''_2 & b_2 & c_2 \\ a''_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال (٧) :

ولإثبات هذه المتساوية، يكفي تطبيق قاعدة المثلثات على المحددات في الطرفين ومقارنة النتائج.

— إذا أضيفت إلى عناصر عمود ما (أو صف ما) العناصر الم対اظرة في عمود آخر (أو في صف آخر)، مضروبة في أي معامل مشترك، لا تغير قيمة المحدد عند ذلك.

والخاصية ٨ تنتج من الخاصيتين ٦، ٧ : ولنوضح هذا بمثال. نفرض أنه أضيفت إلى عناصر العمود الأول عناصر العمود الثاني مضروبة في عدد ما k . عندئذ نحصل، وفقاً للخاصية ٧، على :

$$\begin{vmatrix} a_1 + kb_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + kb_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + kb_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} kb_1 & b_1 & c_1 \\ kb_2 & b_2 & c_2 \\ kb_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

وللمحدد الثاني من المحددان الناتجين عمودان متناسبان العناصر. وبالتالي وفقاً للخاصية ٦ يكون مساوياً للصفر، فنحصل على المتساوية التالية:

$$\begin{vmatrix} a_1 + kb_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + kb_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + kb_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

التي تعبر، في هذه الحالة، عن الخاصية ٨ المذكورة للمحدد.
وترتبط الخواص الأخرى للمحددات بمفهوم المكمل الجبرى أو المرافق الأصغر (minor).

— إذا كانت A مصفوفة قطرية أو مثلثية عليا أو سفلية فإن محدد A هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي أي يكون:

$$\text{Det}(A) = |A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

المكمالت الجبرية (الرافقات) والمحددات الصغرى (المحدّدات)

Cofactors and minors

ندرس المحدد

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (1)$$

ووفقاً للتعريف فإن قيمة المحدد هي:

$$\Delta = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - c_1 b_2 a_3 - b_1 a_2 c_3 - a_1 c_2 b_3 \quad (2)$$

نجمع هنا الحدود المحتوية على عنصر واحد ما من عناصر المحدد ثم نخرج هذا العنصر خارج قوسين. ويسمى المقدار المتبقى داخل القوسين بالمكمل الجبري أو الرافقة لهذا العنصر. وسترمز إلى المكمل الجبري بحرف كبير ينفس تسمية الحرف الذي يرمز إلى نفس العنصر وبنفس رقمه. فمثلاً نرمز إلى المكمل الجبري للعنصر a_1 بالحرف A_1 ، وللعنصر b_1 بالحرف B_1 وهكذا.

ـ المحدد يساوي مجموع حواصل ضرب عناصر عمود ما (أو صف) في مكملاتها الجبرية أو رافقاتها. أو بعبارة أخرى تكون المتساوىات التالية

صحيحة:

$$\Delta = a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 \quad \Delta = a_1 A_1 + b_1 B_1 + c_1 C_1 \quad (3)$$

$$\Delta = b_1 B_1 + b_2 B_2 + b_3 B_3 \quad \Delta = a_2 A_2 + b_2 B_2 + c_2 C_2 \quad (4)$$

$$\Delta = c_1 C_1 + c_2 C_2 + c_3 C_3 \quad \Delta = a_3 A_3 + b_3 B_3 + c_3 C_3 \quad (5)$$

ولإثبات المتساوية الأولى من هذه المتساويات، على سبيل المثال، يكفي أن نكتب الطرف الأيمن للعلاقة (2) في الصورة :

$$\Delta = a_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) + a_2(b_3 c_1 - b_1 c_3) + a_3(b_1 c_2 + b_2 c_1)$$

حيث المقادير داخل الأقواس هي عبارة عن المكملاة الجبرية للعناصر a_1, a_2, a_3

$$b_2 c_3 - b_3 c_2 = A_1; \quad b_3 c_1 - b_1 c_3 = A_2, \quad b_1 c_2 - b_2 c_1 = A_3$$

ومن هنا، وما سبق نحصل على: $\Delta = a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3$

وهو المطلوب إثباته. وتنثبت المتساويات الأخرى (٥-٣) بالمثل.

وتسمى طريقة كتابة المحدد وفقاً لعلاقة من العلاقات (٣-٥) بفك المحدد بعناصر

عمود ما أو صف ما (تعطى العلاقة الأولى مفكوك المحدد بعناصر العمود الأول

والأخ ...).

المحدد الأصغر (المحدد) لعنصر ما من عناصر المحدد هو المحدد الناتج من المحدد

المعطى بواسطة شطب العمود والصف الذي يقع في تقاطعهما هذا العنصر. فعلى

سبيل المثال المحدد الأصغر للعنصر a_1 في المحدد Δ هو المحدد $\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ والمحدد

الأصغر للعنصر b_1 هو المحدد $\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$ وهكذا.

ويتبين أن المكمل الجبري cofactor لأي عنصر من عناصر المحدد يساوي المحدد

الأصغر لهذا العنصر مأخوذاً بإشارته، إذا كان مجموع رقمي العمود والصف اللذين

يقع في تقاطعهما هذا العنصر عدداً زوجياً، وبإشارة مخالفة إذا كان هذا المجموع

عدداً فردياً. ولكي يتتأكد الطالب من صحة هذه المقوله عليه أن يدرس المكملاة

الجبرية لكل عناصر المحدد ويقارنها بالمحددات الصغرى.

ويسهل الموضوع المذكور أعلاه كثيراً باستخدام العلاقات (٣-٥) بشكل جوهري،

إذ يكفل كتابة المكملاة الجبرية لعناصر المحدد بمجرد النظر إلى هذا المحدد

ومباشرة. وعند ذلك فمن المفيد أيضاً الأخذ في الاعتبار الجدول التالي:

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

حيث الإشارة الموجبة تعلم أماكن تلك العناصر التي مكملاتها الجبرية تساوي محدداتها الصغرى مأخوذة بنفس إشارتها.

مثال (٨): احسب المحدد $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 12 & 19 \\ 3 & 9 & 17 \end{vmatrix}$ بفكه عن طريق عناصر الصف الأول.

الحل: $\Delta = 2 \begin{vmatrix} 12 & 19 \\ 9 & 17 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 5 & 19 \\ 3 & 17 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 5 & 12 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 8$

ملاحظة: يمكن تسهيل حساب المحدد بواسطة فكه بعناصر عمود أو صف، إذا حولنا هذا المحدد مسبقاً بالاستعانة بالخاصية ٨. وبالذات، بضرب عناصر عمود ما (أو صف ما) في أي معامل مشترك ثم بعد ذلك بإضافتها إلى عناصر عمود آخر (أو صف آخر) تحصل على محدد جديد مساو للمعطى، وعند الاختيار المناسب للمعامل المشترك يمكن التوصل إلى أن يكون أحد عناصر المحدد الناتج مساوياً للصفر. وبتطبيق هذه العملية مرتين تحصل على محدد يكون عبارة من عناصر أحد صفوفه (أو أعمدته) متساوين للصفر. ولحساب مثل هذا المحدد بواسطة فكه بعناصر الصف المذكور (أو العمود) يتحتم علينا أن نحسب محدداً أصغر واحداً فقط، نظراً لأن المحددان الأصغرين الآخرين يكونان مضروبين في هذه الحالة في عنصريين متساوين للصفر. وهكذا، فمثلاً، بحساب المحدد Δ الوارد في المثال السابق

نضيف إلى عناصر عموده الثاني عناصر عموده الأول مضروبة في (2) ثم نضيف إلى عناصر عموده الثالث عناصر عموده الأول مضروبة في (3) فنحصل على :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

وبفك هذا المحدد بعناصر الصفر الأول نجد أن:

$$\Delta = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 8$$

سنعرض هنا عدة صيغ هامة لحل ودراسةمجموعات المعادلات من الدرجة الأولى في ثلاثة مجاهيل (تستخدم صيغ مماثلة تتعلق بالمحددات من الرتب الأعلى من الثالثة حل ودراسةمجموعات المعادلات من الدرجة الأولى في أي عدد من المجاهيل).

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (1)$$

نفكه بعناصر صفر ما أو عمود ما، مثلاً بعناصر العمود الأول:

$$\Delta = a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 \quad (6)$$

نستبدل في الطرف الأيمن لهذه المتساوية الأعداد a_1, a_2, a_3 بأية ثلاثة أعداد h_1, h_2, h_3 ، عندئذ يكون الطرف الأيمن للمتساوية (6) هو عبارة عن مفكوك عناصر العمود الأول للمحدد الذي ينتج من المحدد Δ باستبدال عناصر عموده الأول بالأعداد : h_1, h_2, h_3

$$h_1 A_1 + h_2 A_2 + h_3 A_3 = \begin{vmatrix} h_1 & b_1 & c_1 \\ h_2 & b_2 & c_2 \\ h_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (7)$$

نختار الآن بمحاباة h_1, h_2, h_3 عناصر العمود الثاني أو الثالث للمحدد المعطى (أي نأخذ $h_1 = b_1, h_2 = b_2, h_3 = b_3$ أو نأخذ $h_1 = c_1, h_2 = c_2, h_3 = c_3$) . وفي هذه الحالة يكون للمحدد (7) عمودان متساويا العناصر، وبالتالي يكون هذا المحدد مساوياً للصفر، فنحصل على المتساوية:

$$b_1 A_1 + b_2 A_2 + b_3 A_3 = 0 \quad (8)$$

أو

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 = 0 \quad (9)$$

وإذا انتلقنا في البداية من مفهوك Δ بعناصر عموده الثاني، فإننا نحصل بطريقتنا مشابهة على المتساويتين:

$$a_1 B_1 + a_2 B_2 + a_3 B_3 = 0, \quad (10)$$

$$c_1 B_1 + c_2 B_2 + c_3 B_3 = 0 \quad (11)$$

وانطلاقاً من مفهوك Δ بعناصر عموده الثالث، نحصل على المتساويتين:

$$a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_3 = 0, \quad (12)$$

$$b_1 C_1 + b_2 C_2 + b_3 C_3 = 0 \quad (13)$$

وعلاوة على ذلك تنتهي ست متساويات مماثلة لصفوف المحدد.

وعلى أساس ما سبق عرضه يمكننا أن نصيغ الخاصية التالية للمحددات:

- ١- مجموع حواصل ضرب عناصر عمود ما (أو صف ما) للمحدد في المكملا
- الجبرية للعناصر الم対ية في عمود آخر (أو صف آخر) يساوي صفرًا.

(٣.٨) حل مجموعة من المعادلات الخطية باستخدام المحددات:
حل ودراسة مجموعة الثلاث معادلات من الدرجة الأولى في ثلاثة مجاهيل:
 ندرس مجموعة الثلاث معادلات

$$\left. \begin{array}{l} a_1 x + b_1 y + c_1 z = h_1, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = h_2, \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = h_3 \end{array} \right\} \quad (1)$$

في المجاهيل x, y, z (نفرض أن المعاملات a_1, b_1, \dots, c_3 والحدود المطلقة h_1, h_2, h_3 معلومة).

ويسمى ثلاثي الأعداد x_0, y_0, z_0 يحل المعادلة (1) إذا حفقت هذه الأعداد معادلات المجموعة (1)، أي عند استبدال الرموز x, y, z بالأعداد x_0, y_0, z_0 تتحول كل معادلة من المجموعة (1) إلى متطابقة حسابية. نقوم بإيجاد كل حلول المجموعة (1)، وأثناء ذلك نجري بحثها ودراستها، أي بالذات نوضح في أي الحالات يكون للمجموعة (1) حل واحد فقط، وفي أي الحالات يكون لها أكثر من حل، وفي أي الحالات لا يكون لها حلول على الإطلاق.

وفي التحليل التالي سيلعب المحدد دوراً رئيسياً :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (2)$$

المكون من معاملات المجاهيل، وهو ما يسمى بمحدد المجموعة المعطاة. سترمز كما سبق إلى المكملاة الجبرية للعناصر a_1, a_2, \dots للمحدد Δ بالرموز A_1, A_2, \dots, A_3 . نضرب طرفي المعادلة الأولى من المجموعة (1) في A_1 والثانية في A_2 والثالثة في A_3 ثم نجمع هذه المعادلات حداً حداً فنحصل على

$$(a_1A_1 + a_2A_2 + a_3A_3)x + (b_1A_1 + b_2A_2 + b_3A_3)y +$$

$$+ (c_1A_1 + c_2A_2 + c_3A_3)z = (h_1A_1 + h_2A_2 + h_3A_3)$$

ومن هنا وعلى أساس المعايير ٩، ١٠ نحصل على :

$$\Delta_x = h_1 A_1 + h_2 A_2 + h_3 A_3 \quad (3)$$

و بالمثل نجد أن:

$$\Delta \cdot y = h_1 B_1 + h_2 B_2 + h_3 B_3 \quad (4)$$

$$\Delta_z = h_1 C_1 + h_2 C_2 + h_3 C_3 \quad (5)$$

نرمز للأطراف اليمنى للمتساويات (5), (4), (3) على الترتيب بالرموز $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$. عندئذ تأخذ المعادلات (5), (4), (3) الصورة

$$\Delta.x = \Delta_x, \Delta.y = \Delta_y, \Delta.z = \Delta_z \quad (6)$$

جیٹ

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} h_1 & b_1 & c_1 \\ h_2 & b_2 & c_2 \\ h_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & h_1 & c_1 \\ a_2 & h_2 & c_2 \\ a_3 & h_3 & c_3 \end{vmatrix}, \Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & h_1 \\ a_2 & b_2 & h_2 \\ a_3 & b_3 & h_3 \end{vmatrix} \quad (7)$$

ومن المفيد أن نشير إلى أن المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ تنتج من المحدد Δ بواسطة استبدال عموده الأول والثاني والثالث على الترتيب بعمود الحدود المطلقة للمجموعة المعطاة.

نفرض أن $\Delta \neq 0$ ، وفي حالة تحقق هذا الشرط نحصل من المعادلات (6) على :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta} \quad , \quad \Delta \neq 0 \quad (8)$$

ومن الواضح أن هذه العلاقات تعطي حل المجموعة المستبطة المكونة من المعادلات (6)، وهي نفسها تعطي أيضاً حل المجموعة الأصلية (1). وإثبات ذلك يجب

التعويض في معادلات المجموعة (١) عن x, y, z بصيغها (٨) والتأكد من تحقق كل معادلة من المجموعة (١). وبإحياء هذا التعويض للمعادلة الأولى، نجد أن:

$$\begin{aligned} a_1 \frac{\Delta_x}{\Delta} + b_1 \frac{\Delta_y}{\Delta} + c_1 \frac{\Delta_z}{\Delta} &= \\ = \frac{1}{\Delta} a_1 (h_1 A_1 + h_2 A_2 + h_3 A_3) + \frac{1}{\Delta} b_1 (h_1 B_1 + h_2 B_2 + h_3 B_3) + \\ + \frac{1}{\Delta} c_1 (h_1 C_1 + h_2 C_2 + h_3 C_3) &= \frac{1}{\Delta} h_1 (a_1 A_1 + b_1 B_1 + c_1 C_1) + \\ + \frac{1}{\Delta} h_2 (a_1 A_2 + b_1 B_2 + c_1 C_2) + \frac{1}{\Delta} h_3 (a_1 A_3 + b_1 B_3 + c_1 C_3) \end{aligned}$$

ولكن وفقاً للخاصية التاسعة للمحددات، يكون:

$$a_1 A_1 + b_1 B_1 + c_1 C_1 = \Delta$$

ووفقاً للخاصية العاشرة، يكون:

$$a_1 A_2 + b_1 B_2 + c_1 C_2 = 0, \quad a_1 A_3 + b_1 B_3 + c_1 C_3 = 0$$

وبذلك يكون:

$$a_1 \frac{\Delta_x}{\Delta} + b_1 \frac{\Delta_y}{\Delta} + c_1 \frac{\Delta_z}{\Delta} = h_1$$

أي الأعداد x, y, z المحددة بالعلاقات (٨) تتحقق المعادلة الأولى من المجموعة المعطاة.

وبالمثل يثبت أن هذه الأعداد تتحقق أيضاً المعادلتين الآخرين.

ويكفل ما سبق عرضه استنتاج النتيجة التالية: إذا كان المحدد $\Delta \neq 0$ ، فإن المجموعة

(١) يكون لها حل وحيد يحدد بالعلاقات (٨).

مثال (٩): تعتبر مجموعة المعادلات

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 4, \\ 3x + 5y + 3z = 1, \\ 2x + 7y - z = 8 \end{array} \right\}$$

عين كل حلولها.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -5 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 33$$

الحل: نحسب محدد المجموعة:

وحيث أن $\Delta \neq 0$ ، فإن المجموعة المعطاة يكون لها حل وحيد يتحدد بالعلاقات (8)

ووفقاً للعلاقات (7)، نجد أن:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -5 & 3 \\ 8 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 33, \Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 33, \Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{vmatrix} = 33$$

وبالتالي فإن $x = 1, y = 1, z = 1$.

نفرض الآن أن محدد المجموعة (1) يساوي الصفر ($\Delta = 0$) وإذا كان في حالة $\Delta = 0$ أن أحد المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ مختلفاً عن الصفر فإنه لا يكون للمجموعة (1) أية حلول على الإطلاق (يقال أن معادلات هذه المجموعة غير متواقة أو متناقضة). (non consistent).

بالفعل، إذا كان $\Delta = 0$ ، ولكن كان أحد المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ غير مساو للصفر فإنه تكون على الأقل إحدى التساويات (6) غير ممكنة، أي لا يكون للمجموعة (6) مستبطة من المجموعة (1)، وبالتالي فكل حل للمجموعة (1) إذا وجد يكون حلاً للمجموعة (6). فعلى سبيل المثال:

مثال (١٠): المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 2, \\ 3x + 2y + 2z = 1, \\ 4x + 3y + 3z = 4 \end{array} \right\}$$

ليس لها حلول لأن $0 = \Delta, \Delta_y = 1 \neq 0$ ، ويمكن التأكد مباشرةً من أن هذه المعادلات متناقضة، وذلك بجمع المعادلتين الأوليين منها حداً ثم طرح الناتج من المعادلة الأخيرة. فنجد أن $0 = 0$ أي متساوية غير صحيحة.

يتبقى علينا دراسة الحالة عندما $\Delta = 0$ وكذلك $\Delta_x = 0, \Delta_y = 0, \Delta_z = 0$ غير أنها سندرس هذه الحالة بعد دراسة ما يسمى بالمجموعة المتجانسة .
Homogenous equations

المجموعة المتجانسة من ثلاثة معادلات من الدرجة الأولى في ثلاثة مساحتين هي المجموعة على الصورة:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 x + b_1 y + c_1 z = 0, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = 0, \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = 0 \end{array} \right\} \quad (9)$$

أي مجموعة المعادلات التي حدودها المطلقة تساوي صفرًا. من الواضح أنه يمكن دائمًا لهذه المجموعة الحل $x = 0, y = 0, z = 0$ ، وهو ما يسمى بالحل الصفرى. وإذا كان $\Delta \neq 0$ يكون هذا الحل وحيداً. وستثبت أنه إذا كان $\Delta = 0$ فإنه يمكن للمجموعة المتجانسة (9) عدد لا نهائي من الحلول غير الصفرية. (في هذه الحالة تكون إما معادلة واحدة من معادلاتها نتيجةً للمعادلتين الآخرين، وإما تكون معادلتين من معادلاتها نتيجةً للمعادلة الثالثة).

نقوم بالإثبات أولاً بافتراض أن أحد المحددات الصغرى للمحدد لا يساوي الصفر.

فنفرض مثلاً أن $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ وبتحقيق هذا الشرط يكون للمعادلتين الأوليين من

المجموعة (9) عدد لا نهائي من الحلول المشتركة غير الصفرية. تتحدد بالعلاقات:

$$x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} t, \quad y = -\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} t, \quad z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} t \quad (10)$$

لأي t . وليس من العسير التأكد من أن في حالة $\Delta = 0$ تتحقق كل هذه الأعداد المعادلة الثالثة أيضاً من المجموعة (9). وبالفعل بالتعويض بما بدلأً من المساهيل في الطرف الأيسر للمعادلة (9). نجد أن:

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = \left(a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - b_3 \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + c_3 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \right) t = \Delta \cdot t$$

فحصل نتيجة للتعويض على صفر نظراً لأنه حسب الشرط يكون $\Delta = 0$. وعلى هذا الأساس تحدد العلاقات (10) لأي t حل المجموعة (9). وإذا كان $t \neq 0$ يكون هذا الحل غير صفرى. وفي الحالة المدروسة يكون في المجموعة معادلتان جوهريتان مستقلتان (المعادلة الثالثة نتيجة للمعادلتين الأوليين).

نفرض الآن أن كل المحددات الصغرى للمحدد Δ تساوى صفرأً عندئذ يكون لكل زوج من المعادلات (9) معادلات متناسبة، وبالتالي فكيفما اخترنا من المجموعة (9) أية معادلتين فإن إحداهما ستكون نتيجة من الأخرى بضرب حدودها في معامل مشترك. وهذا يعني أن في المجموعة (9) معادلة جوهيرية واحدة مستقلة فقط (تكون المعادلتان الآخرين نتيجة لها)، ومن الواضح أن مثل هذه المجموعة عدداً لا يهائياً من الحلول غير الصفرية (نظراً لأنه يمكن إعطاء أي مجھولين أية قيمة عدديّة، وتحديد المجھول الثالث من المعادلة الجوهيرية المستقلة الوحيدة من المجموعة). وبهذا أثبتنا فرضنا، ويمكن صياغة النتيجة التي حصلنا عليها كالتالي :

يكون للمجموعة المتجانسة (9) حلول غير صفرية، فقط وفقط، عندما يكون $\Delta = 0$.

مثال (١١): المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 0, \\ 3x - 5y + 3z = 0, \\ 2x + 7y - z = 0 \end{array} \right\}$$

لها حلٌ صفرٍ فقط، لأن $\Delta = 33 \neq 0$

مثال (١٢): المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 0, \\ 2x + 3y + 2z = 0 \\ 4x + 5y + 4z = 0 \end{array} \right\}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

لها عددٌ لاٌنهائيٌ من الحلول غير الصفرية لأن: $\Delta = 0$
وتحدد كل الحلول بالعلاقات (10)، والتي وفقاً لها يكون: $x = -t, y = 0, z = t$ لأيّة قيمة بارامتر.

مثال (١٣): المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 0, \\ 2x + 2y + 2z = 0, \\ 3x + 3y + 3z = 0 \end{array} \right\}$$

لها أيضاً عددٌ لاٌنهائيٌ من الحلول غير الصفرية لأن $\Delta = 0$. وفي هذه الحالة تكون كل المحددات الصغرى للمحدد Δ مساوية للصفر وتؤول المجموعة إلى معادلة واحدة $x + y + z = 0$. ويكون كل من حلول المجموعة من الأعداد الثلاثة x, y, z حيث y, z أي عددين، أما x فيتعدد من العلاقة $y = -x - z$.

نعود مرة أخرى إلى مجموعة اختيارية غير متجانسة

$$\left. \begin{array}{l} a_1 x + b_1 y + c_1 z = h_1, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = h_2, \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = h_3 \end{array} \right\} \quad (1)$$

ستثبت أنه إذا كان $\Delta = 0$ وكان للمجموعة (1) حل واحد فإنه يكون لها عدد لا نهائي من الحلول المختلفة.

نفرض أن الأعداد x_0, y_0, z_0 تكون حللاً ما من حلول المجموعة (1). نعرض بـ

في المعادلات (1) بدلاً من المحايل فنحصل على متطابقات حسابية:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 x_0 + b_1 y_0 + c_1 z_0 = h_1, \\ a_2 x_0 + b_2 y_0 + c_2 z_0 = h_2, \\ a_3 x_0 + b_3 y_0 + c_3 z_0 = h_3 \end{array} \right\} \quad (11)$$

نطرح المتطابقات (11) حداً حداً من المعادلات المعاشرة (1) (نطرح المطابقة الأولى من (11) من المعادلة الأولى من (1)، والمطابقة الثانية من المعادلة الثانية والمطابقة الثالثة من المعادلة الثالثة). فنحصل على :

$$\left. \begin{array}{l} a_1 (x - x_0) + b_1 (y - y_0) + c_1 (z - z_0) = 0, \\ a_2 (x - x_0) + b_2 (y - y_0) + c_2 (z - z_0) = 0, \\ a_3 (x - x_0) + b_3 (y - y_0) + c_3 (z - z_0) = 0 \end{array} \right\} \quad (12)$$

ندخل الرموز

$$x - x_0 = u, y - y_0 = v, z - z_0 = w \quad (13)$$

ومن ثم نكتب المتساويات (12) كالتالي:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 u + b_1 v + c_1 w = 0, \\ a_2 u + b_2 v + c_2 w = 0, \\ a_3 u + b_3 v + c_3 w = 0 \end{array} \right\} \quad (14)$$

وهذه مجموعة متجانسة من ثلاثة معادلات من الدرجة الأولى في المجاهيل u, v, w , بنفس معاملات المجاهيل كما في المجموعة المعطاة (1). وهي تسمى بالمجموعة المتجانسة المعاشرة للمجموعة غير المتجانسة المعطاة (1). وحيث أن $\Delta = 0$ من الشرط، فإن المجموعة المتجانسة (14) لها عدد لا نهائي من الحلول المختلفة. ومن هنا يتضح أن للمجموعة المعطاة (1) أيضاً عدداً لا إهائياً من الحلول المختلفة. وبالذات، ووفقاً للمتساويات (13) يناظر كل حل u, v, w للمجموعة (14) حل:

$$x = x_0 + u,$$

$$y = y_0 + v,$$

$$z = z_0 + w$$

للمجموعة (1). وبذلك أثبتنا فرضنا السابق.

وعلى أساس ما ذكر تنتج مباشرة الصيغة التالية :

إذا كان $\Delta = 0$ وأيضاً $\Delta_y = \Delta_z = 0$ ، فإنه إما لا يكون للمجموعة (1) حلول على الإطلاق، وإما يكون لها عدد لا إهائياً من الحلول المختلفة (في الحالة الأخيرة تكون على الأقل إحدى معادلات المجموعة نتيجة من المعادلين الآخرين، وتسمى مثل هذه المجموعة بالمجموعة غير المحددة).

مثال (١٤): المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 3, \\ 3x + 3y + 3z = 4 \end{array} \right\}$$

(التي تتحقق الشروط $\Delta = 0, \Delta_x = 0, \Delta_y = 0, \Delta_z = 0$) ليس لها حلول على الإطلاق. بالفعل فحتى المعادلين الأوليين من هذه المجموعة تكونان متناقضتين ولأننا

إذا ضربنا المعادلة الأولى في 2 ثم طرحنا الناتج حداً حداً من المعادلة الثانية لحصلنا على متساوية غير ممكنة $1 = 0$.

مثال (١٥) المجموعة

$$\left. \begin{array}{l} 3x + y - z = 1, \\ 5x + 2y + 3z = 2, \\ 8x + 3y + 2z = 3 \end{array} \right\}$$

(التي تتحقق الشرط $0 = 0$, $\Delta_x = 0$, $\Delta_y = 0$, $\Delta_z = 0$) لها عدد لا نهائي من الحلول. فبالفعل، تكون المعادلة الثالثة من هذه المجموعة نتيجة للمعادلتين الأوليين، فهي تنتج منها بواسطة جمعهما حداً حداً. وعلى هذا الأساس يمكنون في هذه المجموعة معادلتان جوهريتان فقط:

$$\left. \begin{array}{l} 3x + y - z = 1, \\ 5x + 2y + 3z = 2 \end{array} \right\} (*)$$

ولتعيين كل حلولهما المشتركة نكتب المجموعة (*) على الصورة:

$$\left. \begin{array}{l} 3x + y = 1 + z, \\ 5x + 2y = 2 - 3z \end{array} \right\}$$

ونعتبر أن المجهول z هنا قد أعطي قيمة عددية ما. بتطبيق العلاقات (8)، نجد أن:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1+z & 1 \\ 2-3z & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = 5z, y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1+z \\ 5 & 2-3z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = 1-14z,$$

ويكون العددان x, y مع العدد z حل المجموعة المعطاة. وهذه المجموعة عدد لا نهائي من الحلول، لأنه يمكن تحديد القيمة العددية للمجهول z اختيارياً.

- ٤- المحدد يساوي مجموع حواصل ضرب عناصر عمود ما (أو صف) في مكملاتها الجبرية. وبهذا يؤول حساب المحدد من الرتبة n إلى حساب n محدد كل منها من الرتبة $(n-1)$.

- ٥- تتعلق كل خواص المحددات التي سبق لنا عرضها بالمحددات من أية رتبة.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 8 & 5 \\ 2 & 8 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

مثال (١٦): احسب المحدد

الحل: بفك هذا المحدد بعناصر أعلى صف، أي بوضعه على صورة مجموع حواصل

ضرب عناصر أعلى صف في مكملاتها الجبرية، نجد أن:

$$\Delta = 2 \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 2 & 8 & 5 \\ 8 & 7 & 3 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 3 & 8 & 5 \\ 2 & 7 & 3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 4 & 2 & 7 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 8 & 3 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 8 \\ 2 & 8 & 7 \end{vmatrix} = 296$$

ملاحظة: يمكن تبسيط عملية حساب المحدد إذا استخدمنا مسبقاً الخاصية ٨.

المصفوفة المترافقة (المصفوفة المصاحبة)

إذا كان $A = [a_{ij}]$ مصفوفة مربعة من درجة n فإننا نعرف المعامل المترافق α_{ij}

لعنصر a_{ij} وينسب كالتالي: $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

حيث M_{ij} هو المحدد minor الناتج بشطب الصف i والعمود j من المصفوفة A

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \dots & \alpha_{n1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{1n} & \alpha_{2n} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

ومصفوفة المرافقات وزمز لها بالرمز

مفهوم المحدد من أية رتبة:

في المسألة العامة حل ودراسة مجموعات المعادلات من الدرجة الأولى في مجاهيل كثيرة، وأيضاً في عدد من مسائل الرياضيات الحسابية تستخدم المحددات من الرتبة n ($n=2, 3, 4, \dots$) وتبني نظرية المحددات من أية رتبة في الملامح العامة مثل عرضنا السابق لنظرية المحددات من الرتبة الثالثة، غير أن بناءها العملي بكل تفاصيله إنما يتطلب عدة فروض مساعدة، ومن ثم فهو يشكل بعض الصعوبات. وتعرض هذه النظرية مثلها مثل النظرية العامة للمعادلات من الدرجة الأولى في مجاهيل كثيرة، في أي كتاب من كتب الجبر العالي.

وسنكتفي هنا فقط بالتوضيحات التالية :

- ١— يعطى المحدد من الرتبة n في حدول مربع من الأعداد (عناصر المحدد) له n صف و n عمود، ويرمز له بالمحدد من الرتبة n بالمثل كالمحدد من الرتبة الثانية أو الثالثة.
- ٢— والمحدد الأصغر (المحدد) لعنصر ما من عناصر المحدد من الرتبة n هو المحدد من الرتبة $[n-1]$ الناتج من المحدد المعطى بشرط الصف والعمود اللذين يقع في تقاطعهما هذا العنصر.
- ٣— المكمل الجبري (المرافق) لعنصر ما من عناصر المحدد هو المحدد الأصغر لهذا العنصر مأخوذاً بنفس أشارته، إذ كان مجموع رقمي الصف والعمود اللذين يقع في تقاطعهما هذا العنصر عدداً زوجياً، وبإشارة عكسية إذا كان هذا المجموع عدداً فردياً.

المصفوفة المصاحبة أو المترافقه أو المرتبطة.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{مثال (١٧): أوجد } \text{adj}(A) \text{ عندما }$$

الحل: حسب الكميات α_{ij} على الصورة:

$$\alpha_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -7, \quad \alpha_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

$$\alpha_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$$\alpha_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 1, \quad \alpha_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

$$\alpha_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{adj}(A) = (\alpha_{ij})^t$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{مثال (١٨): احسب } \text{adj}(A) \text{ عندما }$$

الحل: متروك للطالب كتمرين.

تمارين (٨)

(١) إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ احسب

- (i) $B + A$, $A + B$
- (ii) $B - A$, $A - B$
- (iii) $4A - 2B$, $2(2A - B)$
- (iv) A^T , B^T , $(B^T)^T$
- (v) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- (vi) $A + A^T$, $A - A^T$
- (vii) هل $A + C$ معرفة؟
- (viii) هل $C + C^T$ معرفة؟

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ إذا كانت

$A + (B+C) = (A+B+C)$, $\text{Det}(\text{adj}(A)) = (\text{Det}(A))^{n-1}$

(٢) لأي مصفوفتين مربعتين A , B أثبت أن:

$\text{Trac}(A+B) = \text{Trac}(A) + \text{Trac}(B)$, $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B) \cdot \text{adj}(A)$

احسب $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ إذا كانت:

- (i) $B^T A$, CB , $A^T B$, AB
- (ii) C^T , CB , $B^T C$, BC
- (iii) BB^T , $B^T B$
- (iv) BB^T , $B^T B$
- (v) CC^T , $C^T C$
- (vi) C^2 , C^4 , $C^4 - 3C + 2I$
- (vii) BCA , $B^T CA$, $A^T CA$

احسب $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ إذا كان:

BA معرفة؟

(٦) احسب BA , AB و بين أي منهما يتحقق خاصية الإبدال في الحالات الآتية:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 0 & 3 \\ 6 & -3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ -6 & 5 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -8 \\ 3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad A = [2 \ 4 \ 3 \ 5], \quad B = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

$$(iv) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

(٧) إذا كان: أثبت أن $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \cos y & \sin y \\ -\sin y & \cos y \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} \cos(x+y) & \sin(x+y) \\ -\sin(x+y) & \cos(x+y) \end{bmatrix} = BA, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

(٨) أثبت أن المصفوفة دورية، أو جد دورتها وبين $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$

فيما إذا كانت متساوية القوى أم لا؟

(٩) احسب AB في الحالات الآتية:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\cdot A^3 - 5A^2 - 4A + 30I = 0 \quad \text{أثبت أن } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

حيث I مصفوفة الوحدة.

(11) إذا كان $AB = BA$ أثبت أن:

$$(a) (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad (b) A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

(12) أثبت أنه لأي مصفوفة حقيقة مربعة A :

$$(i) A + A^T \quad (ii) A - A^T \quad \text{مصفوفة شبه متماثلة}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i+1 & 3+i \\ i-1 & 2 & -i \\ 2-3i & i & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$B = \begin{bmatrix} i & i+1 & 2-3i \\ -1+i & 2i & i \\ -2-3i & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

حيث $i = \sqrt{-1}$.

(14) أوجد المصفوفة المترافقه (المصاحبة أو المرتبطة) لمصفوفة A في الحالات الآتية

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(iii) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & -2 \\ 3 & -12 & -2 & -6 \\ -2 & 10 & 2 & 5 \\ -1 & 6 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(١٥) برهن أن المصفوفة متساوية القوى.

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

(١٦) برهن أنه إذا كان $BA = B$, $AB = A$ فإن A , B تكونا متساوياً في القوى.

(١٧) برهن أن المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ معدومة القوى من الرتبة الثالثة.

(١٨) إذا كانت A مصفوفة معدومة القوى من الرتبة الثانية برهن أن

$$A(I \pm A)^n = A, \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

(١٩) أثبت أن $I \cdot \text{adj}(A) = \text{Det}(A) A$

(٢٠) برهن أن المصفوفتان $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ متساوياً في القوى

(٢١) إذا كانت المصفوفة A متساوية القوى فبرهن أن $B = I - A$ متساوية القوى

$$AB = BA = O$$

(٢٢) برهن أن المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ مصفوفة دورية دوريها 2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix} \quad (23)$$

برهن أن المصفوفة معدومة القوى.

(٤) برهن أن وتأكد من ذلك باستخدام الاستنتاج الرياضي

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{bmatrix}, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n}{2}(n-1)\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}, n \in \mathbb{Z}^+$$