

وعملياً يفضل عند تربية نباتات الخيار إزالة أول الفروع الجانبية وأول الثمار المتكونه بمجرد ظهورها، بينما تُقَلَّم الفروع الجانبية الخمسة التالية بعد العقدة الأولى. كذلك تُقَلَّم الفروع الجانبية الستة التالية (أرقام ٧-١٢) بعد العقدة الأولى، ولكن يسمح فيها بنمو الفرع الثانوى (المستوى الثانى للتفرع)، مع تقليصه بعد العقدة الأولى كذلك. أما لفروع الجانبية التالية فإنه يسمح لها بالنمو حتى النسلك العلوى بدون تقليص.

ويحذر الإشارة إلى أن نظام تربية النباتات - الذى يسمح بنفاذ أكبر قدر من أشعة شمس من خلال النباتات - يؤدى إلى إنتاج ثمار أكثر اخضراراً وذات قدرة أكبر على الحريس من تلك النظم التى تحفز النمو الخضرى الغزير (Klieber وآخرون ١٩٩٣)

إزالة الأوراق السفلية

أيًا كانت طريقة التربية المتبعة، وسواء أكانت النباتات قصيرة أنثوية، أم طويلة، فلا بد من تعرية الساق الرئيسية للنبات من جميع النموات - بما فى ذلك الأوراق - حتى ارتفاع ٣٠ سم فى الأصناف ذات الثمار القصيرة، وحتى ارتفاع ٥٠ سم فى الأصناف ذات الثمار الطويلة، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية، وأن تبدأ هذه العملية عند وصول النبات إلى ارتفاع ٧٥ سم، حيث تُزال ورقة أو ورقتان من أسفل مع كل عملية تربية ويساعد ذلك على تحسين كما يجب التخلص من الأوراق والثمار المصابة والمسوحة أولاً بأول مع كل عملية تربية

ولا يحور خف الثمار التى تنمو معاً فى العقدة نفسها، لأنها تنمو جميعاً بصورة جيدة. ويؤدى الخف إلى نقص المحصول لكن يجب التخلص من أى ثمار ملتوية أو متسوحة. وذلك بمجرد ملاحظتها، لأنها لا تصلح للتسويق.

تحسين عقد الثمار

تفشل - أحياناً - نسبة كبيرة من ثمار الخيار فى العقد، فتتوقف مبايض الأزهار المؤنثة عن النمو. ثم تتلون باللون الأصفر، وبعد ذلك تذبل. ثم تجف، ولكنها تظل