

الحصاد والتخزين

ينضج الكرنب - عادة - بعد ٢٥ - ٣ أشهر من الشتل فى الأصناف الأجنبية ، وبعد ٤ أشهر من الشتل فى الصنف البلدى ، ويمتد موسم الحصاد لمدة شهر إلى شهرين .

وأهم علامات النضج هى : اكتمال نمو الرؤوس وصلابتها ، كما تبدو الأوراق المغلفة للرأس مشنودة ولامعة .

يجرى الحصاد بسكين حاد ، أو بالمنقرة ، وتحصد الرؤوس بجزء صغير من ساق النبات ، ويجب الإبقاء على ورقتين أو ثلاث ورقات من الأوراق المغلفة للرأس Wrapper Leaves عند الحصاد .

ويمكن تخزين الكرنب بحالة جيدة لمدة ٢ - ٣ شهور فى درجة الصفر إلى ٢ م° ، مع رطوبة نسبية من ٩٠ - ٩٥ م° % .

الأمراض والآفات

يشترك الكرنب مع كثير من الصليبيات الأخرى فى الإصابة بعدد من الأمراض . وفيما يلى قائمة بأهم الأمراض التى يصاب بها الكرنب فى مصر :

<u>Alternaria brassicicola, A. raphani & A. brassicae</u>	Alternaria disease	مرض الترناريا
<u>Rhizoctoni solni</u>	Damping off	تساقط البادرات
<u>Peronospora parasitica</u>	Downy mildew	البياض الزغبي
<u>Pythium spp .</u>	Pythium disease	مرض بيثم
<u>Rhizoctonia nigricans</u>	Rhizopus soft rot	عفن رينديس الطرى
<u>Sclerotinia sclerotiorum</u>	Sclerotinia disease	مرض اسكليروتينيا
<u>Alibugo candida</u>	White rust	الصدأ الأبيض
<u>Fusarium oxysporum f. conglutinans</u>	Yellows	الاصفرار
<u>Erwinia carotovora</u>	Soft rot	العفن الطرى

ويصاب الكرنب كذلك بكل من الديدان النصف قياسية ، ومن الكرنب ، ومن الخوخ