



الفيتامينات و المعادن
VITAMINS AND MINERALS

obeykandi.com

الفيتامينات والمعادن

Vitamins and Minerals

الفيتامينات: هي مركبات عضوية لا يمكن تخليقها بواسطة أنسجة الإنسان مع أنها مطلوبة للنمو الطبيعي ولذا يجب أن تكون ضمن مكونات الغذاء.

مصادر الفيتامينات:

هناك مصدران للفيتامينات التي يحتاجها الإنسان:

١- جميع الفيتامينات يمكن أن تمد إلى الإنسان من الغذاء ولكن ليس هناك مصدر غذائي وحيد ومحدد يمكن اعتباره مصدر غني لجميع الفيتامينات.

٢- بعض الفيتامينات يمكن تخليقها بواسطة الكائنات المعوية الدقيقة ولكن هذه الكائنات الدقيقة لا تزود الإنسان بكل متطلباته منها.

التقسيم: تقسم الفيتامينات الى نوعين :

١- فيتامينات تذوب في الماء.


٢- فيتامينات تذوب في الدهون .

١- الفيتامينات التي تذوب في الماء :

تكوّن هذه الفيتامينات مجموعة كيميائية غير متجانسة تشمل فيتامينات ب وحامض الفوليك والنياسين (Niacin) وحامض بانتوثينيك (Pantothenic acid) والبيوتين (Biotin) وفيتامين ج (Vitamin C) .

٢- فيتامينات تذوب في الدهون :

١- فيتامينات أ & د & ي & ك (Vitamins A, D, E and K) تذوب في الدهون



ب- أنسجة الإنسان يمكن أن تصنع فيتامين د ولكن لا يمكنها أن تصنع باقي الفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون بالرغم من أنه يمكنها أن تصنع وتتناول وحدات الأيزوبرين التي تستخدم في تخليق الكولسترول واليويكينون (Ubiquinone) (مساعد الإنزيم Coenzyme Q₁₀).

د- العوامل المساعدة Cofactors :

- ١- الفيتامينات ومشتقاتها غالباً ما تستخدم كعوامل مساعدة للإنزيمات (Coenzymes) .
- ٢- تنشيط بعض الإنزيمات يعتمد على توافق Conjugation جزء البروتين من الإنزيم (مثل الأبوإنزيم The apoenzyme) العامل المساعد Cofactor . الهالوانزيمات Haloenzyme هي إنزيمات نشطة تمتلك العامل المساعد الضروري المربوط على الأبوإنزيم apoenzyme. هناك مثال لعامل مساعد coenzyme يتطلب إنزيم هو بيروفات كربوكسيلاز والذي يحتاج إلى البيوتين Biotin حتى يصبح نشط .
- ٣- العوامل المساعدة "المعاونة" Cofactors والتي تظل مربوطة بإحكام بالإنزيم ولا تتفكك منه تسمى مجموعات الصدارة Prosthetic groups .
- ٤- المعادن : وعلى وجه الخصوص المعادن الإنتقالية (مثل : الخارصين والنحاس والحديد) يمكنها أيضاً أن تستخدم كعوامل معاونة Cofactor. إنها قادرة على أن تمنح الإنزيم خاصية لا يمكنه إمتلاكها في غيابها.

هذه المعادن يمكن أن :

- ١- تلعب دور مباشر في عمليات الحفز.
- ٢- تستخدم كعامل مختزل مؤكسد redox reagent .
- ٣- تكون مترابطة "معقدات" complexes مع المكونات الأساسية substrates .

النقص (القصور) Deficiency :-


النقص في معظم الفيتامينات والمعادن يسبب العديد من الأعراض الغير محددة (مثل الأنيميا وبعض المشكلات الجلدية والتناسلية والعصبية).

الفيتامينات التي تذوب في الماء :


الفيتامينات التي تذوب في الماء في معظم الأحيان عوامل مساعدة في أنظمة الإنزيم أو تساهم مع العوامل المساعدة الأخرى.

أ- الثيامين (فيتامين ب₁) (Vitamin B₁) .

التوكيب:-



الثيامين



بيروفوسفات الثيامين (ثيامين بيروفوسفات)

Thiamine pyrophosphate

الثيامين يعرف أيضاً على أنه فيتامين ب₁ ، هذا الفيتامين مشتق من بيريميدين مستبدل وthiazole يرتبطان معاً بقنطرة ميثيلين methylene bridge . الثيامين يتحول بسرعة الى شكله النشط في صورة بيروفوسفات الثيامين TPP في المخ والكبد .


يعتبر وجود الثيامين ثنائي فوسفوترانسفيريز "TPP" ضرورياً كعامل مساعد للتفاعلات التي يتم تحفيزها بواسطة البيروفات ديهيدروجيناز Pyruvate dehydrogenase والفا- كيتوجلوتارات ديهيدروجيناز α -ketoglutarate dehydrogenase لتتجه أكثر فأكثر كما في ترانسكيتولااز حيث يتم تحفيز التفاعلات في مسار بنتوز القوسفات ، إن النقص الشديد في الثيامين يعمل على اختزال سعة الخلايا عند توليد الطاقة ، إنها تقوم بدور حيوي في هذه التفاعلات .

إن المتطلبات الغذائية من الثيامين (RDA) (احتياج الإنسان البالغ الضروري من الفيتامين يشار إليه RDA) تتناسب مع الكالوري المأخوذ من الغذاء والذي يتراوح ما بين ١ الى ١,٥ ملجم/يوم للكبار ، أما إذا كان محتوى الكربوهيدرات في الغذاء زائد فإن كميات إضافية من الثيامين تكون مطلوبة .


الريبوفلافين (فيتامين ب_٢ : Vitamin B₂):

يعتبر هذا الفيتامين مصدراً هاماً لكل من المساعد الإنزيمي coenzyme فلافين أحادي النيكلوئيد (FMN) والمساعد الإنزيمي فلافين أدينين ثنائي النيكلوئيد (FAD). إن الإنزيمات التي تحتاج الى كل من FAD & FMN كعوامل مساعدة تسمى الفلافوبروتينات. إن العديد من فلافوبروتينات تحتوي أيضاً على أيونات معدنية تسمى ميتالوفلافوبروتينات ، كلا القسمين من الإنزيمات يدخل على نطاق واسع في تفاعلات الأكسدة والإختزال كما في السكسينات ديهيدروجيناز succinate dehydrogenase والأكسانثين أوكسيداز. خلال مجمل التفاعلات الإنزيمية المشتملة على الفلافوبروتينات فإن الصور المختزلة للـ FAD & FMN تتولد معطية FADH₂ & FMNH₂ على التوالي .


الإحتياجات العادية للإنسان من الريبوفلافين هي من ١.٠٢ الى ١.٠٧ ملجم/يوم للكبار.



ريبوفلافين
Riboflavin



فلافين أحادي النيكلوئيد
Flavin mononucleotide (FMN)



فلايين أدنين ثنائي النيكلوتيد

Flavin adenine dinucleotide
(FAD)

المصادر: يوجد في اللبن والكبد والكلى والخضروات الخضراء والحصول عليه محدود للغاية من الكائنات الدقيقة المعوية .

إنه فيتامين مطلوب لإرتباطه بإستخدامات البروتين ويزداد الإحتياج اليه أثناء النمو والحمل والوضع والتام الجروح حيث نلاحظ الآتى .

١- يتأثر خروج الريبوفلايين مع البول بالتغير في توازن النيتروجين .

٢- عند توازن النيتروجين الموجب فإنه يوجد خفض في ريبوفلايين البول .

٣- إن ذلك يبين مدى علاقته بإستخدامات البروتين وبالزيادة المطلوبة أثناء النمو وكذلك الحمل والوضع والتام الجروح .


النقص : يؤدي النقص في فيتامين ب٢ الى حدوث ريبوفلافينوزيس Riboflavinosis والتسى تسبب وتحدث الآتى :

١- ضرر بالشفتين والفم والجلد وأعضاء التناسل.


٢- ضرر بزواوية الفم وإلتهاب اللسان والتهاب الجلد والأوعية القرنية .

بيريدوكسين (Pyridoxine) فيتامين ب₆ (Vitamin B₆) :


أ- التركيب: العديد من المركبات القريبة ذات العلاقة مثل البيريدوكسين والبيريدوكسامين والبيريدوكسال تستطيع أن تعمل مثل فيتامين B₆ وهكذا فإن هذه المركبات يجب أن تتحول إلى الشكل الذي يمكن أن يستخدمه ويستفيد منه الجسم (الشكل النشط بيولوجياً للبيريدوكسال فوسفات) .



بيريدوكسين
Pyridoxine




بيريدوكسامين
Pyridoxamine



بيريدوكسال
Pyridoxal

ب- الفوسفرة Phosphorylation : تنتج العامل المساعد النشط كيميائياً البيريدوكسال فوسفات (PLP) Pyridoxal phosphate .



البيريدوكسال فوسفات
Pyridoxal phosphate (PLP)

البيريدوكسال فوسفات (PLP) Pyridoxal phosphate .

الإحتياجات الغذائية لفيتامين B₆ هي ٦، ١ ملجم في اليوم ، هذه الإحتياجات تزداد أثناء الحمل والوضع .

المصادر : السمك - الكبد - المكسرات - حبوب الغلال والبعض يأتي من تخليق البكتريا له في الأمعاء .

التمثيل الغذائي "الأبيض" :

الأشكال الغير فوسفرة nonphosphorylated forms (مثل البيريدوكسين والبيروكسامين والبيريدوكسال) تمتص في الجزء العلوى من القناة المعوية وتتحول الى استرات الفوسفات أولاً ويتم ذلك في المخ والكبد والكلى بواسطة البيريدوكسال كيناز والذي يستخدم ATP كمناح للفوسفات .

يخزن هذا الفيتامين في المخ والكبد والعضلات ، ترتبط حوالى نصف البيريدوكسال فوسفات في الجسم بجليكوجين فوسفوريلاز العضلات .

يحدث للفيتامين تمثيل غذائي "أبيض" والمركب الأساسى الذى ينتج من هذا التمثيل الغذائى هو حامض بيريدوكسيك Pyridoxic acid والذي يتكون في الكبد ويفرز في البول .

الوظائف : يعمل هذا الفيتامين كعامل وسيط للعديد من الإنزيمات التى تستخدم الأحماض الأمينية كمركبات أساسية حيث:-

١-يكون هذا الفيتامين وسائط تحتوى على قاعدة شيف بين جزء الأدهيد بفيتامين PLP ومجموعة الأمينو ألفا للأحماض الأمينية .


٢-إن نطاق واسع من تحولات الحامض الأمينى يحفز بواسطة انزيمات PLP بعد تكوين بعض التفاعلات الوسيطة ، النقص فى فيتامين ب_٦ Deficiency of vitamin B₆ ، يحدث ضرر بالجلد وأنيميا واختلال الجهاز العصبى مع حدوث تشنج عصبى وتغيرات فى الشخصية.

كوبالامين (فيتامين ب_{١٢}) Cobalamin (Vitamin B₁₂)

التركيب: ليجاند سداسى مع الكوبلت. يتكون الليجاند عند إجراء تحضير كميات تجارية من الفيتامين ، توجد مجموعة ميثيل بالعامل الوسيط ميثيل كوبالامين ومجموعة أدينوسيل فى العامل المساعد ٥-ديوكسى أدينوسيل كوبالامين 5-deoxyadenosyl cobalamin .

الإحتياجات الغذائية : احتياج الكبار من الفيتامين هو ٢ ميكروجرام/يوم ويزداد الإحتياج أثناء الحمل .

المصادر : الكبد والكلوى واللحوم الأخرى واللبن .



كوبالامين Cobalamin



التمثيل الغذائي 'الأبيض' Metabolism

أ- فيتامين ب12 يمتص في الأمعاء الدقيقة ileum كمتراب مع عامل جوهري intrinsic هو الجليكوبروتين الذي في المخاط المعدي gastric mucosa حيث ينشق المتراب لينتج فيتامين ب12 حر في الخلايا المخاطية mucosal بالإضافة إلى أكثر من 1% من الجرعة المأخوذة تمتص بالانتشار الامراري passive diffusion من الداخل على طول الأمعاء الصغيرة .

ب- ينتقل الفيتامين في المصل المربوط الى جلوبولين globulin ويتحول الى الكبد وخلايا العظم وكذلك إلى الشبكية reticulocytes .

ت- ليس هناك معنى للهدم .

ث- كميات صغيرة من الفيتامين تفرز في المرارة ولكن الغالبية تمتص في الأمعاء الدقيقة ileum .

ج- الدورة الكبدية الداخلية لـ B₁₂ enterohepatic تزيد غالباً الحفظ الكلى للفيتامينات والنقص قد يأخذ عدة سنوات ليزداد إذا ما تم التخلص من الفيتامين من الغذاء ومع ذلك فإن أضرار في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة ileum تحدث بسرعة عند حدوث نقص لهذا الفيتامين.

الوظائف :

أ- هناك فقط نظامين معروفين يحتاجان الى فيتامين ب₁₂ (كوبالامين) كعامل مساعد.

(١) ميثيل مالونيل مساعد الإنزيم A (Methylmalonyl Co. A) .

إن الميثيل مالونيل إيسوميريز يكون ضمن مكونات الهدم الغذائي للأيسوليوسين Isoleucine والفالين valine وفي حالة استخدام بروبيونيل مساعد الإنزيم A فإنه يحتاج إلى 5-ديوكسي ادينوسيل كوبالامين 5-deoxyadenosyl cobalamin كعامل مساعد cofactor .

(٢) هوموسيستين H₄ فولات ميثيل ترانسفيريز

Homocysteine : H₄-folate methyl transferase

إنه يحفز مثيله الهوموسيستين الى ميثيونين والذي يحتاج إلى الميثيل كوبالامين كعامل مساعد له.

ب- إن دورة فيتامين ب₁₂ في نزيغ الدم hemopoiesis يرجع الى التمثيل الغذائي للفولات Folate . عند نقص الميثيل كوبالامين فإن ذلك يؤدي الى نقص في الإنزيم المساعد للفولات folate coenzyme pool .

ج- فيتامين ب₁₂ يعمل بشكل مجهول في الحفاظ على التوازن في الغشاء النخاعي "الغلاف النخاعي" myelin sheath والخلايا الظهارية "نو البشرة المخاطية" epithelial cells .


النقص : يؤدي الى :

أ- الأيميا المؤذية Pernicious .

النتائج تشمل أنيميا الكرات الحمراء الضخمة عند المصابين بفقر الدم في عمود العظام والى فساد محور عمود الدقائق المحايدة في الحبل الشوكي والى تلف الأسطح المخاطية والتهاب اللسان وقلة حموضة الميثيل مالونيك methyl malonic aciduria .

حامض الفوليك (الفولات) : Folic acid (Folate)

التركيب: يتكون حامض الفوليك من الأجزاء الآتية : حلقة بتيريدين pteridine & بارا أمينوبنزوات p-aminobenzoate وحامض جلوماتيك glutamic acid .



حامض الفوليك Folic acid

الاحتياجات الغذائية : Nutritional requirements

- أ- احتياج الإنسان (RDA) من حامض الفوليك يصل من ١٨٠ إلى ٢٠٠ ميكروجرام يومياً
180 , 200 µg/day ، تردد الاحتياجات أثناء الحمل والوضع.
- ب- المصادر: يتم تخليقه بواسطة بكتريا الأمعاء علاوة على وجوده فى الكبد والخميرة والخضروات الخضراء ، تتكسر الفولات بسهولة أثناء الطهى .

التمثيل الغذائي "الأبيض" :

- أ- توجد الفولات فى الطعام فى البداية فى شكل يولى جلوتامات ، تنشطر أطراف الجلوتامات بواسطة الكونجيكاز المعوى intestinal conjugase قبل الإمتصاص .
الفولات الغير متوافقة تمتص مبدئياً من الطرف الثالث القريب من مركز الأمعاء الصغيرة .
small intestine .
- ب- يخزن الجسم بكامله من ١٢ الى ١٥ ملجم فى آخر ٤ - ٦ شهور بعد توقف ابتلاع الفولات .

الوظائف : Function


- أ- فولات الإنزيمات المساعدة Folate coenzymes (مثل رباعى هيدروفولات) تعمل كحوامل carries للأجزاء المشتملة على الكربون عند مستويات مختلفة من الأكسدة.
- ب- تعتبر الفولات ضرورية أيضاً فى تخليق نيكلو تيد البيورين المناسب وفى تخليق ديوكسى الثميديلات أيضاً .

النقص: يؤدي النقص في هذا الفيتامين إلى


- أ- أنيميا الكرات الحمراء الحادة عند المصابين بفقر الدم.
- ب- ضرر بالنخاع العظمي
- ت- اضطرابات معدية معوية .

النياسين Niacin


إن كل من حامض النيكوتينك Nicotinic acid والنيكوتيناميد nicotinamide (أميد حامض النيكوتين) يكونا متساويا التأثير كمصدر لاحتياج الإنسان منه.



نيكوتينات
Nicotinate



نيكوتيناميد
Nicotinamide



ثنائي النيكلوتيد نيكوتيناميد-أدينين (NAD^+)

Nicotinamide – adenine dinucleotide (NAD^+)

Nutritional requirement : الاحتياجات الغذائية :

الاحتياج (RDA) للنياسين هو من ١٥ الى ١٩ ملجم/يوم (15-19) .

المصادر : الخميرة والكبدة والبقوليات واللحوم .

التمثيل الغذائي "الأبيض" :

إن التخليق الحيوي للنيكلوتيد الثنائي ادينين-نيكوتيناميد (NAD^+) وفوسفاته الخاص ($NADP^+$) تتم في الأساس من النيكوتيناميد .


الوظائف :

النياسين هو عامل أساسي في التخليق الحيوي لـ NAD^+ & $NADP^+$ والعوامل المساعدة الموجودة في تفاعلات الأكسدة والاختزال البيولوجية .


النقص في هذا الفيتامين يؤدي إلى : البلاجرا - التهاب الجلد - اسهال نتيجة للالتهاب المزمن للغشاء المخاطي المعوي - وفي الحالات الحادة الجنون .

حامض البانتوثينك (البانتوثينات) Pantothenic acid (pantothenate)

التركيب :



حامض بانتوثينك Pantothenic acid



مساعد الإنزيم A (Co A) Coenzyme A

Nutritional requirement : الاحتياجات الغذائية :

ربما تتم بتناول من ٥ الى ١٠ ملجم/يوم .


المصادر : ينتشر على نطاق واسع في الغذاء ويُخلق من بعض بكتريا الأمعاء .

الأيض والوظيفة :

حامض البانتوثينك هو الرائد في التخليق الحيوي لمساعد الإنزيم A (Coenzyme A) .

البيوتين Biotin

التركيب :



البيوتين Biotin

الاحتياجات الغذائية : Nutritional requirements

يخلق البيوتين بكميات كبيرة بواسطة الكائنات الدقيقة بالأمعاء حتى أنه ربما المصدر الغذائي له يكون غير ضروري .

المصادر : يوجد في الكبد - الكلاوى - الخضروات - صفار البيض .

التمثيل الغذائي "الأيض" :

- أ- البيوتين مرتبط بالإنزيمات التي تستخدمه كمجموعة صدارة prosthetic group.
- ب- البيوتين هولوكربوكسيلاز سينثيتز Biotin holocarboxylase synthetase يربط تساهمياً مجموعة كربوكسيل البيوتين مع طرف ليسين محدد بالإنزيم .
- ت- البيوتينيداز Biotinidase : يحفز إزالة البيوتين من الإنزيمات خلال دورة البروتين protein turnover والذي يسمح للبيوتين من أن يأخذ دورته في الجسم .

الوظائف :

- أ- البيوتين يعمل كمساعد انزيمي Coenzyme في تفاعلات الكربوكسلة عندما يحمل ثنائي أكسيد الكربون .
- ب- أربعة انزيمات في الجسم تحتاج الى بيوتين .
 - 1) اسيتيل مساعد الإنزيم A كربوكسيلاز .

Acetyl Co A carboxylase

(Acetyl Co A → Malonyl Co A)

٢) ميثيل كروتونيل مساعد الإنزيم A كربوكسيلاز

Methylcrotonyl Co A carboxylase

Methyl crotonyl Co A → methylglutaconyl Co A

في مسار تحلل اللوسين (leucine).

٣) بروبيونيل مساعد الإنزيم A كربوكسيلاز

(Propionyl Co A → 5-methylmalonyl Co A)

٤) بيروفات كربوكسيلاز

Pyruvate → oxaloacetate

النقص: يؤدي الى التهاب الجلد وقلّة الشهية والغثيان وآلام العضلات .


النقص في البيوتين وعدم تناول غذاء كاف يرجع الى عدة عوامل مثل :

١- المضادات الحيوية التي تمنع نمو البكتريا المغلقة والتي تريل هذا المصدر للبيوتين .

٢- ابتلاع كمية كبيرة من ايفيدين Avidin البروتين الموجود في بياض البيض النيئ يمنع امتصاص البيوتين لأن الايفيدين يمتزج مع الفيتامين .

حامض الاسكوربيك (فيتامين ج):

التركيب:



ل- حامض الاسكوربيك L-ascorbic acid

الاحتياجات الغذائية:

الاحتياج من فيتامين ج هو ٦٠ ملجم / يوم .

المصادر: الموالح وعصائرها والفاولة والكتنلوب والخضروات الخام والنصف مطهية .

التمثيل الغذائي "الأيض" ،

فيتامين ج لا يتم تمثيله غذائياً لكنه يستخدم كما هو كعامل مساعد Cofactor

الوظائف :

أ- فيتامين ج مطلوب لهيدروكسلة Hydroxylation أطراف البروتين ، الليسين lysine أثناء التخليق الحيوي للكولاجين.

ب- فيتامين ج مطلوب في تخليق نورإبينفرين Norepinephrine وإبينفرين epinephrine والهرمونات الأساسية للعديد من وظائف الجسم .

ت- يعتبر فيتامين ج عامل حماية في الخلية ضد تدمير الشق الحر الذي يعمل كعامل مضاد للأكسدة .

ث- يساعد فيتامين ج على امتصاص الجسم للحديد .

النقص :

١- يؤدي الى مرض الأسقربوط والذي يؤدي الى تلف الأوعية الدموية والاستعداد للنزيف .


٢- كذلك يؤدي الى الأيميا .

الفيتامينات التي تذوب في الدهون :


أ- الريتينول Retinol فيتامين A .

التركيب :


الكاروتينويدات Carotenoids (مثل بيتا كاروتين β -carotene) هي بواقي فيتامينات pro vitamins ، ويعتبر كل من الريتينال retinal والريتينول retinol من الصور المطلوبة للجسم .



بيتا كاروتين β -carotene



ريتينال retinal



ريتينول retinol

الاحتياجات الغذائية :

الاحتياج (RDA) لفيتامين أ هو من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ من المكافآت يومياً : الريتينول (١) مكافئ من الريتينول = ١ ميكروجرام 1µg ريتينول = ٦ ميكروجرام 6 µg بيتا كاروتين (6 µg β-carotene).

المصادر :

- ١- الكاروتينيدات موجودة في الأوراق الخضراء والخضروات الصفراء .
- ٢- ترانس استرات الريتينيل Trans-retinyl esters يوجد في زيت كبد الحوت والكبد والكلوى ودهن الزبدة .

الامتصاص والتمثيل الغذائي :

- أ- في الأمعاء العليا Upper intestine يتم امتصاص استرات الريتينيل Retinyl esters والريتينول.
- ب- في الخلايا المخاطية المعوية فإن الريتينول يحدث له إعادة أسترة مع البالميتات حيث ينتقل الى الكبد بينما ٩٠% من فيتامين أ يخزن في الجسم .
- ت- الكاروتينويدات يمكن أن تمتص في الجسم مباشرة (الصفراء تكون مطلوبة لتكوين Micelle ولكن معظم الكاروتينويدات تنقسم الى ريتينال وذلك يتحول الى ريتينول يتم امتصاصه في الجسم .

الوظائف :

١- لها دور فى الرؤيا Role in vision :

- ١- عند الدخول الى الشبكية Retina فإن الريتينول Retinol يحدث له عملية استرة مع حامض دهنى يدعم الوسائل التى تركز الريتينول داخل الخلية .
- ٢- استرات الحامض الدهنى تتحلل والريتينول يتأكسد الى ريتينال Retinal بواسطة NAD^+ مرتبط بالديهيدروجيناز Dehydrogenase .
- ٣- مترابطات أشكال الريتينال مع البروتينات تسمى أوبسينات Opsins أكسدة الريتينول تستمر حتى أن كل الأوبسينات Opsins تشبع بالريتينال Retinal .
- ٤- الأوبسينات تفضل ربط ايسومر ١١-سيس 11-Cis isomer للريتينال و يعارض شكل ترانس .
- ٥- إن امتصاص الضوء يكون مصحوباً بتغير فى التشكل " الترتيب الفراغى " للأوبسين Opsin وتغير أيضاً فى ايسومر ١١-سيس للريتينال الى كل شكل ترانس والذى فقط يكون مرتبط بضعف على الأوبسين Opsin .
- ٦- إن التغير فى تشكل الأوبسين يولد جهد .


النقص :

- ١) عدم وجود فيتامين أ بقدر كاف يسبب قصور وضعف فى النظر وزيادة فى العمى الليلى وفى الحالات الحادة إلى العمى الكلى .
- ٢) يؤدي أيضاً النقص فى هذا الفيتامين الى تكوين المادة القرنية فى الأغشية المخاطية وإلى فشل فى إعادة تشكل العظام مما يؤدي الى تكوين عظام صلبة سميكة فى الجمجمة وزيادة أيضاً فى ضغط السائل الدماغى والى عسر فى وظائف الغدة التناسلية عند الذكور وإلى اجهاض عند الإناث .
- ٣) الحرمان من فيتامين أ يؤدي الى الموت .

فيتامين د₃ Vitamin D₃

كولكالسيفيرول Colecalciferol

التركيب:



Cholecalciferol

الاحتياجات الغذائية :

(١) الإحتياج (RDA) لفيتامين D هو ٥ ميكروجرام (5 µg) كولكالسيفيرول في اليوم .

التمثيل الغذائي والوظيفة :

أ- يعتبر الكولكالسيفيرول (فيتامين د₃) والذي يتكون من ٧-ديهيدروكوليسترول مكوناً أساسياً لهرمون ١،٢٥-ثنائي هيدروكسي كولكالسيفيرول المنظم لأيض الكالسيوم .

النقص :


أ- في الأطفال فإن نقص فيتامين د يؤدي الى حالات تعرف بالكساح (rickets) (لين العظام لسوء التغذية) والذي يظهر تشوه بطول العظام .

ب- في الكبار الذين يكتمل نمو عظامهم فإنه نادراً ما يحدث تشوه العظام ولكن تحدث زيادة في ضعف العظام وزيادة في الميل إلى كسرها وهذه الأعراض تعرف بمرض لين العظام

. Osteomalacia

فيتامين ك Vitamin K

التركيب : الميناكينون Menaquinone هو شكل من فيتامين K وهو موجود في كبد الثدييات. أنه عضو في عائلة من المركبات يتم صنعها بواسطة أوراق النباتات الخضراء.



الميناكينون Menaquinone

الاحتياجات الغذائية :

الإحتياج (RDA) من فيتامين K من ٦٥ إلى ٨٠ ميكروجرام في اليوم .

المصادر : تشمل الخضروات الخضراء ويخلق أيضاً بواسطة بكتريا الأمعاء .

هناك أشكال مختلفة لفيتامين K تختلف في طول ودرجة عدم التشبع لطول السلسلة الجانبية

، السبب في هذا التباين غير واضحة .

الوظائف :

فيتامين ك "Vitamin K" يلعب دور هام في تجمع الدم .

أ- العديد من عوامل الانزيم تدخل في عملية تجلط الدم لتصبح نشيطة بواسطة ربط Ca^{2+} .

ب- الانزيمات المبدئية proenzyme تربط Ca^{2+} بقوة لأن مقاطع الأمينو النهائية لها تحتوى على أطراف جلوتامات glutamate residue والتي يحدث لها عملية كربوكسلة Carboxylated الى أشكال ثنائية الكربوكسيل والتي لها قابلية عالية لـ Ca^{2+} .

ت- فيتامين K يعمل كعامل مساعد في تفاعل الكربوكسلة carboxylation والتي تتطلب اكسجين .


النقص :

نقص فيتامين K غير شائع في الإنسان لأنه يوجد بشكل مكثف في نواتج خلايا النبات

والحيوان ويخلق بواسطة الكائنات الدقيقة المعوية .

د-الفا-توكوفيرول α -Tocopherol (فيتامين E) :

التركيب :



ألفا-توكوفيرول
 α -Tocopherol

الاحتياجات الغذائية :

الإحتياج (RDA) من فيتامين E هو من ٨ إلى ١٠ ملجم يومياً (8-10) mg per day ولكن الإحتياج يتعلق بمدى تناول الأحماض الدهنية الغير مشبعة .

المصادر : زيوت البذور والخضروات ، الصفراء تمتص تقريباً ٦٠% للتوكوفيرولات.

التمثيل الغذائي :

ظاهرياً فيتامين E غير متمثل غذائياً في الجسم .

الوظائف :

- ١- له المقدرة لمنع تكوين شق حر في الأحماض الدهنية العديدة في عدم التمشيع بإعطاء الكترولونات رغم أن الميكانيكية غير واضحة .
- ٢- هذه الخاصية تمكنها من المشاركة مع جلوتاثيون بيروكسيداز في إزالة البيروكسيدات المتكونة في الأحماض الدهنية العديدة في عدم التمشيع .

المعادن : Menerals

المعادن تنقسم الى مجموعتين :

١- معادن بكميات كبيرة:

تكون أساسية في الأغذية المناسبة proper nutrition وتكون مطلوبة بكميات أكبر من ١٠٠ ملجم في اليوم وتشمل الكالسيوم والكلوريد والماغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم .

٢-معادن بكميات صغيرة :

(عناصر قليلة trace elements) تكون مطلوبة بكميات أقل من ١٠٠ ملجم يومياً .

الاحتياجات الغذائية :

معادن محددة تكون مطلوبة للجسم للعديد من الوظائف الفسيولوجية .

المعادن الأساسية :

المعدن	الوظائف الأولية	
معادن بكميات كبيرة	كالمسيوم (Ca)	مكون للعظام ومنظم للأعصاب والعضلات.
	كلوريد (Cl)	يحدث توازن الكتروليتي لسائل المعدة gastric fluid
	ماغنسيوم (Mg)	مكون للعظام والعديد من مكونات الأيض
	بوتاسيوم (K)	يحدث توازن الكتروليتي لتنظيم الأعصاب والعضلات
	الصوديوم (Na)	يحدث توازن الكتروليتي لتنظيم العضلات والأعصاب
معادن بكميات صغيرة	كروم (Cr)	مكون وعامل تحمل الجلوكوز
	كوبالت (Co)	أحد مكونات فيتامين B ₁₂
	النحاس (Cu)	عامل مساعد للإنزيم
	اليود (I)	مكون لهرمونات درقية معينة thyroid
	المنجنيز (Mn)	عامل مساعد للإنزيم
	موليبديوم (Mb)	عامل مساعد للإنزيم
	سيلينيوم (Se)	يوجد في جلوتاثيون بيروكسيداز glutathione peroxidase

النقص : النقص في معظم المعادن يكون نادراً نسبياً :

الكالسيوم : النقص يسبب الكساح في الأطفال ويمكن أن يؤدي إلى تشوه وهشاشة في العظام .osteoporosis

النحاس : النقص فيه يؤدي إلى مرض ' Menke حيث يحدث عدم قابلية الأمعاء لامتصاص النحاس.

اليود : أ- النقص يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية goiter (جوتر - جدره) تورم درقي .
ب- النقص المزمن يؤدي إلى نقص إفراز الغدة الدرقية hypothyroidism بواسطة الإنتاج الغير كاف لسهرمونات تراه يودوثيرونين Triiodothyronine (I₃) والثيروكسين thyroxine (I₄) أما في الأطفال فإنه يؤدي إلى اضطراب الغدة الدرقية cretinism وأعراضها قصر القامة والبلاهة .

الحديد: يؤدي إلى انيميا بسبب دورة كمكون للهيموجلوبين .

الكارصين : النقص يؤدي إلى عدم إلتئام الجروح .

