

طاقة الحياة
ENERGY OF LIVING

obeykandi.com


طاقة الحياة Energy of Living

الفوسفاتات عالية الطاقة مثل الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) هي وسائل الجسم للحصول على الطاقة المحررة بأكسدة نواتج الهضم. إننا غالباً نتكلم عن حرق الطعام ، إن خلايانا لا يمكنها أن تستخدم الحرارة مباشرة لتقوم بوظائفها وبدلاً من ذلك فإنها تستخدم جزء من الطاقة الكيميائية الموجودة في الطعام لتكوين أعضاء من عائلة الفوسفات التي يمكنها أن تقوم بالعمل بالخلايا حيث يتكون الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) كفوسفات عضوي على الطاقة موجود على نطاق واسع في الكائنات الحية . إنه يوجد بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في معظم تفاعلات التمثيل الغذائي المستهلكة للطاقة ، إن ATP يمكن أن يتفاعل كيميائياً مع العضلات والانتزيمات والمواد الأخرى فيجعلها تتغير بطرق تسمح لنا أن نعيش ونسير إلى أعمالنا .

المصادر الرئيسية للـ ATP :-

إن الطاقة الكيميائية للـ ATP تستخدم لإتمام بعض وظائف الجسم حيث أن جزيئاته تتكسر عادة إلى الأدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) . أيون من حامض الفوسفوريك يرمز له بالرمز P_i ، ما الذي يحدث غالباً حتى يقوم الجسم بأخذ الطاقة الكيميائية من جزيئات الطعام المهضوم ودمج P_i & ADP ليرجعاً مرة أخرى. هناك إعادة التخليق بمعدل ثابت لفوسفاتات عالية الطاقة لكي تكون فيما بعد هي المصادر الرئيسية كطاقات بيوكيميائية . إن مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية يتم فيها إعادة صنع ATP كما ان نواتج الهضم لأي من الثلاث أنواع غذاء الرئيسية تكون مصادر ايجابية للطاقة ولإعادة تخليق ATP . إنها تسلك مسارات الهدم والأيض "التمثيل الغذائي" لكي تحرر الطاقة الكيميائية. إن مسارات هدمها في الحقيقة تؤدي إلى تكوين مشتق من حامض الخليك يسمى أسيتيل مساعد الإنزيم A . إننا سنتطرق إلى كيف أن الجلوكوز يتحلل إلى أسيتيل مساعد الإنزيم A وكيف ان الأحماض الدهنية من الليبيدات يمكنها أن تقطع و تجزء إلى كربوني وحدة الأسيتيل في أسيتيل مساعد الإنزيم A .


بعض الأحماض الأمينية أيضاً يمكنها أن تتهدم إلى أسيتيل مساعد الإنزيم A . إن أسيتيل مساعد الإنزيم A هو وقود المسار الرئيسي في الهدم والذي يسمى دورة حامض الستريك ، إن الجزيئ الناقل "الحامل" في الدورة يلتقط مجموعة الأسيتيل ليكون حامض الستريك (علاوة على أيون السترات) والذي يتحلل تلقائياً إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وكلمة



A mitochondrion الميتوكوندريون

الغشاء الداخلي وعلى القرب منه مواضع تخليق ATP.

تخليق ATP يحدث داخل الغشاء الداخلي.



جزء من الغشاء الميتوكوندريالي الداخلي يوضح سلسلة تنفس واحدة ومترابك $F_0 - F_1$ واحد كما هو واضح على اليمين. يمكن أن يتحرك ADP إلى الداخل فقط إذا تحرك ATP إلى الخارج.

تولد جزيء الناقل أى كلما مرت السلسلة بدورة فإن جزيئات الهيدروجين يتم استخلاصها من المركبات الوسيطة لهذا المسار. إن أيونات الهيدريد H^- لا تزال تمر مباشرة بمركبات كيميائية فى مسار رئيسى آخر يسمى سلسلة التنفس.


هذه السلسلة تضبط فى الخلية عندما تبدأ مستويات P_i & ADP فى الارتفاع ، يجب التذكر أن أى من النواتج العضوية للهضم يمكن أن تخدم كمادة خام بدائية يمكنها أخيراً أن تعطى أيونات الهيدريد لتجعل سلسلة التنفس تستمر.

سلسلة التنفس :


إن تدفق الإلكترونات فى سلسلة التنفس يولد انحداراً لأيونات الهيدروجين داخل الميتوكوندريون mitochondrion مما يؤدي الى تكوين ATP من P_i & ADP. إن سلسلة التنفس هى تتابع من تفاعلات تحفز بواسطة انزيمات التنفس. فى جزء مكمل من الغشاء الداخلى من جسم صغير جداً داخل الخلية يسمى الميتوكوندريون mitochondrion. إن كل خلية يمكن أن تملك عدة آلاف من الميتوكوندريا .

انزيمات التنفس :


المركبات الوسيطة التى تستطيع أن تعطى أيونات H^- الى سلسلة التنفس تولد فى الداخل فى الفراغ المحاط بواسطة غشاء الميتوكوندريا الداخلى. إن وحدات H^- تمر مباشرة من هذه الوسائط إما الى NAD^+ أو الى FAD. هناك اثنين من مساعدات الانزيم هى أجزاء من الانزيمات الخاصة ، عند مرور الكترولونات H^- المشار إليها بالنقط فى الرمز H^- عند نهاية التدفق عند آخر انزيم بالسلسلة فإن هذه الإلكترونات تسلم الى دورة الاكسجين وهكذا فإن أحد المراحل الهامة فى سلسلة التنفس هو اختزال الاكسجين. عندما تحدث عملية الاختزال فإن اثنين من أيونات الهيدروجين H^+ تسحب من السوائل المحيطة فيكون جزيء الماء فعلياً هو الناتج النهائى لهذه الفاعلية فى سلسلة التنفس . فى الحالة المجردة يمكن أن يكتب اختزال الاكسجين كما يلى :




وهكذا فإن أحد المراحل الرئيسية التي تحدث في سلسلة التنفس هي تدفق الإلكترونات من بعض المواد المحولة "الممثلة غذائياً" والتي يمكن أن تعطى H^- إلى الأكسجين. هذا التدفق من الإلكترونات يمكن أن يولد ATP.




دعنا نمثل المادة التي يحدث لها تحول تمثيل غذائي وتعطى H^- إلى المسلسلة بالرمز MH_2 بينما M تمثل المادة الممثلة غذائياً. غالباً تكون إحدى مجموعاتها الوظيفية هي كحول ثانوي 2° حيث تتأكسد إلى مجموعة كيتو. إذن عندما تنتقل H^- إلى NAD^+ يمكن أن يكتب التالي:



إن العامل التالي مباشرة لإنزيم NAD^+ هو إنزيم مع FMN كمساعد إنزيم ، حيث يستقبل H^- من $NAD:H$ (مع البروتون من السوائل المحيطة) ومن ثم يمر زوج الإلكترونات على إنزيم تنفس آخر. يقف مباشرة بجانب إنزيم FMN بروتين كبريت-حديد الذي يمثل بالرمز FeS-P بينما S هي ذرة الكبريت الموجودة بالسلسلة الجانبية بالسيستين من بروتين P ووظيفتها هي قبول الإلكترونات التي تدخل FMN-enzyme. إنها لا تستقبل H^- من $FMNH_2$ ولكن مجرد الإلكترونين (:).



عندما يتم استقبال زوج الإلكترونات فإن نواتي الهيدروجين (أيونات الهيدروجين) تطرد من غشاء الميتوكوندريا الداخلي إلى الفراغ خارج الغشاء والمحاط بواسطة غشاء الميتوكوندريا الخارجي. إن هذا التغيير هام.



ومن ثم فإن كل جزئ من FeS-P يأخذ ققط الكترون ويمكن أن يكتب $2FeS-P$ ليتعامل مع زوج الإلكترونات. إن سلسلة التنفس معقدة ومن هذا المنطلق فإن انتقال أكثر للإلكترونات من خلال سلسلة تشمل العديد من الإنزيمات تسمى السيتوكرومات Cytochromes والتي تتميز بأنها تعمل كسيتوكرومات a_3 & a & c & c_1 & b . إن الاثنين الأخيرين أحياناً تتجمع تسميتهما في أسم سيتوكروم أوكسيداز وهذا يحفز اختزال الأكسجين والذي تم وصفه سابقاً.

وهكذا فإنه بجانب اكسدة المادة المحولة الممثلة غذائياً والاكسجين المختزل فإن سلسلة التنفس تعمل على خلق عدم توازن في تركيزات ايونات الهيدروجين فتخلق انحدار للبروتونات. اذا كان الغشاء الداخلي مقبوع ومحلل فإن انحدار البروتونات لا يستمر. إن سلسلة التنفس يمكن أن تستمر عندما يتم تدمير الغشاء الداخلي ولكن في هذه الحالة لا يصنع ATP. أما عندما يكون الغشاء كاملاً فإنه يسمح لأيونات H^+ بالنفاذ لترجع فقط داخل أمكن محددة عند مواضع بها انزيمات تعرف بالرمز F حيث تقوم بصنع ATP من ADP & P_i . إن الانزيم F ينشط لصنع ATP حيث تتدفق أيونات H^+ من خلاله، وهكذا فإن الطاقة الكيميائية التي تولدها سلسلة التنفس في خلق انحدار لبروتونات لها طاقة عالية تسترجع في تخليق ATP. حيث يحدث عندما تتدفق البروتونات الى الخلف من خلال انزيم يعمل عندئذ على تخليق ATP في غشاء الميتوكوندريا الداخلي أي أن انحدار البروتونات يؤدي الى تخليق جزيئات ATP والتي تتولد بأكسدة مواد التمثيل الغذائي. إن العملية الكلية تسمى عملية الفوسفرة المؤكسدة Oxidative phosphorylation.

عندما يدخل زوج من الالكترونات سلسلة التنفس بفعل NAD^+ فإن ثلاث أزواج من أيونات H^+ تنتقل الى خارج الغشاء الداخلي كما أن كل زوج من أيونات H^+ يولد جزيء من ATP كلما تم تدفقه خلال هذا الغشاء وينشط أيضاً انزيم F_1 . بعبارة أخرى فإن كل زوج الكترونات معطى الى NAD^+ يولد على الأكثر ثلاث جزيئات من ATP وعندما يدخل زوج من الالكترونات السلسلة بواسطة FAD حينئذ يتكون جزيئان من ATP تسمى هذه العملية بالنظرية الكيميائية الأزموتية Chemisomotic theory والعالم الأنجليزي بيتر ميشيل صاحبها حصل على جائزة نوبل عام ١٩٧٨.


المبادئ العامة للنظرية الكيميائية الأزموتية:

- ١- تخليق ATP يحدث مع انزيم موضوع داخل غشاء الميتوكوندوريا .
- ٢- هذا التخليق يتطلب تدفق بروتونات من خلال الغشاء .
- ٣- إن الطاقة التي تعمل على تدفق البروتونات يمكن أن تأتي من خلال تدفق الالكترونات في سلسلة التنفس .
- ٤- إن تدفق الالكترونات يخلق انحدار للبروتونات بين داخل وخارج الغشاء الداخلي .
- ٥- إن هذا الانحدار يتطلب غلق غلاف الغشاء الداخلي فقط حيث أن أنواع معينة يمكن ان تنتقل عند نقاط اختيارية.

دورة حامض الستريك The citric acid cycle :

إن مجموعات الايسيتيل المحمولة بواسطة أنيونات مختلفة من بعض الأحماض العضوية يمكن أن تتحلل في دورة حامض الستريك الى CO_2 ووحدات H^+ & H^- تدخل الى سلسلة التنفس. إن خطوات دورة حامض الستريك تتضح كما في الرسم والمركبات الوسيطة عند pH الخاصة بفسولوجية الجسم هي أيونات سالبة لأحماض عضوية . إن ناقل الدورة الذي يلتقط وحدة الايسيتيل هو الاوكسالواسيتات والذي يصبح فيما بعد أيون سترات . إن الأيون السالب من حامض ثلاثي الكربوكسيل يحتوى على ست ذرات كربون .

إن وحدات الاسيتيل يمكنها ان تغذى الدورة فقط كمشتقات لمساعد الانزيم A ، إنه مساعد انزيم يحتوى على مجموعة مركبتان "SH" mercaptan . كذلك فإن تركيب مساعد الانزيم A معقد بما فيه الكفاية ولذا يمثل ببساطة بالرمز Co A-SH موضحاً فقط فيه مجموعة -SH . إن مساعد الانزيم A هو ثيوكحول يمكنه ان يكون استر مثل أى كحول . إنه استر اسيتيل .



اسيتيل مساعد الانزيم A

بعد أن تصبح مجموعة الاسيتيل جزء من ايون السترات فإن سلسلة من الخطوات تحدث والتي بواسطتها تتحلل السترات شيئاً فشيئاً حتى تصل الى اوكسالواسيتات .

تفصيلات عن دورة حامض الستريك:

- ١- السترات ينزع منها جزئ ماء لتعطي رابطة ثنائية في سس أكونيتات .
- ٢- في سس أكونيتات يضاف جزئ ماء الى الرابطة الثنائية لتعطي ايزوسترات . إن هاتين الخطوتين تحرك مجموعة الهيدروكسيل (OH) إلى ذرة الكربون المجاورة حيث أن ايون الايزوسترات هو ايزومر لأيون السترات .
- ٣- مجموعة الكحول الثانوية في الايزوسترات ينزع منها جزئ هيدروجين لتعطي مجموعة الكيتو في ايون الاوكسالوسكينات (NAD^+ يستقبل H^+) . ثلاث جزيئات من ATP يمكن أن تصنع كلما تدفق زوج الكترولونات الى سلسلة التنفس .
- ٤- تفقد الاوكسالوسكينات جزئ CO_2 لتعطي الفا-كيتو جلوتارات .
- ٥- إن الفا-كيتو جلوتارات الآن يسلك خطوات معقدة جداً من التفاعلات حيث أن الماء يوجد هنا كمتفاعل وليس مجرد مذيب . إن السلسلة تحفز بواسطة فريق من الانزيمات تحتوى على مساعد الانزيم A . كما أنه ينفصل مع ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين ، إن الهيدروجين يتم استقباله بواسطة NAD^+ مما يؤدي الى تكون ثلاثة جزيئات اكثر من ATP ، إن الناتج هو مشتق مساعد الانزيم A لحامض السكسينك حيث يفقد وحدة مساعد الانزيم A ليتغير الى أيون السكسينات كذلك فإن جوانوسين ثلاثي الفوسفات (GTP) يتم تصنيعه أيضاً . GTP مثل ATP هو فوسفات مرتفع الطاقة ينقل وحدة الفوسفات الى ADP لكي يصنع ATP .

٦- السكسينات تعطى الهيدروجين الى FAD وليس الى NAD^+ وهذا يؤدي الى انتاج جزيئين من ATP . "يتكون ايون الفيومارات" .

٧- الماء المضاف الى مجموعة الالكين في الفيومارات يكون المالات malate .

٨- إن مجموعة الكحول الثانوية في أيون المالات malate تتأكسد الى مجموعة كيتو وهذا يرجعنا الى نقطة البداية حيث أن الجزئ الناقل "الحامل" هو الاوكسالوسيتات .

إن أيون المالات يفقد هيدروجين حيث يذهب الى NAD^+ في سلسلة التنفس فتصنع ثلاث جزيئات من ATP .

إن دورة واحدة في دورة حامض الستريك تبدأ مع اسيتيل مساعد الانزيم A فيتولد عنها على الأكثر ١٢ جزئ من ATP ولكي يحدث ذلك فإن الخلية يجب ان تحدث شغل حيث تأخذ إمداد من P_i & ADP والخلية يجب ان تحصل أيضاً على امداد من الاكسجين . أحياناً بعض الأنسجة تكون منهكة وخلاياها لا يمكن لها ان تحصل على الاكسجين بسرعة كلما احتاجت اليه .

