

الهرمونات والنقلات العصبية

HORMONES AND  
NEUROTRANSMITTERS

obeykandi.com

## الهرمونات والناقلات العصبية

### Hormones and Neurotransmitters

**الهرمونات :** هي مركبات كيميائية تصنع في أعضاء خاصة في الجسم وهي مسؤولة عن إعطاء نوع من الإشارة والغدد التي تصنع الهرمونات هي الغدد الصم (الصلماء) وكل هرمون مسئول عن إشارته أو عن مجموعة قليلة من الإشارات .


الهرمونات تحمل الإشارات الكيميائية من الغدد الصم "الغدد اللاحوية" endocrine glands الى الخلايا المستهدفة والناقلات العصبية تنقل الإشارات الكيميائية من خلية عصبية الى أخرى .

إن الخلية التي يعمل عندها الجزئ الرسول أو الأيون تسمى الخلية المستهدفة ، إن الرسول هو المدخل لبعض التغيرات التي تحدث في الخلية أو في غشاء الخلية . إن التغير نفسه هو الرسالة المرغوبة حيث يمكن أن يسرع أو يبطئ التفاعل أو يغير في نفاذية الغشاء لإنتقال الجزيئات أو الأيونات أو الرسالة التي تنشط الجين . في النورونات [العصبونات (الخلايا العصبية Neurons (nerve cells)] فإن التغير يمكن أن يحدث إثارة للعصبونة المجاورة لإرسال الإشارة. إن التغير يمكن أن يكون عكسي أى يمنع الإشارة .

إن كل من الهرمونات والناقلات العصبية تعتبر أحيانا كرسول كيميائية أولية لأن العديد وليس جميع الأنواع تستخدم النيكلو تيد الحلقى (مثل AMP الحلقى) للحصول على رسائلها عبره سوف تبدأ بهذه الكيماويات المميزة .

### النيكلوتيدات الحلقية :


تعتبر النيكلوتيدات الحلقية وعلى الأخص AMP الحلقى في الغالب رسلا كيميائية ثانوية شائعة في الكائنات العديدة الخلية .



نيكلوتيد حلقى

هذه النيكلوتيدات الحلقية تتكون داخل غشاء الخلية عندما تستقبل جزيئات بعض الهرمونات والناقلات العصبية بواسطة المنتهيات العصبية المستقبلة للتنبه "المستقبلات receptors" ، إن جزء من الجزيء المستقبل معرض ومكشوف لغشاء الخلية الخارجى وعندما يتفاعل الرسول والبروتين المستقبل فإن ذلك ينشط الإنزيم الموضوع فى غشاء الخلية ، إن الإنزيم يمكن أن يكون نيكلوتيد حلقى يتكون من نيكلوتيد ثلاثى الفوسفات ، على سبيل المثال : الأدينيلات سيكليز هو الإنزيم المستخدم فى عمل AMP الحلقى من ATP وجزء من تركيبه الجزيئى يعرض لداخل الخلية.

وهكذا عندما ينشط الأدينيلات سيكليز من الخارج يمكنه أن يحفز التفاعل الآتى داخل الخلية.



بمجرد تكون AMP الحلقى فإنه يعمل كمنشط لإنزيم آخر إما داخل الخلية أو فى غشاء الخلية. فإن هذا الإنزيم بعد ذلك إما أن يحفز مباشرة أو بطريقة غير مباشرة التغيير الخلوى والذى يقابل الرسالة الواصلة "المستلمة".

أخيراً فإن هناك انزيم يسمى فوسفودايستيريز يعمل على حفز التحلل المائى لـ AMP الحلقى الى AMP .

لتلخيص العملية الكلية فإنه عندما يتواجد فيها AMP الحلقى يحدث الآتى:

- ١- هناك إشارة تعمل على تحرر الهرمون أو الناقل العصبى .
- ٢- الجزئ المتحرر ينتقل الى خليته المستهدفة ، وذلك يكون على مسافة محددة فى حالة الهرمون عادة من ١٥ الى ٢٠ سم بعيداً ولكن تكون الخلية فى وضع مناسب ومحكم للناقل العصبى .
- ٣- إن جزئ الرسول يربط على البروتين المستقبل بالخلية المستهدفة وينشط ادينيلات سيكليز
- ٤- الأدينيلات سيكليز يحفز تكوين AMP الحلقى من ATP .
- ٥- AMP الحلقى ينشط الإنزيم الخلوى الغير نشط .
- ٦- الإنزيم النشط حديثاً يحفز بعض التفاعل المقابل للرسالة .
- ٧- إن AMP الحلقى يتحلل والنظام يرجع الى الحالة قبل المثارة .

بما أن الهرمونات هى جزيئات كيميائية فإن سلوكها يجب أن يرجع الى طبيعة خواصها الكيميائية .

إن مقدرة جزئ الهرمون فى الدورة هو أن يؤثر فقط على خليته المستهدفة وهذا يتم بواسطة نوع من الغلق lack والفتح للتعرف للجزيئى ، إن جزئ الهرمون له شكل معين وطرارز معين على البروتين المستقبل بنفس الطريقة والتي يكون فيها الانزيم وأساسه متوافقين معاً حتى يدخل جزئ الهرمون الدائر الى الخلية المستهدفة فإنه يبقى فى تيار الدم .

إن الهرمونات تتغير فى التركيب من البسيط نسبياً مثل الأبينفرين الى هرمونات الأسترويد الحلقية العديدة الى البولى ببيدات مثل الأنسولين ، إن الثلاثة طرق الأساسية التى تعمل بها الهرمونات هى إما بواسطة تنشيط جين أو بواسطة تنشيط انزيم أو التغيير بواسطة النفاذية فى غشاء الخلية لمركب أو أيون . إن هرمونات الجنس على سبيل المثال تظهر لتعمل كمنشطات جين . إن الأدرينالين هو أحد هرمونات الغدة الدرقية كما أن هناك عدد قليل آخر من الهرمونات تعمل كمنشطات للإنزيم . الأنسولين وهرمون نمو الإنسان أمثلة لهرمونات تؤثر

على نفاذية غشاء الخلية ، إن الأنسولين يساعد الجلوكوز ليصل للخلايا وانزيم نمو الإنسان يساعد الأحماض الأمينية لأن تهاجر الى الداخل .

الوظيفة الرئيسية للهرمون	الهرمون	الغدة أو النسيج
يزيد معدل التمثيل الغذائي المؤكسد وينظم العادى. يخفض مستوى الكالسيوم فى الدم.	Thyroxine ثيروكسين Thyroidal calcitonin ثيروكالسيتونين	الدرقية
ينظم مستويات الكالسيوم والفوسفور فى الدم .	Parathormone باراثورمون	البارادرقيه
ينقص مستوى جلوكوز الدم	الأنسولين	البنكرياس
يرفع مستوى جلوكوز الدم	Glucagon جلوكاجون	(جزيرة لانجرهانس) (Islets of Langerhans)
يحدث بعض التأثيرات الاضطرابية على الدم والعضلات والحرارة	ايبيفرين "الأدرينالين" epinephrine (Adrenaline)	الغدة النخاعية
يتحكم فى التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والبروتين والمعادن والأملاح والماء	كورتيزون والهرمونات ذات العلاقة	قشرة الكظر adrenal cortex
يعزز وظائف الغدة الدرقية .	1- ثيروتروبك Thyrotropic	النخاعية المتقدمة
يعزز زيادة افراز غدة قشرة الكظر.	2- ادينوكورتيكوتروبيك Adenocorticotropic	
يعمل على زيادة وزن الجسم ومعدل نمو الهيكل العظمى .	3- هرمون النمو.	
يعزز الغدة التناسلية .	4- جونا-أوتروبك Gonadotropic	
يعزز زيادة اللبن "الرضاعة" .	5- بروجولاكتين Prolactin	

يسبب انقباض "انكماش" العضلات المنبسطة.	١- أوكسيتوسين Oxytocin	النخامية المتأخرة
يمنع خروج الماء من الجسم عن طريق البول .	٢- فاسوبريسين Vasopressin	
تؤثر على زيادة الأعضاء التناسلية والخصائص الأنثوية .	إيمتروجينات Estrogens	المبيض "الإخصاب"
تؤثر على دورة الحيض وتعد الرحم للحمل وتحافظ على الحمل.	بروجيستيرون Progesterone	المبيض "منع الإخصاب"
تعمل على الحفاظ على الحمل .	استروجينات وبروجيستيرون	الرحم "المثبته"
مسئولة عن نمو بعض الأعضاء التناسلية وخصائص الذكورة الثانوية	أندروجينات Androgens	الخصية
يستكمل عمليات الهضم والعديد من العمليات المعدية المعوية	تستوستيرون Testosterone	النظام الهضمي

إن مقدرة الهرمون الدائر على أن يؤثر فقط على خليته المستهدفة وذلك بواسطة نوع الغلق والفتح للتعرف للجزيئ ، إن جزيئ الهرمون له شكله الخاص وبه شحنات كهربية كاملة أو جزئية ، إنها تتوافق بشكل مكمل على البروتين المستقبل بنفس الطريقة التي بها الإنزيم وأساسه يتناسبا معاً يظل الهرمون في تيار الدم وحتى يدخل جزيئه الدائر طرازه المتوافق بخليته المستهدفة.

### الناقلات العصبية : Neurotransmitters :


هي عائلة كبيرة من المركبات الكيميائية التي تستخدم بواسطة النورونات (الخلايا العصبية) ليصل كل منها بالآخر . بعضها عبارة عن أحماض أمينية بسيطة جداً والبعض الآخر عبارة عن بيتافينيل ايثيل أمين  $\beta$ -phenylethylamine والعديد منها عبارة عن بولى ببتيدات .

إن كل خلية عصبية لها طرف خيطى طويل يسمى أक्सون (ليف عصبى) axone والذي يصل الى وجه النورونه القادمة أو الى أحد الخويطات (الفتيلة) الممتدة التى تسمى زائدة شجيرية dendrite بين نهاية الأक्सون للليف العصبى ونهاية الزائدة الشجيرية dendrite للنورونه القادمة . توجد فجوة ضيقة مملوءة بسائل يسمى القران العصبى synapse .

إن الاتصال الكيميائى بين احدى النورونات والأخرى يحدث عبر هذه الفجوة. فى انتظار هذا الاتصال الكيميائى فإن جزيئات الناقلات العصبية تمسك بأكياس صغيرة جداً Tiny sacs تسمى تجويفات vesicles بالقرب من نهايات الأكسونات . إنها تتحرر قبل الوصول الى محرك العصب nerve impulse والتي تكون موجات الانتقال للشحنة الكهربية تحت مدى الأكسون كأيونات صغيرة تهاجر بمعدلات مختلفة بين داخل وخارج النورونه . التغييرات فى نفاذية الأغشية العصبية تبدأ بواسطة الناقلات العصبية عند مركز تحرك هذه الأيونات .

عندما تتحرر جزيئات الناقلات العصبية بواسطة خلية عصبية ما قبل القران العصبى synapse فإنها تتوافق مع جزيئات المستقبل عند النورونه (الخلية العصبية) القادمة (نورونه الملمس) الخارجى بواسطة ميكانيكية الفتح والغلق. إن تكوين مترابك المستقبل - الناقل العصبى ينشط إنزيم نيكلو تيد سيكليز (مثل أدنينيلات سيكليز) والذي يحفز تكوين AMP الحلقى. إن AMP الحلقى المتكون حديثاً ينشط إنزيم آخر فى نورونه الملمس الخارجى وحيث يبدأ ببعض التغييرات التى تحرك محرك العصب عليه. إن الإنزيم الآن لا ينشط ادنينيلات سيكليز ولكن هناك حقيقة متعارضة يمكن أيضاً أن تحدث وهى إن جزيئات الناقلات العصبية والتي مازالت فى الملمس (القران العصبى) أو على سطح المستقبل يجب ألا تتشط ، من جهة






نظم الإتصالات الكيمائية في جسم الإنسان:

- (a) تنتقل الهرمون لمسافة معينة من غدة تصنع الهرمون إلى المستقبل في الخلية المستهدفة.
- (b) الناقلات العصبية التي تصنع في خلية عصبية واحدة تنتقل فقط إلى الخلية العصبية التالية.




نوع واحد من نورنة أو خلية عصبية

أخرى فإن الإشارة يجب أن تستمر دون اختيار حتى عند محركات عصب إضافية لاستقبال .  
 إن جزيئات الناقلات العصبية لا تنشط عندما تتحلل عند أو بالقرب من الملمس "القران العصبى"  
 بواسطة حفز إنزيم الاستيل كولين Acetylcholine على سبيل المثال فإن إحدى الناقلات  
 العصبية فى النظام العصبى التلقائى أو ANS بمجرد أن تتم عملها فإنها يجب ألا تنشط وفى  
 "القران العصبى" فإن هناك انزيم يسمى اسيتيل كولين ترانسفيريز يحفز تحلل الأستيل كولين .






إن الإنزيم يبدأ عمله بمجرد ظهور أساسه ، فى الحقيقة إنه يظهر لينافس مع مستقبل  
 البروتين ولكن ليس بنجاح كبير حتى أن الرسالة لا يمكن أن تصل عند النورثة القادمة خلال  
 $2 \times 10^{-3}$  ثانية .

إن الأستيل كولين يتحلل أثناء تفاعلات الجسم الأكثر سرعة . حيث يكون النظام مستعد  
 وقادر على أن يتعامل مع إشارة أخرى واتباق آخر من أستيل كولين عبر فجوة القران  
 العصبى .



## الناقلات العصبية :


أمينات أحادية: Mono amines	
$(\text{CH}_3)_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OC}(=\text{O})\text{CH}_3$	استيل كولين Acetyl choline
$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 	الدوبامين Dopamine
	النورإبينفرين Norepinephrine
	السيروتونين serotonin
أحماض أمينية :	
$\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{CO}_2^-$	جليسين Glycine
$\text{NH}_3^+\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2^-$	حامض جاما أمينوبيوتيريك Gamma-aminobutyric acid
$\text{NH}_3^+\text{CH}(\text{CO}_2^-)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	حامض جلوماتيك Glumatic acid
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met	النيوروببتيدات ميت-إينكيفالين Met-enkephalin
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu	ليوإينكيفالين Leu-enkephalin
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser Gln-Thr.Pro.Leu.Val.Thr.Leu.Phe-Lys-Asn Ala.Ile.Val.Lys.Asn.Ala.His.Lys.Lys.Gly.Gln	بيتا-اندورفين β-Endorphin
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-phe-Leu-Gly-Met-NH <sub>2</sub>	مادة P substance P

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-NH <sub>2</sub>	أنجيوتنسين II II
<p>Ala.Gly.Cys.Lys.Asn.Phe</p> <p>Cys</p> <p>Try</p> <p>Ser.Thr.Phe.Thr</p>	سوماتوستاتين Somatostatin


العديد من السموم تعمل بالتأثير على الأعصاب الكولينيرجية Cholinergic في اتجاه ما أو اتجاه آخر على سبيل المثال هناك أحد السموم القوية المعروفة والتي تعتبر هي السبب في تسمم الطعام طبيعياً هو السام السحقي المقاتي botulinus والذي يصنع بواسطة بكتريا باسيلوس السحقي botulinus bacillus ، إنه يعمل على إيقاف تخليق الأستيل كولين Acetylcholine. إن تجريد الأعصاب الكولينيرجية Cholinergic من ناقلاتها يحدث غلق ANS. إن غازات الأعصاب والتي تشمل على بعض المفسدات القادرة "الفاعلة" Potent pesticide والتي تخفض نشاط الاستيل ترانسفيريز ، لذا فإن الإشارة تستمر ولا تتحلل. إن القلب لا يمكنه أن يستوعبها ويحدث الموت بسرعة ، إن الأتروبين atropine هو ترياق مضاد للسموم antidote ولغازات الأعصاب حيث لا ينشط مستقبل البروتين الأستيل كولين ، وهكذا فإنه لا يعمل رغماً عن وفرة الأستيل كولين ، بهذه النغمات من الإشارات يستطيع الجسم إصلاح الضرر، إن بعض مركبات فقدان الشعور الموضعي مثل Tetracaine procaine & nupercaine أيضاً تعلق مستقبل البروتين (الأستيل كولين) أنها أيضاً تعلق إشارة الألم .

إن النورايبينفيرين هو ناقل عصبي آخر في ANS علاوة على وضعه في مقطع المخ عند مركز تنظيم المزاج mod إنه مثل الأستيل كولين يقل نشاطه أو تخمد فاعليته deactivated بعد أن يدخل القران العصبي ولكن ليس على وجه السرعة. إن جزء من النورايبينفيرين يرجع بواسطة الأكسون الذي يتم تحرره ثم يتكسر "يتحلل" .

إذا حدث بعض القوضى فإنها تدفع النورايبينفيرين إلى التخزين في الأكسونات ويجب أن يتحرر إلى القران العصبي كنظام أمن ضد هذا الاحتمال علاوة على التعامل مع النورايبينفيرين الذي يعاد امتصاصه من القران العصبي. إن الأكسون يحتوي على انزيم يسمى أحادي أمين أوكسيداز monoamine oxidase أو MAO والذي يساعد على تحلل الزيادة منه. هذه الانزيمات هي نفسها التي يتم منعها بواسطة iproniazid ذلك الدواء الذي يستخدم ضد الاكتئاب antidepressant. إنه يمنع التحلل المحفز MAO للنورايبينفيرين ومن ثم فإن الناقل العصبي يمكنه أن يساعد بصورة أفضل لكي يحفظ مستوى نشاط ارسال الإشارة في القران




الإنتقال العصبى




منع تحرر مادة ب بواسطة الإنكفالين Enkephalin لاذى يعمل على خفض حدة إشارة الألم إلى المخ

العصبى كتأثير تام مماثل يتم إنجازه بطرق مختلفة بواسطة مضادات الإحباط ثلاثية الحلقة والتي لا تؤثر على إنزيمات MAO . من هذه المضادات الأميتراى بتيلين (مثل الإلافييل Elavil) والإميبيرامين imipramine (مثل توفرانيل Tofranil) يعمل على منع عدم امتصاص الناقلات العصبية الى الأكسون والتي من جهة أخرى تتحلل بواسطة انزيمات MAO .




Amitriptyline




imipramine

إن الدوبامين Dopamine هو ناقل عصبى آخر أحادى الأمين يوجد فى نورونات منطقة وسط المخ فى منطقة الشعور بالسعادة والانتعاش علاوة على التحكم فى الحركات . هناك دليل بأنه عند الفصام العقلى schizophrenia فإنه يكون هناك نشاط بالغ فى كل من ميكانيكية الدوبامين المتحرر والدوبامين المستقبل فى نورونات المخ ، ينتج عن ذلك تقوية زائدة للنورونات الموجودة للتحكم فيها. إن هناك أدوية ترتبط بمستقبلات الدوبامين Dopamine وتمنع ربط الدوبامين ، حيث يوجد دواءان من الأدوية الشائعة المستخدمة مع الشيزوفرنيا هى كلوربرومازين Chlorpromazine (مثل ثورازين Thorazine) والهالوبيريدول Haloperidol (هالدول Haldol).



هالوبيريدول  
Haloperidol



كلوربرومازين  
Chlorpromazine


إن الأمفيتامينات هى الأكثر انتشاراً فى الاستخدام كمنبهات Stimulants إنها تعمل على تحريك وتحرر الدوبامين Dopamine ليصل الى مراكز الانتعاش فى المخ. نلاحظ أنه عند

استخدامها أكثر من اللازم فإن الأمفيتامينات تسبب أعراض تشبه الشيزوفرينيا من الهوس والشعور بالاضطهاد والهوسة والاضطرابات الأخرى في التفكير .


في مرض الباركينسون Parkinson فإن الدوبامين يقل تولده بواسطة نورونات المخ ويتم في هذه الحالة العلاج بمركب يسمى L-DOPA (ثنائي هيدروكسي فينيل الاينين يسارى الاتجاه Levorotatory dihydroxy phenylalanine) حيث النورونات يمكن أن تستخدمه لعمل الدوبامين والذي يستمد لفترة قصيرة .

إن حامض جاما أمينوبيوتيريك (GABA) هو ناقل عصبي يمنع صدور الإشارات بدلاً من أن تبدأ . إن المهدئات المتوسطة مثل ديازپام Diazepam (فاليوم valium) وهيدروكلوريد الكلورديازبوكسيد Chlordiazepoxide hydrochloride (ليبريوم Librium) علاوة على الايثانول (الكحول الإيثيلي) الذي يعمل على تعزيز عمل GABA وهذا بالطبع يزيد منع صدور الإشارات ويختزل القلق ويعمل على الشعور بالعدل ويدخل النوم ، إن استخدام هذه المواد على نطاق واسع له مساوئه.


إن GABA يحد ويقلل الفوضى العصبية الوراثية والتي تسمى الاختلاج العصبى Huntington's chorea حيث تعاني الضحية من اضطرابات في النوم والحركات الغير منتظمة وتدهور في التفكير العقلى ، لسوء الحظ فإن GABA لا يمكن تناوله كدواء لهذا المرض لأن جزيئاته لا تتحرك خارج الدائرة إلى داخل المناطق العصبية بالمخ والتي يجب أن يذهب إليها لتكون مؤثرة .



ل-دوبا  
L-DOPA



ديازپام (فاليوم)  
Diazepam (valium)



هيدروكلوريد كلورديازبوكسيد (ليبريوم)  
Chlordiazepoxide hydrochloride  
(librium)

إن أحدث المركبات المكتشفة والتي يعتقد أن تكون ضمن الناقلات العصبية هي البولي ببتيدات الصغيرة ، أحدها يشمل الإنكفالينات Enkephalins والأخر يصنع من الأندورفينات endorphins ، إنها تعتبر موانع ألم قوية ، إن الدينورفين dynorphin هو قاتل فعال للألم أقوى ٢٠٠ مرة من المورفين والذي هو قلويد الأفيون والذي يستخدم على نطاق واسع لإزالة الألم المرض الشديدة. هناك مواضع في المخ ترتبط بقوة بجزيئات المورفين وأيضاً ترتبط الإنكفالينات وهذه المركبات تسمى opiates أوبيئات الجسم الطبيعية ، ولكن الإنكفالينات enkephalins يجب أن تعمل على منع تحرر ناقل عصبي هام آخر يعطى إشارات الألم ويسمى المادة پ (substance P) ، إن المادة پ عبارة عن بولي ببتيد polypeptide وطبقاً لإحدى النظريات فإنه عندما تنشط النورنة الناقلة للألم فإنها تحرر جزيئات المادة پ في فجوة القران العصبى والتي تصل الى النورنة المستقبلية للألم فى الحبل الفقرى (النخاع) spinalcord ، إن الإنكفالين Enkephalin يتحرر بواسطة نورونات خاصة تعمل ضد النورونات التي تعطى إشارات الألم وتمنع فى هذه الحالة جزيئات الإنكفالين لأن تحرر المادة پ (substance P) .

