

الفصل الثالث

الحامض النووي

DNA

الحامض النووي Deoxyribonucleic acid

حمض أوكسيريبونيوكلينك (DNA)

- الحامض النووي DNA هو من أهم المواد الكيميائية الموجودة في الكائن الحي حيث يحمل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر.
- الحامض النووي DNA هو المسئول عن جميع العمليات أو الأنشطة الحيوية والبيولوجية داخل الخلية.
- هو المسئول عن جميع عمليات تخليق البروتينات أو الأحماض الأمينية داخل الخلية.

نبذة تاريخية: Historical

- كان العالم فيشر Fischer عام 1880م أول من حدد أو بين تركيب الحامض النووي DNA من البيرين purines والبيريميدين pyrimidine.
- ثم جاء العالم كوسيل Kossel وحدد أن البيريميدين pyrimidine يتكون من سيتوزين cytosine والثيامين thiamine والبيرين purines يتكون من الأدينين Adenine والجوانين guanine وقد أخذ جائزة نوبل على ذلك عام 1910م.
- ليفان Levene الروسي قد اكتشف النوكس ريبوز في الحامض النووي عام 1910م ووجود حامض الفوسفوريك.
- في عام 1941م اكتشف العالم فولجين Robert Feulgen تفاعل كيميائي يحدد وجود مادة DNA بواسطة اللون.
- في عام 1953م استطاع كل من وطسن وكريك أن يقترح بأن DNA يوجد أغلبه في صورة حلزون مزدوج ذي خواص مميزة للغاية.
- في عام 1967م استطاع العالم كورنبرج بأن يوضح DNA بأنه يخلق من حوالي 6,000 نيكلويد 6.000 nucleotides.

وجوده Occurrence

- فيما عدا بعض الفيروسات جميع الكائنات الحية تحتوي على مادة DNA.
- تتمركز كل المادة الوراثية DNA في النواة المركزية في الخلية وخاصة في الكروموسومات في بعض الحالات توجد مادة DNA في الأجسام السباحية والبلاستيدات والجسم المركزي.

وحدة القياس DNA

تقاس كمية DNA بواسطة وحدات صغيرة تسمى بالبيكوجرام (pg) picogram

$$1 \text{ pg} = 10^{-12} \text{ grams}$$

- كمية DNA تكون ثابتة من خلية إلى خلية ومن نوع إلى آخر.
- كمية DNA في البرمائيات في النواة للضفدعه ٧,٧٣ بيكوجرام.

شكله: Morphology

- (١) يشكل shape جزء DNA في الخلايا ذات الانويه الحقيقية Eukaryotic تكون مثل الخيوط الممتدة المستقيمة والغير متفرعة وهو مزدوج شكل (٣-١).
- بينما جزء DNA في الخلايا بدائية النواة مثل بعض الفيروسات تكون دائرية الشكل.

الحجم: Size

- يختلف حجم جزء DNA من نوع لآخر فيبلغ حجم جزء في الأجسام السباحية حوالي ميكرومتر 5mm يبلغ حجم DNA جزء الفردي منه في البكتريا حوالي ١,٤ ملم طول 1.4 mm long

التركيب الكيميائي لجزء دن أ

Chemical Composition of DNA

يتركب جزء DNA من وحدات عديدة ومتكررة تسمى بوليميرات وتسمى هذه الوحدات بنيوكلوتيدات Nucleatides ويحتوى كل نيوكلوتيد على ثلاث أجزاء هي:

(١) سكر خماسي يسمى بنتوز pentose وهذا السكر يعرف باسم دي أوكس ريبوز Deoxyribose.

(٢) حمض الفوسفوريك Phosphoric

(٣) قواعد نيتروجينية Nitrogen bases

وتشمل هذه القواعد على نوعين هما:

أ- البيريميدين pyrimidines

هو مركب عضوي يحتوى على حلقة واحدة. ويوجد به نوعين من البيريميدين هما :


- السيتوزين cytosine - الثيامين thymine

ب- البيورين purines


- وهو مركب عضوي يحتوى على حلقتين ويوجد به نوعين من البيورين هما:

- الادنين Adenine - الجوانين Guanine

DNA strands are antiparallel



DNA bases



شكل رقم (١-٣)

التركيب الجزيئي لمادة دن أ

Molecular Structure of DNA

- تتحد كل من البيورينات والبيريميدات أي القواعد النتروجينية مع جزء السكر pentose البننوز بواسطة روابط كيميائية بين ذره كربون في الموقع ١ في السكر ونره الكربون في الموقع ٩ في البيورين ويسمى هذا الاتحاد بين القواعد النتروجينية والسكر بالنيكلوسيد Nucleoside.

- ثم يتحد جزء النيكلوسيد Nucleoside مع جزء من مجموعة الفوسفات phosphate group وتسمى حينئذ بالنيكلوئيد Nucleotides.

- النيكلوسيد + مجموعه واحده من الفوسفات تعرف باسم نيكلوئيد. أحادى الفوسفات Deoxy Adenosine (nucleoside) monophosphate (d AMP) أو قد تتحد النيكلوسيد مع

مجموعتين من الفوسفات أو ثلاث وحينئذ تسمى ADP or ATP Adenosine Diphosphate

Deoxy Adenosine Triphosphate (dATP)

Deoxy guanosine Triphosphate (dGTP)

Thymidine Triphosphate (TTP)

- يتركب جزء DNA من بوليميرات مكونه من وحدات متكرره من النيكوتيد وهي كالتالى:

- مجموعة فوسفات تتحد مع ذرة الكربون رقم ٥ في السكر.

- تتحد ذرة الكربون رقم ٣ في السكر مع جزء النيكلوئيد الآخر عن طريق مجموعه الفوسفات الأخرى.

- وهكذا تستمر حلقات الاتصال بين كل مجموعة وأخرى حتى تكون سلسله من جزء البوليمر.

- وهذه الروابط تعرف باسم روابط استر تساهميه Covalent ester bonds

- أوضح وطسون وكريك أن كل لفه للشريط المزدوج لجزء DNA يتكون من ١٠ نيكلوئيد و نصف

قطره الاسطوانى الحلزوني 20Å in diameter اتجستروم وفى الطول 34Å in long.

- وتتنظم المعلومات الوراثية على الشريط الحلزوني لجزء DNA بواسطة تتابع الأربعة قواعد نتروجينية على طول هذا الشريط.

- يرتبط شريطى جزء DNA Two polynucleotides strands مع بعضهما البعض بواسطة رابطته هيدروجينية بين كل من البيورينات والبيريميدات.

- وتكون هذه الرابطة بين الادنين والثيامين ثنائية الروابط الهيدروجينية وبين الجوانين والسيتوزين ثلاثية الروابط الهيدروجينية.

- التركيب الجزيئى لمادة دن أ DNA هي:

A = T Adenine - Thymine

G = C Guanine - cytosine

فتح وغلق جزء DNA Denaturation and Renaturation of DNA

- يرتبط شريطي جزء DNA الزوجي ببعضهما البعض بروابط هيدروجينية ضعيفة.
- إذا سخن محلول يحتوى على جزء DNA فان هذا الجزء لا يظل مستقراً وقد يؤدي هذا التسخين إلى فصل الشريطين عن بعضهما البعض وتسمى عملية الفصل هذه Melted or Denaturated.
- تتم عملية الفصل أيضا بواسطة استخدام محلول قلوى قوى والذي يدخل في الروابط الهيدروجينية التي بينهما.
- اما إذا برد هذا المحلول الساخن فانه يتكون جزء DNA المزدوج الشرط ويسمى حينئذ باسم الغلق Renaturation.
- يتم أيضا فتح الشريط المزدوج من جزء DNA بواسطة أيضا بعض أنزيمات النسخ Restriction enzymes بإضافة جزء من النيكلوتيد إلى إحدى جانبي الشريط المزدوج بعد الفتح لتساعد في عملية النسخ كما يتم قفل أو أتمم هذا الشريط أو غلقه بواسطة بعض أنزيمات النسخ الرابطة أو المتحددة ligase enzymes مثل T4.


تناسخ مادة أو جزء دى أوكس ريبوز (د ن أ) Replication of DNA

- هناك نوعين من التناسخ هما:
- التناسخ غير ذاتي Hetero catalytic function وهما كما يحدث في توجيه جزء نحو تخليق مادة (RNA) ريبوزونيكليز والبروتين.
 - التناسخ الذاتي Autocatalytic function وهو توجيه نشاط جزء DNA في تخليق مادة أو جزء من DNA نفسه.
- هناك ستة عوامل أساسية ضرورية في عملية التناسخ الذاتي لجزء DNA وهي:
- ١- تتم عملية التناسخ بواسطة طرق شبه ثابتة أو محافظة على طريقه معينه.
 - ٢- تتم عملية التناسخ في اتجاه واحد ولكن غالبا تتم في اتجاهين.
 - ٣- يتم التناسخ في نقطة معينه unique point أو المنظم origin أو أكثر من نقطه.
 - ٤- يتم التناسخ في كلا الشريطين بواسطة إضافة نيكلوتيد أحادى النيكلوتيد monomers في اتجاه ٥١ إلى ٣١ من ذرات الكربون.



٥- يحدث هذا التناسخ كجزء قصير أو صغير غير مستمر وذلك بأن يتكون جزء صغير قصير ثم يتحد

فيما بعد مع الجزء الرئيسي للجزء DNA.

٦- جزء صغير من RNA ضروري لعملية تنشيط جزء DNA البوليمر للاستطالة. شكل (٣-٢)



The Discontinuous Model for DNA Replication. This Model is Most Widely Accepted and Supported One.



A segment of DNA Molecule Showing Arrangements of Different Components (P = phosphate, A = Adenine, T = Thymine, G = Guanine and C = Cytosine)

شكل رقم (٢-٣)

الطريقة النصف أو الشبه محافظة لتتاسخ مادة DNA The Semi-conservative of DNA Replication

- تتطلب هذه الطريقة تتاسخ مادة DNA واستمراريتها للحفاظ على نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر.
 - حسب اقتراح وطسن وكريك بأن إحدى الشريط المزدوج من مادة DNA بوليمير يعمل كوسادة template لتخليق الشريط الآخر المكمل للشريط الأصلي old strand وتخليق الشريط الجديد .
 - فإذا حدث تتاسخ لشريط المزدوج الأصلي فإنه ينتج شريطين أصليين وآخرين جديدين فى الجيل الأول.
 - وفى حالة تتاسخ أفراد الجيل الثاني فإنه ينتج عنه اثنين من الجيل الأصلي القديم وستة أشرطة من أفراد الجيل الجديد أي الاجمالي ثمانية أشرطة أى ستة أشرطة Daughter molecules وأثنين أصليين.
- شكل (٣-٣)
- ويمكن تحديد هذه الأشرطة الجديدة بواسطة استخدام مواد مشعة لدقه التحديد مثل ن^{١٥} (15N)، ن^{١٤} (14N) مع استخدام مادة كلوريد السيزيم cesium chloride (C s cl) لفصل مادة DNA بواسطة الطرد المركزي حسب طريقة ماثيو وفرنكلين (١٩٥٨).

توجيه جزء DNA للتتاسخ Direction of DNA Replication

- قد أوضحت أحسن التجارب العلمية لتوجيه جزء DNA للتتاسخ بواسطة العالم كارينز Cairns عام ١٩٦٣ مستخدماً تشعيع كروموسومات *E. coli* (كولاي) في عملية التتاسخ. فقد وضع اشرشيا كولاي (*E. coli*) في وسط غذائي لنمو في وجود المادة المشعة ثيمادين 3H-Thymidine لمدة نصف ساعة وذلك لتشخيص شريط DNA بالمادة المشعة.
- وقد ترك جزء DNA لفترات متعددة فى المادة المشعة والوسط الغذائي ليحدث عليه التتاسخ فوجد أنها ضعف الكمية الأصلية من DNA.
- اقتراح كارينز إذا انفصل جزء جديد New molecules من الجزء الأصلي فإن الجزء الجديد المنزلق من الأصلي يلتف حول نفسه أو نهايته ويربط بين طرفيه مكونا دائرتين Two circles.
- ويكون اتجاه وحركة هذه الجزئيات وتتاسخها تبدأ أساسا من نقطة معينة origin.
- اقتراح كارينز أن التتاسخ الشوكي Replication fork يخرج أو يبدأ من النقطة في اتجاه واحد.




Diagram interpreting the experiment of Meselson and Stahl (1958) to show the semi-conservative method of DNA replication. Above—Parent DNA molecule with both strands labeled with N^{16} ; Middle—First generation shows the daughter molecules (in white) synthesized in a medium containing N^{15} (Note that the DNA molecules are hybrids of N^{15} —and N^{14} DNA strands); Below—At the second generation two molecules are hybrids and two are not.

شكل رقم (٣-٣)

تخليق القطع الصغيرة من DNA Synthesis of Short Pieces

- إستطاع اوكازكا عام ١٩٦٨-١٩٧١ من توضيح أن تخليق جزء DNA يكون في صورة قطع صغيرة والتي فيما بعد تدخل في جزيئات السلسلة الطويلة من DNA.
- وفي نمو الشرشيا كولاى فى الأوساط الغذائية قد أضيفت بعض المعجلات أو المحفزات المعلمة أو المبنية precursor label والتي وجدت هذه الجزيئات المعلمة في جزء DNA وتسمى هذه لجزيئات بجزيئات التتاسخ أو جزيئات أو قطع اوكازكا Okazaki fragments replication fragments
- وأن هناك بعض الأنزيمات الضرورية والتي تؤدي إلى فرد سلسله DNA أو اتحاد القطعه القصيرة من النيكلوتيد مع شريط.
- وتتاسخ قطع اوكازكا يبدأ بإضافة هذه القطع (نيكلوتيد) في سلسلة DNA في الاتجاه ذرة الكربون ٥' إلى ٣' وأحدث هذه الإضافات للنيكلوتيد تكون في نهاية ذره ٣' لكل سلسله من شريطى DNA لمزدوج.

اتحاد القطع الصغيرة Linking of Short Pieces

- يقوم بعملية اتحاد قطع أو أجزاء DNA مع بعضها البعض أو مع سلسلة جزء DNA البوليمر أنزيم الربط DNA ligase.

تنشيط عملية النسخ بواسطة بدائيات RNA Initiation of Replication by RNA Primer

- العالم كورنمبرج وأوكازكا عام ١٩٧٠ وضع أهمية بدائيات RNA للتخليق جزء DNA. وقد أوضح أن جزيئات RNA الموجودة تكون من بعض الأنزيمات النووية والتي تضاف إلى نهاية ذرة ٣' والذي يرتبط برابطه تساهميه أو تكافؤية covalently bonded لموقع رقم ٥.

Unwinding the double helix

- بعض البروتينات لا بد من وجودها لتسهيل عملية اكتمال (ملتقى الاثطار) جزئى DNA فى المرحلة المتقدمة للتتاسخ الشوكي replicating fork دون ازدواج لشريطى جزء DNA.
- وأول البروتينات الضرورية الخاصة بفق DNA فى عم أحداث حلزونيه أو التقاف جزء DNA هو البروتين الخاص الذى يعطى ٣٢ جين فى البكتريا اشرشيا كولاى فاج (gene e in E. coli phage T4).

- هذا البروتين له القدرة على تحويل ثنائي الشريط من جزء DNA (Duplex DNA) إلى أحادي الشريط single strand عند درجة حرارة 40م وقد لا يجد الحلزون المزدوج على الانشطار.
- هناك رابطة قوية Tight binding بين البروتين والشريط الأحادي من DNA.
- رابطة ضعيفة little binding بين البروتين وثنائي شريط DNA (Duplex DNA)
- يتحد البروتين الخاص بالنسخ بعدم الازدواجية Unwinding protein مع A-T ادينين - ثيامين وينتج حرارة تكفي لاكتمال التفاعل والربط بينهما. وأيضا يتحد مع مجموعة الفوسفات والسكر الأساسية فى تكوين جزيء DNA.
- والشكل المتطاوول من جزيء البروتين الخاص يسمح باتحاد أو الربط بقوة مع عشرة أجزاء من النيكلوتيد المفردة، وذلك لان تفاعل جزيء البروتين - مع البروتين لإحدى شريط DNA يكون أفضل وأسرع وبالتالي فان اتحاد جزيئات البروتين مع بعضهما البعض افضل من تفاعله مع القاعدة الأساسية لجزيء DNA دون فتحها ويسمى التفاعل باسم التعاون المتبادل.
- ليس فقط البروتين الخاص بعدم الازدواجية يقوم بفتح ازدواجية جزيء DNA (Duplex) إلى أحادي الشريط single-strand ولكن أيضا يقوم بتسهيل تعلق أو التصاق القواعد النتروجينية بين الشريط الأحادي لجزيء DNA أثناء التناسخ. أى أنه بمجرد أن ينشطر الحلزون المزدوج ليكشف عن خيوطه المفردة يرتبط على الفور جزيء من بروتين الفك ذى الخيوط المفردة، وتتقدم بروتينيات اضافيه ترتبط بكفاءة أعلى من الأولى (في ظاهرة تعرف باسم التعاون المتبادل) لتصبح وبسرعة أحادية الخيط المفرد مستقرة عن طريق غلاف بروتينيات الفك.
- يعتقد أن بروتين الفك د ن أ مسئول عن جعل الانشطار الحلزون المزدوج متقدما عن ملتقى النسخ.
- يكون جزيئا واحدا من بروتين الفك بطول يسمح بتغطيه 8 نيكلوتيد من DNA بمعنى أن بروتينيات الفك لـ 400 الموجودة في كل خلية تستطيع أن تثبت أطوالا أساسيه لكل من ملتقى التناسخ.

وهناك عدة أنواع من الأنزيمات هي:

- أنزيم فك DNA وفك البروتين.
- من الواضح أن تناسخ د ن أ يتطلب أن يفك الجزيء النووي المزدوج حتى تكون القواعد النتروجينية الداخلية معرضة للأنزيمات التناسخ. ويبدو أن نشاط الفك في الاشرشيا كولاى يتم بواسطة بروتين التناسخ والذي يميئ لـ ATP الاديوزين ثلاثي الفوسفات في حين يحفز حلزون على الانشطار.

- وبمجرد الانشطار تصبح الخيوط المفردة المعرضة مثبتة بواسطة بروتين آخر هو البروتين الخاص بفك دن.أ.

- هناك بروتينات أخرى تشارك في التماسخ مثل:

- إنزيم الاسترخاء (البروتين w) والذي يعتقد انه يتخلص من اللغائف فوق الحلزوني الكبيرة والعقد المتولدة في كروموسوم دائري مزدوج أثناء عملية الفك استعدادا للتاسخ.

- أنزيمات الاستطالة (البلمرة) وهذه مهمة لفرد واستطالة الشريط الفردي لـ دن.أ. وهذه الأنزيم يسمى بإنزيم البلمره III ويلزم أثناء الاستطالة استمرار عملية الفك للحلزون واستقرارا لحاجة الانشطار بواسطة بروتينات الفك.

- إنزيم الاسترخاء وهو الذي يعمل على إزالة اللغائف الناتجة ويتحاشى التشابك الكروموسومي.

أنزيمات النيكلوبيز Nuclease enzyme

هذه الأنزيمات تقوم بتحليل وكسر سلسلة النيكلوتيدات إلى مركبات أو قطع من النيكلوتيدات حيث ترتبط

بروابط ثنائية الفسفورية 3', 5' phosphodiester bonds

وتهاجم هذه الأنزيمات نهاية الموقع 3' أو 5' في هذه الارتباطات وهناك نوعان من هذه الأنزيمات:

(١) أنزيم اكسونيكليز Exonuclease enzyme

والتي مهاجم الطرف الحر من النيكلوتيد والذي يبدأ في نهاية الموقع الحر 3' (3'-OH) من النيكلوتيد والذي يكسر أو يؤثر على الرابطة المتصلة بنهاية الموقع 3'-OH للرابطة الفسفورية الثنائية phosphodiester back bone أو أنها تبدأ في التأثير على نهاية الموقع 5'-pend وتهضم النيكلوتيد

في اتجاه 5' - 3'

(٢) أنزيم اندونيكليز Endonuclease enzyme

- وهو الأنزيم الذي يهاجم طرف واحد من طرفي رابطة ثنائي الفوسفور phosphodiester linkages والذي يهاجم الروابط الداخلية لسلسلة النيكلوتيدات.

- إذا كانت سلسلة النيكلوتيد هذه فراديه فان الأنزيم يقطع السلسلة إلى قطعين.

البلمرة دن أ في الأوساط الغذائية

In vitro D/A polymerization

تتطلب عدة جزيئات من المواد العضوية وتكون ضرورية للتفاعل وهي:

- دوكسي نيكلوسيد ثلاثي الفوسفات Deoxynucleoside Triphosphate

وهي متشابهة تماما بنيكليوتيدات أحادية الفوسفات

Deoxynucleotide monophosphate (d AMP, d CMP, d GMP)

وبإضافة جزئين من مجموعة الفوسفات إليها ينتج (d ATP, d CTP, d GTP) نيكليوتيدات ثلاثية الفوسفات.

- عديدة النيكليوتيدات مع نهاية 3'-OH

Polynucleotide chains with 3'-OH ends

وعديد من أشرطة DNA تسمى أساسيات الأشرطة Primer strands

- شريط الطبع أو القالب Template strands

جميع النشاطات الهامة لبوليمر د ن أ تحتوي على صفات خاصة وهي أضافه نيكليوتيدات إلى الشريط البدائي أو الأصلي primer strands

- في حالة البلمرة في الأوساط الغذائية ألفا (ب) فوسفات نيكليوسيد ثلاثي الفوسفات يكون ٣١، ٥١ رابطة ثنائية فوسفارية مع مجموعة حرة من 3'-OH أثناء نمو سلسلة النيكليوتيد.

وجزئ البيروفوسفاتيز (P ~ P) فهو تلقائيا ينتج عن طاقة عالية "high" "bond" (~) energy" or والذي بمعنى أنه عند تحلل البيروفوسفاتيز ينتج عنه جزئان من الفوسفات مع تحرير طاقة

وتكون دائما الإضافة في اتجاه ٥' - ٣' وموقع الإضافة في نهاية الموقع ٣'

ومما سبق يتضح أن تتناسخ د ن أ يتطلب الآتي:

- أنزيمات لفك الحلزون المزدوج.
- تخليق خيوط البادئ الأولى.
- أنزيمات للاستطالة وتتطلب أنزيم البلمرة III والذي يعمل مع أنزيمات أخرى. ويلزم أن يسبق عملية الاستطالة فكا مستمرا للحزون واستقرارا لحالة الاثطار بواسطة بروتينات لفك.
- أنزيم الاسترخاء والذي يعمل على إزالة اللغائف الناتجة ويتحاشى التشبك الكروموسومي.
- تفاعل تخليق قطع والالتحام الذي يتأثر بأنزيم البلمرة د ن أ ١ والليجيز ل د ن أ وأنزيمات أخرى لتصحيح وتلحم معا قطع أوكازاكي المخلفة بجهاز التناسخ.

حمض ريبونيكلك أسد (ر ن . أ) Ribonucleic acid (RNA)

- معظم الخلايا ذات الأنوية البدائية والحقيقية تحتوى على حامض نووى غير DNA ويسمى RNA حمض ريبونيكلك اسد (ر ن أ).

- فى بعض الفيروسات لا تحتوى على المادة الوراثية DNA ولكن تحتوى فقط على RNA وبذلك يكون هناك ريبونيكلك وراثي مثل DNA وأخر غير وراثي وبذلك ينقسم RNA (ر ن أ) إلى قسمين:
أحدهما:

Genetic RNA

أ (حمض ريبونيكلك وراثي

Non Genetic RNA

ب) حمض ريبونيكلك غير وراثي

أ (حمض ريبونيكلك الوراثي Genetic RNA

- يوجد هذا النوع من الحامض الوراثي في كثير من الأنواع الفيروسية النباتية وأنواع فيروسية حيوانية مثل فيروس الأنفلونزا، وفيروسات الفم والقدم وغيرها من الفيروسات الحيوانية.

- يتكون هذا الحامض من عدد من النيكلوتيدات حوالي 4 تسمى ribonucleotides ذلك واحدة نيكلوتيد تحتوى على سكر (ribose) ومجموعة الفوسفات وقاعدة نتروجينية.

- القاعدة انتروجينية هي الاننين - الجوانين (البيورين) السيتوزين - اليوراسيل (البيريميدين) توجد أربعة صور من النيكلوتيد سابعة في السائل النووي وكن بصورة ريبونيكوسيد ثلاثي الفوسفات

Triphosphates of ribonucleosides

مثل اوتيوزين ثلاثى الفوسفات

Guanosine Triphosphate (GTP), Adenosine triphosphate (ATP) cytidine Triphosphate (CTP) and uridine Triphosphate (UTP).

Molecular structure of RNA

تركيب جزيى ر ن أ

- يتكون الشريط الفردي من ر ن أ والموجود فى النواة على أساس أنه مادة وراثية فى فيروسات النبات والحيوان. من عديد من النيكلوتيدات polynucleatides والذي يحتوى على عدد كبير من ريبونيكلو تيد.

- يرتبط الريبوز + حمض الفوسفوريك في النيكلوتيد بواسطة روابط ثنائية الفوسفات phosphidester bonds.

ب) حمض ريبونيكلك غير وراثي Non Genetic RNA

وهذا النوع من الحامض النووي موجود في الخلايا حقيقية النواة وهو ليس المادة الوراثية في الخلية ولكن من الأساسيات في تكوين الأنواع المختلفة للبروتينات

تناسخ ريبونيكلك الوراثي Replication of genetic RNA

- تناسخ RNA الوراثي للفيروسات نباتية أو الحيوانية يكون ذاتيا Self - replication ويسمى ريبونيكلك اساسي وريبونيكلك مخلق RNA-dependent RNA synthesis
- وظيفة ريبونيكلك الفيروس يعمل على أنه ريبونيكلك مسافر as a messenger RNA والذي يكون مصاحبا أو عاملا مع الجهاز الريبوسومي في العائل وفي تخليق كل من أنزيمات البلمرة للريبونيكلك ر ن أ RNA polymerase enzyme والضروري في تخليق RNA والبروتين الخاص بتغليف الفيروس.
- ويعمل فيروس RNA على أساس أنه قالب أو طابع Template في تخليق سلسلة ريبونيكلك المتممة أو المكملة لتكوين شريطين من ريبونيكلك أي تضاعف.
- قد ترتبط سلسلة RNA مع أخرى من DNA ويعمل RNA في نسخة المعلومات الوراثية وترجمتها.

مقارنة بين كل من مادة DNA و RNA

الرقم	الفرق	DNA	RNA
١.	المكان	غالبًا في النواة	غالبًا في السيتوبلازم والبعض في النواة موجود في النوية
٢.	الشكل	ثنائي الأشرطة حلزونية	أحادي الأشرطة وليس حلزونية
٣.	فوسفات	حمض الفوسفوريك	حمض الفوسفوريك
٤.	بريميدينات	ثيامين ، سيتوزين	سيتوزين ، يوراسيل
٥.	بيرين	ادنين ، جوانين	ادنين ، جوانين
٦.	الأهمية	تلعب دورا هاما في التحكم الوراثي والظفرات الوراثة والتحكم في معظم العمليات الحيوية في معظم العمليات الحيوية بالخلية	تكون مادة وراثية كما في بعض الفيروسات. وتكون مادة غير وراثية في الحيوانات والفقاريات العليا وتعمل على الهيمنة في تكوين البروتين في الخلية
٧.	السكر	٢- ديزوكس ريبوز	الريبوز
٨.	الاتحاد بين كل من السكر + الفوسفات + القواعد النتروجينية	هذا الاتحاد واحد في كل منهما	الاتحاد واحد
٩.	التركيب الجزيئي	A-T G-C	A-C G-U