

الباب الثالث

الخواص التنظيمية (الأوستيرية)
للهموجلوبين

obeikandi.com

الخواص التنظيمية (الألوستيرية) للهيموجلوبين:

يتميز جزئى الهيموجلوبين بصفات تنظيمية نتيجة تفاعل وحداته الأربعة :
سلسلتين ألفا وسلسلتين بيتا :

ففي الأوكسى هيموجلوبين تكون للأحماض الأمينية (النهائية الكربوكسيلية للسلاسل الأربع حرية الدوران الكاملة .

وفي الدى أكسى هيموجلوبين تكون للأحماض الأمينية (النهائية الكربوكسيلية للسلاسل الأربع حرية مشمولة بالتفاعلات (روابط ملحية : ٨ روابط ملحية)

عند الاتحاد بالأكسجين يقل قطر ذرة الحديد بحيث تتحرك بمستوى حلقة البورفيرين وينسحب بقية المستدين المرتبط بها وهو ما يشير لاندفاع باقي التيروسين من الجيب بين منطقتي حلزونان ألفا فتخترق الروابط الملحية بين وحدات الهيموجلوبين الثانوية.

تقوم الجليسيريدات ثنائية الفوسفات (٢ و ٣-داى جليسر فوسفات : 2. 3-GPD) بتثبيت الدى أكسى هيموجلوبين بروابط بيتا مستعرضة حاملا أربع شحنات سالبة وترتبط داخل التجويف الوسطى ببقايا الليسين والهستدين وتطرح جزء من الجليسيريدات ثنائية الفوسفات عند الاتحاد بالأكسجين لصغر التجويف المركزي.

يشمل تأثير بور (قابلية الدى أكسى هيموجلوبين للارتباط بأيونات الهيدروجين) ثلاثة أزواج من المجاميع الرابطة للبروتونات (مجموعة الأميد الطرفية لسلاسل ألفا وأثنين من بقايا الهستدين) وجميعها تزداد قيمة ثابت تفككها (pK) لها بنزع الأكسجين منها لقرب المجاميع المشحونة السالبة.

تبلغ قابلية ذوبان ثاني أكسيد الكربون عشرون مرة قدر ذوبان الأكسجين بالبلازما فينتشر ثاني أكسيد الكربون بسرعة من الأنسجة للأوعية الدموية و يتمياً إلى حمض كربونيك مجفراً بأنزيم كاربونيك انهيدريز (Carbonic anhydrase) ثم يتفكك الحمض تلقائياً :



الأكسيجين من الهيموجلوبين (تأثير بور) فتزداد قيمة pA للهيموجلوبين ويمكن أحتواء أيونات الهيدروجين الناتجة من التفكك بدون نقص قيمة أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) ويسمى ذلك التحول المتساوي التمثياً بالايسو-هيدريك (Isohydric shift).

في الوقت نفسه فإن نزع الأكسيجين يخفض قيمة أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) بمقدار ٠,٠٢ لزيادة قيمة pk للهيموجلوبين أي احتواء ٠,٣ مللي مكافئ من أيونات الهيدروجين تحتوى على ملل مكافئ من الهيموجلوبين دون تغير قيمة أس تركيز أيون الهيدروجين وترتبط أيونات الهيدروجين الباقية ببقايا الهستدين الغنى بها الهيموجلوبين.

يتفاعل الهيموجلوبين مع ثاني أكسيد الكرون ويرتبط كيميائياً مع مجاميع ألفا-أمينو بالسلاسل الأربع ويتكون كاربو أمينو هيموجلوبين (Carbo amino Hb) وتكوينه يساهم في نقل ثاني أكسيد الكربون لكن بدرجة أقل لانخفاض تركيز البروتين في البلازما :

$$R-NH_2 + CO_2 \longleftrightarrow R-NH-COOH \longleftrightarrow R-NH-COO^- + H^+$$

تنتشر أيونات البيكربونات من كرات الدم للبلازما وتتحرك أيونات الكلوريد من البلازما لداخل الكرات الحمراء للمحافظة على التعادل الكهربى ونتيجة ذلك فإن معظم ثاني أكسيد الكربون الملوث ينتقل في البلازما بشكل بيكربونات (مع أن تكون البيكربونات وتنظيم أيونات الهيدروجين يحدث داخل الكرة فمدى تحول الكلور باتزان دونان يتطلب أن تكون نسبة البيكربونات : الكلور داخل الخلايا = خارجها) و تكون حركة البيكربونات من الكرة (تحول الكلور) ونتيجة ذلك فإن معظم كمية ثاني أكسيد الكربون المنتقل بشكل بيكربونات البلازما الوريدي (٢٧ ملليمول أكثر من داخل الكرة ١٢,٥ ملليمول) أي حركة ضد التركيز وتفسر بان أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) داخل الخلية (٠,٥ وحدة) أقل من أس تركيز أيون الهيدروجين خارج الخلية وحيث أن أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) يحدد نسبة البيكربونات

إلى نسبة ثاني أكسيد الكربون المذاب وبما أن الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون نفسه بكلا الجزئين فإن التركيز المتوازن داخل الخلية لليكربونات تبلغ ٢/١ تركيزه خارج الخلية.

وتتعادل شحنات الهيموجلوبين السابقة لارتباطها من خلال أيونات الهيدروجين فإن الأيون الموجب داخل الخلية هو البوتاسيوم (Ka) ويجب معادلته بالبيكربونات أو بالكالور وتزيد هذه الأيونات الإضافية الأسموزية داخل الخلية فينتدقق الماء لدخلها وعليه يكون الهيماتوكريت بالدم الوريدي أكثر منه بالدم الشرياني.

وتتظم "ثاني أكسيد الكربون - بيكربونات" بتنظيم الأحماض الثانوية أو القواعد وهي نظام مفتوح فأحد مكوناته ثاني أكسيد الكربون المتزن مع هواء الحويصلات الهوائية حيث ثابت التآين (pk) لحمض الكربونيك إلى كربونات و أيونات هيدروجين هي ١,٦ وحسب معادلة هندرسون وهازلنباخ يتم تحديد أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) للبلازما بواسطة نسبة تركيز البيكربونات إلى حمض الكربونيك الغير متفكك :

$$pH = ١,٦ + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$$

وبما أن حمض الكربونيك متوازن مع ثاني أكسيد الكربون فإن حمض الكربونيك غير متفكك يشمل الحمض وثاني أكسيد الكربون المذاب وعليه فحسب قانون هنري فإن كمية ثاني أكسيد الكربون المذاب (0.2) يتمياً إلى حمض كربونيك و يحدد ذلك بالضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون :

$$pCO_2 \times \alpha (0.03) = CO_2 \text{ sol} + H_2CO_3$$

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{0.3 pCO_2}$$

التركيز الكلي لثاني أكسيد الكربون داخل البلازما = تركيز ثاني أكسيد الكربون + تركيز البيكربونات + تركيز حمض الكبريتيك

$$pH = 6.1 + \log [CO_2] - 0.3 pCO_2 / 0.3 pCO_2$$

$$= 6.1 + \text{Log} \left[\frac{[\text{CO}_2]}{0.3 \text{ pCO}_2} \right]$$

وعند إضافة أيونات الهيدروجين (H⁺) تتحول البيكربونات إلى ثاني أكسيد الكربون ويخرج خارج الجسم بالتنفس من خلال عملية الزفير :

وتنظيم الأحماض الثنائية يستهلك بيكربونات البلازما وللحصول على نسبة ٢٠ : ١ أى النسبة بين الكربونات : الضغط الجزئى لثاني أكسيد الكربون X ٠.٣ . فان سرعة التنفس تزداد بشكل طبيعى فينخفض الضغط لثاني أكسيد الكربون داخل الحويصلات (عملية التعويض Compensation) وقد يكون التعويض غير كافي لاستعادة أس تركيز أيون الهيدروجين (pH) بشكل كامل واستعادتها يتطلب استعادة تركيز البيكربونات الأصلية باليات كلوية . حيث أن اضطراب أس تركيز أيون الهيدروجين بالبلازما يكون بتغير تركيز أيون البيكربونات (اضطراب ذهني) أو بالضغط الجزئى لثاني أكسيد الكربون (اضطراب نفسى).