

الباب الثالث

الحشرات الناقلة للفطريات الممرضة للنباتات

- الحشرات ونقل الأمراض النباتية المتنسبية عن فطريات

obeikandl.com

الحشرات ونقل الأمراض النباتية المتنسبية عن فطريات

Insect Transmission of Plant Pathogenic Fungi

تشكل الفطريات أكبر مجموعة من الكائنات الدقيقة الممرضة للنبات، فهناك الفطريات التي تصيب البذور والأجزاء التكاثرية الأخرى، والنباتات بكافة مراحل نموها وأجزائها وكذلك المنتجات النباتية المخزونة. وتقوم الحشرات بنشر مسببات الأمراض الفطرية وتؤمن الجروح الالازمة لدخولها إلى العائل النباتي كما تساعد الحشرات بعض الفطريات على البقاء والتغلب على الظروف البيئية غير المناسبة. ومن المعروف أن جراثيم الفطريات مقاومة جداً للظروف البيئية القاسية ويمكن أن تبقى تلك الجراثيم بحالة جيدة حتى في حالة غياب عائلها النباتي. وتنتشر تلك الجراثيم بسهولة بواسطة الرياح والمياه الجارية ومياه الأمطار والعديد من الحشرات، وتعتمد بعض مسببات الأمراض الفطرية النباتية على الحشرات في انتقالها إلا أن الكثير منها ينتقل أيضاً (بواسطة الحشرات) عن طريق الصدفة (Paul et al., 1989، Atkins, 1978، Hang, 2003)

.(Fitt et al., 1989, 2004)

هناك منهجان مختلفان لدراسة العلاقة بين مسببات أمراض النبات الفطرية والمحشرات الناقلة لها. الأول وهو الذي ينتهجه (Carter, 1973) والذي يصنف تلك العلاقات حسب علاقة الحشرة بالفطر. أما المنهج الآخر فينتهجه (Agrios, 2005) حيث يصنف تلك الأمراض الفطرية والمحشرات الناقلة لها إلى مجموعات مختلفة وذلك تبعاً للجزء النباتي الذي تصيبه أو تهاجمه. وبهدف تكامل المعلومات حول هذا الموضوع فسيتم دراسة المنهج الأول بشيء من التفصيل ثم يُتبع بسرد موجز للمنهج الآخر مع محاولة تفادى أي تكرار مل للمعلومات التي سوف يتم التطرق إليها. ويمكن أن تستفيد الفطريات المرضة للنباتات من المحشرات من عدة وجوه يمكن أن تتلخص فيما يلي :

- ١- تساعد المحشرات الفطريات في البقاء (لكن هذه الفائدة ليست ذات أهمية كبيرة نظراً لأن الفطريات يمكن أن تنتج جراثيم مقاومة تحت الظروف غير المناسبة).
 - ٢- تساعد المحشرات في نشر مصدر العدوى الأولية والثانوية بالفطر وللحشرات أهمية كبيرة في هذا الخصوص.
 - ٣- قد توفر المحشرات الجروح الالزمة وساحات الدخول للفطر المرض للنبات.
 - ٤- تساعد المحشرات الفطريات (أحياناً) في مواجهة الظروف القاسية وتتوفر الظروف المفضلة لبقاء الفطريات وحدوث العدوى بها.
- كما تتلخص العلاقات الرئيسية بين مسببات الأمراض النباتية الفطرية والمحشرات فيما يلي (Carter, 1973) :

- ١- الحشرة تنقل الفطر المرض دون أن تحدث جروحاً للنبات.
- ٢- الحشرة تنقل الفطر المرض وتحدث جروحاً للنبات.
- ٣- المنفعة متبادلة بين الفطر والحشرة.
- ٤- الفطر ينمو على إفرازات الحشرة.

٥- الحشرة تكيف البيئة لنمو الفطر.

وسوف يتم سرد بعض الأمثلة لكل علاقة من تلك العلاقات بإيجاز فيما يلي :

أولاً: نقل العشرة الفطر دون أن تحدث جرحاً للنبات

المقال الأول: عفن كيزان اللزرة ودينان جذور اللزرة

تقل دينان جذور اللزرة (شكل ٢٤) (الأطوار البالغة / الكاملة للحشرة *Diabrotica app.* الفطر المسبب لعفن كيزان اللزرة *Fusarium moniliforme* (كما يسمى أيضاً عفن الساق Stalk rot)، حيث تحمل تلك الحشرات (البالغة) جراثيم الفطر داخلياً وخارجياً وعندما تتجول على كيزان اللزرة فإنها تسبب العدوى بالفطر المرض (White, 2001).



شكل (٢٤). الحشرة الكاملة لدودة جذور اللزرة (وهي تهدى على المروط العرني لكيزان اللزرة) وتقل الفطريات المعرفة لللزرة أثناء تجويفها.

المصدر : (Crambaw, 2004).

المقال الثاني: فطر الأرجووت على محاصيل الحبوب

وهذا الفطر (شكل ٢٥) ينبع على أزهار محاصيل الحبوب وتنمو الجراثيم الكوئينية لهذا الفطر في أماكن تحتوي على إفرازات سكرية لزجة تختلف العديدة من أنواع

الحشرات (وبالذات أنواع النباب والخنافس) وتتلوث هذه الحشرات داخلياً وخارجياً بجراثيم هذا الفطر وهي مهمة للعدوى الثانوية بالفطر أما العدوى الأولية فتتم بواسطة الرياح من خلال الجراثيم الأسكنية للفطر والتي تتحرر من الجسم الحجري للفطر (Sclerotia). كما أن بعض الأنواع من الخنافس قد تتغذى على الجسم الحجري وتحمل معها جراثيم الفطر وقد تسبب في حدوث العدوى الأولية به (Lambert and McIlveen, 1976، Butler et al., 2001). كما أثبتت أيضاً بعض الدراسات الحديثة إمكانية انتقال جراثيم هذا الفطر داخلياً بواسطة بعض أنواع الفراشات مثل فراشة دودة كيزان الذرة *Helicoverpa zea* (Bodd.)، وتتمكن الخطورة هنا في نقل الفراشات لجراثيم الفطر (العدوى الأولية) لمسافات طويلة خلال هجرتها إلى حقول جديدة أو دول مجاورة (Prom and Lopez, 2004). وفي دراسة أخرى على الحشرات الناقلة للفطر، وجد أن ١٠٠٪ من الفراشات و ٧٥٪ من أنواع النباب التي جُمعت من الحقول (تحت الدراسة) تحتوي على كونيديا الفطر المرض (Butler et al., 2001).



شكل (٣٥). فطر الأرجوت على حبوب ستابل الرأي وتنقل جراثيم الفطر بواسطة العديد من الحشرات الزائرة.

المصدر: (Schumann, 2005).

المقال الثالث: التقرحات السيراتوسينستية Ceratosytic cankers

وتسببها الفطريات التابعة للجنس *Ceratosystis* ومنها التقرحات التي تصيب أشجار الشمار ذات الثواقة الحجرية. ويدخل الفطر مع الحشرات الملوثة به عندما تزور تلك الحشرات الجروح الناتجة أثناء عملية الحصاد الميكانيكي لشمار الأشجار، ومن تلك الحشرات خنافس النسخ (شكل ٣٦) وذبابات الفاكهة. أما التقرحات التي تصيب أشجار الحور وتنتهي إلى فطريات تابعة للجنس السابق فيشتراك في نقل تلك الفطريات مع الحشرات السابقة كل من الخنافس الجحوالة (Rove beetles) وكذلك الخنافس المقاتلة على الجذور Root-feeding beetles. وبالإضافة إلى التقرحات السابقة هناك أيضاً أنواع من الفطريات (تابعة للجنس السابق) تسبب الذبول ومنها ذبول أشجار البلوط (Oak) ويسبيه الفطر *C. fagacearum* والذي يُفتح وسائل ميسليومية تسبب تشقق القلف وتسهل دخول الحشرات الملوثة بالفطر (وبالذات خنافس النسخ والتي تتكاثر في تلك الوسائل الموجودة بين القلف والخشب). وتحمل الخنافس الفطر الممرض داخلياً وخارجياً وتحتفظ به خلال فترة التشتية (Appel, 1971 ، Ingold, 1994).



شكل (٣٦). خنافس النسخ (زيادية البقع) التي تنقل العديد من مسببات الأمراض الفطرية للنبات.
المصادر: (Cranshaw, 2004)

المثال الرابع: فطر الفرتسيليوم المسبب للذبول البرسيم *Verticillium albo-atrum* وهو من أهم الأمراض الفطرية على البرسيم وينتقل بواسطة العديد من الأنواع الحشرية (سواء كانت آفات حشرية أو مفترسات أو ملقطات) وهو انتقال عرضي غير متخصص (Haung, 2003). كما أن هناك العديد من الأمثلة الأخرى في هذا الصدد والتي لا يتسع المجال لذكرها.

ثانياً: الحشرة تنقل الفطر وتحدث جروحاً للنبات

ويمكن للفطر المرض أن يدخل النبات إما من خلال الخدوش البسيطة التي تحدثها الحشرة للنبات، من خلال جروح التغذية وإما من خلال جروح وضع البيض.
١ - الفطر يدخل النبات خلال الخدوش البسيطة التي تحدثها الحشرات الرائعة للنبات
 والمثال على ذلك تقع آذار الأزalia *Azalia flower spot* (لفحة الأزalia) على أزهار الأزalia (Smith and Weiss, 1942) ويسببه الفطر *Ovulina azaliae* وتنقله العديد من الحشرات مثل النحل والنمل وحشرات، الترس حيث تنشر هذه الحشرات العدوى الثانوية بالفطر ومسافات طويلة (ربما تصل إلى ثلاثة كيلومترات من مصدر العدوى). عندما تختك تلك الحشرات الملوثة بالفطر بالأزهار الناعمة وتحدى بها الشائكة، فإن جراثيم الفطر تجد طريقها للنبات من خلال تلك الجروح البسيطة وتحدى العدوى بالفطر المرض.

٢ - الفطر يدخل النبات من خلال الجروح الناتجة أثناء عملية تغذية الحشرة:

المثال الأول: مرض تلوث لوز القطن الفطري *Stigmatomycosis of cotton bolls* ويسببه الفطر *Nematospora gossypii* والذي يسبب أضراراً كبيرة لثيلة (نسالة/ألياف) القطن (داخل اللوز)، ولوز القطن المصابة يكون صغيراً في الحجم ولا تظهر عليه أعراض مرضية خارجية.

يدخل الفطر إلى داخل اللوز أثناء عملية تغذية حشرة "بق تلوث القطن" *Cotton Stainer* حيث تكون أجزاء الفم الرمحية لهذه الحشرة ملوثة بالفطر داخلياً وخارجياً. الفطر المرض لا يدخل إلى لوز القطن السليم والحسنة المذكورة ضرورية للعدوى به (Carter, et al. 1973 و Borror, et al. 1989). كما يعتقد أن حشرات الترس *Frankliniella spp.* ومن خلال الخدوش التي تحدثها في أزهار القطن ربما تسبب في دخول جراثيم فطر الفيوزاريوم المسئب لمرض "انغلاق لوز القطن، Cotton hardlock" والذي يمنع لوز القطن من التفتح عند النضج (Osekre et al., 2009).

المثال الثاني: مرض تعفن ساق الذرة الشامية

ويسبب هذا المرض (التعفن) عدة أنواع من الفطريات التابعة للأجناس *Diplodia* و *Fusarium*، *Gibberella* و تدخل هذه الفطريات إلى ساق الذرة من خلال جروح التغذية التي يُحدثها حفار ساق الذرة الأوروبي (شكل ٣٧). كما أن هذه الفطريات يمكن أن تنمو على المخلفات الإخراجية لهذه الحشرة، كما أن الأخيرة تنمو بصورة أفضل على الذرة المصابة بتلك الفطريات (Koehler, 1960).



شكل (٣٧). ثقب ومخلفات يرقة حفار ساق الذرة الأوروبي (على ساق الذرة الشامية) والتي تمهد للإصابة باعغان الساق الفطرية.

المصدر: (Hammond et al., 2009)

ومن الأمثلة الأخرى في هذا السياق مرض تغصن جلور الزرة والذي يحدث أثداء تغذية برقان خنافس جلور الزرة عليها. أيضاً تغصن جلور البرسيم والثعلب والذي يتجزء عن أنواع من الفيوزناروم وتنقله إلى النبات خنافس جلور الثعلب الخضراء *Strane spp.* (كما أن البرسيم المصايب بالفطر يكون عرضة لاجهاض أكبر عندما يصاب بشدة بحشرة من القول التي تهاجم الجزء الخضراء للنبات)، هنا بالإضافة إلى العديد من الأمثلة الأخرى.

٤- الفطر يدخل النبات من خلال الجروح الدائمة أثناء عملية وضع البيض

المثال الأول: مرض نارجع ألمع الطماح *Tree Cricket Canker of Apple* يسبب هذا المرض عن الفطر *Leptosphaeria coniothyrsina* والذي ينقله نوعان من جنادج الأشجار *Tree crickets* تقع تحت الجنس *Oecanthus* وتبلا الإصابة بالفطر عندما تفرض إرثاث تلك الحشرات (يأجزأه منها القارض) تقوياً لوضع البيض (شكل ٣٨) وبعد وضعيه تسد تلك التفرب بمخلفاتها الإخراجية الملوثة بالفطر والتي تنتج عنها التقرحات (Loach, 2007).



شكل (٣٨)- ثقوب وضع البيض لأجي حشرة جندب الأشجار والتي تدخل الفطر المسبب لنارجع ألمع الطماح.

المصدر: (Crossman, 2004).

المثال الثاني: العفن البني على ثمار التواة الحجرية

يتسبب العفن على ثمار التواة الحجرية *Brown Rot of Stone Fruits* عن الفطر *Monilinia laxa* وتنتقل خنفسي البخاري الخرطومية *Conotrachelus nenuphar* (Herbst) (شكل ٣٩) أو تضع البيض عليها وتكون ملوثة بالفطر من ثمار مصابة سابقة. وتعزى نسبة الإصابة بالفطر والتي تصل إلى ٩٣٪ إلى الحشرة كناقل للفطر ولكن للفطر قدرة ضعيفة على إصابة الثمار دون الاعتماد على الحشرة الناقلة. كما أن هناك حشرات أخرى لها القدرة على نقل الفطر الممرض لكنها أقل أهمية في هذا الشأن (Daines, 1942). (Mulder and Stafne, 2007).



شكل (٣٩). خنفسي البخاري الخرطومية والتي تنقل فطريات العفن البني على الثمار الحجرية.
المصدر: (Schwartz, 1981).

ثالثاً: المتنفسة متبادلة بين الفطر والحسنة

المثال الأول: مرض تقرح الفاح الدائم

يتسبب عن الفطر *Gloeosporium perennans* وينتقل بواسطة من التفاح الصوفي *Eriosoma lanigerum* (Hausm) وتحذى هذه الحشرة على اللحاء قريباً من سطح التربة وتسرب ظهور الأورام الثالثولية ويتحذى المزيد من هذه الحشرة على تلك الأورام

وعندما تنفجر الأورام بسبب التجمد شتاءً يدخل الفطر المرض ويتقدم ويسبب المزيد من التقرحات. وفي فصل الصيف يقوم النبات بإنتاج نسيج الكالوس في مكان الإصابة بالفطر وتشفى التقرحات، إلا أن حشرات المُنْ تعاود مهاجمة نسيج الكالوس الجديد وتتكرر العملية. وفي مثل هذه الحالات فإن كلاً من الفطر المرض وحشرات المُنْ يتبدلان المنفعة (Leach, 2007 ، Austwick, 1958).

المثال الثاني: مرض عفن الأخشاب

ينتج عن الفطريات التابعة للجنس *Ceratosystis* (والتي تسبب العفن الأزرق) وكذلك الفطريات التابعة للجنس *Leptographium* (والتي تسبب العفن الرمادي) وتنقلها خنافس القلف التابعة للجنس *Dendroctonus* وكذلك التابعة للجنس *Ips*. وتتكاثر الخنافس الناقلة على أخشاب الأشجار المريضة وشبه الميتة ومن النادر أن تهاجم الأشجار السليمة (الصنوبريات). ويحدث هجوم مكثف على الأشجار من تلك الخنافس بسبب إفرازها لفرومون التجمع aggregation pheromone عندما تجد العائل النباتي المناسب وتكون تلك الخنافس ملوثة بالفطريات الممرضة مما يزيد من فرص الإصابة به، وهذه الفطريات تضعف الأشجار وتتسبب في النهاية في موتها التام مما يجعلها مناسبة جداً لتكاثر خنافس القلف الناقلة. ولذلك فإن تلك الخنافس تنقل الفطر والذي بدوره يقضي على الأشجار و يجعلها صالحة لتكاثر الخنافس وتتضخم بذلك علاقة تبادل المنفعة بينهما (Leach, 2007).

المثال الثالث: مرض العفن الأبيض على الأخشاب الطيرية

ويتسبب عن نوعين من الفطريات هما: *Stereum* و *Amylostereum areolatum* و *sanguinolentum* وتنقلها عدة أنواع من زنابير الأخشاب منها *Sirex gigas* و *Urocerus spp.* وتحمل إناث تلك الزنابير الفطر في مكان مخصص على آلة وضع البيض حيث يتلوث البيض بالفطر أثناء عملية وضع البيض. من مميزات الفطر المرض أنه ينمو

وتحلل الخشب بصورة أسرع من ثبويرات الزنابير الناقلة، كما تنمو تلك اليرقات بصورة أفضل على الخشب المصايب بالفطر ومن ذلك تتضح علاقة تبادل المنفعة بينهما .(Talbot, 1977)

المثال الرابع: مرض الدردار الهولندي Dutch elm disease

يسbib هذا المرض الفطر *Ophiostoma (= Ceratocystis) ulmi* وينقله نوعان من خنافس قلف الدردار هما: الأوروبية (*Scolytus multistriatus* (Marsh.) والأمريكية (*Hylurgopinus rufipes* (Elch.) وتعملان كناقلات رئيسية للفطر المرض (الشكلان ٤٠ و ٤١)، ويتسبب الأخير في سد الأوعية الخشبية للأشجار مما يؤدي إلى ذبولها وموتها السريع حيث تصبح مناسبة جداً لتكاثر الخنافس الناقلة. تخرج الخنافس الكاملة / البالغة في فصل الربيع وتتلوث بجراثيم الفطر المرض و تقوم بنشره إلى أفرع أشجار جديدة عند تغذيتها عليها. ومع أن الفطر يمكن أن ينتشر من خلال التطعيم الطبيعي بين الجذور إلا أن الانتقال الرئيس له (الفطر) يتم بواسطة الخنافس الناقلة. كما أن كثافة انتشار هذا المرض تعتمد على البيئات المناسبة والتوزيع الجغرافي للحشرات الناقلة (Schreiber and Peacock, 1974, Leach, 2007) . ويتبّع من ذلك علاقة تبادل المنفعة (Mutualistic) بين الفطر والحسنة الناقلة. عندما يصل الفطر إلى الأنسجة الوعائية للأشجار حديثة الإصابة فإنه يتسبب في موتها خلال سنة إلى ستين من العدوى عندما تكون البيئة مناسبة لتكاثر الحشرة الناقلة. وفي السنوات الأخيرة ظهر نوع خبيث من الفطر المرض في أمريكا وأوروبا يسمى *novo-ulmi* حل محل النوع الأول (*ulmi*) الأقل عدوانية. وقد صنف في الفترة الأخيرة على أنه تحت نوع وليس نوعاً مستقلاً (Temple et al., 2006) . ومن البديهي أن الفطر ينتشر بواسطة الخنافس في الطبيعة لمسافات قصيرة أما الانتشار لمسافات بعيدة (قد تكون قارات أخرى) فيتم عندما تنقل الأخشاب المصابة إلى أماكن أخرى لأهداف تجارية. ومن الجدير ذكره أن هناك علاقات مشابهة

إلا أنها تميل إلى أن تكون علاقات تعايشية (Symbiotic) بين الحشرة الناقلة والفطر، منها على سبيل المثال العلاقة بين نوع من خنافس أخشاب الأمبروسيا *Xylosandrus crassiusculus* (Mot.) والفطريات *Ambrosiella spp.*. في هذه الحالة، فإن الخنافس الأخيرة لا تتغذى على الخشب نفسه وإنما تتغذى على الفطر الذي تنقله وتنميه على تلك الأخشاب عندما تهاجمها، ومع ذلك فإنها تسبب أضراراً كبيرة عند حفرها لأنفاقها (Beaver, 1989).

مثال آخر هو تغذية نوع من خنافس أبي العيد *Psylllobora vigintimaculata* Say (عائلة/ فصيلة Coccinellidae) على فطر البياض الدقيق (الذي يصيب القرعيات والنباتات الأخرى) ولذلك فإن الحشرة السابقة يمكن الاستفادة منها من ناحيتين هما: المكافحة الحيوية للفطر المرض، وكدليل (indicator) على وجود الفطر المرض وإصابة النباتات به حيث إن ذلك لهفائدة كبيرة جداً في التخطيط المبكر لبرامج إدارة آفات المحاصيل (Sutherland and Parrella, 2009).

وأخيراً، مما يجدر ذكره هو العلاقة الخاصة (والمتقدمة) بين النمل قاطع الأوراق leaf cutting ants أو ما يسمى بالنمل الزارع لحدائق الفطر fungus-gardening ants. هذه العلاقة تلخص في أن النمل من قبيلة Attini والتي تحتوي على أكثر من ٤٠٠ نوع (من أكثرها شهرة النوع *Atta sexdens*) تقطع وتجمع الأوراق الطازجة لأنواع معينة من النباتات وتنقلها إلى أعشاشها (مستعمراتها) وتعمل منها عجينة خاصة تربى عليها أنواع خاصة من الفطريات، حيث تصبح تلك الفطريات هي الغذاء الوحيد للنمل (خصوصاً البرقات) أما الحشرات الكاملة فهي أيضاً تتغذى على نسخ (عصارة) الأوراق عند قطعها. كما أن ذلك النوع من النمل ينتج إفرازات (شرجية) معينة تعمل كسماد للفطر المزروع، كما أن تغذيتها على الفطر وتقليمها له ينبع نموه إلى حد كبير. ولكل نوع من أنواع ذلك النمل نوع خاص من الفطريات التي ينميهما ويتغذى عليها.

وفي حالة انقسام خلايا التمل فإن الملكة تحمل معها أجزاء من الفطر لزراعتها في المستعمرة الجديدة (Bass and Cherret, 1986، Cherret, 1994). وقد وجد أن الأنواع من ذلك التمل الذي يعيش في الغابات الصنوبرية يجذب الأرض (الترسب) المكسوقة عن تلك الظليلية لأنها في الغالب أكثر دفئاً وأقل تعرضاً للكوارث الطبيعية مثل الحرائق الموسمية التي تحدث في الغابات (Seal and Tschinkel, 2006).



شكل (٤٠). نوعان من خنافس قلف الدردار الناقلة للفطر المسبب لمرض الدردار الهولندي.
المصدر: (Johnson and Lyon, 1991).



شكل (٤١). أعراض الإصابة بالفطر المسبب لمرض الدردار الهولندي والذي تنقله خنافس القلف.
المصدر: (Cranshaw, 2004).

رابعاً: الفطر ينمو على إفرازات الحشرة

المثال الأول: العفن الأسود Sooty mold

العفن الأسود (وهو فطر ذو ميسليوم أسود اللون) لا يصيب خلايا النبات وإنما ينمو على الإفرازات الكربوهيدراتية (الندوة العسلية) التي تفرزها بعض الحشرات الماصة للعصارة النباتية والتابعة لرتبة متشابهة الأجنحة (مثل المُن، الذباب الأبيض، البق الدقيقي، السلد والمحشرات القشرية الرخوة). من الأجناس المهمة للفطريات المسيبة للعفن الأسود: جنس *Capnodium*, جنس *Fumago* و الجنس *Scorias*. عندما تنمو هذه الأنواع من الفطريات على أوراق النباتات بغزارة فإنها تقلل من كفاءة التمثيل الضوئي photosynthesis ، وتبادل الغازات وربما تسبب تczم النبات وشيخوخته المبكرة. كل أنواع الحشرات السابقة (الكاملة وغير الكاملة) تُنتج الندوة العسلية التي ينمو عليها العفن الأسود وهي غير مهمة في انتقاله ولكن تكمن أهميتها (أي تلك الحشرات) في أنها توفر البيئة الغذائية المناسبة لنمو تلك الفطريات. من الحشرات التي تنقل العفن الأسود (جانب انتقاله بواسطة الرياح) خناكس أبي العيد المفترسة وأسد المن التي تفترس وتتجذب إلى الحشرات المنتجة للندوة العسلية. ويمكن التفريق بين العفن الأسود السابق ذكره (وهو تلوث طبيعي) وبين التلوث الناتج عن الأنشطة الإنسانية (مثل الأدخنة) حيث إن الأول يكون انتشاره موضعيًا وغير مت蔓延 إذا ما قورن بالنوع الثاني والذي يكون انتشاره عاماً ومت蔓延اً على الأسطح المعرضة (Laemmlen, 2003, Nameth et al., 1996).

المثال الثاني: عفن الساق الأسود الربيعي على البرسيم Spring Black Stem of Alfalfa يسبب عن الفطر *Phoma medicaginis* ويكون أكثر خطورة في وقت الربيع (مع اعتدال درجة حرارة الجو وزيادة الرطوبة / الأمطار). كل الأجزاء الخضرية للبرسيم عرضة للإصابة بهذا الفطر. كما أن الإصابة بهذا النوع من الأمراض الفطرية تزدهر وتزداد خطورته بوجود الندوة العسلية (والمحشرات المفرزة لها) حيث إن المادة الأخيرة تشجع إنبات جراثيم الفطر وتزيد معدل نموه (Thomson and Ockey, 1984).

المثال الثالث: عفن ساق الذرة والمخلفات الإخراجية لحفار ساق الذرة: Corn stalk rot and Corn borer frass

إصابة ساق الذرة بحفار ساق الذرة الأوروبي (*Ostrinia nubilalis* (Hub.) يؤثر سلبياً على سربان العناصر الغذائية في سيقان الذرة، يُسهل تكسرها، يقلل المحصول، ولكن الأكثر أهمية في ذلك أنه يُسهل ويساعد على الإصابة بأعفان الساق الناتجة عن الفطريات المرضة التابعة للأجناس مثل *Gibberella*, *Diplodia* و *Fusarium*. وقد وجد أن تلك الفطريات يمكن أن تنمو على المخلفات الإخراجية للحشرة، كما أن يرقات الحشرة السابقة تنمو بصورة أفضل على أنسجة الساق المصابة بتلك الفطريات خصوصاً فطر الفيوزاريوم (Gatch and Munkvold, 1961)، (Chiang and Wilcoxson, 1961)، (Hammoond et al., 2002، 2009).

خامساً: الحشرة تُكيف البيئة المحيطة (يجعلها مناسبة) لنمو الفطر
 إن إصابة الحبوب في المخزن بعض الآفات الحشرية (ومنها السوس Weevils) مثل سوسة الحبوب (*Sitophilus granaries* (L.) ، سوسة الأرز (*S. oryzae* (L.) وسوسة الذرة (*S. zeamais* Motsch Coleoptera: Curculionidae) ترفع درجة الحرارة والرطوبة في بور الإصابة وتخلق هذه الظروف بيئه مفضلة لنمو الفطريات التي تصيب الحبوب مثل فطريات الأسبرجلس (جنس *Aspergillus*) مثل *A. niger* Van, *A. candidus* Link (Deutoremycetes: Moniliales) *A. flavus* Link (Tiegem) وفطر الأفلاتوكسين (Yoon et al., 2003).
 لوحظ أن الحرارة والرطوبة في الحبوب تزداد مع زيادة الإصابة بتلك الحشرات (Hell et al., 2000) كما لوحظ أن سوسة الأرز تفضل الأرز الملوث بالفطريات على الأرز السليم (Yoon et al., 2003). وبالنسبة فقد وجد أيضاً أن الإصابة بتلك السوسة تشجع النمو السريع لتلك الفطريات (Yoon et al., 2009).

جدول (١). ملخص عام للمطريات المرضية للنباتات والمحشرات الناقلة لها موترة حسب الحجر الباقي الصاب.

| النبات الصاب | المحشرة الناقلة | سبب المرض الفطري | أولاً: البدور في التربية، الجذور، البادرات وأسفل الساق | الثانية المعاشرة |
|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| حاصلب الحبوب والذرنة الشاعبية | Sphecothrix parvulus | Fusarium spp. | برقات حفنساء المشيشة الجزرقة | المشيشة الجزرقة |
| فول الصوص | Phytophthora destructor | Pythium spp. | برقات زيدابه البسيلان | الفطريات |
| تحليل الزيت | Dianthotica spp. | Neimanthosporum spp. | ديدان جنذور الذرة | ديدانات |
| الغسل | Sitona spp. | Fusarium spp. | خناقش التعلج الخضراء | الفطريات |
| الغسل | Rhodotoma spp. | Fusarium spp. | برقات ذياب القطر | الفطريات |
| قول الصوص | Bryotropha spp. | Pythium spp. | برقات ذباب المطر | الفطريات والتنقل الأحمر |
| تحليل الزيت | Syfella sunitedalis Walk | Fusarium spp. | برقات الفراشة Walk | البرسيم والتنقل الأحمر |
| الغسل | Sancassanini | Gaudinellma sp. | الجلسم (من معصلات الأرجل) التابع للجنسين | البرسيم والتنقل الأحمر |
| الغسل | Tyrophagus | Aspergillus flavus | تلورث البدور بسموم الأفلوكوكين الداتج عن التفسير | البرسيم والتنقل الأحمر |
| الدرة الشاعبية | ثانية: السويقات، السبيقات، الجلسوخ والأفرع | Pyrenopeziza nubilans | برقات حلزون ساق الدرة الأوروبي | الفطريات المسيبة لمعصر الساق وتشمل: |
| الدرة الشاعبية | Pyrenopeziza nubilans | Pyrenopeziza spp., Diplodia zeae, Gibberella zeae | برقات حلزون ساق الدرة الأوروبي | الفطريات المسيبة لمعصر الساق وتشمل: |
| قصصي السكر | Diabrotica saccharalis Fab. | Colletotrichum luteum Went | سوسنة قصب السكر | فطر العفن الأحمر لقصصي السكر |
| قصصي السكر | Diabrotica saccharalis Fab. | Colletotrichum luteum Went | ساق قصب السكر | فطر العفن الأحمر لقصصي السكر |

الحشرات ونقل الأمراض النباتية المنسية عن نظراء

| الحشرة المدققة | مسبب المرض الفطري | النبات المصايد |
|--|---|--|
| الحشرات العصوية نيجي <i>Cryptococcus fagi</i> | فطر تقرح فاف أشجار الزبان | أشجار الزران |
| نوعان من بق الأكابسدة <i>Capsid bugs</i> | فطر التدهور (الموت البطيء) للكاكاو أو <i>Cacao dieback</i> | |
| <i>Sidibergella singularis</i> Hazl. <i>Distantiella theobroma</i> Dist. | <i>Calomeria rigidinervia</i> Sacc. | أشجار الكاكاو |
| (Sap beetles) تختلاع النسخ <i>Carphobius freeman</i> | | أشجار الشمار ذات النواة الحمراء |
| ذبابات الدرودينيلا <i>Drosophila melanogaster</i> <i>Chymomyza procnemoides</i> | <i>Ceratocystis limonaria</i> الفطر المسئب للثمار حات (الخوخ، المشمش، ... الخ) وأشجار الخور البرجاع | (الخوخ، المشمش، ... الخ) وأشجار الخور البرجاع |
| (Tree crickets) نوعان من جنادل الأشجار <i>Oecanthus niveus</i> DeG. <i>O. angustipennis</i> Fitch | <i>Lepidosphaeria coniothyrium</i> الفطر المسئب للتغحر حات المسعدية (أورام الثليل) على أشجار النصال | |
| من الفلاح الصوفي <i>Eriophoma lanigerum</i> (Hausm.) | الفطر المسئب للتغحر حات المسعدية (أورام الثليل) على جلدوع النصال | |
| رتيلير الأخشاب (زنبروك السردي) <i>Trachelus gigas</i> <i>Sirex spp.</i> | <i>Gnathocinus venenans</i> الفطريات المسئبة للمفعن الأبيض <i>Amplystereum areolaatum</i> <i>Stenom sanguineolum</i> | |
| خنافس القلف (Bark beetles) <i>Dendroctonus ponderosae</i> Ips spp. | الفطريات المسئبة للمفعن الأزرق <i>Cerambycidae</i> spp. | |

تابع جدول (١).

| البيات الصناب | مسبب المرض الفطري | الحشرة الدالة |
|---------------|--|--|
| أشجار الصنوبر | الفطريات المسيبة لفحة الحارة <i>Nectria curvibrinuta</i> <i>Diplodia pinea</i> | توغان من البرق الباصق <i>Aphrophora varatogensis</i> Fitch <i>A. parallela</i> Say و |
| أشجار البوط | (Oak wilt) الفطر المسبب لنعول البوط <i>Ceratosysis fagacearum</i> | خنافس النسنخ <i>Carpophilus lugubris</i> Mur. <i>Colopterus</i> spp. <i>Cryptarcha ample</i> Er. |
| أشجار البوط | (Oak wilt) الفطر المسبب لنعول البوط <i>Ceratosysis fagacearum</i> | (Oak bark beetles) خنافس قلف البوط (Oak bark beetles) <i>Monarthrum fasciatum</i> Say. <i>Pseudotyphlochorus minutissimus</i> Zimm. <i>P. prunosus</i> Eic. |
| أشجار المنجو | الفطر المسبب لتشوه المنجو <i>Fusarium moniliforme</i> | الحالم الأربوفي (من معصليات الأرجل) <i>Aceria mangifera</i> Sayed |
| أشجار المنجو | الفطر المسبب للذبول المانجو <i>Diplodia recifensis</i> | نوع من الخنافس <i>Xyleborus affinis</i> |
| أشجار المنجو | الفطر المسبب لذبول المانجو <i>Ceratocystis fimbriata</i> | خنساء النسنخ <i>Hypoeryphalus mangifera</i> |
| أشجار الدردار | الفطر المسبب لمرض الدردار البولندي <i>Ceratocystis ulmi</i> | (Elm bark beetles) <i>Scolytus multistriatus</i> Marsh. <i>Hylobiopsis rufipes</i> Elch. |

تابع جدول (١).

| المحشر الداكنة | مسبب المرض الفطري | النبات المصايب |
|--|---|---|
| أنواع كثيرة من الذباب، النذير، النحل وخفافس أبيض العيد المفترسة والتي تنقل جراثيم الفطر أو أجزاء من هيئاته. | العديد من الأعفان البارلية (Sooty molds) وهي غير متطفلة على النباتات بصورة مباشرة بل على إفرازات الندوة العسلية التي تغرسها المحشرة من رتبة متطفلة الأجسام مثل الذباب الأبيض، الحشرات القشرية، البعي الدقبي، المن...إلخ | ثالثاً: المجرى الفطري |
| ذبابات الدره وسيفلا الملوثة بالجراثيم <i>Drosophila</i> spp. | الفطر المسبب لصدأ البن ((العهوة) <i>Coffee Rust</i>) <i>Hemileia vastatrix</i> | العديد من النباتات في المناطق المدارية وتحت المدارية |
| نوع من الهموش المسبب للأوراق والصنوبر <i>Pseudoxiphidium betulae</i> Ensl. | الفطر المسبب له: لفححة الأوراق الابيرية للصنوبر <i>Pulularia pululans</i> | أوراق البن |
| انخفاضه الغربيات المقطرة <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Howard. | الفطر المسبب لأشراكوز القرعيات <i>Cotylorichum lagenaicum</i> | الأوراق الابيرية للصنوبر |
| نوع من البق الشبكي الثاني للجنس <i>Gragaphia</i> <i>Pestalotiopsis palmarium</i> <i>P. glandicola</i> | القرعيات | القرعيات |
| فسوسة الشوك <i>Centropygnus liliaceus</i> | خertil الزيت | خertil الشوك الكندي |

المشرفة الناقلة

مسبب المرض الفطري

النبات المصاب

رابع: البراعم والأزهار

الحلم (من مفصليات الأرجل)
*Sieropites graminum*فطر المسبب لتعفن براعم القرنفل
*Fusarium rose*الفطر المسبب لتعفن براعم القرنفل
Ustilago violacea

القرنفل

العديد من المشرفات الرائرة الملوثة بمجرى التنفس
العديد من أنواع التحلل الناتجة المفحة للأزهار (والتحلل له دور أكبر في انتشار العدوى الثانوية)الفطر المسبب لـ: لفحة أزهار الطفل الأحمر
Botryotis anthophilila
الفطر جهازي وينتقل مع البذور أيضاً (العدوى الأولية)

التنفل

العديد من أنواع النباتات والخواص التي تتسبّب إلى الإفرازات المزاجية لافطر وتصبح ملوثة بآثرهم (والمشرفات مهمة بصورة أكبر في نشر العدوى الثانوية ولمسقات بعيدة)

الفطر المسبب لمرض الأزهار
Claviceps purpurea

التنفل الأحمر

تابع جدول (١).

| الحيثنة الناقلة | البات المصايب | مسبب المرض الفطري | الخامس: الشمار والبنور في المقل |
|--|---|---|--|
| زنبر التين <i>Blastophaga psenes</i> L. | الفطر المسبب للعفن الداخلي الطري لشمار التين <i>Fusarium moniliforme</i> f.s. <i>fici</i> | زنبر التين أنواع من المفترس (من مفصليات الأرجل) وبدرجه الفطريات المسيبة لتفحثم وتعفن التين من أهمها الفطر <i>Aspergillus niger</i> | الذين |
| خففاء البخاري الخروممية (Plum curculio) <i>Conotrachelus nemoralis</i> Herbst. | الفطريات المسيبة للعفن البني لشمار الفواكه ذات النواة فراشة الفواكه الشرقية <i>Grapholita molesta</i> | خففاء البخاري الخروممية (Plum curculio) <i>Conotrachelus nemoralis</i> Herbst. فراشة الفواكه الشرقية <i>Grapholita molesta</i> | الذين |
| خرفانه، الفواكه الجفنة <i>Carpophilus hemipterus</i> و نوعان من خرافن النسبخ <i>Carpophilus mutatus</i> <i>Haplochus luteolus</i> | مثار الفواكه ذات النواة المجبرية <i>Monilia fructicola</i> <i>M. laxa</i> | خرفانه، الفواكه الجفنة <i>Carpophilus hemipterus</i> و نوعان من خرافن النسبخ <i>Carpophilus mutatus</i> <i>Haplochus luteolus</i> | الفطريات المسيبة للعفن البني لشمار الفواكه ذات النواة المحجرية <i>Monilia fructicola</i> <i>M. laxa</i> |
| يرقات الفراشتين <i>Argyrolaelia pulchellana</i> Haw. <i>Lobesia botrana</i> العديد من أنواع التملالي أهتمها <i>Crematogaster striatula</i> Emery | الفطر المسبب للعفن الرمادي للعنابي <i>Botrytis cinerea</i> | الغريب | الفطر المسبب لفساد فرون (ثمار) الكاكاو <i>Phytophthora palmivora</i> |

| الحيثرة الناقلة | مسبب المرض الفطري | البيات المصايب | الاكتار |
|--|---|-------------------------------|---------|
| <i>Brachypeplus pilosellus</i> وحننساء النسخ | سوسة لوز القطن | | |
| <i>Anthonomus grandis</i> دودة (كيران الذرة / ممار الطماطم / لوز القطن) <i>zea</i> Boddie | الفطريات المسيبة لتعفن لوز القطن <i>Fusarium moniliforme</i> <i>Alternaria tenuis</i> | | |
| <i>Lygus lineolaris</i> بعي النباتات المكر | | | |
| <i>Lygus hesperinus</i> بعي النتن (البيق كريه الائمة) | الفطر المسبب لتعفن اللوز <i>Aspergillus flavus</i> | | |
| <i>Chlorochhra sayi</i> دخول الفطر إلى داخل لوز القطن يعتمد على إيجاد التي تسبيها بروتينات دودة اللوز الفرعية مكتملة النمو | (منتج سسموم الأفلاوكوكينين) | | |
| <i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders دودة لوز القطن <i>Earias insulana</i> Boisd. | الفطر المسبب لتعفن اللوز <i>Rhizopus stolonifer</i> | الفطر المسبب لتعفن تيلة القطن | |
| <i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders الحلم (من منصات الأرجل) <i>Sitophilus reinfornis</i> | | | |

الحشرات ونقل الأمراض النباتية المسببة عن طريق

| الحيثرة المقابلة | مسبب المرض الفطري | الآفات المصابة |
|---|---|-------------------|
| أذوغ من بق تلوث القطن التابعة للجنس <i>Dysdercus</i> spp. | الفطر المسبب للعفن الداخلي للوزق القطن (<i>Sigmatomycosis</i>) <i>Nematospora gossypii</i> | |
| نوعان من البق النتن <i>Antestia linearicollis</i> Stol. <i>A. faceta</i> Germ. | الفطريات المسببة لتعفن (مار / حبات) البن (الذهبة) <i>Nematospora conyphi</i> <i>N. gossypii</i> | البن (مار / حبات) |
| دودة كيريان الذرة الأوروبية حفار الذرة الأوروبية خففباء التزهفه <i>Glyschrochilus quadrisignatus</i> | الفطريات المسببة لتعفن كيريان الذرة <i>Fusarium</i> spp. <i>Gibberella zae</i> <i>Diplodia maydis</i> والعديد من الفطريات التابعية للأجناس: <i>Cephalosporium</i> , <i>Rhizopus</i> , <i>Negrospora</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Aspergillus</i> | الذرة الشامية |
| بع الأزر النتن <i>Oebalus pugnax</i> (F.) | الفطر المسبب للعفن النباتي سبوري للأزر <i>Nematospora corylii</i> | الأزر |
| العديد من أنواع البق النتن العديد من حشرات التريس (<i>Thrips</i>) وحشرات الـ (Aphids) | فول الصويا، الفاصوليا واللوبيا الفطر الساقية الفطريات المسببة لتعفن (قرون) القنفول <i>Baccharis fahne</i> <i>Cladosporium cladosporoides</i> <i>Pulularia pullulans</i> | الفول |

تابع جدول (١).

| المحشرات الناقلة لسيارات الأمراض النباتية | البيات المصايب | مسبب المرض الفطري | المسار والجوب بعد الحصاد | سادساً: الشمار والجوب بعد الحصاد |
|---|---|---|---------------------------|--|
| <i>Rhagoletis pomonella</i> : ذبابة النفخ ذبابة فاكهة البير الموسط | فراشة التشار (الفاكهة) الشرقية: <i>Grapholita molesta</i> | الفطريات التابعة للأجناس الآتية: <i>Penicillium, Fusarium, Botryotis, Rhizopus, Alternaria, Sclerotinia, Monilia, and Colletotrichum</i> | الفاكهة والخضار في المخزن | فراشة التشار (الفاكهة) الشرقية: <i>Grapholita molesta</i> |
| <i>Ceratitis capitata</i> : الديبية المنزلية | <i>Stiphilus oryzae</i> : سوسنة الأرز <i>Stiphilus granaries</i> : سوسنة المخزن المشابهة <i>Tribolium confusum</i> : خنفساء الدقيق المشابهة فراشة الجوب (فراشة المخزن) | <i>Musca domestica</i> : سوسنة المخزن المشابهة | | |
| <i>Pyrausta nubilalis</i> : خطار ساق الزلة والأوردي <i>Heliothis zea</i> : دودة كبيرة إن الزلة | الفطريات التابعة للأجناس الآتية: <i>Aspergillus, Fusarium, and Penicillium</i> | الجوب والبقول في المخزن | | |

المصدر: باختصار شديد وجدولة من (Argüitos, 2005).

ويتضح مما سبق أن تغذية الحشرات على الجنور في الغالب تُسَهِّل إصابتها بالفطريات وذلك إما بسبب أن الحشرات تُهْبِئ الساحة لدخول الفطريات الممرضة وإما لأن تغذية الحشرات تضعف (تجهد) النباتات المهاجمة وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بتلك الفطريات. وما يمدد ذكره أيضاً أن الدور الأهم والأكبر في نقل وانتشار مسببات الأمراض الفطرية في أماكن تخزين (مخازن) الحبوب والفاكهه يكون للحشرات التي يمكن أن تهاجم تلك المواد وليس للرياح أو للأمطار دور يذكر (مقارنة بما يحدث في العالم).

وأخيراً، فإن مكافحة مسببات الأمراض الفطرية لا تعتمد على مكافحة الفطر المرض فحسب بل أيضاً على مكافحة الحشرات الناقلة، ولذلك فإن التقدم في هذا المجال يعتمد على التعاون المشترك بين علماء الحشرات وعلماء أمراض النبات ولهذا فإن ميل علماء أمراض النبات في التركيز على الكائن (المسبب) المرض يبدو أنه يتساوى مع ميل علماء الحشرات على التركيز على الحشرات (وعزو كل الأضرار إليها) وتجاهل حقيقة أن تلك الحشرات في كثير من الأحيان تتزامن الإصابة بها مع الإصابة بمبسبات الأمراض النباتية.