

## (الفصل الثالث عشر)

### المعادلات التفاضلية العاديّة Ordinary Differential Equations

#### (١٣، ١) تعريف الحدود

##### Definition of Terms

المعادلة التفاضلية العاديّة (اختصاراً تُكتب ODE) هي معادلة تحتوي على مشتقات الدالة الكلية  $y(x)$  (تُسمى مشتقة الدالة أحياناً المؤثر التفاضلي ويرمز له بالرمز  $Dy(x)$ ) ولا تحتوي على مشتقات جزئية كالتى ناقشناها في الفصل العاشر. وتعرف رتبة المعادلة التفاضلية على أنها درجة أعلى مشتقة للدالة  $y$  في تلك المعادلة. على سبيل المثال ، المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى تحتوي على حدود مثل  $\frac{dy}{dx} = y'$  ولكنها لا تحتوي على حدود درجاتها أعلى مثل  $\frac{d^2y}{dx^2} = y''$  أو  $\frac{d^3y}{dx^3} = y'''$ . تقسم المعادلات التفاضلية العاديّة إلى قسمين ، خطية وغير خطية ، فالمعادلة التفاضلية الخطية هي المعادلة التي تكون فيها قوى  $y$  ومشتقاتها تساوي 1 وما عدا ذلك فهي غير خطية. كما تعرف درجة المعادلة التفاضلية على أنها القوة المرفوعة لها أعلى مشتقة ، سنقصر دراستنا هنا على المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى.

## (١٣، ٢) الرتبة الأولى القابلة للفصل

**First Order Separable**

إن أبسط أنواع المعادلات التفاضلية العاديّة هي

$$(13, 1) \quad \frac{dy}{dx} = k$$

حيث  $k$  ثابت ، وهذه معادلة من الرتبة الأولى وخطية من الدرجة الأولى. وكما رأينا في الفصل الرابع فإن هذه المعادلة تمثل دالة ميل منحنىها ثابت. ومن ثم فإن حل هذه المعادلة هو خط مستقيم. ولإيجاد معادلة هذا المستقيم نقوم بتكاملة طرفي المعادلة (١٣، ١) بالنسبة إلى  $x$  لنحصل على

$$(13, 2) \quad y = kx + A$$

والثابت  $A$  هو نتيجة إجراء عملية تكامل واحدة ، وبصورة عامة فإن الحل العام لمعادلة تفاضلية من الرتبة  $n$  يجب أن تحتوي على عدد  $n$  من الثوابت. إنه ليس بالأمر العسير رؤية وجود ثابت واحد فقط في حل معادلة الرتبة الأولى (١٣، ١)؛ لأن هذه المعادلة تؤكد لنا أن لمنحنى الدالة  $y(x)$  ميل ثابت  $k$  ولا تزودنا بمعلومات عن تقاطع الخط المستقيم مع المستقيم  $x = 0$ . ولذا فإن أي ثابت  $A$  سيحقق المعادلة (١٣، ١)، ولإيجاد قيمة هذا الثابت نحتاج إلى شرط حدي (معلومات إضافية). على سبيل المثال، إذا علمنا أن  $y = 0$  عندما يكون  $x = 0$  فنجد أن  $A = 0$ ، وبهذا نحصل على الحل الوحيد للمستقيم ذي الميل الثابت  $k$  وهو المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل.

ومعادلة تفاضلية من الرتبة الأولى أعم من المعادلة السابقة هي

$$(13, 3) \quad \frac{dy}{dx} = X(x)Y(y)$$

حيث  $X$  و  $Y$  دالتان في المتغيرين  $x$  و  $y$  على التوالي. هذه المعادلة قابلة للفصل (بمعنى أننا نستطيع إعادة صياغة المعادلة بحيث يكون أحد طرفيها دالة في  $x$  مضروبة بـ  $dx$  والطرف الثاني دالة في  $y$  مضروبة بـ  $dy$ ). بقسمة طرفي المعادلة (١٣، ٣) على  $y$  ثم المتكاملة نحصل على

$$(13, 4) \quad \int \frac{dy}{Y(y)} = \int X(x) dx$$

ومنها نحصل على حل  $y(x) = \cos x$ . على سبيل المثال ، إذا كان  $X(x) = \cos x$  و  $Y(y) = y$  فنحصل من المعادلة (١٣، ٤) على

$$\ln y = \sin x + A \Rightarrow y = Be^{\sin x}$$

حيث استبدلنا الثابت  $A$  بالثابت  $Be^A$  بأخذ  $e$  للطرفين.

### (١٣، ٣) الرتبة الأولى المتتجانسة

#### First Order Homogeneous

نقول إن الدالة  $f(x, y)$  متتجانسة من الدرجة  $m$  إذا كان

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x, y)$$

حيث  $\lambda$  ثابت. على سبيل المثال ، الدالة  $f(x, y) = x^3 + 3x^2y + 3y^2x + 5y^3$  متتجانسة من الدرجة الثالثة في المتغيرين  $x$  و  $y$ ؛ لأنه إذا ضربنا كل من العددين  $x$  و  $y$  بالعدد 2 فإن الدالة  $f$  تزيد بمعامل  $2^3 = 8$ . لاحظ أن أي دالة متتجانسة  $f$  يمكن كتابتها على الصورة  $f = x^m F(V)$  حيث  $F$  دالة في متغير واحد  $V$  و  $V = \frac{y}{x}$  في حالة

الدالة  $f$  المقدمة أعلاه نجد  $F(V) = 1 + 3V + 3V^2 + 5V^3$ . لذا نأخذ الآن المعادلة التفاضلية العادية

$$(13, 5) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\theta(x, y)}{\varphi(x, y)}$$

حيث  $\theta(x, y)$  و  $\varphi(x, y)$  متجانستان من الدرجة نفسها. وهذا يمكن إعادة كتابتها على النحو

$$(13, 6) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x^m \theta(V)}{x^m \varphi(V)} = \Psi(V)$$

بعد التخلص من الحد  $x^m$  وحيث  $y = Vx$  وباستناد إلى  $y = Vx$  وباستناد قاعدة اشتقاق ضرب دالتين المقدمة في المعادلة (٤٩) نجد أن

$$(13, 7) \quad \frac{dy}{dx} = V + x \frac{dV}{dx} = \psi(V)$$

وبفصل المتغيرات كما في المعادلة (٤) نجد

$$\int \frac{dV}{\psi(V) - V} = \int \frac{dx}{x}$$

ومن ثم نستطيع حل المعادلة لإيجاد  $V$ . وللحصول على الحل  $y(x)$  للمعادلة الأصلية نستخدم التعويض  $y = Vx$  وشرط حدي مناسب.

هناك العديد من الأفكار التي يمكن استخدامها لتحويل معادلة تفاضلية عادية من الرتبة الأولى غير متجانسة إلى معادلة متجانسة. على سبيل المثال ، المعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{x-y}$$

غير متجانسة ولكن بالتعويض ،  $v = y + b$  و  $u = x + a$  (لاحظ أن  $a = b = \frac{1}{2}$ ) و اختيار  $dv = dy$  و  $du = dx$  تأخذ المعادلة التفاضلية الصورة

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{du} = \frac{u+v}{u-v}$$

وهي معادلة تفاضلية متجانسة نحصل على حل لها بالطريقة الموصوفة في بداية البند.

#### (٤) معامل التكامل للرتبة الأولى

##### Integrating Factor of First Order

الصيغة العامة للمعادلة التفاضلية العادية من الرتبة الأولى هي

$$(13,8) \quad \frac{dy}{dx} + yP(x) = Q(x)$$

ولحل هذه المعادلة نضرب طرفي المعادلة بمعامل التكامل  $I(x)$

$$(13,9) \quad I(x) = \exp \left( \int P(x) dx \right)$$

لتحصل على الحل العام للمعادلة (٨١٣) وهو

$$y(x)I(x) = \int I(x)Q(x)dx$$

ولتبرير ذلك ، لاحظ أنه بضرب طرفي المعادلة (٨١٣) بمعامل التكامل  $I(x)$  نحصل على

$$I(x)\frac{dy}{dx} + I(x)y(x)P(x) = I(x)Q(x)$$

ولكن

$$\frac{dI}{dx} = \frac{d}{dx} \exp \left( \int P(x)dx \right) = \exp \left( \int P(x)dx \right) P(x) = I(x)P(x)$$

و بهذه يكون

$$I(x)\frac{dy}{dx} + y(x)\frac{dI}{dx} = I(x)Q(x)$$

وبملاحظة أن الطرف الأيسر لهذه المعادلة هو  $\frac{d}{dx}(I(x)y(x))$  نجد أن

$$\frac{d}{dx}(I(x)y(x)) = I(x)Q(x)$$

$$(٨١٣, ١٠) \quad I(x)y(x) = \int I(x)Q(x)dx$$

هو حل المعادلة (١٣، ٨).<sup>(١)</sup>

كمثال على المعادلة التفاضلية (١٣، ٨) دعنا نقوم بایجاد حل المعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x$$

معامل التكامل هو

$$I(x) = \exp \int P(x) dx = \exp \int \frac{1}{x} dx = \exp (\ln x) = x$$

وبضرب طرفي المعادلة بالمعامل  $I(x)$  نجد أن

$$x \frac{dy}{dx} + y = x^2$$

أي أن

$$\frac{d}{dx}(xy) = x^2$$

ومن ثم فإن

$$xy = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + A$$

(١) المترجم: هذا التبرير ليس ترجمة حرفية للتبرير الذي قدمه المؤلف حيث قمت بتوضيح بعض الخطوات ليسهل على القارئ فهمها.

ونخلص إلى أن الحل العام للمعادلة هو

$$y = \frac{1}{x} \left( \frac{1}{3}x^3 + A \right)$$

### (١٣، ٥) الرتبة الثانية المتتجانسة

#### Second Order Homogeneous

ندرس الآن المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية المتتجانسة (أي أن الطرف الأيمن يساوي صفرًا)

$$(13, 11) \quad \frac{d^2y}{dx^2} + k_1 \frac{dy}{dx} + k_2 y = 0$$

حيث  $k_1$  و  $k_2$  ثابتان. لاحظنا في البند (٤، ٣) أن الدالة الأسية هي الدالة الوحيدة التي تكون مشتقاتها دوالًّاً أسيّة أيضًا. ولذا يكون من المنطقي التخمين بأن حل المعادلة (١٣، ١١) يأخذ الشكل  $y = Ae^{\alpha x}$ . وبتعريض ذلك في المعادلة نجد أن

$$(13, 12) \quad \begin{aligned} Ae^{\alpha x}(\alpha^2 + k_1\alpha + k_2) &= 0 \Rightarrow \alpha^2 + k_1\alpha + k_2 = 0 \\ Ae^{\alpha x}(\alpha^2 + k_1\alpha + k_2) &= 0 \Rightarrow \alpha^2 + k_1\alpha + k_2 = 0 \end{aligned}$$

تُسمى معادلة الدرجة الثانية هذه بالمعادلة المساعدة. وبحل هذه المعادلة نجد قيم  $\alpha$  المناسبة. وكما هو معلوم فإن جذور معادلة الدرجة الثانية ثلاثة حالات

(١) الحالة الأولى هي الحالة التي يكون جذراً المعادلة حقيقيان ومتقابلان. على سبيل المثال

$$(13, 13) \quad \frac{d^2y}{dx^2} - w_0^2 y = 0 \Rightarrow (\alpha + w_0)(\alpha - w_0) = 0 \Rightarrow y = A e^{w_0 x} + B e^{-w_0 x}$$

حيث  $A$  و  $B$  ثابتان. افترضنا لإيجاد هذا الحل مبدأ التراكب والذي ينص على أن الحل العام للالمعادلة التفاضلية العادية الخطية المتتجانسة هو تركيباً خطياً لحلوها الخاصة. لاحظ أيضاً أنه بالامكان الاستعانة بمتطابقة الدوال الزائدية (٧, ٧) لكتابة الحل

العام للالمعادلة (١٣, ١٣) على الصورة

$$y = C \cosh(w_0 x) + D \sinh(w_0 x)$$

$$D = A - B \quad C = A + B$$

لقد وضحنا في البند (١٣, ٢) الحاجة لوجود ثابتين في الحل العام للالمعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. ومع أنه واضح حسرياً أن  $A$  و  $B$  (أو  $C$  و  $D$ ) كانا نتيجة لتكاملين ولكتنا حصلنا عليهما في حالتنا هذه بالصورة العكسية حيث قمنا بتحمين الحل ومن ثم أجرينا عملية استقاق مرتين.

(٢) الحالة الثانية هي التي يكون فيها جذراً المعادلة تخيليين. على سبيل المثال

$$(13, 14) \quad \frac{d^2y}{dx^2} + w_0^2 y = 0 \Rightarrow (\alpha + iw_0)(\alpha - iw_0) = 0 \Rightarrow y = A e^{iw_0 x} + B e^{-iw_0 x}$$

لهذه المعادلة أهمية خاصة في التطبيقات الفيزيائية حيث تصف الازاحة ( $y$ ) للعديد من أنظمة التذبذب كالبندول (هنا  $x$  يمثل الزمن) وتدعى معادلة الحركة

التوافقية البسيطة. وفي حالتنا نستطيع الاستعانة بالتطابقات المثلثية المقدمة في البند (٦,٧) لكتابة الحل العام على الصورة

$$y = C \cos(w_0 x) + D \sin(w_0 x)$$

$$\text{حيث } D = i(A - B) \text{ و } C = A + B$$

إن إضافة عامل تخدامد غير صفرى (أى حد يحتوى على  $\frac{dy}{dx}$ ) للمعادلة يولد حلاً أصعب قليلاً من الحل السابق. على سبيل المثال<sup>(٢)</sup>


$$(13, 15) \quad \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = 0 \Rightarrow y = \left[ C \sin\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) + D \cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right) \right] e^{-x/2}$$

تفسر لنا صيغة الحل السبب وراء تسمية هذا النظام بالخامد لأن ضرب التذبذب بحد أسي يؤدى إلى الصفر عندما يؤدى الزمن  $x$  إلى مالا نهاية ، يعني أن ذبذبة البندول ستخدم مع الزمن.<sup>(٣)</sup>

(٣) الحالة الثالثة هي الحالة التي يكون فيها جذراً معادلة الدرجة الثانية متساويان. فمثلاً

$$(13, 16) \quad \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + y = 0 \Rightarrow (\alpha + 1)^2 = 0 \Rightarrow y = (A + B)x e^{-x} = Ce^{-x}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) \quad (2)$$



حيث نحصل هنا على ثابت واحد فقط  $C = A + B$ . ولذا فإن علينا تخمين الحل (الخاص) الآخر وهو في حالتنا الحل  $y = xe^{-ax}$  حيث نستطيع التأكد من أنه يحقق المعادلة (١٦، ١٣). إذن ، نخلص إلى أن الحل العام للمعادلة في هذه الحالة هو

$$y = (A + Bx)e^{-x}$$

تُسمى هذه الحالة في بعض الأحيان ، حالة الخמוד المخرج. من الممكن تحويل بعض المعادلات التفاضلية العادي الخطية المتتجانسة من الرتبة الثانية بمعاملات غير ثابتة إلى واحدة معاملاتها ثابتة (أي إلى معادلة مماثلة للمعادلة (١٣، ١١)) وذلك بتغيير مناسب للمتغيرات. على سبيل المثال

$$(13, 17) \quad x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

إذا وضعنا  $u = \ln(x)$  واستخدمنا قاعدة السلسلة (٤، ١٢) نحصل على

$$(13, 18) \quad x \frac{dy}{dx} = x \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du}$$

$$(13, 19) \quad x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = x^2 \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{du} \right) = x^2 \frac{du}{dx} \frac{d}{du} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{du} \right) = \left( \frac{d^2y}{du^2} - \frac{dy}{du} \right)$$

حيث  $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}$ . وبتعويض المعادلين (١٨، ١٣) و (١٩، ١٣) في المعادلة (١٧) نحصل على معادلة تفاضلية عادي متتجانسة من الرتبة الثانية بمعاملات ثابتة في المتغيرين  $y$  و  $u$ .

## (٦) الرتبة الثانية غير المتجانسة

## Second Order Inhomogeneous

المعادلة التفاضلية العادي الخطية غير المتجانسة من الرتبة الثانية تأخذ الشكل العام

$$(١٣, ٢٠) \quad \frac{d^2y}{dx^2} = k_1 \frac{dy}{dx} + k_2 y = F(x)$$

حيث  $F(x)$  دالة مناسبة في المتغير  $x$ .

الحل العام لهذه المعادلة يأخذ الشكل  $y(x) = c(x) + p(x)$ . حيث يُسمى  $c(x)$  الحل المتمم وهو الحل العام للمعادلة المتممة المتجانسة التي نحصل عليها من المعادلة (١٣, ٢٠) بوضع  $F(x) = 0$  ويمكن الحصول عليه بطريقة مطابقة تماماً لحل المعادلة (١٣, ١١). أما  $p(x)$  فيدعى حلاً خاصاً للمعادلة (٢٠, ١٣) وهذا الحل يجب أن يحقق المعادلة (٢٠, ١٣). أي إذا عوضناه في الطرف الأيسر للمعادلة فإن الطرف الأيمن لها يساوي تماماً  $F(x)$  بدون إضافة ثوابت.

توجد طريقة بسيطة لإيجاد  $p(x)$  ولكنها تحتوي على معالجات جبرية قد تكون مزعجة في بعض الأحيان والإطار العام لهذه الطريقة يكون على النحو التالي

اعتبر  $p(x)$  كترتيب خطي لجميع أنماط الدوال المكونة من  $F(x)$  ومشتقتها الأولى والثانية وبعد ذلك نحصل على الثوابت بمقارنة الناتج مع المعادلة (٢٠, ١٣).

نوضح ذلك بالمثال التالي

$$(١٣, ٢١) \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \omega_0^2 y = x \sin x$$

كما أسلفنا ، نستخدم طريقة حل المعادلة المتجانسة لنجد أن

$$c(x) = C \cos(\omega_0 x) + D \sin(\omega_0 x)$$

ولإيجاد  $p(x)$  نكتبه كترتيب خطى للدالة  $x \sin x$  ومشتقها الأولى والثانية فنجد

$$p(x) = ax \sin x + bx \cos x + c \sin x + d \cos x$$

بالتعويض في المعادلة (٢٠، ١٣) ومقارنة المعاملات نحصل على أربع معادلات آنية.<sup>(٤)</sup>

بحل هذه المعادلات نجد قيم الثوابت وهي في حالتنا ،  $b = c = 0$  ،  $a = \frac{1}{\omega_0^2 - 1}$  ،  $d =$

فيزيائياً ، تمثل المعادلة (٢٠، ١٣) نظام ذبذبة بتأثير قوة  $F(x)$ . في التطبيقات الواقعية يكون عامل الخمود موجوداً دائماً بحيث تتحامد الدالة المتممة إلى الصفر عندما يتزايد الزمن  $x$ .

يُسمى هذا الجزء من الحل وهو الجزء الوحيد الذي يعتمد على شروط حدية ، الحل الانتقالى. أما الحل الخاص فيُسمى حل الحالة الثابتة. في العادة يمكن إيجاد حل الحالة الثابتة بتجرب حلول تحتوي معاملاتها أعداداً مركبة (ساعات مركبة) مضروبة بالدالة  $\exp(imx)$ .

$$a(\omega_0^2 - 1) = 1 \quad (x \sin x) \quad (4)$$

$$b(\omega_0^2 - 1) = 0 \quad (x \cos x)$$

$$-2b + c(\omega_0^2 + 1) = 0 \quad (\sin x)$$

$$2a + d(\omega_0^2 - 1) = 0 \quad (\cos x)$$

نختم هذا الفصل بمناقشة بعض الصعوبات التي نواجهها لحل المعادلة (١٣، ٢٠).  
لأنّخذ الحالة التي يكون فيها  $k_1 = 0$  ،  $k_2 = 0$  ،  $F(x) = \sin x$ . الحل المتمم هو  
حل المعادلة (١٤، ١٣) حيث  $1 = \omega$  وهو

$$y = C \sin x + D \cos x$$

ولإيجاد الحل الخاص  $p(x)$  فإننا نحاول كتابته كترتيب خططي للدالة  $F(x)$   
ومشتقتها الأولى والثانية. في هذه الحالة يكون  $p(x) = a \sin x + b \cos x$  وهذا  
هو حل المعادلة المتممة ، ولذا بتعويضه في الطرف الأيسر للمعادلة (١٣، ٢٠) نحصل  
على صفر. والسؤال هنا هو كيف نستطيع اختيار حدود بدالة الدالة  $\sin x$  لنحصل  
على الدالة  $F(x)$ ? أحد الاختيارات المناسبة هو  $p(x) = a x \sin x + b x \cos x$ .  
ويعويض  $p(x)$  في المعادلة (١٣، ٢٠) ومقارنة المعاملات نحصل على  $a = 0$  و  $b = -\frac{1}{2}$   
ونخلص إلى أن الحل العام هو

$$y = A \sin x + B \cos x - \frac{1}{2} x \cos x$$

### تمارين

(١) المعادلة  $-\lambda N = \frac{dN}{dt}$  هي قانون تناقص ذرات مشعة عددها  $N$  في مركب  
مع الزمن  $t$ . إذا كان عدد الذرات المشعة في البداية يساوي  $N_0$  فجد صيغة  
لنصف الحياة (أي الزمن اللازم التي يكون عنده عدد الذرات المشعة في المركب  
يساوي  $\frac{1}{2} N_0$ ).

(١٣, ٢) جد الحل العام لكل من المعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الأولى

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - y^2}{x} \quad (١)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y^2 + xy}{x^2} \quad (٢)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y + 5}{x - y + 2} \quad (٣)$$

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = \operatorname{cosec} x \quad (٤)$$

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = x \quad (٥)$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \cos x \quad (٦)$$

(١٣, ٣) معادلة برنولي هي

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = y^\alpha Q(x)$$

حول هذه المعادلة إلى المعادلة (١٣, ٨) باستخدام التعويض

. $\alpha = 2$  ،  $Q(x) = x$  ،  $P(x) = x$  عندما تكون  $y(x)$

(٤) أثبت أنه يمكن كتابة المعادلة (١٣, ٨) على الصورة

$$[Q(x) - P(x)y]dx - dy = 0$$

بضرب طرفي المعادلة بمعامل  $I(x)$  واستخدام شروط المعادلة (١١, ٦) ،

أثبت أن  $I(x)$  هو معامل التكامل المعطى بالمعادلة (١٣, ٩).

(١٣، ٥) جد الحل العام للمعادلة (١٣، ٢٠) في الحالات التالية

$$F(x) = \sin x, \quad k_2 = -3, \quad k_1 = -2 \quad (١)$$

$$F(x) = x^2, \quad k_2 = -8, \quad k_1 = -2 \quad (٢)$$

$$F(x) = \cos(\omega x), \quad k_2 = \omega^2, \quad k_1 = 0 \quad (٣)$$

$$F(x) = \cos(\omega x), \quad k_2 = 1, \quad k_1 = 1 \quad (٤)$$

$$F(x) = \cos(2x), \quad k_2 = 4, \quad k_1 = 0 \quad (٥)$$

جد حل المعادلة (١) باستخدام الشرط الحدي ،  $y(0) = 0$  حيث  $y$  يبقى ممتليئاً عندما  $x \rightarrow \infty$ . ماذا يحصل في الفقرة (٣) عندما يكون  $\omega = 0$  جد حل الحالة الثابتة في الفقرة (٤) بكتابة الطرف الأيسر كمركبة حقيقية لدالة أسيّة مركبة ووضع  $p = \operatorname{Re}\{A \exp(i\omega x)\}$ .

(٦) حل المعادلة

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

باستخدام

(١) الحل التجريبي  $y = Ax^\lambda$

(٢) الطريقة المقدمة في البند (١٣، ٥).