

الجذور البدائية والأدلة

Primitive Roots and Indices

الجميل في الجذر البدائي g قياس عدد أولي p هو ظهور أي عدد غير صافي قياس p على أنه قوة للعدد g . لذلك لأي عدد $a < p$ ، يمكننا اختيار قوة واحدة

فقط من القوى :

$$g, g^2, g^3, g^4, \dots, g^{p-3}, g^{p-2}, g^{p-1}$$

لتكون مكافئة للعدد a قياس p .

" g يسمى الأساس" دليل a قياس p للأساس g

(index of a modulo p for the base g)

لنفرض أننا حددنا g, p ، نرمز للدليل بالرمز $I(a)$

مثلاً ، إذا استخدمنا الجذر البدائي 2 كأساس للعدد الأولي 13 ؛ فإن $I(3) = 4$ ؛ لأن $3^4 = 81 \equiv 16 \pmod{13}$. بالمثل $I(5) = 9$ لأن $5^9 = 1953125 \equiv 1 \pmod{13}$. لإيجاد الدليل لأي عدد معين ، مثلاً 7 ، فإننا نحسب فقط القوى $2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{12}$ حتى نحصل على عدد مطابق للعدد 7.

طريقة أخرى هي عمل جدول لكل قوى 2 قياس 13. عندها يمكننا أن نقرأ أي معلومة نريدها من الجدول.

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^I \pmod{13}$	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1

قوى 2 قياس 13

على سبيل المثال ، لإيجاد $I(11)$ نعمل مسح للصف الثاني من الجدول حتى نجد العدد 11 ، وعندما يمكننا أن نقرأ من الصف الأول للجدول أن الدليل هو $I(11) = 7$.

إن هذا يقترح طريقة أخرى لتنظيم البيانات التي قد تكون أكثر فائدة. ما نفعله هو إعادة ترتيب الأعداد بحيث يصبح الصف الثاني مرتب عددياً من 1 إلى 12 وبعد ذلك نقوم بتبادل الصفين الأول والثاني. الجدول الناتج فيه الأعداد مرتبة من 1 إلى 12 في الصف الأول ، وتحت كل عدد دليله.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$I(a)$	12	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6

الأدلة قياس 13 للأساس 2

الآن من السهل قراءة دليل أي عدد ، مثل $I(8) = 3$ ، $I(10) = 10$ ، فيما مضى ، كان الباحثون في الأعداد يؤلفون جداول الأدلة لتسخدم في

الحسابات العددية^(١). النظرية التالية تسلط الضوء على السبب في كون الأدلة مفيدة عند إجراء العمليات الحسابية.

نظريّة (١) (قوانين الأدلة)

الأدلة تتحقق القوانين التالية:

$$I(ab) \equiv I(a) + I(b) \pmod{p-1} \quad (a) \quad [\text{قانون الضرب}]$$

$$I(a^k) \equiv kI(a) \pmod{p-1} \quad (b) \quad [\text{قانون القوة}]$$

البرهان

هذه القوانين ما هي إلا قوانين الأسس المعروفة ، متلازمة مع حقيقة أن g جذر بدائي. لذلك ؛ إذا أردنا إثبات (a) نحسب :

$$g^{I(ab)} \equiv ab \equiv g^{I(a)} g^{I(b)} \equiv g^{I(a)+I(b)} \pmod{p}$$

هذا يعني أن $g^{I(ab)-I(a)-I(b)} \equiv 1 \pmod{p}$. لكن g جذر بدائي ؛ لذلك $I(ab) - I(a) - I(b) \equiv 0 \pmod{p}$. وبذلك تكون قد برهنا (a). لإثبات (b) ، نجري الحسابات المشابهة التالية :

$$g^{I(a^k)} \equiv a^k \equiv (g^{I(a)})^k \equiv g^{kI(a)} \pmod{p}$$

يقتضي أن $I(a^k) - kI(a) \equiv 0 \pmod{p}$ ، وبذلك تكون قد برهنا (b).

(١) في عام 1839 ، قام "كارل جاكوببي" بنشر "قوانين حسابية" تضم جدول لأدلة كل الأعداد الأولية الأقل من 1000. بعد ذلك ، قام "ويستيرن" و "ميرر" بعمل جدول موسع ضم كل الأعداد الأولية حتى 50021 ، وتم نشره في "رويال سوشيتي" الصادرة عن جامعة كامبريدج وذلك سنة 1968.

إن أحد أكثر الأخطاء الشائعة عند التعامل مع الأدلة هو اختزالهم قياس p بدلاً من قياس $1-p$. من المهم أن نتذكر دائماً أن الأدلة تظهر كأسس ، وأن الأساس في نظرية فيرما الصغرى هو $1-p$ وليس p . مرأة أخرى:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{دائماً تخزل الأدلة قياس} \\ p-1 \end{array}}$$

أريد الآن أن أشرح بشكل مختصر كيف أن قوانين الدليل وجدول الأدلة يمكن استخدامها لتبسيط الحسابات وحل التطابقات ، لتحقيق هذا الهدف ، هنا جدول أدلة العدد الأولي $p=37$ والأساس $g=2$.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I(a)$	36	1	26	2	23	27	32	3	16	24

a	11	12	13	14	15	16	17	18
$I(a)$	30	28	11	33	13	4	7	17

a	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
$I(a)$	35	25	22	31	15	29	10	12	6	34

a	29	30	31	32	33	34	35	36
$I(a)$	21	14	9	5	20	8	19	18

أدلة قياس 37 للأساس 2

إذا أردنا حساب $(23 \cdot 19) \pmod{37}$ فإننا بدلاً من ضرب 23 و 19 يمكننا جمع دليلهما. إذاً

$$\begin{aligned} I(23 \cdot 19) &\equiv I(23) + I(19) \\ &\equiv 15 + 35 \\ &\equiv 50 \\ &\equiv 14 \pmod{36} \end{aligned}$$

لاحظ أن الحسابات أنجزت قياس $1 - p$ ، أي قياس 36 في حالتنا هذه .

بالنظر إلى الجدول ، نجد أن $14 = I(30) \pmod{37}$ ونستنتج أن $23 \cdot 19 \equiv 30 \pmod{37}$.
 "انتظر دقيقة" ، قد تتعرض على ذلك ، "استخدام الأدلة لحساب الضرب $23 \cdot 19 \pmod{37}$ يتطلب الكثير من الجهد". قد يكون من الأسهل ضرب 23 ، 19 ثم قسمة الناتج على 37 ، ومن ثم اخذ الباقي . إن هناك سبباً قوياً لاستخدام الأدلة في حساب القوى. على سبيل المثال :

$$I(29^{14}) \equiv 14 \cdot I(29) \equiv 14 \cdot 21 \equiv 294 \equiv 6 \pmod{36}$$

من الجدول نرى أن $6 = I(27) \pmod{37}$ ، لذلك $29^{14} \equiv 27 \pmod{37}$. هنا الرقم 29^{14} له خانة 21 ؛ لذلك لا نرغب في حساب القيمة المضبوطة للعدد 29^{14} يدوياً وبعد ذلك نخزن قياس 37 . من ناحية أخرى ، نحن نعلم كيف نحسب $(29^{14}) \pmod{37}$ بسرعة باستخدام طريقة التربعات المترابقة (الفصل السادس عشر). إذاً ، هل الأدلة مفيدة فعلاً لأي شيء؟ الجواب هو أن القوة الحقيقية لجدول الأدلة لا يمكن في استخدامه للحسابات المباشرة ، بل في كونه أداة لحل التطابقات. وسوف نعطي مثالين لتوضيح ذلك.

في مثالنا الأول ، ليكن لدينا التطابق $19x \equiv 23 \pmod{37}$

إذا كانت x حلاً ، فان دليل $19x$ يساوي دليل العدد 23 . باستخدام قانون الضرب وأخذ قيم من جدول الأدلة ، يمكننا حساب :

$$I(19x) \equiv I(23)$$

$$I(19) + I(x) \equiv I(23) \pmod{36}$$

$$35 + I(x) \equiv 15 \pmod{36}$$

$$I(x) \equiv -20 \equiv 16 \pmod{36}$$

لذلك ؛ فان دليل الحل هو $I(x) = 16$ ، وبالنظر مرة أخرى للجدول ، نجد أن $x \equiv 9 \pmod{37}$. يجب أن نقارن هذا الحل للتطابق $19x \equiv 23 \pmod{37}$ مع الطرق المروضة في الفصل الثامن . بالطبع ، فإن طريقة الدليل لا تكون مجديّة إلا إذا كان لديك جدول أدلة جاهز ؛ لذلك فإن نظرية التطابق الخطي الواردة في الفصل الثامن تفرض نفسها .

بالنسبة لمثالنا الثاني سوف تقوم بحل مسألة تحتاج إلى كثير من الحسابات الشاقة حتى هذه اللحظة . سوف نبحث عن كل الحلول للتطابق :

$$3x^{30} \equiv 4 \pmod{37}$$

سنبدأ بأخذ الدليل للطرفين ، ونستخدم الضرب وقوانين القوة .

$$I(3x^{30}) = I(4)$$

$$I(3) + 30I(x) \equiv I(4) \pmod{36}$$

$$26 + 30I(x) \equiv 2 \pmod{36}$$

$$30I(x) \equiv -24 \equiv 12 \pmod{36}$$

لذلك سوف نحتاج حل التطابق $I(x) \equiv 12 \pmod{36}$ لإيجاد $I(x)$.
[تحذير: لا تقسم الطرفين على 6 لتحصل على $5I(x) \equiv 2 \pmod{36}$ ، سوف تنفرد بعض الإجابات]. رأينا في الفصل الثامن كيف نخل تطابقاً من هذا النوع. بشكل عام، التطابق $\gcd(a, m) \mid ax \equiv c \pmod{m}$ له حل إذا كان $\gcd(a, m) = \gcd(30, 36) = 6$ والذى يقسم c ، خلاف ذلك لا يكون لها حل. في حالتنا هذه $6 \mid 12$ ، إذًا يجب أن يكون هناك 6 حلول. باستخدام الطرق الواردة في الفصل الثامن ، أو بالمحاولة والخطأ نجد أن :

$$30I(x) \equiv 12 \pmod{36}$$

إذاً

$$I(x) \equiv 4, 10, 16, 22, 28, 34 \pmod{36}$$

أخيراً ، نرجع إلى جدول الأدلة لنحصل على القيم المقابلة للمجهول x .

$$\begin{array}{lll} I(16) = 4, & I(25) = 10, & I(9) = 16, \\ I(21) = 22, & I(12) = 28, & I(28) = 34 \end{array}$$

وعليه ؛ فإن التطابق $3x^{30} \equiv 4 \pmod{37}$ له ستة حلول :

$$x \equiv 16, 25, 9, 21, 12, 28 \pmod{37}$$

إن الإيجابيات الحسابية لاستخدام أدلة يمكن صياغتها بسهولة. قوانين الأدلة تحول الضرب إلى جمع والأسس إلى ضرب.
إن هذه العبارة مألوفة لدينا ؛ لأنها تماماً مثل القوانين المطبقة على اللوغاريتمات :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b),$$

$$\log(a^k) = k \log(a)$$

لهذا السبب، يسمى الدليل أيضاً باللوغاريتم المنفصل. وتماماً كما استخدمت جداول اللوغاريتم في الزمن القديم لإجراء الحسابات، وذلك قبل ظهور الآلات الحاسبة الرخيصة، كذلك استخدمت جداول الأدلة لإجراء الحسابات في نظرية الأعداد.

في هذه الأيام، ومع توفر أجهزة الكمبيوتر، أصبحت جداول الدليل تستخدم بشكل قليل في الحسابات العددية، ولكن الأدلة ما زالت تحفظ بمحاذاتها كأدلة نظرية.

على كل حال، هناك سمة أخرى للوغاريتمات المنفصلة تجعلها مهمة للغاية في الأساليب الحديثة لكتابة الرسائل بالشيفرة. افرض أنك أعطيت عدداً أولياً كبيراً p وعدين a, g ، قياس p . إن مسألة اللوغاريتم المنفصل (Discrete Logarithm Problem) هي مسألة إيجاد الأس k بحيث $g^k \equiv a \pmod{p}$. بمعنى آخر، مسألة اللوغاريتم المنفصل تتطلب منك إيجاد دليل a قياس p للأساس g . كما رأيت في الفصل السادس عشر، من السهل حساب $(g^k) \pmod{p}$ إذا عرفت g, k . على كل حال، إذا كان p عدداً كبيراً، فإنه من الصعب جداً إيجاد قيمة k حتى لو أعطيت قيمة $(g^k) \pmod{p}$. إن هذا الفصل يمكن استخدامه لإنشاء التعميم ذات المفتاح المعلن، نفس فكرة صعوبة تحليل الأعداد التي استخدمت لإنشاء نظام التعميم RSA في الفصل الثامن عشر. سنصف مثل هذا الإنشاء في التمرين 22.6.

تمارين

(٢٢,١) استخدم جداول الأدلة قياس 37 لإيجاد جميع الحلول للتطابقات التالية :

$$(a) \quad 12x \equiv 23 \pmod{37} \qquad (c) \quad x^{12} \equiv 11 \pmod{37}$$

$$(b) \quad 5x^{23} \equiv 18 \pmod{37} \qquad (d) \quad 7x^{20} \equiv 34 \pmod{37}$$

(٢٢,٢) (a) أنشئ جدول أدلة قياس 17 باستخدام الجذر البدائي 3 .

(b) استخدم جدولك لحل التطابق $4x \equiv 11 \pmod{17}$

(c) إستخدم جدولك لإيجاد جميع حلول التطابق $5x^6 \equiv 7 \pmod{17}$

(٢٢,٣) (a) إذا حقق a العلاقة $ab \equiv 1 \pmod{p}$ ، كيف يرتبط الدليلان

$I(b)$ ، $I(a)$ ببعضهما البعض ؟

(b) إذا حقق a العلاقة $a+b \equiv 0 \pmod{p}$ ، كيف يرتبط الدليلان

$I(b)$ ، $I(a)$ ببعضهما البعض ؟

(c) إذا حقق a العلاقة $a+b \equiv 1 \pmod{p}$ ، كيف يرتبط الدليلان

$I(b)$ ، $I(a)$ ببعضهما البعض ؟

(٢٢,٤) (a) إذا كان K يقسم $p-1$. بين أن التطابق $x^k \equiv 1 \pmod{p}$ له

بالضبط K حلًا مختلفاً قياس p .

(b) بشكل عام ، ليكن لدينا التطابق $x^k \equiv a \pmod{p}$. أوجد طريقة سهلة

لاستخدام القيم k ، p والدليل $I(a)$ لتحديد كم عدد حلول هذا التطابق.

(c) العدد 3 هو جذر بدائي قياس العدد الأولي 1987 . كم عدد حلول

التطابق $x^{111} \equiv 729 \pmod{1987}$ ؟ (مساعدة: $729 = 3^6$).

(٢٢.٥) اكتب برنامجاً يأخذ كمدخلات عدد أولي p ، جذر بدائي g للعدد p ، وعدد a ، ويعطي الدليل (a) I كمخرج. استخدم برنامجك لعمل جدول أدلة للعدد الأولي $p = 47$ والجذر البدائي $g = 5$.

(٢٢.٦) في هذا التمرين نصف نظام تعميم ذات مفتاح معلن يسمى نظام التعميم ElGamal ، وهو مبني على صعوبة حل مسألة لوغاريتيم منفصل. ليكن p عدداً أولياً كبيراً ول يكن g جذراً بدائياً قياس p . السؤال هنا هو كيف ستتمكن "الس" Alice من إنشاء مفتاح ومن ثم يرسل لها "بوب" Bob رسالة.

أول خطوة ستقوم بها "الس" هي اختيار عدد k ليكون مفتاحها السري. هي ستحسب العدد $a \equiv g^k \pmod{p}$. ستقوم "الس" بنشر هذا الرقم a ، والذي هو المفتاح العام الذي سيقوم "بوب" (أو أي أحد آخر) باستخدامه لإرسال رسالة لها.

الآن افرض أن "بوباً" يريد إرسال الرسالة m لـ "الس" ، حيث m عدد بين ٢ ، $p - 1$. هو سيختار بشكل عشوائي عدد r ويحسب العددين :

$$e_1 \equiv g^r \pmod{p} , \quad e_2 \equiv ma^r \pmod{p}$$

"بوب" يرسل لـ "الس" زوج الأعداد (e_1, e_2) . أخيراً، تحتاج "الس" لفك الشيفرة.

في البداية سوف تستخدم مفتاحها السري k لحساب $c \equiv e_1^k \pmod{p}$. بعد ذلك ستحسب $u \equiv c^{-1} \pmod{p}$. [أي أنها توجد حل $cu \equiv 1 \pmod{p}$ في u ، باستخدام الطريقة الواردة في الفصل الثامن] ، أخيراً، ستقوم "الس" بحساب $v \equiv ue_2 \pmod{p}$. يمكننا تلخيص حسابات "الس" بالصيغة :

$$v \equiv e_2 \cdot (e_1^k)^{-1} \pmod{p}$$

(a) بين أنه عندما تنهي "ألس" حساباتها فإن العدد v الذي تحسبه يساوي رسالة "بوب" m .

(b) بين أنه إذا قام شخص ما بمعرفة كيف يحل مسألة اللوغاريتم المنفصل للعدد الأولي p والأساس g ؛ فإنه سيستطيع قراءة رسالة "بوب".

(22.7) في هذا التمرين، استخدم نظام التعمية ElGamal الموضح في التمرين 22.6.

(a) يريد "بوب" استخدام مفتاح "ألس" العام $a = 22695$ للعدد الأولي $p = 163841$ والأساس $g = 3$ ليرسل لها الرسالة $m = 39828$. اختار "بوب" الرقم العشوائي ليكون $r = 129381$. احسب الرسالة المشفرة (e_1, e_2) التي أرسلها "بوب" لـ "ألس".

(b) افرض أن "بوب" أرسل نفس الرسالة لـ "ألس"، ولكنه اختار قيمة مختلفة للعدد r . هل ستكون الرسالة المشفرة نفسها؟

(c) اختارت "ألس" المفتاح السري $k = 278374$ للعدد الأولي $p = 380803$ والأساس $g = 2$. استلمت "ألس" الرسالة (تحتوي ثلاثة رسائل منفصلة) :

$$(61745, 206881), \quad (255836, 314674), \quad (108147, 350768)$$

من "بوب". فك شيفرة الرسالة وحولها إلى أحرف باستخدام الرقم مقابل الحرف المبين في الجدول الوارد في الفصل الثامن عشر.