

## الفصل الثاني عشر

### تحليل التباين

#### (١ - ١٤) مقدمة

استخدمنا فيما سبق الإحصائية ص والإحصائية تي في فحص مدى وجود فرق بين متواسطي عينتين. كما أشرنا في الفصل الثاني عشر إلى الاختبارات غير المعلمية لفحص الفرق بين مجموعتين في حالة عدم امكانية معرفة التوزيع الذي تتبعه البيانات ولو بصورة تقريبية. والجدير بالذكر أن مثل هذه الاختبارات يمكن استخدامها في حالة وجود أكثر من مجموعتين على حدة، ومقارنتهما معًا. ولكن من الملاحظ أننا نحتاج إلى إجراء الفحص ٣ مرات مثلاً عندما نود فحص وجود فرق بين متواسطات ثلاثة مجموعات من البيانات مثلاً أي  $\bar{q}$ ، وعند فحص مدى اختلاف المتواسطات في مجموعة نحتاج إلى  $\bar{q}$  مرة.

من الملاحظ أنه بالإضافة إلى أن هذه الطريقة متعدة وعملة فإنها أكثر عرضة للخطأ الحسابي لكثره المقادير المراد حسابها فيها. في الواقع إن اختبار كروسكال واليس يعتبر تعديلاً مثل هذه الفحوصات عند عدم معرفة التوزيع الاحتمالي الذي يحكم البيانات المدروسة، ولكنه تقريريأسوة بجميع الاختبارات غير المعلمية ولا نلتجأ إليه عادة إلا عند صغر العينة أو عدم إمكانية التعرف على توزيعها.

و قبل أن نستعرض البديل الأدق والأسرع لمقارنة متواسطات عدة مجموعات وفحص ما إذا كان يوجد فروق معنوية أم لا . نورد بعض الأمثلة التي تبين مدى الحاجة له .

نحتاج أحياناً إلى معرفة مستويات مجموعات مختلفة من الطلاب مثلاً كخريجي عدد من الثانويات أو الذين درسوا عبر برامج تعليمية مختلفة، وذلك بإجراء امتحان موضوع أو أكثر ومقارنة الدرجات لهذه المجموعات. تتركز معظم الأبحاث الزراعية على المقارنة بين تأثير أسمدة على نمو محصول أو نبات ما أو تأثير أنظمة معينة للتغذية على حيوان ما، فمثلاً لو أراد باحث أن يدرس تأثير الأسمدة أ، ب، جـ على محصول القمح فلا بد أن يزرع نوعية القمح المطلوبة تحت نفس الظروف، ويعالج عدداً من أجزاء أو مساحات متساوية من الأرض المزروعة بالسياد أ، ب، جـ كل على حدة ومن ثم نرصد مقادير المحاصيل الناتجة تحت تأثير هذه الأسمدة لدراستها واختبار مدى وجود فروق فيها بينها.

كما قد يكون الموضوع المراد دراسته هو معرفة مدى وجود فرق في الواردات أو الصادرات الشهرية للمملكة على مدى ٣ سنوات أو أكثر أو مقارنة الواردات، أو الصادرات، أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى الشهرية من عدة دول.. الخ.

دراسات هذه المقارنة بين متوسطات عدد من المجموعات تظهر في مجالات متعددة من الحياة العملية ففي الطب قد يراد معرفة الفروق بين تأثيرات عقارات معينة على الشفاء من مرض ما، أو تأثير عقار ما على مجموعات مختلفة من البشر مثلاً، في السن، أو الوزن، أو فصيلة الدم، أو عدد كريات الدم الحمراء، أو البيضاء في المليметр المكعب.. الخ. كما تظهر هذه الدراسات في الصناعة والهندسة والإدارة والتجارب البحثية في مختلف العلوم كالفيزياء والكيمياء والأحياء.. الخ.

ويعتبر مفهوم تحليل التباين من أنجح الأساليب الإحصائية في المقارنة بين متوسطات مجموعات ومن أدقها وأقلها تكاليفاً من الناحية الحسابية كما توجد حزم من برامج الحاسوب الآلي لإنجاز حسابات تحليل التباين، مثل حزم ساس وإس بي إس وبي إم دي بي. سنجاول في هذا الفصل استعراض (وبصورة مبسطة) كيفية إجراء تحليل التباين مع التركيز على توضيح الأسس الداخلية في تبرير خطوات هذا الأسلوب.

وتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر في هذا الفصل على تحليل التباين باتجاه واحد، أي فحص جموعات القراءات من متغير مستقل وحيد، أي دراسة إمكانية وجود تأثير على التغيير من استخدام علاجات، أو معاملته بطرق مختلفة، وستتضاعف الصورة لمثل هذا التحليل من الأمثلة التي سنقدمها فيما بعد.

#### (١٤ - ٢) فرضيات تحليل التباين

يمكن التعبير عن تحليل التباين على أنه نموذج خطى على الصيغة

$$س = م + ع + خ$$

أو

$$س - م = ع + خ$$

أي أنه في أي تجربة فإن القراءة المشاهدة س تختلف عن وسط المجتمع تو بمقدارين الأول ع ناتج من تأثير المعالجة التي تعرضت لها الوحدة التي قرأتها س، والثاني هو التغيير الطبيعي أو الخطأ خ، ولو كانت المعالجة عديمة التأثير أي أن ع = صفرًا فإن الفرق الناتج بين مختلف القراءات هو عبارة عن الخطأ العشوائي الذي سببه الفحص الإحصائي، وأنه فرق سطحي وليس معنويًا.

والفرضيات التي لا يمكن تطبيق أسلوب تحليل التباين أو الاعتماد عليه إلا بتوفرها هي :

- ١) يجب أن يكون الخطأ المتوقع عشوائياً في كل المجموعات المعالجة أي أن تكون معالجة المجموعات محل الدراسة باتجاه واحد، وتحت الظروف نفسها تقريرياً.
- ب) يجب ألا يكون الاختلاف في قيم بيانات المجموعات كبيراً جداً بحيث يعزى إلى أكثر من كون ذلك صدفة فقط. أي تكون بيانات المجموعات متجانسة أو متقاببة وفي حالة ظهور تباين إحدى المجموعات بقيمة مختلفة وبصورة متميزة عن تباينات المجموعات الأخرى، فلا بد من إعادة النظر في تصميم التجربة، أو الظروف التي أجريت فيها.

ج) يجب أن يتبع التغير المراد دراسته عن طريق تحليل التباين التوزيع الطبيعي، وذلك لأن تحليل التباين من الاختبارات المعلمية التي ترتبط بطبيعة توزيع المجتمع المراد دراسته، وتجدر الإشارة إلى إمكانية تطبيق تحليل التباين في حالة الإنحراف البسيط للبيانات عن التوزيع الطبيعي.

و سنستعرض في هذا الفصل تحليل التباين لبيانات تتفق مع الفرضيات الأساسية للتحليل. على أنه يمكن استخدام بعض التحويلات مثلأخذ لوغاريثم البيانات الناتجة لجعلها تقترب من الفرضيات السابقة ومن ثم إجراء تحليل التباين بالصورة المعادة.

#### (١٤ - ٣) استخدام تحليل التباين

أراد أحد الباحثين في قسم الإنتاج الحيواني معرفة تأثير ثلاث نوعيات من أنظمة التغذية أ، ب، ج على أحد أنواع البقر. اختار لذلك ١٨ بقرة تعيش في نفس الحظيرة، وتحت نفس الظروف وأعطي كل ست اختيرت عشوائياً منها الرموز أ أو ب أو ج على التوالي. وبعد فترة زمنية كافية وجد أن الزيادة في الوزن مقربة لأقرب كيلوجرام هي كما في الجدول التالي:

الزيادة في أوزان الأبقار للأغذية الثلاثة

ج	ب	أ
١٤	٩	١٦
١٩	١٣	١٧
١٣	١٢	١١
١١	١١	١٥
١٣	١٥	١٨
١٤	١٢	١٩

في هذه الحالة يكون عدد المجموعات  $L = 3$  وعدد القراءات في كل مجموعة هي  $n_1, n_2, n_3$  حيث إن كلاً منها تساوي ٦ (في هذه التجربة) كما أن  $n_1 + n_2 + n_3 = 18$ ، ونوجد لكل مجموعة متوسطها وتبينها كما يلي:

$$\bar{s}_1 = \frac{s_{11} + s_{12} + s_{13}}{n_1}$$

$$\bar{s}_2 = \frac{19 + 18 + 15 + 11 + 17 + 16}{6}$$

$$\bar{s}_3 = 16$$

$$\sigma^2(s_1) = \frac{\text{مجم}(s_1 - \bar{s}_1)^2}{n_1}$$

$$\sigma^2(s_1) = \frac{(16 - 19)^2 + (16 - 17)^2 + (16 - 16)^2 + (16 - 15)^2 + (16 - 11)^2 + (16 - 18)^2}{6}$$

$$\sigma^2(s_1) = 8,004$$

وبالمثل نجد أن:

$$\bar{s}_2 = 14, \quad \sigma^2(s_2) = 3,996$$

أما المتوسط الكلي للقراءات الناتج من جمع جميع القراءات في المجموعات الثلاث ومن ثم تقسيمها على  $N$  فيكون:

$$\bar{s} = \frac{\bar{s}_1 + \bar{s}_2 + \bar{s}_3}{3}$$

أي أنه في هذه الحالة يكون:

$$\bar{s} = \frac{\bar{s}_1 + \bar{s}_2 + \bar{s}_3}{3}$$

وذلك لأن عدد المفردات في كل المجموعات متساوي.

$$\therefore \bar{s} = \frac{14 + 12 + 16}{3} = 14$$

أما التباين الكلي فهو أن نجد متوسط تباعد جميع القراءات في كل المجموعات الثلاث عن الوسط الكلي أي أن:

$$\sigma^2 = \frac{\sigma^2_{(S_1)} + \sigma^2_{(S_2)} + \sigma^2_{(S_3)}}{3}$$

$$\frac{7,2 + 3,996 + 8,004}{3} = \sigma^2 \therefore$$

$$6,4 =$$

أما مجموع مربع انحرافات الأوساط عن الوسط الكلي فتحسب كالتالي:

$$M_m = \sum (S_i - \bar{s})^2$$

$$= (16 - 14)^2 + (12 - 14)^2 + (14 - 14)^2$$

$$= 8$$

وبذلك نجد أن تباين  $\bar{s}$  هو مجموع مربعات الانحراف السابق على عدد المجموعات لمطروحاً منه واحد بغرض الحصول على التباين غير المتجيز أي أن:

$$\therefore M_m = \frac{8}{3}$$

$$\therefore \sigma^2_{(\bar{s})} = \frac{8}{3}$$

ويعطي التغيير الماصل بين أوساط المجموعات تقديرًا لتباين المجتمع. فمعلوم أننا نستطيع نظريًا سحب عشرات أو مئات المجموعات، كل مجموعة تتكون من ست قراءات حيث إن  $n = 6$  ومن ذلك نوجد توزيع العينة لأوساط المجموعات، حيث إننا نحسب تباين توزيع الأوساط من تباين المجتمع من العلاقة على الصورة:

$$\sigma^2_{(\bar{s})} = \frac{\sigma^2}{n}$$

أي أن :

$$\sigma^2 = n^2 \sigma^2 (\bar{x})$$

$$= 6 \times$$

$$= 24$$

وهذا تقدير آخر لتباین المجتمع من التقديرات الحاصلة بين المجموعات ومن الملاحظ أنه مختلف في قيمته عن التباين داخل المجموعات الذي كانت قيمته ٦,٤ . ومن الملاحظات الأساسية في هذه الحالة هو أن تقدير التباين بين المجموعات يعتمد على ثلات قراءات فقط ، بينما يعتمد التباين داخل المجموعات على ١٨ قراءة ، وهي مجموع قراءات المجموعات الثلاث .

و قبل أن نجري اختبار تحليل التباين بصورة نهائية نشير إلى قاعدة مهمة يعتمد عليها هذا التحليل ، وهي :

«أي تغير ناتج بين أوساط المجموعات يتكون من تقدير تباين المجتمع بالإضافة إلى كمية ناتجة بسبب الاختلافات الناتجة بتأثير المعالجات المستخدمة» .

ولاختبار ما إذا كان تقدير تباين المجتمع عن طريق تباين متوسطات المجموعات هو التقدير الوحيد لتباین المجتمع ، أو يحتوي على كمية إضافية لاختلاف قيم أوساط المجموعات ، نستخدم توزيع ف حيث تكون قيمة ف المحسوبة (ف) هي :

$$F = \frac{24}{3,75} = \frac{24}{6,4}$$

وتقىل قيمة ف المحسوبة كلما قلت قيمة تقدير تباين المجتمع الناتجة عن الفروق بين أوساط المجموعات والعكس بالعكس أي أن ف تعكس التغير بين قيم المجموعات أو بين المعالجات المستخدمة في كل مجموعة .

أما حساب ف من الجدول رقم (٥) والملاحق في نهاية الكتاب تجت عن قيمة  $F$  تحت  $0,05$  أو  $0,01$  ، ففي التقاء العمود الثاني مع الصف  $15$  نجد أن قيمة  $F$  هي  $3,68$  ، ومتناظر  $5,00$  أو  $F_{(15,2)} = 6,76$  ومتناظر  $1,00$  .

ونتيجة التحليل هي أنه تحت مستوى معنوي  $1\%$  فإن الاختلاف بين أوساط المجموعات ليس معنواً أو أنه ليس كبيراً للدرجة أنه لا يمكن استخدامه في تقدير تباين المجتمع لأن قيمة  $F$  المحسوبة  $3,75$  أقل من قيمة  $F$  المجدولة في جدول رقم (٥) تحت مستوى  $1\%$  وهي  $6,36$  . وبعبارة أخرى لا يوجد فرق بين المجموعات أو المعالجات الثلاث السابقة تحت مستوى  $1\%$  .

بينما نلاحظ أنه - تحت مستوى  $0,05$  - يوجد فرق معنوي لأن قيمة  $F$  المحسوبة تساوي  $3,75$  ، بينما قيمة  $F$   $= 3,68$  ، وبالتالي هناك فرق بين المعالجات أو المجموعات الثلاث السابقة تحت مستوى معنوية  $0,05$  .

والآن نلخص الحسابات السابقة في جدول يسمى جدول تحليل التباين كما يلي :

**جدول تحليل التباين**

المصدر	الد.ج.	نو (م)	أختبار F
الفرق بين المجموعات	$(L-1)$	$M_{\text{ب}} = \frac{1}{n} \sum M_i^2$	$\frac{1}{n}$
الفرق داخل المجموعات	$(n-L)$	$(n-1) + (n-1) + \dots + (n-1)$	$M_{\text{م}} = \frac{n}{n-L} \sum M_i$
المجموع	$n-1$		$M_{\text{ك}} = \frac{1}{n} \sum M_i$

حيث إن  $M_{\text{ب}}$  هي مجموع مربعات الانحرافات بين المجموعات .  
 $M_{\text{م}}$  مجموع مربعات الانحرافات داخل المجموعات .  
 $M_{\text{ك}}$  مجموع مربعات الانحرافات الكلية .

د.ح. درجات الحرارة.

للم) متوسط مجموع مربعات الانحرافات.

ففي مثالنا السابق في مسألة تغذية الأبقار يكون:

$$- \frac{\frac{(\text{مجس ج.})}{n}}{\frac{(\text{مجس ا.} + \text{مجس ب.} + \text{مجس ج.})}{n}} = \frac{(\text{مجس ا.})}{n}$$

$$\text{حيث إن } n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

اما درجات الحرية بالنسبة لمجموع المربعات بين المجموعات فهي  $L - 1$  ، ودرجات الحرية بالنسبة لمجموع المربعات داخل المجموعات  $[n - 1] + [n - 1] + \dots + [n - 1]$ .

ويتطبق ذلك المثال السابق تحسب أول المقادير التالية :

ج	د	ب	ب	هـ	أ
١٩٦	١٤	٨١	٩	٢٠٦	١٦
٣٦١	١٩	١٧٩	١٣	٢٨٩	١٧
١٧٩	١٣	١٤٤	١٢	١٢١	١١
١٢١	١١	١٢١	١١	٢٢٥	١٥
١٧٩	١٣	٢٢٥	١٥	٣٢٤	١٨
١٩٦	١٤	١٤٤	١٢	٣٦١	١٩
١٢١٢	٨٤	٨٨٤	٧٢	١٥٧٦	٩٧
					المجموع

ومن ذلك نجد أن:

$$\frac{^r(84+72+96)}{18} - \frac{^r(84)}{6} + \frac{^r(72)}{6} + \frac{^r(96)}{6} = 22$$

$$3528 - 3576 =$$

$$48 =$$

$$\frac{^r(84+72+96)}{18} - (1212 + 884 + 1576) = 22$$

$$3528 - 3672 =$$

$$144 =$$

ومنه نجد أن:

$$22 = 22 - 22$$

$$48 - 144 =$$

$$96 =$$

ويكون جدول تحليل التباين هو:

المصدر	م²	د.ح.	تو (م)	قيمة ف
الفرق بين المجموعات	48	٢ = ١ - ٣	٢٤	٣,٧٥
الفرق داخل المجموعات	٩٦	١٥ = (١ - ٦) + (١ - ٦) + (١ - ٦)	٦,٤	٦,٣٦

ونجد قيمة ف سوأ في مستوى ٠١ ، أو ٠٥ ، أو ٠٠٥ وبدرجات حرية (٢ ، ١٥) وهي ٣,٦٨ أو ٦,٣٦ وبالتالي فإننا نجد أن قيمة ف المحسوبة غير معنوية عند مستوى ٠١ ، ومعنوية عند مستوى ٠٠٥ لأن ف المحسوبة = ٣,٧٥ . ويشار أحياناً في بعض جداول تحليل البيانات للفرق بين المجموعات بالمعالجة ، والفرق داخل المجموعات بالخطأ ، ويضاف كذلك المجموع ، وسنوضح هذه الصيغة في البند التالي.

## (٤ - ١٤) تحليل تصميم تام العشوائية

ما زلنا في طور تحليل التباين وفي اتجاه واحد وذلك لدراسة الاختلاف في أوساط قراءات متغير ما تعرض لتأثير خارجي ، أراد أحد الباحثين اختبار تأثير حضور المدرس دورة في الرياضيات المعاصرة واستيعاب الطالب لمقرر الرياضيات ، فجرى اختيار عينة مكونة من ١٦ طالباً من المستوى الدراسي نفسه وهم مستوى الذكاء نفسه تقريباً ، وأخذت عينة لها المؤهلات نفسها من المدرسين بعضهم حضر دورة ، وجرى توزيع هؤلاء الطلاب على فصول المدرسين ، وكانت نتائجهم في نهاية البرنامج المعد كالتالي:

جدول (٤ - ٢) درجات الطلاب حسب دورة الرياضيات للمدرس

بدون دورة (س،)	دورة قصيرة (س،)	دورة متوسطة (س،)	دورة طويلة (س،)
٥٥	٦٥	٨٠	٨٥
٦٠	٦٥	٨٠	١٠٠
٥٥	٧٠	٧٥	٩٥
٥٠	٦٠	٨٥	٩٥

ومن ذلك نحسب المقادير كما في الجدول الآتي :

س،	س،	س،	س،	س،	س،	س،	س،	س،
٧٢٢٥	٨٥	٦٤٠٠	٨٠	٤٢٢٥	٦٥	٣٠٢٥	٥٥	
١٠٠٠٠	١٠٠	٦٤٠٠	٨٠	٤٢٢٥	٦٥	٣٦٠٠	٦٠	
٩٠٢٥	٩٥	٥٦٢٥	٧٥	٤٩٠٠	٧٠	٣٠٢٥	٥٥	
٩٠٢٥	٩٥	٧٢٢٥	٨٥	٣٦٠٠	٦٠	٢٥٠٠	٥٠	
<b>٣٥٢٧٥</b>	<b>٣٧٥</b>	<b>٢٥٦٥٠</b>	<b>٣٢٠</b>	<b>١٦٩٥٠</b>	<b>٢٦٠</b>	<b>١٢١٥٠</b>	<b>٢٢٠</b>	<b>المجموع</b>

$$\bar{M}_k = \frac{\sum_{i=1}^n (M_i - \bar{M})^2}{n}$$

$$\bar{M}_k = \frac{(35275 + 25650 + 16950 + 12150) - (375 + 320 + 260 + 220)}{16}$$

$$86289,062 - 90020 =$$

$$3735,938 =$$

$$\bar{M}_b = \frac{\sum_{i=1}^n (M_i - \bar{M})^2}{n}$$

$$86289,062 - \frac{(375)}{4} + \frac{(320)}{4} + \frac{(260)}{4} + \frac{(220)}{4} =$$

$$86289,062 - 89756,250 =$$

$$3467,188 =$$

وبالتالي نجد أن

$$\bar{M}_d = \bar{M}_k - \bar{M}_b$$

$$3467,188 - 3735,938 =$$

$$268,750 =$$

ويكون جدول تحليل التباين على الصورة

المصدر	النوع	د.ج.	٢٢	ف
المعالجات	١١٥٥,٧٢٩	٣	٣٤٦٧,١٨٨	٥١,٦
الخطأ	٢٢,٣٩٥٨	١٢	٢٦٨,٧٥	
المجموع الكلي	-	١٥	٣٧٣٥,٩٣٨	

وي باستخدام جدول ف نجد أنه تحت مستوى ٥٪ و ١٪ هي على التوالي:

$$F_{(12,3)} = 3,88 \quad , \quad F_{(12,3)} = 6,93$$

أي أنه توجد فروق معنوية بين درجات الطلاب الذين قام بتدريسيهم مدرسوون بمدد مختلفة من الدورات في الرياضيات ونستنتج من ذلك أن دورات الرياضيات المعاصرة ذات تأثير إيجابي على استيعاب الطلاب للمقرر.

نلاحظ أنه يمكن تطبيق أسلوب تحليل التباين حتى في حالة وجود مجموعة ليست متساوية القراءات، والفرق الوحيد يكمن في حساب  $M_B$  ، وكذلك في درجات الحرية، وسنورد بعضًا من هذه الحالات في التمارين. علماً أنه من المستحسن تقليل عدد المتغيرات ما أمكن ذلك وبالتالي يجب أن تكون أعداد القراءات في كل المجموعات متقاربة إلا في حالة الضرورة كأن تكون طبيعة التجربة لا تمكننا من ذلك.

#### (١٤ - ٥) تمارين

١ - وجد أن عدد الأطفال في الأسرة السعودية في ثلاثة عينات كل منها يتكون من ٥ أسر من ثلاثة مناطق في مدينة الرياض هي كما يلي :

**أعداد الأطفال في خمس أسر في ثلاثة مناطق مختلفة**

المنطقة ج عدد الأطفال	المنطقة ب عدد الأطفال	المنطقة أ عدد الأطفال
٥	٦	٤
٢	٨	٠
١	١٢	٨
٠	٨	٥
٣	٥	٢

استخدم تحليل التباين واختبار F لمعرفة ما إذا كان يوجد فرق بين متوسط عدد الأطفال في المناطق الثلاث.

- ٢ - أعطي أحد الباحثين قراءات ثلاث عينات من ثلاثة مواقع لكمية النيتروجين مقاسة بالميللجرام في ١٠٠ جرام والمطلوب فحص ما إذا كان يوجد اختلاف معنوي في كميات النيتروجين في هذه المواقع الثلاثة.
- كميات النيتروجين لثلاث عينات في ثلاث مناطق مختلفة

موقع ج	موقع ب	موقع أ
٢٤٠	٢٥٠	٢٦٠
١٨٠	١٩٠	١٩٨
١٩٥	٢٠٥	٢١١
١٩٠	٢٥٠	٢٢٦
٢٠٠	٣١٠	٣٢٠
-	٢٣٠	٢٥٠

- ٣ - لاختبار فاعلية أربعة أنواع من السماد على محصول القمح أخذت عشرون قطعة من الأرض متجانسة تماماً واستعمل لكل منها نوع من الأسمدة أ، ب، ج، د وكانت النتائج كالتالي:

إنتاج القمح باستخدام أربع أنواع مختلفة من السماد

د	ج	ب	أ
٤١٧	٣٧٥	٤٢٥	٣٩٠
٤٠٨	٣٦٠	٤٠٥	٣٥٠
٣٩٠	٤٣٥	٣٧٠	٤١٠
٤٠٥	٣١٥	٤٢٥	٣٦٨
٤٢٠	-	٤٠٣	٤٠٤
٤٥٦	-	٤٠٥	-

- والمطلوب اختبار فاعلية الأسمدة الأربع عند مستوى معنوية .٠٠،٠٥
- ٤ - يوجد أربع آلات في مصنع يعمل على كل آلة عامل مدرب بطريقة معينة. أخذت عينات من الآلات الأربع أ، ب، ج، د، وكانت النتائج كالتالي:

## إنتاج أربع عمال مدرسين بطريق مختلفة

أ	ب	ج	د
١٠٥	١٠٧	١١٢	١١٣
١٠٧	١١٠	١١١	١١١
١١٢	١٠٧	١١٢	١١٠
١١١	١٠٦	١١٠	١٠٩

والمطلوب عند مستوى معنوي  $0,05$  اختبر ما إذا كان إنتاج الآلات الأربع متجانساً (أي له نفس التوزيع).

٥ - استخدمت أربع أنواع من الحمية (نظام التغذية لمجموعة الأطفال) يعني كل منهم من مرض نفسي ما وكانت الزيادة في أوزانهم بالكيلوجرام هي كمالي:

الحمية الأولى:	٣,٢	٢	٤,٢	٣,٥
الحمية الثانية:	٢,٣	٢,٧	٢,٩	٢,٩
الحمية الثالثة:	٦,٣	٣,٩	٥,٧	٤,٥
الحمية الرابعة:	٤,٥	٣	٣,٤	٤

استخدم تحليل التباين لفحص الفرق بين أنواع الحمية على أوزان الأطفال.

٦ - أخذت عينات من السيارات غير متساوية الحجم أصحابها يسكنون في ثلاثة أحياe مختلفة، وكان سعر سيارة كل منهم بآلاف الريالات وحسب سعر السوق الحالية هي كمالي:

## أسعار السيارات لعينة من سكان ثلاثة أحياe مختلفة

أسعار سيارات ساكني الحي الأول	٩	١٣	١٩	٢٥	٣٦
أسعار سيارات ساكني الحي الثاني	١٠	٢١	٢٩	٤٠	
أسعار سيارات ساكني الحي الثالث	١٢	١٦	١٢	١٧	٢٠

يبين ما إذا كان يوجد اختلاف في متوسط أسعار السيارات في الأحياء الثلاثة باستخدام تحليل التباين.

٧ - أعد أحد الباحثين التربويين ثلاث نسخ من إجابة أحد الامتحانات النهائية لعشرة طلاب في مادة ما في المستوى الأول في جامعة الملك سعود وأعطيت لثلاثة مدرسين للمقرر لتصحيحها فكانت النتائج كالتالي:

درجات تصحيح ثلاثة مدرسين لستة أوراق إجابة

٣ ٩ ٨ ٦ ٥ ٤ ٣ ٧ ٩	المدرس الأول
٥ ٨ ٨ ٦ ٧ ٩ ٧ ٨ ٥	المدرس الثاني
٥ ٣ ٤ ٥ ٦ ٨ ٧ ٣ ٧	المدرس الثالث

يبين ما إذا كان يوجد اختلاف معنوي في التصحيح للمدرسين الثلاثة.

٨ - البيانات التالية تعطي النقاط التي حصل عليها مجموعة من الجنود في التهديف لإصابة هدف باستخدام نفس البنادقية، ونفس العدد من الطلقات، وباستخدام ثلاث طرق للتهديف وهي عندما تكون العينان مفتوحتان، أو العين اليسرى فقط مفتوحة، وأخيراً عندما تكون العين اليمنى فقط مفتوحة، وكانت النتائج كما يلي:

نقاط التهديف باستخدام ثلاث طرق مختلفة

٥٥ ٦٢ ٤٦ ٤٥ ٥٢ ٦٤ ٥٢	استخدام العينين معاً
٣٨ ٤٩ ٥٦ ٤٥ ٤٠	استخدام العين اليسرى فقط
٦٠ ٤٥ ٥٣ ٥٢ ٤٩ ٤٧	استخدام العين اليمنى فقط

يبين ما إذا كان يوجد اختلاف معنوي في استخدام الثلاث طرق السابقة.

## ثبوت الرموز والمصطلحات

$\sigma^2$	بيان	المنوال	م
$\Sigma$	تبالين العينة	معامل الارتباط الخططي	مب
تق.	تقدير سنة الأساس	(بيرسون)	
تق.	تقدير سنة (ن)		
مل	توقع	معامل التوافق	مت
مل (م)	متوسط مجموع مربعات الانحرافات	التكرارات المتوقعة	مش
ح (٠)	احتمال حادثة	المئين رقم ر	مر
د.ح.	درجات الحرية	معامل ارتباط الرتب	مس
		(سبيرمان)	
د.	الربع الأدنى (أو الأول)	معامل اقتران يل	مش
د.	الربع الأعلى (أو الثالث)	التكرارات المشاهدة	
ر	نصف المدى الربيعي	مجموع مربعات انحرافات	م
س	المتوسط	الأوساط عن الوسط الكلي (أو	
ص	القيمة المعيارية للمقدار س	(العام)	
فر.	الفرضية الأولية	مجموع مربعات الانحرافات	مب
فر.	الفرضية البديلة	بين المجموعات	
ك	تكرار الفئة تحت الدراسة	مجموع مربعات الانحرافات	مم
كا	مربع كاي	داخل المجموعات	

$M_{\bar{x}}$	متوسط مربعات انحرافات
$M_i$	الأوساط عن الوسط العام
$M_d$	مجموع مربعات الانحرافات
$\sigma$	الكلي

## المراجع

### أولاً: المراجع العربية

- أبو صالح، محمد صبحي، وعوض، عدنان محمد (١٩٨٣). مقدمة في الإحصاء.  
نيويورك: دار وايل للنشر.
- الصياد، جلال وسمرة، عادل (١٩٧٦). مبادئ الإحصاء لطلاب الدراسات  
الأدبية. الطبعة الأولى. جدة: جامعة الملك عبدالعزيز.
- بنخلف، مصطفى (١٩٧٥). الاحتمالات والإحصاء الرياضي. المغرب، الدار  
البيضاء: دار الشر المغربي.
- بيوسشتز، سيمور (١٩٧٤). الاحتمالات. ماجروهيل للنشر؛ ترجمة سامح داود  
ومراجعة عبد العظيم أنيس، الرياض: دار المريخ.
- زيyd، مصطفى (١٩٨٤). الإحصاء ووصف البيانات. الرياض: دار العلوم للطباعة  
والنشر.
- سرحان، أحمد عباده (١٩٦٥). طرق التحليل الإحصائي. القاهرة: دار المعارف.
- عاشر، سمير كامل (١٩٧٧). مبادئ الإحصاء الوصفي والتحليلي. القاهرة:  
معهد الإحصاء، جامعة القاهرة.
- عبد الرحمن، جوهرة فهد محمد (١٤٠٠). العدد ودلاته، دراسة لغوية نحوية قرآنية.  
بحث مقدم كجزء من متطلبات الماجستير في علوم اللغة العربية، الرياض:  
كلية التربية للبنات.

- كنجو، أنيس (١٩٨٠). الإحصاء وطريق تطبيقه في طرق البحث العلمي. الجزء الثاني. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- مصطفى، مدنى دسوقي (١٩٧٥). مبادئ في علم الإحصاء. القاهرة: دار النهضة العربية.
- مصطفى، مدنى دسوقي (١٩٧٩). مبادئ في نظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضى. القاهرة: دار النهضة العربية.
- متصر، سعدية (١٩٧٥). الإحصاء الوصفى مع مقدمة في الحاسوبات الإلكترونية. القاهرة: مكتبة التجارة والتعاون.
- منصور، أنيس فرنسيس و عبد العزيز، زكي محمد (١٩٧٢) مقدمة إلى الإحصاء. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- هويل، ح. (١٩٨٤). المبادئ الأولية في الإحصاء. الطبعة الرابعة؛ ترجمة بدرية شوقي عبد الوهاب و محمد كامل الشربini ، نيويورك : جون وايل.
- هيكل، عبد العزيز فهمي وأحمد، فاروق عبد العظيم (١٩٨٠). الإحصاء. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

### ثانياً: المراجع الأجنبية

- Ferguson, G.A. (1981). *Statistical Analysis in Psychology and Education*. London: McGraw Hill.
- Francis, A. (1979). *Advanced Level Statistics*. Stanley Thrones (Publ.) Ltd.
- Gupta, C.B. (1973). *An Introduction to Statistical Methods*. India, Sahibabad: Vikas Pub. House Pvt. Ltd.
- Huntsbarger, D.V. and Billingsley, P. (1973). *Elements of Statistical Inference*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Lapin, L. (1980). *Statistics: Meaning and Method*. New York: Harcourt Brace Jonanorrich Inc.
- Lindley, D.V. and Miller, J.C.P. (1953). *Cambridge Elementary Statistical Tables*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Mendenhall, W. (1980). *Introduction to Probability and Statistics*: North Scituate: Duscbury Press.
- Regier, M.H.; Mohapatra, R.N. and Mohapatra, S.N. (1982). *Biochemical Statistics with Computing*. Chichester: Research Studies Press.
- Scheffer, W.C. (1979). *Statistics for Biological Sciences*. 2nd Ed. Reading, MA, U.S.A.: Addison-Wesley.
- Sprinthall, R.C. (1982). *Basic Statistical Analysis*. Reading, MA, U.S.A.: Addison-Wesley.

## الجداول

جدول (١) الأرقام العشوائية

٧٤	٧٣	٩٨	٣٨	٨٢	٤	٦٣	٨	٢٢	٤	٢٧	٩٥	٥٣	٨٢	٣٢	٩٧	٠٠	٨٢	١٨	٠٩			
٥٠	٦١	٠٧	٨٧	٩١	٩٧	١٩	٨٨	٩٣	٩٤	٥٤	٦	١٥	٩٨	٥١	٩٧	٥٤	٥٨	٠٤	٩٦			
١٨	٧٠	٤٦	١٢	٧٧	٦٤	٤٤	٦	٦٩	٦٢	٦٩	٦٢	٧٢	٧٧	٤٧	٠٧	٠٢	٩٥	١٨	٧٣			
٧١	٥٨	٥٠	٣٧	٩٥	٧٢	٢٢	٩١	٤٢	٩٠	٤٩	١٧	١٨	٩٧	٢٠	٩٠	٧٤	٨٧	٦	٧٥			
٩٥	٣٢	٤٥	٧١	٢٠	٩٨	٧٣	٢٢	٦٨	٠	٠٣	١٠	١٣	٢٨	٦٦	٥٦	٤٠	٦٤	٠١	٥٤			
٥٣	٧٥	٨٩	٦١	٤	٧٣	٨٨	١٥	٦٦	١٣	٨٥	٢٧	٢٤	٥٤	٧٨	١٠	٩٩	٨٦	٣٥	١٨			
٧٥	٠٤	٤٦	٦٠	٣٢	٩٣	٧٨	٠	٥١	٤٠	٩١	٥	٣١	٣٣	٨١	٦٤	٣٢	٩٠	٣٠	٧٨			
٩٥	٨٧	٦٦	٤٦	٢٨	٩٠	٠٢	٥٩	٢١	٥١	٢٨	٣٦	٤١	٥٩	٨١	٢٣	٦٢	٠٨	٨٤	٥٣			
١٤	٦٥	١٧	٧٨	٥٥	١٢	٠٢	٣٩	٢٦	٥	٦٩	٢٢	٣٦	٦١	٦١	٣٧	٧٥	٧٥	٩١	٩١			
٠٦	٢٣	٩٧	٩٤	٤٨	٤٦	٧٦	٧١	٦٠	١٢	٩١	٨٣	٧٥	٣٩	٠	٩٤	٦٦	٥٩	٤١	٨٩			
٨٠	٣٩	٨١	٩٠	٥١	٧٤	٢٧	٤٨	٤١	٦٨	٠	٩٩	٤٢	٨٣	٦	٢١	٣٨	٣٠	٥١	٧٧			
٥١	٥٢	٧٧	٢٨	٧٤	٧٣	٩٧	٠	٢	٢١	٥٥	٨٨	٠٢	٩٢	٩٧	٦٩	٧٤	٧١	٢٣	٥٠	١٩		
٤٦	٥	٢٨	٠٨	٠٧	٥٦	٣١	٦٧	٦٨	٠	٥٧	١٧	٨٨	٢٧	٩٣	١٣	٩٣	٨٥	٨١	٧١	٧١		
٩١	٩١	٦٠	٨٣	٤٢	٤٥	١٣	٩٩	٠٤	٦٤	٢١	٣٦	٧٢	١٠	٦٨	٩٩	٦٤	٤٦	٤٧	٥١	٥١		
٤٢	٨١	٩٧	٨١	٧٤	٣٠	٢٨	٧١	٧٧	٦٩	٠	٤١	٥٢	٥٣	٦٢	٣١	٨٣	٩٦	٥٥	٩٩	٩٩		
٢٢	٩٨	٣٢	٣٠	٥٨	٢١	٤٧	٦٦	٩٢	٥	٩٦	٢٨	٤٧	٥٣	٩٣	٠	٧	٨	٣٤	٧١	٣٣		
٠٠	٤	٥٩	٥١	٧٣	٣٧	٤١	٤٣	٨٣	٢٨	٧	٩٢	٣٢	٥٠	١١	٩٣	٦٨	٤٨	٢٧	٨٥	٢٧		
٦١	٥	٦٦	٢٢	٢٢	٦١	٩١	٠	٢٧	٨٥	٣	٦	٢١	٥٥	٤٤	٤	٩٦	٣٨	١٣	٨٤	٨٤		
٦٠	٧٥	٦٥	٤٩	٨٥	٢٢	٦	٣٩	١٢	١	٣١	٦	٥٩	٣٩	١٧	٣٤	٦٢	٢١	٧٣	٥٦	٥٦		
٧٩	١٠	٥٢	٨٧	٤٥	٦١	٥٨	٣	٣	٣	٣	٦	٥٢	٨٨	٦٤	٨٧	٦	٦٨	٨٥	١٣	٦٥		
٤٠	٤٠	٩٦	٢١	٧٤	٣٧	٢٩	٩٩	٦٠	٦	٩٦	٢٨	٤٧	٥٠	٩٣	٠	٧	٨	٣٤	٧١	٣٨		
٠٠	٤٦	٦٦	٣٢	٤٧	٨٦	٠	١١	٢٧	٥	٦	٧	٥٧	٤٧	٣٠	١	٩٧	٦٣	٦٣	٤٠	٣٧		
٤٧	٠٢	٧٦	٢٣	٧٣	٥٠	٩٢	٥٣	٨١	٢١	١٧	١٤	٣٣	٠	٨٧	٤٨	٥٣	١٢	٩٧	٣٧	٩٧		
٤١	٦٤	٩٠	١٣	٩٣	٠٢	٥٩	٨٨	٦٣	٦	٧	٣	٣٣	١٤	٤٧	٣٤	١١	٦٤	٨٢	٢١	٢١		
٥٦	٨١	٩٨	٧٨	٠٨	٩٦	٤٢	٤٧	٧٩	٨٥	٣٥	٩	٩	٧١	٩٥	٤٢	٢٧	٥٤	١٣	٧٣	٧٣		
٦٦	٧١	٦٥	٧٢	٩٠	٨٥	٧٣	٢	٦	٦٨	٧	٢	٢	٨٩	٩٧	٥٢	٧	٦	٦٤	٧٢	٨٠	٦٥	
٢٠	٣٦	٤٨	٩٨	٦٨	٠	١٨	٣٤	٤٤	٢	٤	٦	٨٠	٢٩	٣٠	٨٨	٧٥	٧٩	٠٩	١٧	٠٧		
٨٩	٦٤	١١	٤٢	٣٦	٣٨	٨٨	٦٢	١٧	٠	٥	١	٥	١	٢٨	٤	٦٤	٦٤	٨٥	٠	٧٠		
٣٣	٥	٨٤	٦٣	٩٢	٤٤	١٩	٢٧	٥	٨	٠	٢	٦	٢٢	٦	٨٣	٣	١	٩٣	٤٨	٠٤	٩٤	٨١
٠٨	٢٨	٦٨	٠	٢	٢	٩٢	٥	٧	١٧	١٣	٤٣	٦	٩٧	٧	٥	٢	٠	٦٩	٥	١٩	١٩	١٩
٧٤	٠١	٨١	١٧	٩١	٠	١	١	٥	٥	٧٨	٢	٥	٥٤	٣	٤٢	٦	٢	٤٤	٦	٣	٣	٣
٥١	١٨	٩٨	١٨	٩٨	٠	٤	٤٨	٨٦	٤٥	٤٧	٢	٩٣	٥	٩٩	١٥	٤	٨٩	٢٨	٣١	٠	٧	
٤٤	٤٢	٧٥	٧١	٩٣	٣٢	٨٠	٥	٤	٤	٧٤	٢	٦	٧٩	٨٩	١١	٠٧	٠	٣	٢٠	٩٤	٦	
٣٦	٣١	٨٩	٤٤	٣٩	٦١	٢	٩٩	٢	٧	٦	٣٧	٦	٤٤	٢٨	٧٨	٣٢	٨٩	٩٩	٢٢	٩٢		
٢٠	٧٨	٧٦	١٣	٥٨	٧١	٩٦	١٢	٥	٦	٨٥	٢	٤	٩	٤٥	٣	٣	٦	٦	٩٣	٩٣	٩٣	

## جدول (١) الأرقام العشوائية

## جدول (٢) المساحات التي تحت المحتوى الطبيعي القياسي

### جدول (٣) القيم المخرجة لـ تي

مستوى المعنوية لطرف واحد							نوع البيان	
٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠١	٠,٠٢٥	٠,٠٥	٠,١٠	٠,٢٠		
مستوى المعنوية لطرفين								
٠,٠٠١	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٥	٠,١٠	٠,٢٠	٠,٤٠		
٦٣٦,٦١٩	٦٣,٦٥٧	٢١,٨٢١	١٢,٧٠٦	٦,٣١٤	٣,٠٧٨	١		
٣١,٥٩٨	٩,٩٢٥	٦,٩٦٥	٤,٣٠٣	٢,٩٢٠	١,٨٨٦	٢		
١٢,٩٤١	٥,٨٤١	٤,٥٤١	٣,١٨٢	٢,٣٥٣	١,٦٣٨	٣		
٨,٧١٠	٤,٦٠٤	٢,٧٤٧	٢,٧٧٦	٢,١٣٢	١,٥٣٣	٤		
٦,٨٠٩	٤,٠٣٢	٣,٣٦٥	٢,٥٧١	٢,٠١٥	١,٤٧٦	٥		
٥,٩٥٩	٣,٧٠٧	٢,١٤٣	٢,٤٤٧	١,٩٤٣	١,٤٤٠	٦		
٥,٤٠٥	٣,٤٩٩	٢,٩٩٨	٢,٣٦٥	١,٨٩٥	١,٤١٥	٧		
٥,٠٤١	٣,٣٥٠	٢,٨٩٦	٢,٣٠٦	١,٨٦٠	١,٣٩٧	٨		
٤,٧٨١	٣,٢٥٠	٢,٨٢١	٢,٢٦٢	١,٨٣٣	١,٣٨٣	٩		
٤,٥٨٧	٣,١٦٩	٢,٧٦٤	٢,٢٢٨	١,٨١٢	١,٣٧٢	١٠		
٤,٤٣٧	٣,١٠٦	٢,٧١٨	٢,٢٠١	١,٧٩٦	١,٣٦٣	١١		
٤,٣١٨	٣,٠٥٥	٢,٦٨١	٢,١٧٩	١,٧٨٢	١,٣٥٦	١٢		
٤,٢٢١	٣,٠١٢	٢,٦٥٠	٢,١٧٠	١,٧٧١	١,٤٥٠	١٣		
٤,١٤٠	٢,٩٧٧	٢,٦٢٤	٢,١٤٥	١,٧٧١	١,٣٤٥	١٤		
٤,٠٧٣	٢,٩٤٧	٢,٦٠٢	٢,١٣١	١,٧٥٣	١,٣٤١	١٥		
٤,٠١٥	٢,٩٢١	٢,٥٨٣	٢,١٢٠	١,٧٤٦	١,٣٣٧	١٦		
٣,٩٦٥	٢,٨٩٨	٢,٥٦٧	٢,١١٠	١,٧٤٠	١,٣٣٣	١٧		
٣,٩٢٢	٢,٨٧٨	٢,٥٥٢	٢,١٠١	١,٧٣٤	١,٣٢٠	١٨		
٣,٨٨٣	٢,٨٦١	٢,٥٣٩	٢,٠٩٣	١,٧٢٩	١,٣٢٨	١٩		
٣,٨٥٠	٢,٨٤٥	٢,٥٢٨	٢,٠٨٦	١,٧٢٥	١,٣٥٥	٢٠		
٣,٨١٩	٢,٨٣١	٢,٥١٨	٢,٠٨٠	١,٧٢١	١,٣٢٣	٢١		
٣,٧٩٢	٢,٨١٩	٢,٥٠٨	٢,٠٧٤	١,٧١٧	١,٣٢١	٢٢		
٣,٧٧٧	٢,٨٠٧	٢,٥٠٠	٢,٠٧٩	١,٧١٤	١,٣١٩	٢٣		
٣,٧٤٥	٢,٧٩٧	٢,٤٩٢	٢,٠٧٤	١,٧١١	١,٣١٨	٢٤		
٣,٧٢٥	٢,٧٨٧	٢,٤٨٥	٢,٠٦٠	١,٧٠٨	١,٣١٦	٢٥		
٣,٧٠٧	٢,٧٧٩	٢,٤٧٩	٢,٠٥٦	١,٧٠٦	١,٣١٥	٢٦		
٣,٦٩٠	٢,٧٧١	٢,٤٧٣	٢,٠٥٢	١,٧٠٤	١,٣١٤	٢٧		
٣,٦٧٤	٢,٧٦٣	٢,٤٦٧	٢,٠٤٨	١,٧٠١	١,٣١٣	٢٨		
٣,٦٥٩	٢,٧٥٦	٢,٤٦٢	٢,٠٤٥	١,٦٩٩	١,٣١١	٢٩		
٣,٦١٦	٢,٧٥٠	٢,٤٥٧	٢,٠٤٢	١,٦٩٧	١,٣١٠	٣٠		
٣,٥٥١	٢,٧٠٤	٢,٤٢٣	٢,٠٢١	١,٦٨٤	١,٣٠٣	٤٠		
٣,٤٦٠	٢,٦٦٠	٢,٣٩٠	٢,٠٠٠	١,٦٧١	١,٢٩٦	٦٠		
٣,٣٧٣	٢,٦١٧	٢,٣٥٨	٢,٩٨٠	١,٦٥٨	١,٢٨٩	١٢٠		
٣,٢٩١	٢,٥٧٦	٢,٣٢٦	١,٩٧٠	١,٦٤٥	١,٢٨٢	-		

جدول (٤) مربع کای

١	ج	٠,٢٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٢٥	٠,٠١	٠,٠٠٥
١	١	٧,٨٧٩	٦,٦٣٥	٥,٠٢٤	٣,٨٤١	٢,٧٠٦	١,٣٢٣
٢	٢	١٠,٥٩٧	٩,٢١٠	٧,٣٧٨	٥,٩٩١	٤,٦٠٥	٢,٧٧٣
٣	٣	١٢,٨٣٨	١١,٣٤٥	٩,٣٤٨	٧,٨١٥	٦,٢٥١	٤,١٠٨
٤	٤	١٤,٨٦٠	١٣,٢٧٧	١١,١٤٣	٩,٤٨٨	٧,٧٧٩	٥,٣٨٥
٥	٥	١٦,٧٥٠	١٥,٠٨٦	١٢,٨٣٣	١١,٠٧١	٩,٢٣٦	٦,٦٢٦
٦	٦	١٨,٥٤٨	١٦,٨١٢	١٤,٤٤٩	١٢,٥٩٢	١٠,٦٤٥	٧,٨٤١
٧	٧	٢٠,٢٧٨	١٨,٤٧٥	١٦,٠١٣	١٤,٠٦٧	١٢,٠١٧	٩,٠٣٧
٨	٨	٢١,٩٥٥	٢٠,٠٩٠	١٧,٥٣٥	١٥,٥٠٧	١٣,٣٦٢	١٠,٢١٩
٩	٩	٢٣,٥٨٩	٢١,٧٦٦	١٩,٠٢٣	١٧,٩١٩	١٤,٦٨٤	١١,٣٨٩
١٠	١٠	٢٥,١٨٨	٢٣,٢٠٩	٢٠,٤٨٣	١٨,٣٠٧	١٥,٩٨٧	١٢,٥٤٩
١١	١١	٢٦,٧٥٧	٢٤,٧٢٥	٢١,٩٢٠	١٩,٦٧٥	١٧,٢٧٥	١٣,٧٠١
١٢	١٢	٢٨,٢٩٩	٢٦,٢١٧	٢٣,٣٣٧	٢١,٠٢٦	١٨,٥٤٩	١٤,٨٤٥
١٣	١٣	٢٩,٨١٩	٢٧,٦٨٨	٢٤,٧٣٦	٢٢,٣٦٢	١٩,٨١٢	١٥,٩٨٤
١٤	١٤	٣١,٣١٩	٢٩,١٤١	٢٦,١١٩	٢٣,٦٨٥	٢١,٠٦٤	١٧,١١٧
١٥	١٥	٣٢,٨٠١	٣٠,٥٧٨	٢٧,٤٨٨	٢٤,٩٩٦	٢٢,٣٠٧	١٨,٢٤٥



<sup>١</sup> درجات الحرارة للبسط

نایاب جدول (۵) . قیام با (۹۶۰، ۱۵۰، ۱۲۰) .

تابع جدول (٥) رقم (٩٦) ، (١٠٠، ٩٦) في .

$\Delta^2 \text{ مملاة الميزة للنقطة } = 1$

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	٠	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
٨٠	٧٧	٧٤	٧١	٦٩	٦٦	٦٣	٦٠	٥٧	٥٤	٥١	٤٩	٤٦	٤٣	٤٠	٣٧	٣٤
٧٦	٧٣	٧٠	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٣٢	٣٠	٢٧	٢٤	٢١
٧٥	٧٢	٧٠	٦٩	٦٧	٦٤	٦٢	٥٩	٥٧	٥٤	٥١	٤٩	٤٧	٤٤	٤٢	٣٩	٣٧
٧٤	٧١	٦٩	٦٧	٦٤	٦٢	٥٩	٥٧	٥٤	٥١	٤٨	٤٦	٤٣	٤٠	٣٧	٣٤	٣٢
٧٣	٧٠	٦٨	٦٦	٦٣	٦١	٥٨	٥٥	٥٢	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٣٢	٣٠
٧٢	٦٩	٦٧	٦٤	٦٢	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٢٩	٢٦	٢٣	٢٠
٧١	٦٨	٦٦	٦٣	٦٠	٥٩	٥٤	٥١	٤٨	٤٥	٤٢	٣٩	٣٤	٢٩	٢٤	٢٠	١٧
٧٠	٦٧	٦٤	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤
٦٩	٦٣	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١
٦٨	٦٢	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١
٦٧	٥٩	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨
٦٦	٥٦	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥
٦٥	٥٣	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢
٦٤	٥٠	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠
٦٣	٤٧	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠
٦٢	٤٤	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠
٦١	٤١	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠
٦٠	٣٨	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠
٥٩	٣٥	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٨	٣٢	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٧	٣٠	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٦	٢٩	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٥	٢٧	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٤	٢٤	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٣	٢٢	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٢	٢٠	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥١	١٧	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٠	١٤	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٩	١١	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٨	٨	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧	٥	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٦	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

$\Delta^2 \text{ مملاة الميزة للنقطة } = 1$

# جدول (٦) . توزيع ولكوكسون

الجداول

ع نادم : يمثل عدد التدريبات المركبة للرتب التي يعملاها ، + ، - ، و = ت ،  $\frac{1}{4} (ن ، ن + 1)$

ن ، ن ع نادم	ج
٢٠	٢٠
١٩	١٨
١٨	١٧
١٧	١٦
١٦	١٥
١٤	١٣
١٢	١١
١٠	٩
٩	٨
٧	٧
٦	٥
٥	٤
٤	٣
٣	٢
٢	١
١	٠

جدول (٧) . المغاريثمات للأساس (١٠)

ن	الجدارل									
	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
١٠	٠٠٠	٠٠٤٣	٠١٢٨	٠١٧	٠٢١٢	٠٢٦	٠٣٦٣	٠٤٣٣	٠٣٧٣	٠٣٧٣
١١	٠١٤	٠٤٥٣	٠٥٩٢	٠٥٣١	٠٥٧٩	٠٥٩٢	٠٥٣١	٠٥٣١	٠٥٣١	٠٥٣١
١٢	٠٧٦٢	٠٨٢٨	٠٨٩٧	٠٩٩٩	٠٩٦٩	٠٩٦٩	٠٩٣٣	٠٩٣٣	٠٩٣٣	٠٩٣٣
١٣	١١٧٣	١١٧٣	١٢٠٦	١٢٣٩	١٢٣٩	١٢٣٩	١٣٦٧	١٣٦٧	١٣٦٧	١٣٦٧
١٤	١٦٦٣	١٦٦٣	١٦٩٢	١٦٩٢	١٦٩٢	١٦٩٢	١٧٣٢	١٧٣٢	١٧٣٢	١٧٣٢
١٥	١٦٦١	١٦٦١	١٦٦١	١٦٦١	١٦٦١	١٦٦١	١٧٦٣	١٧٦٣	١٧٦٣	١٧٦٣
١٦	٢٠٤٣	٢٠٤٣	٢٠٦٨	٢٠٧٥	٢٠٧٥	٢٠٧٥	٢٢٥٣	٢٢٥٣	٢٢٥٣	٢٢٥٣
١٧	٢٣٠٤	٢٣٠٤	٢٣٣٠	٢٣٥٥	٢٣٦٨	٢٣٦٨	٢٤٠٥	٢٤٠٥	٢٤٠٥	٢٤٠٥
١٨	٢٥٥٤	٢٥٥٤	٢٥٧٧	٢٥٧٧	٢٦٠١	٢٦٠١	٢٦٤٨	٢٦٤٨	٢٦٤٨	٢٦٤٨
١٩	٢٧٨٨	٢٧٨٨	٢٨١	٢٨١	٢٨٣٣	٢٨٦٦	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٢٨٧٧	٢٨٧٧
٢٠	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣	٢٩٣٣
٢١	٣٠١٠	٣٠١٠	٣٠٣٢	٣٠٣٢	٣٠٣٢	٣٠٣٢	٣٢٦٣	٣٢٦٣	٣٢٦٣	٣٢٦٣
٢٢	٣٢٤	٣٢٤	٣٤٤٤	٣٤٤٤	٣٤٤٤	٣٤٤٤	٣٦٦٥	٣٦٦٥	٣٦٦٥	٣٦٦٥
٢٣	٣٦١٧	٣٦١٧	٣٧٦٦	٣٧٦٦	٣٧٦٦	٣٧٦٦	٣٧٢٩	٣٧٢٩	٣٧٢٩	٣٧٢٩
٢٤	٣٩٦٢	٣٩٦٢	٣٩٣٥	٣٩٣٥	٣٩٣٥	٣٩٣٥	٣٩٠٩	٣٩٠٩	٣٩٠٩	٣٩٠٩
٢٥	٤١٣٣	٤١٣٣	٤١٦٣	٤١٦٣	٤١٨١	٤١٨١	٤١٦٣	٤١٦٣	٤١٦٣	٤١٦٣

تابع جدول (٧). المواريثات للأساس (٠١)

الجدل الأول

تابع جدول (٧). المواريثات للأساس (١٠)

تابع جدول (٧). المواريثيات للأساس (١٠)





تابع جدول (٨) . اللوغراریتمات المقابله

اللوغاريتمات المقابلة جدول (٨) .

الجداول



## كشاف الموضوعات

١

- أعمدة بيانية ٣٩  
جزءاً، ٤٠ ٤٢  
مزدوجة (متلاصقة) ٤٠، ٤١  
اقران ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٣  
التنوع ١١٥، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١  
انحدار ١٣١، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨  
انحراف متوسط ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢  
معايير ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧  
أوساط متحركة ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢  
٢٠٣

٢

- بيانات كمية (رقمية) ١٤، ١٦، ١٨  
وصفتية (كيفية) ١٤

٣

- تباديل ٢٦٤

احتياك شرطي ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧١  
إحصاءات الأمراض ٢٢٨  
حيوية ٢١٦، ٢١٧

إحصائيات المواليد ٢٢٣  
الوفيات والمحجرة ٢٢٥  
اختبار الإشارة ٣٨٥، ٣٨٦  
غير معتملة ٣٨٥  
الفروق بين متوسطي عينتين غير مستقلتين ٣٥٠  
الفرض ٣٣١  
كروسكال والبيس ٣٩٤  
مان - وتيهي يو ٣٨٩  
ولكركسون ٣٩١  
ارتباط ١٣١

الأرقام القياسية ١٦١  
استقلال ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠  
استهارة احصائية ١٢، ٧  
أشكال المنحنيات التكرارية ٣٥  
أعمدة بسيطة ٣٩

- طبيعي (معدل) ٣٠٠  
 طبيعي قياسي ٣٠٢  
 معاينة ٣١٨، ٣١٧، ٣١٣  
 توقع ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩١، ٢٩٧، ٢٩٥  
 تباين ٨٦، ٩٠، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٥، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧  
 تباين ٢٩٣، ٢٩١، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٤  
 تجربة عشوائية ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٣  
 تحليل التباين ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤١٣، ٤١٢  
 تصعيم تام العشوائية ٤١١  
 السلسل الزمنية ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٧  
 تعداد السكان ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٤، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥  
 تعريف تجربة للاحتمال ٢٤٨، ٢٤٨  
 تقليدي للاحتمال ٢٤٨  
 نفلطح ١١٥، ١٢٢، ١٢٣، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩  
 تقدير ٣١٣، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦  
 عدد السكان ٢١٨  
 تمثيل بياني للتوزيعات ٢٨  
 بياني للسلسلة الزمنية ١٩٢  
 تنظيم وتلخيص البيانات ١٣  
 توافق ١٤٨، ١٤٩  
 توافق ٢٦٥  
 توزيعات احتمالية ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٥  
 توزيع بواسون ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩  
 تسي ٣٤٤، ٣٤٥  
 ذي الحدين ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧

## ج

- جدال التجانس ٣٧٦، ٣٧٧  
 تكرارية ذات الفئات غير المنتظمة ٢٣  
 توزيعات تكرارية مزدوجة ٢٦  
 توزيعات تكرارية مفتوحة ٢٤  
 جدول توزيع التكرار النسبي ٢٢  
 متجمع صاعد ٢١، ٢٠، ٢٢  
 متجمع هابط ٢١، ٢٠

## ج

- حادثة ٢٧٣، ٢٥٥-٢٤٣، ٢٦١-٢٥٧، ٢٧١، ٢٧١، ٢٥٥-٢٤٣  
 حدود فعلية للفئات ١٩، ٢٠

## خ

- خط بياني ٣٦، ٣٧

## خ

- رسوم بيانية ٣٦  
 دائيرية ٤٢، ٤٣

## س

- سلال زمنية ١٩١

**م**ركبات السلالسل الزمنية ١٩٨ - ١٩٤

مركز الفئات ١٩ ، ٢٠

مشتملات الاحتياطات ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢

٢٥٤

مقدار البيانات ٦

مصدر تاريخي ٦

ميداني ٦

مضلع تكراري ٣٢ - ٣٠

معامل الاختلاف المثوي ١١٤ ، ١١٥

معامل الاختلاف النسبي ١١٤ ، ١١٥

مقاييس الشتت النسبية ١١٣

التوزع المركزية ٥١

منحنى تكراري ٣٢ ، ٣٣

متجمع صاعد ٣٣ ، ٣٢

متجمع هابط ٣٤

منوال ٧٩ - ٦٩

## ط

طرق العد ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩

طريقة المربعات الصغرى ١٥٨

## ع

عزوم ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٠

١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢٢

عينة إحصائية ٣

عشوانية بسيطة ٤

عشوانية طبقية ٥

## ف

فراغ العينة ٢٤٣ - ٢٤٣ ، ٢٤٨ ، ٢٤٦

٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ ، ٢٦٣

## ج

مباديء الاحتياطات ٢٣٣

متغيرات عشوائية ٢٨١ - ٢٨١ ، ٢٨٨

٢٩٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٤ - ٢٩١

٣٠٧ ، ٢٩٩

مجتمع إحصائي ٣ ، ٤

مجموعات ٢٣٤ - ٢٣٤ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣

مدرج تكراري ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٧٦

مدى ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢

مربع كاي ٣٥٩ - ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٦٩

٣٧٥ ، ٣٧٣ ، ٣٧٠

## ن

نصف المدى الربيعي ٩٧ - ٩٢ ، ٩٩

## هـ

وسط توافقي ٨١ ، ٨٢

حسابي (متوسط) ٥٤ - ٥٢

٥٨ - ٥٦

حسابي مرجح ٥٨ ، ٥٩

هندسي ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٢

وسيط ٦٩ - ٦٠