

الأرقام القياسية

(٦ - ١) مقدمة

لقد صاحب التقدم والتطور التكنولوجي المعاصر اتساع في التبادل التجاري بين الدول والشعوب، وزيادة في الإنتاج والاستهلاك، وربما رافق ذلك بعض الزيادة في الأسعار لبعض السلع، وارتفاع في تكاليف المعيشة بالنسبة لمستوى الدخل، مما يجب تعطيه بزيادة معقولة في الرواتب والأجور على المستويين العام والخاص. دفعت كل هذه العوامل المسئولين لبحث واستقصاء مقدار التغير في الأسعار ونفقات المعيشة مثلاً، حتى يتمكنوا من تحديد زيادة مناسبة في الرواتب والأجور تتفق مع الزيادة التي تطرأ على أسعار السلع وتتكاليف المعيشة، أو للدراسة كيفية معالجة مثل هذه الزيادة في بعض السلع على الأقل. ولذلك نشأت الحاجة إلى إيجاد مقاييس إحصائية تعبّر بصورة واضحة ودقيقة عن مقدار التغيرات من حيث الزيادة أو النقص في الأسعار، أو في الكميات المنتجة، أو الكميات المستهلكة أو الكميات المعروضة، أو قيمة الصادرات أو الواردات بالنسبة لفترتين زمنيتين مختلفتين، أو بالنسبة لمكانين مختلفين.

وهذه المقاييس هي ما يسمى الأرقام القياسية، وسوف نكتفي بدراسة الأرقام القياسية للمتغيرات بالنسبة للزمن، وهي : عبارة عن مقياس نسبي لقيمة المتغير محل الدراسة في فترة زمنية معينة تسمى فترة المقارنة ، بالنسبة إلى قيمة هذا المتغير في فترة زمنية أخرى تسمى فترة الأساس . ولتعريف الرقم القياسي نورد على سبيل المثال ما يلي :

إذا كان سعر سلعة ما في ١٣٩٥ هـ هي ٤٠ ريالاً وسعرها في ١٤٠٠ هـ هو ٥٠ ريالاً فإن الرقم القياسي لسعر هذه السلعة في عام ١٤٠٠ هـ باعتبار أن عام ١٣٩٥ هـ سنة الأساس: هو حاصل قسمة السعر في سنة المقارنة ١٤٠٠ هـ مقسوماً على السعر في سنة الأساس ١٣٩٥ هـ مضروباً في ١٠٠ أي أن:

$$\frac{٥٠}{٤٠} \times ١٠٠ = ١٢٥\%$$

ولقد جرت العادة على حذف النسبة المئوية، وكذلك التعبير عن سنة الأساس بالرقم ١٠٠ وعليه، ففي المثال السابق يمكن القول: إن سعر السلعة زاد في سنة المقارنة ١٤٠٠ هـ بمقدار ٢٥٪ عنما كان عليه سعر السلعة في سنة الأساس ١٣٩٥ هـ.

ولكي تكون الأرقام القياسية معبرة بصورة صحيحة يجب أن تختار فترة الأساس بحيث تكون فترة طبيعية ومستقرة بعيدة عن الأحداث الطارئة، مثل الكوارث والمحروب .. الخ.

وهناك عدة أنواع من الأرقام القياسية نذكر منها الأرقام القياسية البسيطة (الجمعية والنسبية)، والأرقام القياسية المرجحة (الجمعية والنسبية)، وكذلك الأرقام القياسية المثلث (ال الجمعية والنسبية). وسوف نتناول فيما يلي كلاماً من هذه الأنواع بالشرح مع بعض التفصيل موضعين ذلك بالأمثلة.

(٦ - ٢) الأرقام القياسية البسيطة

يتكون الرقم القياسي البسيط لسلعة ما بقسمة سعر السلعة في فترة المقارنة على سعر السلعة في فترة الأساس وضرب خارج القسمة في ١٠٠ . فإذا كان سعر سلعة ما في سنة المقارنة هو س، وسعرها في سنة الأساس هو سـ.

فإن الرقم القياسي البسيط لهذه السلعة يُعرف كالتالي:

$$\text{الرقم القياسي البسيط} = \frac{س}{سـ} \times ١٠٠ \quad (١) \dots\dots$$

مثال (١)

إذا كان سعر سلعة ما عام ١٤٠٠ هـ هو ٧٠ ريالاً وسعرها في عام ١٤٠٥ هـ هو ١٠٥ ريالات، فاحسب الرقم القياسي البسيط لهذه السلعة لعام ١٤٠٥ هـ باعتبار عام ١٤٠٠ هـ سنة الأساس.

نفرض أن سعر سنة المقارنة ١٤٠٥ هـ هو ١٠٥ = ١٠٥ ريالات

وأن سعر سنة الأساس ١٤٠٠ هـ هو ٧٠ = ٧٠ ريالاً

$$\text{فيكون الرقم القياسي البسيط للسلعة} = \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times 100$$

$$= \frac{100}{70}$$

$$= 142.857$$

وإذا كان المطلوب حساب الرقم القياسي البسيط لأسعار مجموعة من السلع فإننا نستخدم في هذه الحالة نوعين من الأرقام القياسية البسيطة. النوع الأول يسمى الرقم القياسي التجمعي البسيط، والنوع الثاني يسمى الرقم القياسي النسبي البسيط، ويمكن تعريفهما كما يلي.

(٦ - ٢ - ١): **الرقم القياسي التجمعي البسيط**
هو مجموع أسعار السلع في سنة المقارنة مقسوماً على مجموع أسعار السلع في سنة الأساس وضرب نتيجة القسمة في ١٠٠ أي أن:

$$\text{الرقم القياسي التجمعي البسيط} = \frac{\text{مج. س.}}{\text{مج. س.}} \times 100 \dots \dots \dots (٢)$$

(٦ - ٢ - ٢): **الرقم القياسي النسبي البسيط**
ويعرف بأنه متوسط الأرقام القياسية البسيطة لمجموعة من السلع وضرب الناتج في ١٠٠ أي أن:

$$\text{الرقم القياسي النسبي البسيط} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{s_i}{s_i}$$

حيث إن «ن» عبارة عن عدد السلع الداخلة في تركيب الرقم القياسي النسبي البسيط ونوضح طريقة الحساب بالمثال التالي.

مثال (٢)

احسب الرقم القياسي التجميعي البسيط وكذلك الرقم القياسي النسبي البسيط لأسعار وحدة من السلع ا، ب، ج «بالريالات» الموضحة بالجدول التالي:

جدول (٦ - ١) : أسعار ٣ سلع في عامي ١٤٠١ هـ و ١٤٠٥ هـ

السلعة	أسعار عام ١٤٠١ هـ بالريالات	أسعار عام ١٤٠١ هـ بالريالات	أسعار عام ١٤٠٥ هـ بالريالات
ا	٤٠	١٢٠	٤٠
ب	٦٠	٩٠	٩٠
ج	٢٠	٤٠	٤٠
المجموع		١٢٠	٢٥٠

سبق أن عرفنا الرقم القياسي التجميعي البسيط بالصيغة التالية:

$$\text{الرقم القياسي التجميعي البسيط} = \frac{\sum s_i}{\sum s_i} \times 100$$

وباستخدام بيانات الجدول السابق نجد أن

$$\text{الرقم القياسي التجميعي البسيط} = \frac{40 + 90 + 120}{40 + 60 + 90} \times 100$$

$$= \frac{250}{120} \times 100$$

$$= 208,33$$

$$\begin{aligned}
 \text{الرقم القياسي النسبي البسيط} &= \frac{1}{n} \sum \left(\frac{s_i}{s} \right) \times 100 \\
 \text{أي أن} \\
 100 \times \left(\frac{40}{20} + \frac{90}{60} + \frac{120}{40} \right) &= \frac{1}{3} \\
 100 \times (2 + 1.5 + 3) &= \frac{1}{3} \\
 &= 216.67
 \end{aligned}$$

ونورد فيها بــ بعض الملاحظات على استخدام الرقمن القياسيين السابقين:

- ١ - عند استخدام الرقم القياسي التجمعي البسيط يجب ملاحظة كونه يتأثر بوحدات القياس، ولذلك يراعي عند استخدامه تساوي الوحدات لجميع السلع. بينما نجد أن الرقم القياسي النسبي البسيط لا يتأثر باختلاف الوحدات من سلعة إلى أخرى وذلك لأن النسبة تلغى الوحدات.
- ٢ - كما يلاحظ من الحسابات في مثال (٢) السابق بأن الرقم القياسي البسيط سواء التجمعي أو النسبي يشير إلى زيادة في أسعار السلع يفوق الضعف، وعند النظر إلى جدول أسعار أ، ب، ج نجد أن السلعة أ زادت بمقدار ثلاثة أضعاف سعرها في سنة الأساس، وأن السلعة «ب» زادت بمقدار قليل يمثل نصف السعر، أما السلعة ج فإنها زادت بمقدار الضعف، وهذا يفسر أن السلعة أ أثرت على زيادة الرقم القياسي للأسعار للسلع الثلاثة مما جعل قيمته تزيد عن الضعف.

ولذلك فإننا بحساب الرقم القياسي بهذه الطريقة تكون قد أعطينا نفس الأهمية. أو نفس الوزن لجميع السلع الداخلة في حساب الرقم القياسي وهذا ليس صحيحاً دائمًا. فهل السلعة «أ» من الأهمية بحيث تعطي أهمية أكبر من السلعتين ب، ج، عند حساب الرقم القياسي البسيط؟

بالفرض الصحيح ، عند حساب مستوى تكاليف المعيشة في منطقة ما لابد من إعطاء وزن للمواد أو السلع التي تدخل في استهلاك الفرد وهذه تختلف من منطقة إلى أخرى ، وهذا ينطبق على الأرقام القياسية للمواد المستوردة أو المصنعة إلخ . مثل هذا التساؤل عن أهمية العناصر أو السلع الداخلة في حساب الأرقام القياسية يقودنا إلى دراسة ما يسمى الأرقام القياسية المرجحة .

٦ - ٣) الأرقام القياسية المرجحة

تحسب الأرقام القياسية المرجحة بعد إعطاء كل سلعة وزناً أو ترجيحاً يتاسب مع أهميتها في تكوين الرقم القياسي . وقد تكون هذه الأوزان هي الكمية المنتجة من هذه السلع ، أو الكميات المستهلكة منها في إحدى السنوات ، أو الكميات المعروضة منها أو... وذلك لتلافي تأثير إحدى السلع الداخلة في تكوين الرقم القياسي تأثيراً أكبر من السلع الأخرى ، مع أن هذه السلعة أقل أهمية من السلع الأخرى . وعندما نستخدم الأوزان لبيان أهمية السلع الداخلة في تركيب الرقم القياسي فإننا في هذه الحالة نسمى الأرقام القياسية بالأرقام القياسية المرجحة . وسوف نتناول دراسة الأرقام القياسية للأسبير (Laspeyres) . والأرقام القياسية المرجحة بالنسبة لأوزان أو كميات سنة المقارنة ، وهي ما تسمى الأرقام الناتجة من الوسط الهندسي لكل من الرقمين القياسيين السابقين للأسبير وباش ، وهي ما تسمى الأرقام القياسية المشل لفisher (Fisher) . ويستتناول تعريف كل من هذه الأرقام القياسية مع تطبيقها على مثال لتوضيح طريقة استخدامه .

٦ - ٣ - ١) الرقم القياسي المرجح للأسبير

يستخدم الرقم القياسي المرجح للأسبير (Laspeyres) كميات أو أوزان سنة الأساس كأوزان مرحلة وذلك لحساب الرقم القياسي المرجح لأسعار مجموعة من السلع فإذا كانت الكميات النسبية لسنة الأساس كـ ، والكميات النسبية لسنة المقارنة كـ (حيث إن المقصود بالكميات النسبية هو حاصل قسمة كمية السلعة على مجموع

الكميات في تلك السنة)، وأسعار سنة الأساس، وأسعار سنة المقارنة، لمجموعة من السلع فإننا نعرف الرقم القياسي التجميعي المرجح للأسبير على أنه: «مجموع حاصل ضرب أسعار سنة المقارنة في الكميات النسبية لسنة الأساس مقسوماً على مجموع حاصل ضرب أسعار سنة الأساس في الكميات النسبية لسنة الأساس وضرب نتيجة القسمة في ١٠٠» أي أن:

$$\text{الرقم القياسي التجميعي المرجح للأسبير} = \frac{\text{مج. س. ك.}}{\text{مج. س. ك.}} \times 100 \dots \dots \dots (4)$$

أما الرقم القياسي النسبي المرجح للأسبير فهو: «مجموع حاصل ضرب نسب سعر سنة المقارنة إلى سنة الأساس في الكميات النسبية لسنة الأساس وضرب حاصل الجمع في .١٠٠.

أي أن:

$$\text{الرقم القياسي النسبي المرجح للأسبير} = \frac{\text{مج.}}{\text{س.}} \times 100 \dots \dots \dots (5)$$

(٦ - ٣ - ٢) **الرقم القياسي المرجح لبلاش**
يستخدم الرقم القياسي المرجح لبلاش (Paasche) أوزان أو كميات سنة المقارنة وذلك لحساب الرقم القياسي المرجح لأسعار مجموعة من السلع. وبذلك فإنه يمكن تعريف الرقم القياسي التجميعي المرجح لبلاش بأنه: «مجموع حاصل ضرب أسعار سنة المقارنة في كمياتها النسبية لسنة المقارنة مقسوماً على مجموع حاصل ضرب أسعار سنة الأساس في الكميات النسبية في سنة المقارنة وضرب حاصل القسمة في .١٠٠»

أي أن

$$\text{الرقم القياسي التجميعي المرجح لبلاش} = \frac{\text{مج. س. ك.}}{\text{مج. س. ك.}} \times 100 \dots \dots \dots (6)$$

أما الرقم النسبي المرجع لباش فهو: «عبارة عن مجموع حاصل ضرب سعر ستة المقارنة على سعر ستة الأساس لكل سلعة مضروباً في الكمية النسبية لتلك السلعة في سنة المقارنة وضرب الناتج في .١٠٠ أي أن:

$$\text{الرقم القياسي النسبي المرجع لباش} = \frac{\sum (S_i / K_i) \times 100}{\sum S_i} \dots \dots \dots (7)$$

(٦ - ٣ - ٣) الرقم القياسي الأمثل لفيشر
والرقم الأمثل لفيشر (Fisher) يشتق من الرقمين السابقين للاسيير وباش وهو عبارة عن الوسط الهندسي لها.

ويعرف الرقم القياسي التجميعي الأمثل لفيشر: « بأنه الجذر التربيعي لحاصل ضرب الرقمين القياسيين التجميعيين لكل من لاسيير وباش».

$$\text{الرقم القياسي التجميعي الأمثل لفيشر} = \sqrt{\frac{\sum S_i / K_i \times \sum S_i / K_i}{100}} \dots \dots \dots (8)$$

أما الرقم القياسي النسبي الأمثل لفيشر: فيعرف على أنه «الجذر التربيعي لحاصل ضرب الرقمين القياسيين النسبة لكل من لاسيير وباش».

$$\text{الرقم القياسي النسبي الأمثل لفيشر} = \sqrt{\frac{\sum (S_i / K_i) \times \sum (S_i / K_i)}{100}} \dots \dots \dots (9)$$

ولتوضيح كيفية استخدام كل من الأرقام القياسية السابقة نورد المثال التالي.

مثال (٣)

إذا أعطيت السلع الثلاث ،أ، ب ، ج الموضحة في مثال (٢) أوزانها حسب أهمية كل منها كما هو مبين بالجدول:

جدول (٢ - ٦) : أسعار ٣ سلع لعامي ١٤٠١ و ١٤٠٥ هـ وأوزانها المرجحة

السلعة	أسعار عام ١٤٠١ (س.)	أسعار عام ١٤٠٥ (س.)	وزن المرجح لعام ١٤٠٥ (ك.)	وزن المرجح لعام ١٤٠١ (ك.)
أ	٤٠	١٢٠	٠,١٥	٠,١٩
ب	٦٠	٩٠	٠,٦٠	٠,٥١
ج	٢٠	٤٠	٠,٢٥	٠,٣٠

احسب الأرقام القياسية لكل من لاسبير وباش والأمثل لفيشر.

الحل

يمكن تلخيص الحسابات في الجدول التالي:

السلعة	س. ك.	المجموع										
أ	٤٠	١٢٠	٠,١٩	٠,١٥	٢٢,٨	٧,٦	١٨	٦	٣٦	٥٤	٣٠,٦	٠,٥٧
ب	٦٠	٩٠	٠,٥١	٠,٦٠	٤٥,٩	٤٠,٩	٤٠	٣٦	١٠	٥	٠,٧٧	٠,٩٠
ج	٢٠	٤٠	٠,٣٠	٠,٢٥	١٢,٠	٦,٠	١٠	٥	٣٦	٥٤	٠,٦٠	٠,٥٠
												١,٩٤
												١,٨٥

$$\text{الرقم القياسي التجمعي للإسبير} = \frac{\sum \text{س. ك.}}{\sum \text{س. ك.}} \times 100 \dots \dots \dots (٦)$$

$$= \frac{100 \times ٨٠,٧}{٤٤,٢}$$

$$= ١٨٢,٥٨$$

$$\text{الرقم القياسي النسبي المرجح للاسيير} = \frac{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}}{100} \times 100$$

$$= 100 \times 1,94$$

$$= 194$$

$$\text{الرقم القياسي التجمعي المرجح لباش} = \frac{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}}{100} \times 100$$

$$= \frac{82}{47}$$

$$= 174,47$$

$$\text{الرقم القياسي النسبي المرجح لباش} = \frac{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}}{100} \times 100$$

$$= 100 \times 1,80$$

$$= 180$$

$$\text{الرقم القياسي النسبي الأمثل لفيشر} = \sqrt{\frac{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}}{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}}} \times 100$$

$$= \sqrt{100 \times 1,7447 \times 1,8258}$$

$$= \sqrt{100 \times 1,7848}$$

$$= 178,48$$

$$\text{الرقم القياسي النسبي الأمثل لفيشر} = \sqrt{\text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.}} \times \text{مج. } \left(\frac{\text{س.}}{\text{س.}} \right) \text{ ك.} \times 100$$

$$= \sqrt{100 \times 1,85 \times 1,94}$$

$$= \sqrt{100 \times 1,8945}$$

$$= 189,45$$

(٤ - ٣) منسوب السعر

سبق أن عرّفنا الرقم القياسي للأسعار بأنه خارج قسمة سعر سلعة ما في فترة المقارنة مقسوماً على سعر هذه السلعة في فترة الأساس وضرب حاصل القسمة في ١٠٠ . وعادة ما يشار خارج قسمة سعر السلعة في فترة المقارنة على سعرها في فترة الأساس بمنسوب السعر وسوف نرمز له بالرمز m_f أي أن

$$m_f = \frac{\text{سعر سلعة ما في فترة المقارنة}}{\text{سعر هذه السلعة في فترة الأساس}} = \frac{s_f}{s_i}$$

وكذلك إذا علم m_f فإنه يمكن حساب الرقم القياسي بسهولة بأن نضرب هذا المنسوب في ١٠٠ أي أن :

$$\text{الرقم القياسي} = m_f \times 100$$

(٤ - ٤) الأرقام القياسية ذات الأساس المتحرك

لقد سبق لنا حساب الأرقام القياسية وذلك بعد ثبيت فترة الأساس ، وأحياناً تكون المدة بين فترة الأساس وفترة المقارنة كبيرة نسبياً مما يجعل الرقم القياسي للأسعار مجموعة من السلع غير معتبراً صحيحاً ، لأنه قد تظهر أنواع جديدة من السلع ، أو قد تختفي أنواع أخرى . كما قد تقل أهمية أو كمية بعض الأنواع ، وقد تزداد أهمية أو كمية بعضها الآخر . ولذا فإنه يلزم تكون رقم قياسي دقيق يتطلب تقصير المدة بين فترات الأساس والمقارنة . لأنه كلما قصرت المدة كانت ظروف التشابه للسلع محل الدراسة كبيرة ، من حيث أنواع السلع ، وكذلك أسعارها ، ولهذه الاعتبارات السابقة ، نشأت الحاجة إلى تكون أرقام قياسية ذات فترة أساس متحركة ، وفي نفس الوقت يمكن إرجاعها جائعاً إلى أساس ثابت عند اللزوم . وبهذا نستطيع ادخال ما يستجد من أنواع جديدة من السلع ، وكذلك استبعاد السلع التي تختفي ، وكذلك أيضاً تغيير أوزان السلع ، حسب ما يستجد من زيادة أو نقص في أهميتها .

وتتلخص طريقة الأساس المتحرك في أنه إذا كانت المدة بين فترة الأساس وفترة المقارنة كبيرة ، تقسم إلى مدد زمنية قصيرة تكون فيها ظروف السلع مشابهة وأسعارها

متقاربة . وعند تكوين منسوب السعر لمجموعة من السلع لكل مدة زمنية ، نعتبر بداية هذه المدة فترة أساس لها ونهايتها فترة المقارنة لها ، وكذلك لحساب منسوب السعر للمدة التالية لنفس المجموعة من السلع ، نأخذ فترة الأساس هي فترة المقارنة للمدة السابقة وهكذا... فعلى سبيل المثال إذا قسمنا مدة عشر سنوات إلى فترات كل منها سنة واحدة ، وكانت الأسعار في هذه الفترات لسلعة ما كالتالي :

س. ، س. ، ، س. ،

فإنه يمكن التعبير عن مناسبات هذه الأسعار كالتالي :

٨٩٣ ، ، ١٢٣ ، ٠١٣

حيث إن :

$$\frac{\text{س.}}{\text{س.}} = \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times \dots \times \frac{\text{س.}}{\text{س.}} = \frac{\text{س.}}{\text{س.}}$$

ومن المناسبات السابقة يمكن حساب التالي :

- ١ - الأرقام القياسية ذات الأساس المتحرك بضرب هذه المناسبات في ١٠٠ .
- ب - وإذا رغبنا في إيجاد رقم قياسي ذي أساس ثابت عند فترة ما ، فإننا نضرب المناسبات ذات الأساس المتحركة في بعضها لنحصل على النسبة بأساس ثابت للمدة المطلوبة . ثم نضرب هذا النسبة في ١٠٠ لنحصل على الرقم القياسي ذي الأساس الثابت .

ولتوضيح ذلك من المثال السابق . فإنه إذا أردنا حساب الرقم القياسي لمدة أربع سنوات يكون الرقم القياسي هو :

$$100 \times 123 \times 233 = 100 \times 100 \times \dots$$

$$= \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times \frac{\text{س.}}{\text{س.}}$$

$$= \frac{\text{س.}}{\text{س.}} \times 100$$

مثال (٤)

إذا كانت أسعار السلع أ، ب، ج خلال خمس سنوات موضحة بالجدول التالي:

جدول (٣ - ٦): أسعار ٣ سلع للأعوام من ١٤٠١ هـ حتى ١٤٠٥ هـ

السلع	سعر عام ١٤٠٥	سعر عام ١٤٠٤	سعر عام ١٤٠٣	سعر عام ١٤٠٢	سعر عام ١٤٠١	سعر عام ١٤٠٠
أ	١٢٠	١٠٠	٨٠	٦٠	٤٠	٢٠
ب	٩٠	٨٠	٧٥	٧٠	٦٠	٣٥
ج	٤٠		٣٠	٢٥	٢٠	
المجموع	٢٥٠	٢١٥	١٨٥	١٥٥	١٢٠	

فيكون الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٢ هـ بالنسبة لعام ١٤٠١ هـ

$$M_{1402} = \frac{1}{N} \times \frac{100}{\sum \frac{S_i}{S_0}} =$$

$$= \frac{100}{\frac{25}{20} + \frac{70}{60} + \frac{60}{40}} = \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{100}{(1.25 + 1.17 + 1.50)} = \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

$$= 130.67$$

حيث إن $M_{1401} = 100$ (وذلك بقسمة الرقم القياسي على ١٠٠)

الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٣ هـ بالنسبة لعام ١٤٠٢ هـ

$$M_{1403} = \frac{1}{N} \times \frac{100}{\sum \frac{S_i}{S_0}} =$$

$$= \frac{100}{\frac{30}{25} + \frac{75}{70} + \frac{80}{60}} = \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} = \frac{1}{100 \times (1,20 + 1,07 + 1,33)} \\ & 120 = \\ & \text{ويكون } M_{12} = 1,20 \end{aligned}$$

الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٤هـ بالنسبة لعام ١٤٠٣هـ

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} = \frac{1}{100 \times \left(\frac{S_1}{S_2} \right)} \\ & \frac{1}{3} = \frac{1}{100 \times \left(\frac{35}{30} + \frac{80}{75} + \frac{100}{80} \right)} \\ & \frac{1}{3} = \frac{1}{100 \times (1,17 + 1,07 + 1,25)} \\ & 116,33 = \\ & \text{ويكون } M_{23} = 1,1633 \end{aligned}$$

الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٥هـ بالنسبة لعام ١٤٠٤هـ

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} = \frac{1}{100 \times \left(\frac{S_3}{S_4} \right)} \\ & \frac{1}{3} = \frac{1}{100 \times \left(\frac{40}{35} + \frac{90}{80} + \frac{120}{100} \right)} \\ & \frac{1}{3} = \frac{1}{100 \times (1,14 + 1,13 + 1,20)} \\ & 115,67 = \\ & \text{ويكون } M_{34} = 1,1567 \end{aligned}$$

ومن الأرقام القياسية السابقة ذات الأوساط المتحركة يمكن حساب الرقم القياسي بالنسبة لمدة خمس سنوات باعتبار عام ١٤٠٥هـ سنة المقارنة، وعام ١٤٠١هـ

ستة الأساس وذلك بضرب المنياب السابقة ذات الأساس المتحركة في بعضها، ثم ضربها جميعاً في ١٠٠ كما يلي:

الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٥هـ بالنسبة لعام ١٤٠١هـ على
الأساس المتحرك

$$\begin{aligned} &= ١٠٠ \times ١٢٣ \times ٢٤٣ \times ٢٢٣ \\ &= ١٠٠ \times ١,٣٠٦٧ \times ١,١٦٣٣ \times ١,٢٠ \\ &= ٢١٠,٩٩ \end{aligned}$$

ولقد سبق حساب الرقم القياسي النسبي لأسعار عام ١٤٠٥هـ بالنسبة لعام ١٤٠١هـ على الأساس الثابت وكان يساوي ٢٦١,٦٧، وذلك في مثال (٢)، ويختلف عن نظيره الرقم القياسي النسبي على الأساس المتحرك السابق وهو ٢١٠,٩٩.

(٦ - ٥) اختبار الأرقام القياسية

سبق لنا أن استعرضنا طرق حساب الأرقام القياسية سواء كانت أرقاماً قياسية تجميعية أم نسبية، أم أرقاماً قياسية مرجحة أم غير مرجحة وأرقاماً قياسية ذات أساس متتحرك أم أساس ثابت. ومن الناحية العملية لا توجد قاعدة عامة تفضل طريقة على أخرى، ولكن طبيعة المواد الداخلة في الرقم القياسي من عناصر وأوزان وسنة أساس تجعلنا نختار طريقة الحساب التي تناسب وطبيعة تكوين الرقم القياسي المناسب لها.

ولكن توجد بعض الاعتبارات النظرية للمفاضلة بين الطرق المختلفة لحساب الأرقام القياسية. والرقم القياسي الجيد هو الذي يحقق اختبار الانعكاس في الأساس، وكذلك اختبار الانعكاس في المعامل، وسوف ندرس كلاً من هذين الاختبارين مع إيراد مثال عن كل حالة.

(٦ - ٥ - ١) اختبار الانعكاس الزمني في الأساس

يتتحقق اختبار الانعكاس (time reversal test) في الأساس لأي رقم قياسي إذا ضربنا هذا الرقم الذي يمثل أسعار مجموعة من السلع في الرقم القياسي لمجموعة

السلع نفسها، بعدأخذ فترة الأساس للمقارنة، وفترة المقارنة للأساس (وذلك بأخذ كل من الرقمين مقسوما على ١٠٠)، فإنه يكون ناتج الضرب هو الواحد الصحيح، ونوضح ذلك بالمثال التالي.

مثال (٥)

من البيانات في مثال (٢) أي الأرقام القياسية يحقق خاصية الانعكاس في الأساس؟

١ - سبق في مثال (٢) حساب الرقم القياسي التجمعي البسيط وهو:

$$= \frac{\text{مج. س.}}{\text{مج. س.}} \times 100 = 208,33$$

ويقسمه هذا الرقم على ١٠٠ فإننا نحصل على المنسوب السعري م.م أي أن:

$$2,0833 = .11$$

الرقم التجمعي البسيط باعتبار أسعار سنة ١٤٠٥ هـ كسنة أساس وأسعار سنة ١٤٠١ هـ كسنة المقارنة

$$= \frac{\text{مج. س.}}{\text{مج. س.}} \times 100 =$$

$$= \frac{120}{250} \times 100 =$$

$$= 48$$

ويقسمه هذا الرقم على ١٠٠ نحصل على م.م أي أن:

$$.11 = 1,48$$

اختبار الانعكاس في الأساس = $م_{,٠} \times م_{,٠}$
 $= ١ = ٤٨ \times ٢,٠٨٣٣$
∴ الرقم القياسي التجمعي البسيط يحقق خاصية الانعكاس في الأساس.

ب - سبق في مثال (٢) حساب الرقم النسبي البسيط وهو:

$$\frac{١}{ن} مج(\frac{سن}{سن}) \times ١٠٠ = ٢١٦,٦٧$$

منه $م_{,٠} = ٢,١٦٦٧$ (وذلك بقسمة الرقم القياسي على ١٠٠)

ويحساب الرقم القياسي النسبي البسيط باعتبار عام ١٤٠٥ هـ سنة أساس وعام ١٤٠٠ هـ سنة المقارنة فيكون مساوياً

$$\frac{١}{ن} مج(\frac{سن}{سن}) \times ١٠٠ =$$

$$100 \times (\frac{٢٠}{٤٠} + \frac{٦٠}{٩٠} + \frac{٤٠}{١٢٠}) \frac{١}{٣} =$$

$$100 \times (٠,٣٣٣ + ٠,٦٦٧ + ٠,٥٠٠) \frac{١}{٣} =$$

$$٥٠ =$$

ويكون $م_{,٠} = ٥٠$ (وذلك بقسمة الرقم القياسي على ١٠٠)

$$\begin{aligned} \text{اختبار الانعكاس في الأساس} &= م_{,٠} \times م_{,٠} \\ &= ٠,٥ \times ٢,١٦٦٧ \\ &= ١ \neq ١,٠٨٣٤ \end{aligned}$$

∴ الرقم القياسي النسبي البسيط لا يحقق خاصية الانعكاس في الأساس.

(٦ - ٥ - ٢) اختبار الانعكاس في المعامل
من المعلوم أن القيمة لأي سلعة (Q) = السعر \times الكمية
أي أن

$$Q = S \times K$$

فإذا كان لدينا أسعار مجموعة من السلع معلوم لها كمياتها، وحسبنا الرقم القياسي للأسعار واستبدلنا في هذا الرقم سعر كل سلعة في فترة معينة بكمياتها في نفس الفترة، وكمية كل سلعة في فترة معينة بسعرها في نفس الفترة، فإن الرقم القياسي الناتج يسمى البديل في المعامل. وتنص قاعدة الانعكاس في المعامل بأن حاصل الضرب للرقم القياسي للأسعار في البديل المعامل له يساوي الرقم القياسي للقيمة (وذلك بقسمة الأرقام السابقة على ١٠٠).

وعلى سبيل المثال الرقم القياسي التجمعي البسيط للأسعار مجموعة من السلع

$$= \frac{\text{مج. س.}_1}{\text{مج. س.}} \times 100$$

$$\text{البديل في المعامل لهذا الرقم القياسي} = \frac{\text{مج. ك.}_1}{\text{مج. ك.}} \times 100$$

ويكون الرقم القياسي التجمعي البسيط لهذه المجموعة من السلع = $\frac{\text{مج. ق.}_1}{\text{مج. ق.}} \times 100$

الرقم القياسي \times البديل في المعامل = $\frac{\text{مج. س.}_1}{\text{مج. س.}} \times \frac{\text{مج. ك.}_1}{\text{مج. ك.}} = \frac{\text{مج. ق.}_1}{\text{مج. ق.}}$
(وذلك بعد قسمة الأرقام السابقة على ١٠٠)

ولقد وجد أن الرقم القياسي الأمثل هو الوحيد الذي يحقق خاصية الانعكاس في المعامل، وكذلك خاصية الانعكاس في الأساس، ولذلك سمي الأمثل.

مثال (٦)

المجدول التالي يبين أسعار ثلاثة سلع أ، ب، ج، وكذلك كمياتها في كل من عام ١٤٠٥هـ للمقارنة، وعام ١٤٠١هـ للأساس.

جدول (٦ - ٤): أسعار ٣ سلع في عامي ١٤٠١هـ و ١٤٠٥هـ وكمياتها

السلعة	س. ك.	ك.	س. ك.	س. ك.	ك.	س. ك.	ق. = س. ك.
أ	٤٠	٦	٢٤٠	١٢٠	٨	٩٦٠	
ب	٦٠	٨	٤٨٠	٩٠	١٦	١٤٤٠	
ج	٢٠	٤	٨٠	٤٠	١٢	٤٨٠	
المجموع	١٢٠	١٨	٨٠٠	٢٥٠	٣٦	٢٨٨٠	ق. = س. ك.

ومن المجدول يمكن حساب المقادير التالية:

$$\text{الرقم القياسي التجمعي البسيط للأسعار} = \frac{\sum \text{س. ك.}}{\sum \text{س.}} \times 100$$

$$= \frac{100 \times 250}{120}$$

$$= 208,33$$

$$\text{الرقم القياسي البديل في المعامل} = \frac{\sum \text{ك.}}{\sum \text{ك.}} \times 100$$

$$= \frac{100 \times 36}{18}$$

$$= 200$$

$$\text{الرقم القياسي التجمعي البسيط للقيمة} = \frac{\sum \text{ق.}}{\sum \text{ق.}} \times 100$$

$$= \frac{100 \times 2880}{800}$$

$$= 360$$

بقسمة هذه الأرقام القياسية على ١٠٠ نحصل على
 $3,6, 2, 2, 0, 833$

فإن اختبار الانعكاس في المعامل = الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار
 \times الرقم القياسي البديل في المعامل
 $4,166 = 2 \times 2,0833$
 $3,6 \neq$

أي أن الرقم التجميعي البسيط لا يحقق خاصية الانعكاس في المعامل، وبالتالي نفس الخطوات لباقي الأرقام القياسية المختلفة نجد أن الرقم القياسي الأمثل هو الذي يحقق خاصية الانعكاس في المعامل.

(٦ - ٦) تمارين

١ - الجدول التالي يوضح متوسط الأجر الأسبوعي بالريال للعمال في بعض الصناعات في الأسبوع الأول من محرم عام ١٣٩٢هـ ، ومحرم عام ١٣٩٥هـ .

الأجر الأسبوعي لعمال بعض الصناعات في عامي ١٣٩٢ و ١٣٩٥هـ

الإسم	الاثاث	الملابس	المشروبات	المواد الغذائية	السنة
١٣١	١٣٧	١١٧	١٢٩	١٣٤	١٣٩٢
١٣٧	١٦٢	١٤٥	١٨١	١٦٩	١٣٩٥

المطلوب:

حساب رقم قياسي بسيط لأجور العمال في عام ١٣٩٥هـ بالنسبة لعام ١٣٩٢هـ كسبة أساس في الصناعات المذكورة على طريقة القياس للأسعار وذلك بطرفيتين مختلفتين.

٢ - الجدول التالي يمثل بيانات الأسعار بالريالات، وكميات ثلاثة سلع في إحدى البلدان.

أسعار ثلاثة سلع وكمياتها في عامي ١٩٥٠ و ١٩٥٥

الكمية		الأسعار		السلع
١٩٥٥	١٩٥٠	١٩٥٥	١٩٥٠	
١٠٠	٩	٩,٥	٤,٨	فم
١٢	١٠	٦,٨	٣,٦	أرز
٥	٣	٥,١	٢,٧	شعير

أوجد ما يلي :

- ١) الرقم القياسي لكل من لاسبير وباس والأمثل لفيشر.
- ب) اختبر خاصية الانعكاس في الأساس، وفي المعامل لكل من الأرقام القياسية السابقة.
- ٣ - أثبت جرباً أن الرقم القياسي للأمثل لفيشر يحقق خاصية الانعكاس في المعامل، وكذلك خاصية الانعكاس في الأساس أيضاً.
- ٤ - أسعار ثلاثة سلع استهلاكية أ، ب، ج من عام ١٩٧٧ م حتى عام ١٩٨٢ م في إحدى البلدان معطاة كما يلي :

أسعار ثلاثة سلع في الأعوام من ١٩٧٧ م حتى ١٩٨٢ م

سعر ١٩٨٢ م	سعر ١٩٨١ م	سعر ١٩٨٠ م	سعر ١٩٧٩ م	سعر ١٩٧٨ م	سعر ١٩٧٧ م	السلعة
١٦	١٦	١٥	١٣	١٣	١٢	أ
٢٠	١٩	١٩	١٨	١٨	١٧	ب
٣٥	٣٣	٣٤	٣٣	٣٣	٣٢	ج
٧١	٦٨	٦٨	٦٤	٦٤	٦١	المجموع

احسب الرقم القياسي البسيط باستخدام الأساس المتحرك لمدة عام وذلك للأسعار عام ١٩٨٢ م بالنسبة لعام ١٩٧٧ م وقارن هذا الرقم القياسي بالرقم القياسي للأسعار عام ١٩٨٢ م بالنسبة لعام ١٩٧٧ م وذلك باستخدام الأساس الثابت.

٥ - الجدول التالي يوضح الإنتاج وسعر البيع في إحدى المصانع لثلاثة أنواع من السلع أ، ب، ج.

أسعار ثلاثة سلع وكميات انتاجها في عامي ١٣٩٦ و ١٣٩٨

عام ١٣٩٨		عام ١٣٩٦		السلع
الإنتاج	السعر	الإنتاج	السعر	
٨٢	٦١	٧١	٦٢	أ
٩٣	٦٥	١٠٢	٦٣	ب
٧٧	٦٦	٨١	٦٢	ج

باعتبار كمية الإنتاج هي مقياس لأهمية السلعة. أوجد الأوزان المرجحة لكل من السلع أ، ب، ج. ثم استخدم هذه الأوزان في حساب الرقم القياسي النسبي لكل من لاسبير وباش والأمثل لفيشر.

٦ - إذا كان متوسط أجر العامل في السنوات من عام ١٣٨٧ م إلى ١٣٩١ م في بلد ما هو كما يلي ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣٠ ريالاً في اليوم والأرقام القياسية للأسعار هي على التوالي ١٠٩ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٠. فاحسب متوسط أجر العامل بأسعار عام ١٣٨٧ م.

٧ - في إحدى الدول المتقدمة كانت الطاقة الكهربائية المباعة بيليين الكيلووات/ساعة كما في الجدول التالي:

كميات الطاقة الكهربائية بالكيلووات / ساعة المباعة في الأعوام من ١٣٨٧هـ حتى ١٣٩٢هـ

السنة	١٣٩٢	١٣٩١	١٣٩٠	١٣٨٩	١٣٨٨	١٣٨٧	طاقة الكهربية بليون كيلووات/ساعة
	٧,٢	٥,٥	٤,٥	٣,٥	٣,٢	٢,٦	

- عبر عن البيانات باستخدام مناسبات الكمية مستخدماً سنة ١٣٨٨هـ كسنة أساس.
- في عام ١٣٩٠هـ زاد سعر سلعة ما بنسبة ٦٠٪ عن سعرها في عام ١٣٨١هـ بينما انخفضت كمية الإنتاج بنسبة ٣٥٪ ما هي النسبة المئوية للارتفاع أو الانخفاض من القيمة الإجمالية للسلعة في عام ١٣٩٠هـ بالنسبة لقيمة في عام ١٣٨١هـ؟