

راصة في المخ

طالما نسخ ونقرأ عن غرائب سير الرصاص الذي يطلق من عيارات ثانية في جسم الآنان وأعضائه الحيوية وخروجهما أو يقائها فيه بدون أن تُبَدِّل ادنى ضرر أو تأثير في الجسم . ومن هذا التبليغ أذكر حادثة شamedها بضي اخيراً فانها لا تخفي من فائدة وفكرة القراء

منذ خمسة أشهر تقريباً حضر الشاب (. .) ماتشياً سافة نصف مائة من منزله إلى أجزاء خالفة الملايل في الموسكي للحاجة وهو يشك من دوخان وألم في رأسه من دخول رعامة في قتيه من مسدس اطلق عليه خطأ في الليلة السابقة . وبعد الكشف على الجرح وجدت اثراً تزف دموي شديد على الرأس والجبهة وحيث لم أتمكن في الأجزاء خالفة من فحص الجرح مع الأجزاء الاحتياطية اللازمة خذ الفحنة كا يبيغي اخبرته ان يوجه للعيادة وعند حضوره خصت محل الامابة وتحقق ذلك بالفحص وجود جرح ثقي عمقه نحو ٢ مني خارقاً فروة الرأس والجمجمة والأذية والمخ . وعند ادخال الجفن حصل تزف شديد وكان الجفن مكتوحاً في محل الجرح والأغشية توقيع وتتفقد مع ضربات القلب وحصل له إغماء قليل فاكتفيت حينئذ بخطير الجرح جيداً وربطه بدون انت انت على حقيقة الحالة وعلى محل وجود الرمامة . و بما ان المريض لم يقبل لصيق بيوجوب دخوله إلى أحد المستشفيات ليكون تحت المراقبة ولاجراء عملية جراحية لرفع العظم الضاغط على المخ واستخراج الرمامة عند ظهور علامات اذا امكن على تلك مدة يومين او ثلاثة في منزله إلى ان تتمكن من ايقاف التزف ثم فضلت اخذ رسم الججمة باشعة روتين على ادخال الجفن ثانية للاستدلال على محل الرمامة . وبعد اخذ الصورة وجدت ان الرمامة قد انكسرت عند دخولها إلى فتحة العين القسم الواحد وهو الاصغر بيقي هذه في الجرح والقسم الثاني وهو الأكبر خرق عظم الرأس والمخ وبقى داخله كما يظهر جلياً من الرسمين المقابلين . فاستخرجت القطعة التي عند في الجرح مع قطعة عظم متصلة من الججمة بواسطة تكبير الجرح قليلاً ومحبها بالجلف فقط واما القسم الثاني من الرمامة فلا يزال للآن داخله في مع الثاب المذكور مع ان الجرح للدشني تماماً . وعما يتحقق الذكر ان في كل هذه المدة لم يظهر اقبال علامة عصبية كتشنج او شلل وعا اشيه وهو الآن يتعاطى اشغاله كالعادة ب تمام الصحة والرمامة داخل عنه . وهذا مما يثبت انه ليس بـ في مقدم المخ وظيفة مهمة

الدكتور هلال فارسي