

باب الزراعة

الارز واصنافه الزراعية

هـ توطئة الارز من بين محاصيل الحب اي الفلال جميعها يمتع اعظم محصول في العالم اذ يقدر متوجة النروي بنحو مائتين وعشرين مليون كيلو جرام من الارز غير المنشور (الارز الشعير) الذي يعطي مقدار علوي اكبر من مائة وعشرين مليون كيلو جرام من الارز المنشور . وهو يتفوق القمح ولا يوجد غذاء آخر للانسان يتناسب بذلك مقدارها والارز يقوم بتنمية اكبر عدد من النوع البشري . والناس يعيشون عليه وحده اكثراً مما يعيشون على اي غذاء آخر . وهو معتبر عند ثلث سكان الارض اعظم غذاء يقوم باودمه . ولا يزال كاسكان منذ ازمان غالبة غذاء معظم سكان الصين والهند واليابان وماجاورها من البلدان والجزر

هـ الاصناف الزراعية ان اصناف الارز الزراعية المصرية مختلف في مقدار الزمن الذي تتكاثر في الارض من وقت بذرها الى انت تدرك بلوغها وينضج حبها . كما انها تتفاوت في مقدار غلة الحب باعتبار الفدان قبل تثمير الحبة وازالة قشرتها وبعد الازالة وفي جودة الحبة وقيمة كل صنف ودرجة الاقبال عليه في التجار وغير ذلك من الوجوه الزراعية الاقتصادية

والارز المصري يمكن تقسيمه الى قسمين :-

- (١) قسم لا يطول مكثته في الارض فلا يزيد على ثلاثة اشهر
- (٢) قسم يطول مكثته في الارض فمكث بها من ثلاثة اشهر ونصف او اربعة الى خمسة اشهر ونصف او ستة

واصناف الارز المصري تتفاوت ايضاً في زمن زراعتها ، فتها ما يزرع زراعة صيفية وهي الاصناف التي يطول عمرها في الارض . ومنها ما يزرع زراعة نيلية وهي الاصناف التي لا يطول مكثتها في الارض ويظهر ان اصناف الارز المصري لا تساوى كلها في مكثتها بحسباً لما يدلل على ظاهر من الكوادن والنبعات او الطفر

وقد اتجهت الاتجاه حديثاً إلى ادخال بعض اصناف من الارز الاجنبي لزرعها بمصر أكثرها من اصناف الارز الآسيوية مما اشتهر في بلاد الصين واليابان والمند وفارس. ولا تزال كلها في دور الاختبار ولم يظهر للآن في سوق المخافية مع الاصناف الوطنية الأقليل منها كالجمجي والياباني . ولقد ادخل بعض الارز الامريكي وغيره ولم يحصل منه للآن على نتائج نهائية

واليك أشهر الاصناف المصرية : -

- (١) **الطلائني** - اعتاد فلاحو بعض جهات الوجه البحري لاسمها فلاحوا مدبرية الجبيرة اصناف الارز عين البنت المعروفة من قدم بطول مكثها في الارض باسم الارز السلطاني هو يطلق الآن على الارز « عين البنت » او الارز « الفتى » بوجه عام
- (٢) **الارز عين البنت الخفيف** : - هذا الصنف من الارز قصبة متذلل الطول (ارتفاعه ٣٠ سم تقريباً) اقصر من الفينو واطول من الياباني وخصة لونه فاتحة وجذوره أقل من جذور الينتو وورقة عريضة طولها بها ستة هرائق متقدمة ظاهرة والبنية طولها (٢١ سم تقريباً) متذلة اقل كثافة من بنية الفينو بها حلقة من وبر ابيض عند مخارج الذق وفروعه (ثانية او غير ثانية) وشكلها قصير والنها اخر مستقيم لا يحافظ طبيعياً يبلغ في الطول نحو ٦ سنتيمترات . والحبة صفراء بيضاء (اي يفاء عرقاً) ليست عظيمة غير شفافة عليها مسحة من الاحمرار بها اسنة واضحة وعلى سطحها اشتها شعر دenser بغير قصبه والبنية اخارجيتان المتذدينان عند قاعدة الحبة لونهما اخضر باهت او اخضر باهت اقرب الى لون الحبة والحبة مسنة متذلة الطول ($\frac{1}{2}$ متر) والعرض (٣ ملليمترات) وهي بعد ازالة قشرتها في عملية التبييض يشاهدها صبغة الجسم متوسط اللمعة وهذا الارز صنف من الطلائني ينبع اصناف الارز الأخرى في جودة طم سبتو في الاكل لا ينادي سوى زميله عين البنت الاكل قد قلل زراعته في الوقت الحاضر كثيراً وحل محله الينتو فما يرجع لا يرجع الا في جهات من الجبيرة والغربية لاجل الطلبات الخارجية

وهذا الارز يسمى احياناً « بكت البنت » وبمعنى ارضًا خصبة . وهو يتحمل العطش ويتحمّل في الأرض الشديدة يكون محصوله لذلك ضئيلاً نسبياً . وهو سريع الاقتراء بشغل الأرض من ٦ أشهر الى ٢ أشهر ويحتاج الى التكثير بزراعةه ومحصوله اقل من محصول للينتو فهو الربيع وصيفه بعد عملية التبييض من كيلات الى $\frac{1}{2}$ من كل ١٢ كيلو

(٣) الارز عين البنت الاكل : — هذا الصنف من الارز هو ثانٍي اصناف الارز السطاني يشبه كثيراً زميله عين البنت الخفيف ويتميز عنه بات سفانة سراء رائفة مقوسة مرة او مرتين قصيرة تختلف في قصرها (من متر الى ٢٢ متر) والعلبة سراء عمرة قليلاً عليها احياناً بقع حراء داكنة طولها ٦ مليمترات وعرضها ٣٥٥ المتر، والقنايع لإغارجية المتعددة حراء وقد يتراوح اطوالها احياناً وبقى مكانته نبوء . والسبلة مقوسة . وورقة هذا الارز متوسطة الطول والعرض وهو كريبل في المكث بالارض وتتحمل العطش ، واسكان شجاعه بالارض الشعيبة ونقعن محصوله بها وسرعة انتراط جبتو . وهو يحتاج مثله الى ارض خصبة كما يحتاج الى التبكيك بزراعته وجبة بعد الفرب والتبييض يضاف . صغيرة لامبة

(٤) الارز الغل : — كان معدوداً ضمن اصناف السطاني ويعتبر اقدمها عند الاربع المصري . ويراء بعضهم انه اصل السطاني عين البنت المعروف في الزراعة وانه نفع منه ولم يتم دليل اكيد على صحة هذا الرأي للآن . والورقة طويلة عريضة وبالسبلة متعدلة تقريباً وجبة هذا الارز حراء مبيضة . وسفانتها يضاف مسقمة .اما الحبة المشورة لحراها (لانتعدي حمرتها الفطام الشري) صغيرة تزال حمرتها او تخفف بزيادة المرس في عملية التبييض وهي متوسطة الحمة . وهذا الصنف يمكن في الارض كباقي اصناف السطاني وهو قليل الوجود في الوقت الحاضر . يظهر تكتيش بين الاصناف الأخرى

(٥) الارز الشيدي : — ويصاد به في الوقت الحاضر الارز الشيني اما الرشدي المخصوص فنارة عن الارز عين البنت الخفيف او الاكل المزروع والمشور بجهات رشيد . وهذا الاسم يطلق في التجارة

(٦) الارز الشيني : — هذا الصنف من الارز يكروه في اول ثأثيره غبيف القصب والبلذور ثم يشد فيها بد ويفرقى فطول قصبه من قصب غيره من الاصناف الأخرى (طوله ١٤٥ متر) ينظم جسمه ويضع ورقة وتكثرة ندوره بما يخرج من الكعبون التي باسئل اللهل من جذور عارضة ترقى الاغماد الورقية وتضرب في الارض

ورقة هذا الارز كبيرة عريضة في صفحتها تسعه عروق متوازية واحدة والسبلة مقوسة طويلة (أطولاً ٥ سنتيمتر) منتشرة كثيفة بها حلقة ويراء صوبية يضاف عند مخارج العذق ومخارج فروعه (حلقة ثانية او غيرها مة حول العذور) والقنايع الهرة سافية لها سفانة حراء يختلف طولها من $\frac{1}{2}$ متر الى متر الى مترتين الى ٣ مترات الى ٨

تساقط طبيعياً فيق في قمة الناتج الورمية المتعددة حول الجبة تتواء احمر والسناء محببة غير مستقيمة حمراء اللون والجبة صفراء (اي يضاء عرقاً) بطرقها الاعلى حمراء او سبورة وكذلك يحيط المقادير الناتج احياناً كا يوجد احياناً على السطح الجانبي للجبة نقط والقبعات انخارجيتان المستديمان عند قاعدة الجبة لونهما حمراء باعت او سمر باعت الرب الى لون الجبة ، والجبة سنة اهلية محببة قلباً احياناً متعدلة الطول (طولها ٦٥٥ المتر) (وعرضها ٣٥٥ المتر) استثنى واخفجه ويقطع سطح الجبة وعيورها (استثنى) وبر اصل قصير مبخر ، والجبة بعد ازالة قشرتها في التبييض يضاء صفرة لامعة وهذا الارز يكث في الارض غفوة شهر الى سبعة وينتاز عن غيره بتحمله العطش وصبره على شح الماء وقلقه ويهودته في الارض الضعيفة ووفرة محصوله وفرة لا ينابيع فيها سوى الياباني المزروع في ارض خصبة وهو من الانفراط والدراس يحب التكثير يزرعه ، وهو يصنفي في التبييض غفوست كيلات وكور من الجب المتشور من كل ١٢ كيلو من الجب غير المتشور . وجبة هذا الارز جيدة الطعم تعلق في ذلك على كل اصناف الارز المصري ما عدا الارزين عين البنت الذين ينوقانه والارز الذين اهله متقد من الاذى عن البنت

(٢) الارز الياباني : - يوجد في هذا الصنف الياباني الاسهل او الاسهل الياباني الاقرع

الياباني الاسهل الامر قصبة قصير اخضر فاتح نحيف الجذور ورقته متوسطة الطول والعرض ، لها اربعة عروق مستقيمة متوازية ، سبلكة طوبية لونها مقرضة الصر من سبلة زميله بالخواص سبعة متباينات واكثف منها ، عشكالها اقصر ، ويوجد لدى مخرج عذقة حرشفة دقيقة غشائية رعنية حادة ، شفافة في جزئها الاعلى غير موجودة في الصنف الياباني الآخر وهذا العشكال مختلف برو ایض للليل اما مخارج فروع عذق السنبلة الدالية فتحيط بها حلقة من وبر ایض قصبة كثيف نوعاً ، والناتج سافية ، يختلف صناعها في الطول من متر الى مترین الى ٣ مترات الى ١٠ يساقط طبيعياً ويقع مكانه تتواء صفرة ، والسناء محببة غير مستقيمة لونها كلون الجبة . والجبة صفراء ، صفرة ، ذهبية ، رائفة ، مشببة ، متعدلة الطول طولها ٢ متر ، عريضة عرضها ٣٢٥ مترات واستثنى واخفجه في وسط الجبة والاسنة مخطأ بشعر ایض غير كثيف اكثراً ظهوراً في الجهة العلوية من الجبة . والجبة بعد التبييض يضاء صفرة لامعة

وهذا الصنف يوجد مختلطًا مع الصنف الياباني الآخر في الزراعة وهو كثير الحصول أما الصنف الثاني وهو الياباني الأقرع فقصبه قصير أصغر اخضراً ناتج جذوره ذهبية ورقته متوسطة الطاول والعرض لها أربعة عروق مستقيمة متوازية سبائك دالية مقسمة قليلاً عليها حلقة من وبر قليل أحياناً عند مخرج عذقها وفروعها فرعية غير ساقية جبطة صفراء صفراء ذهبية رائفة كثيرة كثيرة مثبتة متطاولة طولها ٧٥٥ المتر متعدلة العرض عرضها ٣ مليمترات اسنتها وأصبعها وسطعها مع سطح اسنتها مغطى بوبر أحياناً قصير كثيف لا سيما بالجزء العلوي منها والملبة يضاف بعد تشرها في التبييض صفراء لامعة وهذا الصنف يوجد في الزراعة مختلطًا مع الياباني الاسميل أي الاسم يبلغ طول قصبه مع سنابله نحو ٨٠ سنتيمترًا له من الكعوب الواضحة لون وجه الأرض ثلاثة يمتد أحدهما عن الآخر يخرج بعد بلوغه سنتين حديثة (فراخاً جديدة) من كدوه السنبل التي توجد عندما الجذور اليابانية تفتق الأغداد الورقية الناعمة وترتفع فوق وجه الأرض

(٨) الأرز الاتجادي أو المتخمر: — هذا الصنف من الأرز حديث سمي بذلك نسبة إلى شركة الاتجادي الفناري التي أخرجته إلى حيز الرجود بواسطة الاتجاد الصناعي ويظهر أنه كودون طبيعي أو نبتة من الأرز السعبيني سبائك مدلاة بها حرشفة غشائية جبطة اللون عند مخرج عذقها وبصلة من الورق قليلة جداً عند مخرج فروعها والنبتة كثيفة نوعاً طولها ٢٥ سنتيمترًا والملبة مثبتة طول القعر بصلة مبيضة غير شفافة اسنتها وأصبعها وسطعها اسنتها طيء شعر أحياناً كثيف وسنابها غبطة نصيرة جداً (من متر إلى متران) تسلط طبيعياً وبقائق توء مكابها ويوجد احياناً على سطح الملبة بعض صفراء صفراء سوداء مبعثرة . والملبة بعد التبييض يضاف متوسطة الحجم أشيه بمحبة الياباني وأ衾ن منها متوسطة الملسان

وهذا الصنف أخذ ينتشر بين اصناف الأرز المصرية في السوق وهو يحتاج إلى أرض أرضًا أقوى معدلاً من أرض الياباني وورقة أطول وأعرض من الياباني . يزرع صيفاً مادة ويُركث نحو ٣ أشهر ونصف إلى ٤ أشهر في الأرض

(٩) الأرز السعبيني: — هذا الأرز هو أرداً الأصناف المصرية قصبه قصير أقصر من الياباني . سبائك مقدمة مدلاة ، جبطة مسطحة ظليلة مبيضة شفافة أقل حجماً من جبطة الياباني سائية أو غير سائية يضاف اللون مغيرة مخمرة قليلاً بعد التبييض يزرع كمحصول نيلي يشغل الأرض مدة شهرين ونصف شهر إلى ٢ أشهر يزرع على الأذهار

للاعنة على الاصلاح في الاراضي الملحية نظراً لمقاومة مدخلح وانصرافه كثيف في الارض واحتياجه إلى الماء الكثير الذي يحيى الارض ويصلحها بالغسل . وهذا الارض يتهلك بواسطة الفلاحين في غذائهم وغذاء دجاجهم وتصنيعه في البيض ٣ كيلات ونصف كيلو من كل ٤ كيلو (١٠) اليومي المتاد : - لهذا الارض سبلة عليها وبر خفيف ایض عند عزازج الطبق وفروعه وستابلة متفرج بعضها عن بعض قليلاً متعدلة الطول (١٨ سنتيراً) سالية والسناء مسودة داكنة معوجة في النالب ثلاث مرات تقريباً . بلغ طولها نحو ٤٥ سنتيراً والحبة يخاه خصبة عظيمة شفافة متباعدة اميليجية . ومحظها مع سطح استنبتها الواضح مقطعي بور قصیر ایض خفيف . بمثقب قصیر وطويل الحبة ٥٥ المتر متعدلة العرض .

وهرسها ٣٦٥ المتر ، وهو يزرع بالبيوم لاسيا بير كراطا

(١١) الارض النبوي الايض : - وهذا المتن من الارض قصبة طوبيل (١٢٠ سنتيراً) خضراء فاتحة وورقة متعدلة الطول والعرض لها تسمة صروق مستقيمة متوازية واضحة على السطح الملوى منها وحافة الورقة منشارية شائكة ومحظها شائكة اما المطلع الاسفل فامثل ما عد الحافة

والبنية فتحية ولصيرة وللتسبة سفاه يخاه طوبيلة بلغ طولها نحو ٢٥ مليراً مستقيمة في حبوب الصحف الملوى من البنية . ومحظها احياناً افنا . قليلاً في فاعدمها بمحبوب الجزر الاسفل من البنية وهي لا تساعد طبيعياً والحبة خصبة استنبتها واضحة مقطعي محظها بور قصیر ایض بمثقب فوق الاستنبطة وستاند الورق واطوله عند قمة الحبة ولون القبيعين المازجيين تكون الحبة بل انفع قليلاً

والحبة متباعدة طولها ٧ سنتيرات . عربية عرضها ٣٥ المتر وهي بعد ازالة فشرتها خصبة بيض لونها اذا ما هرمت كثيراً في عملية البيض

وأكثر ما يزرع هذا المتن في محبيات القبور حيث لم يحونه بالسبعيني لكنه في الارض نحو ٣ اشهر وهو يزرع نيلياً وبعذى عليه الفلاحون على الاكثر دجاجهم

(١٢) الارض الجنوبي : - وهو اقرب الى الارض السابق غير ان سبلة طوبيلة طولها ٢٥ سنتيراً خصلتها الوربة التي عند عزازج فروعها غير واضحة كما في السابق والسناء باهنة اللون طولها ٣٣ سنتيرات الى ٣٦ سنتير طوبيلة مقوسة مرتين او اكثير . والحبة متباعدة اميليجية مقوسة من جانب اكثير من الآخر استنبتها واضحة ومحظها سطحها استنبتها مقطعي بور قصیر ایض بمثقب والذي عند القمة طوبيل والحبة متعدلة (الطول

٦١ مثمرًا) عريضة في ثمنها الأعلى معتدلة المرض ٦٢٥ ظهر صرامة باعنة مائة إلى الحضرة قبلاً أحياناً

(١٢) الارز الصيفي : — وهو صنف من الارز يشبه الياباني الاقرع سبكة مدللة لا مقروسة كنبيلة الياباني جبنة يضاء والحبة بعد التبييض أكبر من حب الياباني اشد ياضاً من حبة الاتحاد قليلة اللعان والنبات ورقه طوبيل هر يرش يتنج في الاراضي الغصينة ويزرع قليلاً

العمي : — سبكة مقوسة عديمة السن والحبة سمراء داكنة باطرافها سواد مع احرار والتقطيعان اخارجيتان لونهما اسمر مع الاحرار . والحبة بعد التبييض يضاء سفينة اقل الجلنج لاماً . وورقة النبات متوصطة الطول والعرض . وهذا الصنف مرغوب فيه عند الفارسيين الموجودين بصر خواص جيتو ورامختها في الاكل

البخاري : — واظب عليه بلا سنا ويوجد منه ما له سنا والحبة يضاء متطلالة رقيقة تكون بعد التبييض يضاء وحراوة ولها رائحة خاصة في الاكل ولطلا بطيئة الحجم دون غيره

البني : — قببه قصير قابعة غير سافية جبنة يضاء ويكت في الارض من ٣ اشهر الى اربعة شهور وبلى عين البنت وغيره في مقدار المحمول ولكن يفرق في ذلك البعمي اما من حيث مقدار الصافي بعد التبييض فيتفوق البعمي وبذر عين البنت وغيره وهو اجهود بين البعمي واقل من الياباني وغيره والاقبال عليه في السوق أكثر من البعمي واقل من الفينو وعين البنت والياباني وجبنة بعد التبييض تكون يضاء

الحدادي : — وهذا العنف يظهر من نفسه غريباً بين الاصناف الأخرى في

الظهور له سنا اسود لامع وجنته خضراء مشببة بالسواد وتكون بعد التبييض يضاء

الياباني نوباري : — صنف قليل الزراعة محدودها جبنة سمراء محمرة هي وسفناها القصير الشاطئ تكون الحبة بعد التبييض يضاء ويكت في الارض اربعة الشهور ونصف شهر الى ٥ اشهر

المندي : — صنف مختلف من المند حديثاً قليل الغلة اكثر زراعته بجاجية مصنفة بمرکز رشيد قليل الظهور في الاسواق سريع الانفراط والدراس ويكت في الارض ٦

أشهر واجياناً ٧ اشهر وهو ذو سنا ابيض سهل الاتصال او عدم السن جبنة يضاء سمراء وتكون بعد التبييض حراوة داكنة والحبة متطلالة متبعجة ربعة

الارز المزلاوي : — حدوث الظهور كثير الشبه بالياباني بسيء في التجارة باسم

الياباني عدم السنا سبب اطول من الياباني وحياته اكبر وبناه اطول وهو اسرع انتراطًا يشغل الارض من اربعة اشهر الى ٤٠ شهر واجود اصناف الارز في الاكل هي هين البت ويليه البنو فالبعجي فالباباني فالمندي فالنيري (وقد يخلطا ساق في الفرب) فالبعجي فالبغاري الذي يستعمله الفرس كثيراً .

حصاد المزارعين

كانت الحكومة الاميركية قد عزمت على حماية زراعي القطن بايجاع جانب كبير من قطنهم لكن الرئيس كولورج لم يوافق على ذلك لكن لا يودي ارتفاع سعر القطن الى التوسع في زراعته في بلدان اخرى لكن كثرين من اكبر الكتاب والباحثين في اميركا يخالفونه في ذلك ويشرون باشاء ادارة خاصة تبني باسم الحالات التي تصدر من البلاد حتى يرقى منها ربح كافي لاصحابها كما فعلت الحكومة الانكليزية في الكارتوك لات الفلاح غير قادر على ذلك وتنابات الفلاحين مما قررت لا تستطيع ان تضرس لسائل الدولة التي لتناول الحالات الكبيرة كالقطن والقمح . نعم ان ديوان الزراعة باذله جهوده فيها يعود بالربح على الفلاح ولكن لا يزال امامه باب واسع للربح ولا بد له من ولو جر عاجلاً او آجلاً . هذا ما يقوله كبار المفكرين من الاميركيين . فان كان الفلاح الاميركي محتاجاً الى حماية حكومته فالفلاح المصري لا يستطيع ان يعارض سبيل التجار والمغاربين الا اذا حدثت حكومته

موسم القطن المصري

لم نعلم حتى الآن ماحظ الاطيارات التي زرعت قطنها هذا الموسم لاد تحديد الزراعة بثلاثة اقسام لا تعي ان الزمام كان نصفاً فصار ذلك لأن جانبي من الاطيارات كان يزرع تلك فقط او اربعين في المائة على الاكثر فاذما بلغ الزمام مليوناً ونصف مليون من الافدان ومتوسط محصول الفدان اربعة فناطير بلغ الموسم المتبقي ستة ملايين فنطار اي اقل من المقطوعية ولا سيما بعد ما قيل القطن الاميركي الطويل الشعرة بسبب النيفان فيتفقد جانب كبير من مختلفات الموسم الحاضر واذا استمر تقييد الزمام بالثلث سنين اخرین انتعش القطر واسبرد ما خسره في العام الماضي . ونظهر قاعدة تقييد الزمام من الفرق الكبير الان بين

سر المصري والاميركي ولو لا هذا التقييد لكان الفرق بين السعرين طفيفاً جداً كما كان غالباً

موسم القطن الاميركي

لم يعلم حتى الآن عدد الأفدنة التي زرعت قطنًا في اميركا ولكن يظهر من ارتفاع الأسعار وتمسكها أنه لا يتحمل أن يكون مقدارها كذا كان في العام الماضي بل المرجح أنه يتضمن عنده عشرة الى عشرين في المائة وإذا كان فيidan المسيي قد اتفق زراعته باربعين مليون فدان فلا يمكنه يكون الباقى مزروحاً أكثر من ٣٨ مليون فدان فلابد منه منها أكثر من ١٣ مليون باللة لستغرفها المطرورية السنوية وتستغرق أيضًا أكثر مما تختلف من الموسم السابق

مستقبل القطن في اميركا

حدث بعضهم الدكتور رسل سعيد استاذ الجنراليا الاقتصادية في جامعة كولومبيا وأسئلته عما يراه من مستقبل زراعة القطن في اميركا فالجابة رأوا بها الحادثة التالية بلغتى منذ سنوات قليلة وانا ابحث في زراعة الولايات الجنوبية ان اهالي مدينة انديبورن من ولاية الاباما نسبوا نذكاراً لدواء اللوز^(١) التي اختلف القطن الاميركي فكتبوا الى صحة هذه المدينة أسئلته عن صحة هذا النذر فالجوابي بكتاب يقول فيه انما نذكاراً لهذه الدودة في ١١ ديسمبر سنة ١٩١٩ وهو سبيل من البرنز فتشنا عليه ما يأتى (اقام مدا الذذكار لدوادة لوز القطن سكان مدينة انديبورن اعتراضاً صريراً منهم بفضل طلبيم لأنها كانت رائداً لنجاحهم)

«فإن هذه الدودة اتلفت قططاً وتبثت أهل البلاد إلى ما يحيط طلبيم منذ سنة ١٩١٥ فانصرفو إلى زراعات أخرى كالغزلان السوداني . وسنة ١٩١٨ أصدرنا ما نسميه أربعة ملايين ونصف مليون ريال من هذا الغزلان وصرفنا نصف الملايين والثلاثين لتنافر وعندى أن هذه الدودة ستكون الفاصل بين الزراعة الجديدة في الولايات الجنوبية والزراعة الجديدة التي تفتقى البلاد عن زرع القطن

هذا ما نقلهُ المكتب عن لسان الدكتور سعيد وقد رأينا كثيرون من القائلين الاميركيين يقولون ويؤكدون أن زراعة القطن باسعاره الحالية اخسرت بالدين يزدادونه ولو لا فقرم المدفع لأبطلوا زرعة

(١) الاسم الانكليزي متاح خطأ ولكننا جلتنا الدين نرجوه بكلمة دودة