

# مفردات النبات

بين اللغة والاستعمال

لمحمود مصطفى الرباطي

— ٩ —

## الْحَوْخُ

معروف شجره وثمره . قال ابو حنيفة الدينوري الحوخ لفة شامية . وقال ابن دريد عرب الشام يسمون الحوخ (دُرَّاقِين) وقد تشدد الراء وهو المشهور على الالسة وهو معرب سرياني او رومي او فارسي نقله الجواليقي في معرّبه . وأورده جونسون في معجمه . ويقال له بالفارسية (شِفَسَالُو) أو (شفتالود) أو (شفتالوج)

شجرته متوسطة الحجم متساقطة الورق اجزاؤها الخضراوية خضراء اللون داكنة ملساء ورقها كالحذاء مستطيلة صغيرة منشورية الحافة . أزهارها حمراء وردية عديدة الاضلاع تنبت قبل الأوراق او معها من براعم حرشفية على فروع السنة الماضية . اما ثمرتها وهي الحوخة المعروفة فن الثمار الزيتونية ( ذات نواة فيها بذرة ) وذات زغب او ملساء . ولها غلاف سميك غض عصاري شديد الحلاوة وهو ما يؤكل منها والنواة توجد غائرة في الغلاف وعلى سطحها شقوق غير منتظمة وبدانها البذرة ذات فلتين كبيرتين للواحدة منها وجه منبسط والاخر محدب .

اسمها العلمي ( *Prunus persica*, Benth. & Hook. fil. ) ( برونوس پرسقا ) او ( *Amygdalus persica*, L. ) ( اميغدالوس پرسقا ) او ( *Persica vulgaris*, Mill. ) ( پرسقا ) ولغاريس ( وفضيلته الوردية ( *Rosaceae* ) ( روزاسية ) وبالانجليزية ( *The Peach-tree* ) وبالفرنسية ( *Pêcher* )

موطنه بلاد الصين وكان يزرع بها في القرن العاشر قبل المسيح عليه السلام ثم انتقل منها الى جنوب اوريا في اوائل القرن الاول من الميلاد ويزرع الآن عادة في الهند وبنغالستان وغرب آسيا واوربا ومصر . ويشور بزيانها في جبال هيمالايا . وأهميتها الاتقاع بثماره في الغذاء وأهل

الهند يعملون انقلب من شجره طارداً للديدان كما يستعملون خشب الشجر الذي تقدم عليه  
الزمن ولم يمد يجعل شيئاً من الثمر في المباني وغيرها

### الْمَنْجُور

معروف في الغاية النصرية وهو مأخوذ عن الافرنجية أما في الفارسية فيسمى (توزك) أو  
أَنْب ( وهذا الأخير معربة ) ( أنبج )

الشجرة منه كبيرة دائمة الاخضرار ملء ترفع الى ٦٠ قدماً أو ٧٠ في شمال الهند جذعها  
مستقيم قد يبلغ طول محيطه ١٥ قدماً . أوراقها خضراء داكنة في لمس الجلد طول الواحدة منها  
٦ بوصات الى ١٢ كثيرة في اطراف القروع مستطيلة الشكل كالحذاء كاملة الحافة او متموجتها  
غالباً عنقها منتفخ القاعدة . نورتها من النوع النقودي كبيرة قائمة مزعجة قليلاً . زهراتها  
صفراء فاتحة قوية الرائحة . في الثمرة الواحدة زهرات تذكير واخرى حتى . أما الثمرة فيتراوح  
طولها بين ٢ و ٦ بوصات صفراء عند النضج عادة ذات نواة ليفية بسيطة على نوع ما

اسمها العلمي (*Mangifera indica*, B.) (مانجيفيرا إنديقا) ونصبت الباطنية او البلاذرية  
(Anacardiaceae) (أنكاردياسية) وبالانجليزية (The Mango-tree) وبالفرنسية (Mangrier)  
أصل موطنه جزيرة سيلان وانتقل منها الى الهند والآن يمو برتياً في غابات بورما وحيال  
هimalaya ويسمى النوع البري منه (*Mangifera sylvatica*, B.) (مانجيفيرا سيلفاتيكا)  
وبالانجليزية (Wild Mango) وقد انتشر في بلاد أخرى كثيرة كجزائر ملابا والارخبيل الهندي  
وجاوى والبرازيل وأمريكة الاستوائية ومصر والسودان

وتمر المتجود غذاء مهم لعدد كبير من اهالي الهند وأنواعه الجيدة هي المظمة وتكون طرية  
عصارية لذينة الطعم عطرية الزرائحة تؤكل طازجة او ترسب عند نضجها والنسجة منها تخلل او تجفف  
للصباغة او تقطع شرائح وتجفف وتجربها . وفي جاوى يحصل منها على نشا . والهندود ينلون البذور  
ويأكلونها في أيام النضج ويذاوون بها بعض امراض الرحم وقلق الشجر وورقه قابضات  
يتطبب بها ويحصل منها على صبغة صفراء تشمل نادراً . وقد يحصل على صمغ قرمزي  
اللون من جروح قلق الشجر . ويستعمل الخشب وقوداً لاحتراق المولى أو في تجارة الابواب  
والشايفك وبعض القوارب ويستاك بذنيات الاوراق

### التَنْضُب

معروف بهذا الاسم في مصر والسودان للأعراب ويقال له في مصر ايضاً (الحمصبق) وفي  
بلدان أخرى (السداد)

يكون شجيرة أو شجرة صغيرة شائكة يندر أن ترتفع إلى ٢٠ قدماً جذعها قائم يتراوح طوله عيطه بين ٤ أقدام و ٥ وفي السادر بين ٧ و ٨ وهي عديدة الاغصان عديدة الاوراق على وجه عام فلا نشاهد اوراقها الا على الاغصان الصغيرة فقط بسبب سقوط الاوراق الكيرة باكرآ وهذه الاوراق مناه بلا أثناق الواحدة منها في صورة الخرز طولها ١٢ مليمترآ واحياناً تكون ملعقة الشكل طولها ١٢ مليمترآ . واذينات اوراقها عبارة عن أشواك سمرآ وأزهارها حمرآ تضرب الى السرة أو قرمزية مجتمعة في نورة مشطية ونورها كرية الشكل أو بيضية في حجم الكريزة الصغيرة حمرآ عند التفتح تسميها عرب السودان (الحننج)

اسمها العلمي (*Capparis decidua* Pax.) (تاريس سيدوا)

أو (*Capparis aphylla*, Roth. = *Solida decidua*, Forsk.) (تاريس انيلاً =

سوداداد سيدوا) وفصيلته الكبرية (*Capparidaceae*) (كباريداسية)

وهو ينمو في الهند وبلاد العرب ومصر والثوبة والسودان وغيرها وخشب من الطعم يستعمل في الهند والسند في مجارة السقوف وفي صنع الزواوق ومصاصر الزيت والآلات الزراعية وكوقود لاحتراق الدبن (الطوب) في القبان وتؤكل البراعم الزهرية بعد وضها في الحل وتطبخ الثمار المبرجة كما ينضج من الثمار الناضجة والقمحة نوع من الحلل بإضافة الملح والقليل للتصدير أما في السودان فملاوة على اكل اهل الثمار قائم يستعملون النبات في علاج بعض امراض الجلد والمفاصل

## الكبر

أو (اللصاف) محركة لفة في (الأصاف) الواحدة لصفة معروف بهذا في مصر والسودان ويسميه أهل العراق (الكبر). أما عرب فالعرب تسميه (الشقلج) وفارسيته (الشقلج) وذلك اذا انشق وتفتح كالبرعومة ويعرف في مصر أيضاً (بشوك الحمار) و (ورد الحيل)

يكون شجيرة قصيرة متفرعة شائكة تفرش أو تطلق اجزاؤها الصغيرة مغطاة بشعر أملس يضرب الى البياض أو الخضرة لا يلبث حتى يسقط . اذينات اوراقها صغيرة شائكة مفوسة أو مستتعة . اوراقها بيضية الشكل عريضة أو شبه مستديرة لحمية على نوع ما منطاة بشاه شمعي أبيض مناه ذات أثناق . أزهارها بيضاء كيرة جميلة المنظر عرض الواحدة منها ٢/٣ سنتيمترآ الى ٧/٨ توجد فرادى في آباط الاوراق أو تضها سابل جانبية غير مكتظة وفي كل زهرة ٤ بيلات (أوراق الكأس) الثتان الخارجيتان منها اكبر حجماً من الداخليتين و ٤ بيلات

(أوراق التبرج) كبيرة بيضاء وأسدية (وحدات عضو التذكير) عديدة خيوطها طويلة وأشبراتها أرجوانية اللون. ثمرتها بيضية الشكل مستطيلة طولها  $\frac{1}{2}$  سنتيمتر أو أكثر ولها عنق متين يتوسم إلى أسفل عند التضج وتمتدح إلى ثلاثة مصاريع أو أربعة حمرء اللون قانية من الداخل اسمه العلمي (*Capparis spinosa*, L.) (قباريس اسينوزا)

أو *Capparis obovata* or *Capparis aegyptiaca*, Lam. (قباريس اوبواتا أو قباريس ايجيبتاكا) وفصلته الكبريتة أو الصفية (*Capparidaceae*) (قباريداسية) وبالإنجليزية (*Common Caper-tree; The Caper-Bush*) وبالفرنسية (*Caprier epiceux*)

وقد جاء في بعض المراجع ان اسم (*Capparis*) (قباريس) المشتق من (كپسر) (*Kapar*) اسم النبات العربي كما وان اليونانيين اشتقوا منه أيضاً اسم (*Kapparis*) وهو يكثر في جنوب اوربا وشمال إفريقيا وغرب آسيا وجنوبها وشمال اسراليا والهند والسودان ومصر ينمو على الصخور والتلال بمخاضة وزرع في الحدائق لجمل أزهاره وأغصانه الخضراء الطرية كما يزرع لبراعمه الزهرية (*Caper butis*) في جزيرة صقلية وفي البساتين بضواحي مدينة طولون بمجنوب فرنسا بين شجر التين والزيتون ويرب في ضواحي باريس على الجدران المنخفضة فاذا جاء الشتاء رقت أغصانه وغطيت بالتراب لوقايتها من الصقيع

والكبر مرغوب فيه في أنحاء اوربا للحصول على الكبر الاوربي (*Capers of Europe*) المعروف في التجارة كما وان المر والاعنام تحب أكل أوراقه وثمراته الناضجة. وفي ايطاليا تملح الثمار النضجة الصغيرة والبراعم الزهرية من الكبر وتمحظ في الحقل فان كليهما يكون عادةً للأعما كاربياً قبل ذلك. وفي جزائر بحر الروم بالقرب من مدينة طولون تحيي البراعم الزهرية مباشرة قبل بدء فتحها وتفاشها في كل يوم مدى ستة شهور ذلك لان هذا النبات بعدئذ يأخذ في الإزهار فلا ينتفع ببراعمه في صنع تلك المحللات وطريقة ذلك هي ان توضع البراعم في براميل بمجرد جنبها ويضاف إليها ملح وحل بحيث يصرها وكما زيدت البراعم في البراميل زيد مقدار الحل وعند انتهاء فصل حني الكبر يفرغ ما في البراميل ثم تفرز البراعم حسب حجمها ولونها وأحسنها ما كان صغير الحجم شديد الخضرة ثم توضع البراعم بعدئذ في براميل صغيرة أو زجاجات مع حل طازج للأعماج فيها وبذلك تبقى صالحة للاستهلاك في الاكل خمس سنين أو ست والنصر انكيماي الموجود فيها يسمى (*Rutin*) (روتين)

ويوجد نوع آخر من الكبر اسمه العلمي (*Capparis galeata*, Frs.) (قباريس جالياتا) وهو كثير الشبه بالسابق ينمو في وسط إفريقيا وبلاد العرب وغرب الهند والسودان ومصر ومنافعه كالسابق