

مفردات النبات

بين المأهنة والاستعمال

محمد مصطفى الرياطي

- ١٦ -

الأرجوان

والفارسية (أرجوان) وفي الشام يقال له (الزمريريق) شجرة ترتفع من ٦ أمتار إلى ١٠ أورانها تكون فرادى تنسابط الواحدة منها قليلة الشكل مستديرة كالاذن، أزهارها حمراء أرجوانية بوجة مكحلة في خاتمة تبثق حق من انفروع التدبعة قبل إلنشاق الأوراق تبدو الشجرة في جموعها كأنها إكيل أرجوانى وكل زهرة منها على صورة الفراشة وثمرة قرن طوله من ١٣ سنتيمترًا إلى ١٥

اسمها العلمي (L. Lycium) (كركيس سليكونستروم)^(١) وفصيلتها القلبية أو القرنية (Lycium) (ليمونيتوزية) وبالإنجليزية (Common Jumberry-tree) والفرنسية (Gommier abeille du stylée)

وهي شائعة في جنوب أوروبا (إيطاليا) وفلسطين والشام تزرع للزينة ولنظرها الجرافة المقبولة في ظلم أزهارها ووفرة هذه الأزهار على الأغصان كثيراً ما تؤكل في أوروبا ضمن «البلطة» وتحسب هذه الشجرة جيل تحمل عروق سود وخرق وهو قابل للقتل الجيد

الأنثى الكبير

عشب معمر، تنسابط الورق ورقة، ضاعفة التفسيم الريشي الثلاثي يكروها شر حريري المنس تصير ورؤوسه الزهرية (نوراته) متداة الواحدة منها شبيهة بنصف كرة وزهرة صفراء

(١) نيوفر اسطووس هو الذي أطلق اسم كركيس (Lycionstrem) على هذه الشجرة، قبل أنما كانت محبوبة في الأزمان القديمة في حدائق بيت المقدس وأن يعودوا الأماكن بروجي سبب نسخة عليها

اسمه العلمي (*L. Absinthium*) (آرغميزيا ابستھیوم) ^(١) وفصیله المركبة وبالإنجليزية (common wormwood) والفرنسية (grande absinthe ou sauge) وهو شائع في أوروبا وشمال آسيا ووسطها وشمال أفريقيا وهو من نباتات الزينة ونافع في الطب مقوياً ومماداً للتشنج والديدان ومتى استعمل من الظاهر كان حلاً للاورام ومماداً للمفن وقيل إن استعماله مقيد في أمراض القولون (داء الملوكة) والامقربيط (داء الحفر) والاستئصال إلى غير ذلك ومع أن اطب الحديث لا يتوكل على تأثيره في هذه الامراض الا نادرأ فإن له بعض الفائدة في تقوية المعدة

أما الناصر الفعال فيه فهي الابتين (*Absinthium*) ومادة زيتية قابلة للتبلور وزرت طبار خاص به . هذا وقد أوصى بعض الباحثين بالامتناع عن زراعته حينما تربى التحل وقالوا بزرعه منعاً لنشي الحشرات

الإفنتين الصغير

عشب قد يرتفع عن الأرض متراً متساقطاً الورق سعير ورقة ذات شعرات من وجهها السفلي ريشية ، ضاعفته وريقتها على صورة خطوط ورؤوس الزهرية (نوراته) كريمة وزهرته صفراء اسمه العلمي (*L. Artemisia Penticostalis*) (آرغميزيا بونتيقا) من الفصيلة المركبة وبالإنجليزية (*petite absinthe ou absinthe pontique*) والفرنسية (true Roman wormwood) شائع في وسط أوروبا وجنوبها وغرب آسيا وهو من نباتات الزينة أكثر عطرية وأقل مرارة من الإفنتين الكبير المتقدم

اذن المثار الكبير

واليونانية (*συμφύτον*) ^(٢) وقد جاء في بعض المديحات (سفيتون) وهو عشب معمر خشن أقرب شيئاً بالشجيرة جبل المنظر ولذا يسمى من نباتات الزينة جذره درني وأوراقه يشبه الشكل الواحدة منها مستعلية قاعدتها متعددة إلى أسفل وأزهاره يض

اسمه العلمي (*J. Symphytum officinale*) (سفيتوم أو فيفيتالي) من فصيلة لسان التور (الشجرة) (Boraginaceae) (إيراجينائية) وبالإنجليزية (common comfrey or comsonom) والفرنسية (grande consoude; consoude officinale)

(١) أتيل ان آرغیس (*Artemis*) سومن اسماء ديانا (Diana) ربة الغناف فيساطط اليونان وإن هذا النبات سمى آرغيميزيا نسبة لآرغيس المذكور فما كان يجمع عن استعماله من الذهن إلا ما يذكر عند الآباء أما ابستھیوم (*Artemisia absinthium*) فهذا شبه سار انتقاماً من (A) التي قررت في أول السکدة اليونانية بمعنى التي ولدت (psuthothos) اليونانية تبقى سرور وذلك لما في هذا النبات من الخضم الرو (٢) هذا الأسم مختلف من (سفيتون) اليونانية المركبة من كلتي (من حرف جي عجمي) (قبر) لعل يعني بذو اي القوى او الانتقام وهذا لأن النبات في اذن المثار في اذن اذن ٥٣ النبات رقم ٦ ذوي الصلة في الجورج

شائع في أوروبا وغرب آسيا وفي مادة غروبة (mangelage) ولذا قد يستنشق به في الاستعمال عن الحطبي (الخطبية) (*Althaea officinalis*) وجذره يستعمل في الطب البطري على الحصوص كابستعمل دواء دافئاً نلاسم والبواشر آدان الأرانب

ويقال له في مصر (الكليلوب) و(الحيوان) كما جاء في معجم اثنين لوندلر الالماني عشب سني جبل النظر ورقته بسيطة كالماء الماء قاعدتها مكتففة لسانه وزهرته صفراء اسمه الطبي (Bupleurum rotundifolium, L.) (بوليوروم روتونديفوليوم) وفصيلة الصبرانية أو الخبيرة (Umbelliferae) (أو بليفرية) وبالإنجليزية (arrow-wax; ethoongh-wax; buplever; hare's ear) والفرنسية (bupleure; perce-feuille) شائع في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا وشمال أمريكا وهو ليس مهمًا اقتصاديًّا

الأمشوخ

ويقال له (ذنب الحبشي) عشب متعرج يشو بطبيعته في البناء التي يوجد بها مستنقعات على الحصوص مذكر منه نوعين وهما:

(١) المولندي: وهو دائم الاحضار سوقه بسيطة قاعدة خشنة جداً لتوفر مادة المليكا (الرمل) فيها وتحتل في اطرافها ساقيل

اسم الطبي (*Equisetum hyemale*, L.) (اكبنتوم هيمالي) ^(١) وفصيله الامسوخة (*Equisetaceae*) (اكبتساسية) وبالإنجليزية (Ditch - rush) والفرنسية (prélo des tourneurs) شائع في فرنسا وهولندا وبريطانيا يتفق بيونه في جلاء المرض والمعدن وكثيراً ما يستعمله بضم الشحاس وصالحه لاما طاط وكان مرغوباً فيه قديعاً لجلاء الآوانى والركبتين والحنجرة في الطابع (٢) الخلقي: وهو قنطرة الاوراق سوقه غير الدورة (العنقية) تكون زاحفة على الارض ذات فروع بسيطة خشنة مرتبعة الضلوع وسوقه الشمرة ذات اغداد اسطوانية النكيل ذات اسنان اسم الطبي (*Equisetum arvense*, L.) (اكبنتوم اروسي) وبالإنجليزية (corn - horse-tail) والفرنسية (prêle des chevaux; prêle petite) شائع في أوروبا ولا سيما بريطانيا ويكثر في الاراضي المزروعة وهو من الاعشاب العنارة في الاراضي الفيرستيكية (الكونية من الطبي) السيدة وهي التي تنشأ عن الانهار والبحيرات

(١) اشتق اسم (*Equisetum*) الاجنبي ويعاد شرط حمان اشتقاناً لظاهرها من كوفي (*equus*) اي حصان و(*seca*) اي شرة وذلك تجسيد فروع دافق كالحشم في جميع الانواع من هذا النبات