

فضاءات هلبرت

1.5. تعاريف. خصائص أولية. إسقاط على محدب مغلق

تعريف. - ليكن H فضاء متجهيا. الجداء السلمي (u, v) هو دالي ثنائي الخطية من $H \times H$ إلى \mathbb{R} ، متناظر، و معرف موجب [أي $\forall u \in H (u, u) \geq 0$ و $(u, u) > 0$ إذا $u \neq 0$].
نذكر بأن الجداء السلمي يحقق متباينة كوشي - شفارتز - Cauchy - Schwarz :

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{1/2} (v, v)^{1/2} \quad \forall u, v \in H.$$

[نلاحظ أنه لإثبات متباينة كوشي - شفارتز لا نستعمل الفرضية $(u, u) > 0$ إذا $u \neq 0$].
نذكر أيضا بأن $|u| = (u, u)^{1/2}$ هو تنظيم¹.
بالفعل $|u + v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2(u, v) \leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v|$
نذكر أخيرا " بمتطابقة متوازي الأضلاع " :

$$(1) \quad \left| \frac{a+b}{2} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{2} \right|^2 = \frac{1}{2}(|a|^2 + |b|^2), \quad \forall a, b \in H.$$

تعريف. - يقال بأن H فضاء هلبرت إذا كان فضاء متجهيا مرفقا بجداء سلمي (u, v) بحيث يكون تاما بالنسبة للتنظيم $(u, u)^{1/2}$.

في كل ما سيأتي يرمز H إلى فضاء هلبرت.

¹ نرمز عادة بالرمز $\| \cdot \|$ (عوضا عن $\| \cdot \|$) للتنظيم المصاحب لجداء سلمي.

مثال أساسي: $L^2(\Omega)$ مرفق بالجداء السلمي

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x)dx$$

هو فضاء هلبرت؛ فضاء صوبوليف H^1 الذي سوف نلتقي به في الفصلين 8 و 9 هو فضاء هلبرت " على منوال " L^2 .

• قضية 1.5. - H محدب بانتظام و بالتالي انعكاسي.

إثبات. - ليكن $\epsilon > 0$ ، $u, v \in H$ بحيث $|u| \leq 1$ ، $|v| \leq 1$ و $|u - v| > \epsilon$. بفضل متطابقة متوازي الأضلاع لدينا

$$\delta = 1 - \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right)^{1/2} > 0 \quad \text{مع} \quad \left|\frac{u+v}{2}\right| < 1 - \delta \quad \text{و بالتالي} \quad \left|\frac{u+v}{2}\right|^2 \leq 1 - \frac{\epsilon^2}{4}$$

□

• مبرهنة 2.5 (إسقاط على محدب مغلق). - ليكن $K \subset H$ محدبا مغلقا غير خال. إذن لكل $f \in H$ ، يوجد $u \in K$ وحيد بحيث

$$(2) \quad |f - u| = \min_{v \in K} |f - v|.$$

بالإضافة إلى ذلك يتميز u بالخاصية:

$$(3) \quad \begin{cases} u \in K \\ (f - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K. \end{cases}$$

نضع $u = P_K f =$ إسقاط f على K .

إثبات.

أ) وجود - سوف نقدم برهانين

(1) الدالة $\varphi(v) = |f - v|$ محدبة، مستمرة و $\lim_{|v| \rightarrow \infty} \varphi(v) = +\infty$ إذن (لازمة 20.3) φ تدرك نهايتها الصغرى على K بما أن H انعكاسي.

(2) البرهان الثاني لا يستدعي استعمال نظرية الفضاءات الانعكاسية. لتكن (v_n) متتالية تصغيرية لـ (2)، أي أن $v_n \in K$ و

$$d_n = |f - v_n| \rightarrow d = \inf_{v \in K} |f - v|.$$

لنبين أن (v_n) هي متتالية كوشي. بتطبيق متطابقة متوازي الأضلاع مع $a = f - v_n$ ، $b = f - v_m$ نصل إلى

$$\left| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right|^2 + \left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 = \frac{1}{2}(d_n^2 + d_m^2).$$

غير أن $\frac{v_n + v_m}{2} \in K$ ، إذن $\left| f - \frac{v_n + v_m}{2} \right| \geq d$ بالتالي

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |v_n - v_m| = 0 \quad \text{و} \quad \left| \frac{v_n - v_m}{2} \right|^2 \leq \frac{1}{2}(d_n^2 + d_m^2) - d^2$$

إذن $v_n \rightarrow u \in K$ لدينا و $d = |f - u|$

(ب) تكافؤ (2) و (3)

ليكن $u \in K$ محققا لـ (2) و ليكن $w \in K$ لدينا

$$t \in]0, 1[\quad \text{لـ} \quad v = (1 - t)u + tw \in K$$

و إذن

$$|f - u| \leq |f - [(1 - t)u + tw]| = |(f - u) - t(w - u)|.$$

بالتالي

$$|f - u|^2 \leq |f - u|^2 - 2t(f - u, w - u) + t^2|w - u|^2.$$

أي أن $2(f - u, w - u) \leq t|w - u|^2$ عندما $t \rightarrow 0$ نحصل على (3). عكسيا، ليكن $u \in K$ محققا لـ (3) إذن لدينا

$$|u - f|^2 - |v - f|^2 = 2(f - u, v - u) - |u - v|^2 \leq 0 \quad \forall v \in K;$$

و منه نحصل على (2).

ج) وحدانية

ليكن u_1 و u_2 محققين لـ (3) لدينا

$$(4) \quad (f - u_1, v - u_1) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$$(5) \quad (f - u_2, v - u_2) \leq 0 \quad \forall v \in K.$$

بوضع $v = u_2$ في (4) و $v = u_1$ في (5) ، نحصل بعد الجمع على $|u_1 - u_2|^2 \leq 0$.² □

قضية 3.5 - تحت فرضيات البرهنة 2.5 لدينا

$$|P_K f_1 - P_K f_2| \leq |f_1 - f_2| \quad \forall f_1, f_2 \in H.$$

إثبات . - بوضعنا $u_1 = P_K f_1$ و $u_2 = P_K f_2$ نصل إلى

$$(6) \quad (f_1 - u_1, v - u_1) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$$(7) \quad (f_2 - u_2, v - u_2) \leq 0 \quad \forall v \in K.$$

بأخذ $v = u_2$ في (6) و $v = u_1$ في (7) نحصل بعد الجمع على

$$|u_1 - u_2|^2 \leq (f_1 - f_2, u_1 - u_2).$$

بالتالي $|u_1 - u_2| \leq |f_1 - f_2|$ □ .

لازمة 4.5 - ليكن $M \subset H$ فضاء جزئياً متجيباً مغلقاً. ليكن $f \in H$. إذن $u = P_M f$ يتميز بـ

$$(8) \quad \begin{cases} u \in M \\ (f - u, v) = 0 \end{cases} \quad \forall v \in M.$$

² وحدانية u على الشكل (2) تحصل أيضاً مباشرة من خاصية التحدد الفعلي للنظيم في فضاء هلبرت.

بالإضافة إلى ذلك فإن P_M مؤثر خطي.

إثبات - من (3) لدينا

$$(f - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in M$$

إذن

$$(f - u, tv - u) \leq 0 \quad \forall v \in M, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

ما ينتج عنه

$$(f - u, v) = 0 \quad \forall v \in M.$$

و بالعكس عندما يكون u محققا لـ (8) فإن

$$(f - u, v - u) = 0 \quad \forall v \in M.$$

□

2.5. ثنوي فضاء هيلبرت

• **مبرهنة 5.5 (مبرهنة التمثيل لرايز - فريشيه Riesz - Fréchet)** - يعطي $\varphi \in H'$ ، يوجد عنصر وحيد $f \in H$ بحيث

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

بالإضافة إلى ذلك فإنه لدينا

$$|f| = \|\varphi\|_{H'}.$$

إثبات - نقدم من جديد برهانين:

(1) البرهان الأول يشبه إثبات المبرهنة 11.4 . نعتبر التطبيق $T: H \rightarrow H'$ المعروف كالتالي: بإعطاء $f \in H$ ، فإن التطبيق $(f, v) \mapsto v$ هو دالي خطي مستمر على H ؛ إذن هو يعرف عنصرا من H' يرمز له بـ Tf ، أي

$$\langle Tf, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

إنه واضح من متباينة كوشي - شفارتز أن $\|Tf\|_{H'} = |f|$. إذن T هو مؤثر خطي تقاييسي من H على $T(H)$ الذي هو فضاء جزئي من H' . للتحتم يبقى أن نثبت بأن $T(H)$ كثيف في H' . ليكن $h \in H'' = H$ (بما أن H انعكاسي) بحيث أن $\langle Tf, h \rangle = 0 \quad \forall f \in H$ ؛ لنبين أن $h = 0$. لدينا $(f, h) = 0 \quad \forall f \in H$ و بالتالي فإن $h = 0$.

(2) البرهان الثاني لا يستدعي نظرية الفضاءات الانعكاسية .

ليكن $M = \varphi^{-1}(0)$ ؛ فضاء جزئيا مغلقا من H .

إذا كان $M = H$ ، أي $\varphi \equiv 0$ ، فإننا نختتم باتخاذ $f = 0$.

لنفرض أن $M \neq H$. لنبين أنه يوجد عنصر $g \in H$ بحيث:

$$\forall w \in M \quad (g, w) = 0 \quad \text{و} \quad |g| = 1 \quad , \quad g \notin M$$

بالفعل ، ليكن $g_0 \in H$ مع $g_0 \notin M$ ، و ليكن $g_1 = P_M g_0$ ؛ نأخذ بعد ذلك $g = \frac{g_0 - g_1}{|g_0 - g_1|}$. كل $v \in H$ لديه تحليل من الشكل $v = \lambda g + w$ مع $w \in M$ و $\lambda \in \mathbb{R}$ ؛ يكفي وضع

$$\lambda = \frac{\langle \varphi, v \rangle}{\langle \varphi, g \rangle} \quad \text{و} \quad w = v - \lambda g$$

يأتي إذن $0 = (g, w) = (g, v - \lambda g)$ ، أي أن $(g, v) = \lambda = \frac{\langle \varphi, v \rangle}{\langle \varphi, g \rangle}$. نستنتج بأن

$$\square \cdot f = \langle \varphi, g \rangle > g \quad \text{حيث إن } f \text{ معرفة بـ } \langle \varphi, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H$$

• ملاحظة 1. - H و H' : نطابقهما أو لا نطابقهما؟ الثلاثي $V \subset H \subset V'$.

المبرهنة 5.5 تبين أنه يمكن تمثيل أي دالي خطي مستمر على H بواسطة الجداء السلمي . التطبيق $f \mapsto \varphi$ هو تشاكل تقابلي تقاييسي يمكن من مطابقة H و H' . سنقوم بهذه المطابقة في أغلب الأحيان و لكن ليس دائما . لنصف حالة نوعية حيث لا يمكن القيام بهذه المطابقة . ليكن H فضاء هلبرت مزودا بالجداء السلمي (\cdot, \cdot) و التنظيم $\|\cdot\|$. ليكن V فضاء جزئيا متجهيا كثيفا في H . لنفرض بأن V مزود بالتنظيم $\|\cdot\|$ و الذي يجعل منه فضاء بناخ

انعكاسياً. لنفرض بأن الاحتواء القانوني لـ V في H مستمر، أي

$$|v| \leq C\|v\| \quad \forall v \in V.$$

نطابق H' و H . يمكننا إذن غمر H في V' بفضل الطريقة التالية: بإعطاء $f \in H$ ، فإن التطبيق $(f, v) \mapsto v \in V$ هو دالي خطي مستمر على H و بالتالي على V ؛ لنرمز له بـ $Tf \in V'$ بحيث أن

$$\langle Tf, v \rangle_{V', V} = (f, v) \quad \forall f \in H, \quad \forall v \in V.$$

تتحقق بسهولة من أن $T: H \rightarrow V'$ يملك الخصائص الآتية

$$(أ) \quad \forall f \in H \quad \|Tf\|_{V'} \leq C\|f\|$$

(ب) T متباين،

(ج) $T(H)$ كثيف في V' .³

بمساعدة T نغمر H في V' و نحصل على الصورة

$$(9) \quad V \subset H = H' \subset V'$$

حيث إن الاحتواءات القانونية مستمرة و كثيفة .

نلاحظ أنه بهذه المطابقة تتساوى $\langle \varphi, v \rangle_{V', V}$ و (φ, v) كلما كان لدينا $\varphi \in H$ و $v \in V$. نقول عندئذ أن H هو الفضاء المحوري .

لنفرض الآن أن V عوض أن يكون فضاء بناخ عام فهو فضاء هلبرت، و له جداوله السلمي الخاص به $((,))$ المرفق بالنظيم $\| \cdot \|$. يمكن إذن مطابقة V و V' عن طريق الجداء السلمي $((,))$. غير أن (9) تصبح في هذه الحالة بلا معنى . هذا يبين أنه لا يمكن القيام بالمطابقتين في آن واحد: يجب الاختيار . لقد تعودنا - و هو اختيار كفي - بتفضيل المطابقة $H = H'$ مع (9) كنتيجة و عدم مطابقة V و V' . في هذا الموضوع نقترح على القارئ تأمل المثال الآتي:

$$\{ \sum u_n^2 < \infty ; u = (u_n) \} = l^2 = H \quad \text{مزود بالجداء السلمي } (u, v) = \sum u_n v_n$$

$$\{ \sum n^2 u_n^2 < \infty ; u = (u_n) \} = V \quad \text{مزود بالجداء السلمي } ((u, v)) = \sum n^2 u_n v_n$$

³ عموماً T ليس غامراً من H على V' .

ملاحظة 2. - باستعمال التشاكل التبادلي لرايز - فريشييه (و البرهان الثاني للمبرهنة 5.5) يمكن الإثبات مباشرة أن H انعكاسي دون اللجوء إلى نظرية الفضاءات المنتظمة التحديب.

ملاحظة 3. - عندما نعتمد المطابقة $H' = H$ ، فإن المتعامد M^\perp لفضاء جزئي $M \subset H$ يعتبر فضاء جزئيا من H و

$$M^\perp = \{u \in H; (u, v) = 0 \quad \forall v \in M\}.$$

في فضاء هلبرت، كل فضاء جزئي مغلق يقبل تكملة طوبولوجية (انظر المقطع 4.2). في الحقيقة، إنه واضح (بفضل اللازمة 4.5) أنه إذا كان M فضاء جزئيا مغلقا فلدينا

$$M + M^\perp = H \quad \text{و} \quad M \cap M^\perp = \{0\}$$

3.5. مبرهنات ستامباكيا و لاكس - ملغرام

تعريف. - نقول إن داليا ثنائي الخطية $a(.,.) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ هو (أ) مستمر إذا وجد ثابت C بحيث إن

$$|a(u, v)| \leq C|u||v| \quad \forall u, v \in H,$$

(ب) إهليلجي إذا وجد ثابت $\alpha > 0$ بحيث إن

$$a(v, v) \geq \alpha|v|^2 \quad \forall v \in H.$$

مبرهنة 6.5 (ستامباكيا Stampacchia) - ليكن $a(.,.)$ داليا ثنائي الخطية مستمرا و إهليلجيا. لتكن K مجموعة محدبة، مغلقة و غير خالية. بإعطاء $\varphi \in H'$ فإنه يوجد وحيدا $u \in K$ بحيث إن

$$(10) \quad a(u, v - u) \geq \langle \varphi, v - u \rangle \quad \forall v \in K.$$

بالإضافة إلى ذلك إذا كان a متناظرا، فإن u يتميز بالخاصية

$$(11) \quad \left\{ \begin{array}{l} u \in K \\ \frac{1}{2}a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in K} \left\{ \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\}. \end{array} \right.$$

لإثبات المبرهنة 6.5 ، نستعمل النتيجة الكلاسيكية الآتية :

• **مبرهنة 7.5** (مبرهنة النقطة الثابتة لبناخ - طريقة التقريبات المتتالية لبيكارد Picard)
- ليكن (X, d) فضاء متريا تاما و ليكن $S : X \rightarrow X$ تطبيقا بحيث أن

$$\forall v_1, v_2 \in X \quad d(Sv_1, Sv_2) \leq kd(v_1, v_2) \quad \text{مع} \quad k < 1$$

إذن يملك S نقطة ثابتة وحيدة، $u = Su$

(انظر مثلا [1] Choquet أو [2] L. Schwartz)

إثبات المبرهنة 6.5 - حسب مبرهنة التمثيل لرايز - فريشيه (مبرهنة 5.5) فإنه يوجد $f \in H$ وحيدا بحيث إن

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in H.$$

من جهة أخرى، لكل $u \in H$ مثبت، فإن التطبيق $v \mapsto a(u, v)$ هو دالي خطي مستمر على H ، و بفضل مبرهنة التمثيل لرايز - فريشيه فإنه يوجد عنصر من H ، نرسم له بـ Au ، بحيث إن $\forall v \in H \quad a(u, v) = (Au, v)$. من الواضح أن A مؤثر خطي من H إلى H و أن

$$(12) \quad |Au| \leq C|u| \quad \forall u \in H$$

$$(13) \quad (Au, u) \geq \alpha|u|^2 \quad \forall u \in H.$$

تصبح المسألة (10) عبارة عن إيجاد $u \in K$ بحيث

$$(14) \quad (Au, v - u) \geq (f, v - u) \quad \forall v \in K.$$

ليكن $\rho > 0$ ثابتا، سوف يعين فيما بعد المتباينة (14) تكافئ

$$(15) \quad (\rho f - \rho Au + u - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

$$\cdot u = P_K(\rho f - \rho Au + u)$$

أي

لكل $v \in K$ ، نضع $Sv = P_K(\rho f - \rho Av + v)$. لنبين أنه عند الاختيار الملائم لـ $\rho > 0$ فإن S سوف يكون انكماشاً فعلياً. أي أنه يوجد $k < 1$ بحيث إن

$$|Sv_1 - Sv_2| \leq k|v_1 - v_2| \quad \forall v_1, v_2 \in K.$$

في الحقيقة، حسب القضية 3.5 لدينا

$$|Sv_1 - Sv_2| \leq |(v_1 - v_2) - \rho(Av_1 - Av_2)|$$

و بالتالي

$$\begin{aligned} |Sv_1 - Sv_2|^2 &= |v_1 - v_2|^2 - 2\rho(Av_1 - Av_2, v_1 - v_2) + \rho^2|Av_1 - Av_2|^2 \\ &\leq |v_1 - v_2|^2(1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2). \end{aligned}$$

لنثبت $\rho > 0$ بحيث إن $k^2 = 1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2 < 1$ (خذ $0 < \rho < \frac{2\alpha}{C^2}$) نرى أن S يملك نقطة ثابتة وحيدة⁴.

لنفرض الآن أن $a(.,.)$ متناظر. إذن $a(.,.)$ يعرف جداء سلمياً جديداً على H و التنظيم المرفق $a(u, u)^{1/2}$ مكافئ للتنظيم $|\cdot|$ إذن H هو فضاء هلبرت بالنسبة لهذا الجداء السلمي أيضاً. بتطبيق مبرهنة التمثيل لرايز - فريشيه نحصل على $g \in H$ بحيث

$$\langle \varphi, v \rangle = a(g, v) \quad \forall v \in H.$$

إذن (10) تصير

$$(16) \quad a(g - u, v - u) \leq 0 \quad \forall v \in K$$

أي أن $u = P_K g$ إسقاط بالنسبة للجداء السلمي الجديد المعروف بـ a . حسب المبرهنة 2.5 فإن (16) تكافئ البحث عن $u \in K$ يحقق

$$\min_{v \in K} a(g - v, g - v)^{1/2}.$$

هذا يعود إلى إيجاد القيمة الصغرى على K لـ $a(g - v, g - v)$ أو أيضاً

$$\frac{1}{2} a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \quad \text{أو أيضاً} \quad a(v, v) - 2a(g, v)$$

□

ملاحظة 4. - نتحقق بسهولة من أنه إذا كان $a(.,.)$ دالياً ثنائياً الخطية بحيث

⁴ عند بحث حساب النقطة الثابتة بطريقة تكرارية فإنه يجدر بنا أخذ $\rho = \alpha/C^2$ (التي تعطي القيمة الصغرى لـ k) لتسريع تقارب التكرارات.

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in H$$

فإن الدالة $a(v, v) \mapsto v$ محددة.

• **لازمة 8.5 (لاكس - ملغرام - Lax - Milgram) .** ليكن $a(.,.)$ داليا ثنائي الخطية مستمرا وإهليلجيا.
إذن لكل $\varphi \in H'$ يوجد $u \in H$ وحيدا بحيث إن

$$(17) \quad a(u, v) = \langle \varphi, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان a متناظرا، فإن u يتميز بالخاصية

$$(18) \quad \frac{1}{2}a(u, u) - \langle \varphi, u \rangle = \min_{v \in H} \left\{ \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle \right\} \quad \text{و} \quad u \in H$$

إثبات. - طبق المبرهنة 6.5 واستدل كما في اللازمة 4.5. □

ملاحظة 5. - إن مبرهنة لاكس - ملغرام هي أداة سهلة وفعالة لحل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الإهليلجية (انظر الفصلين 8 و 9). إنه لمن المهم ملاحظة العلاقة بين المعادلة (17) و مسألة إيجاد القيمة الصغرى (18). لهذه العلاقة عادة تفسير في الميكانيكا أو الفيزياء (مبدأ الأقل فعلا، تصغير الطاقة، إلخ). في مصطلح حساب التغيرات Calculus of Variation، تعرف المعادلة (17) بمعادلة Euler لمسألة التصغير (18). نلاحظ أيضا، بهذه المناسبة، أن المعادلة (17) تظهر عندما نكتب " $F'(u) = 0$ " حيث

$$F(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \langle \varphi, v \rangle$$

ملاحظة 6. - يمكن إعطاء برهان مباشر و بسيط لمسألة أن المعادلة (17) لها حل وحيد. بالفعل، إن حل (17) يرجع إلى إثبات أن

$$\forall f \in H, \quad \exists u \in H \text{ وحيد بحيث } Au = f$$

بمعنى آخر أن A هو تقابل. غير أن

$$(أ) \quad R(A) \text{ مغلق لأن } |Av| \leq \alpha |v| \quad \forall v \in H$$

(ب) $R(A)$ كثيف لأن

$$(Au, v) = 0 \quad \forall u \in H$$

· يستلزم $v = 0$

4.5. مجموع هيلبرتي · قاعدة هيلبرتي

تعريف · - لتكن $(E_n)_{n \geq 1}$ متتالية فضاءات جزئية مغلقة من H .
نقول بأن H هو مجموع هيلبرتي للمتتالية (E_n) ، و نرمز له بـ $H = \bigoplus_n E_n$ ، إذا:

(أ) الـ (E_n) متعامدون متنى متنى، أي

$$(u, v) = 0 \quad \forall u \in E_m, \quad \forall v \in E_n, \quad m \neq n$$

(ب) الفضاء المتجهي المولد بالمتتالية (E_n) كثيف في H ⁵.

• مبرهنة 9.5. - لنفرض أن H مجموع هيلبرتي للمتتالية $(E_n)_{n \geq 1}$. ليكن $u \in H$ وليكن

$$u_n = P_{E_n} u$$

إذن لدينا

$$u = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k u_n \quad \text{أي أن} \quad u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (\text{أ})$$

$$(|u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^2) \quad (\text{ب}) \quad (\text{متساوية Bessel - Parseval})$$

و بالعكس، بإعطاء متتالية (u_n) من H بحيث أن $\forall n \ u_n \in E_n$ و $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^2 < \infty$ ، إذن

$$\text{المتسلسلة } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ متقاربة و } u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ يحقق } u_n = P_{E_n} u$$

⁵ نقصد الفضاء المتجهي المولد بالمعنى الجبري، أي التوافق الخطية المتبينة لعناصر من (E_n) .

إثبات. - ليكن $S_k = \sum_{n=1}^k P_{E_n}$ ؛ S_k هو مؤثر خطي و مستمر من H إلى H .
 ل $u \in H$ لدينا

$$(19) \quad |S_k u|^2 = \sum_{n=1}^k |u_n|^2.$$

من جهة أخرى (لازمة 4.5) لدينا

$$(u, u_n) = |u_n|^2$$

و بالجمع

$$(u, S_k u) = |S_k u|^2.$$

و عليه

$$(20) \quad |S_k u| \leq |u| \quad \forall u \in H.$$

ليكن F الفضاء المتجهي المولد بالتتالية (E_n) . ليكن $\epsilon > 0$ و ليكن $\bar{u} \in F$ بحيث
 $|u - \bar{u}| \leq \epsilon$ ل k كبير بقدر كاف، لدينا $S_k \bar{u} = \bar{u}$. من جهة أخرى (بفضل (20)) لدينا

$$|S_k u - S_k \bar{u}| \leq |u - \bar{u}|.$$

بالتالي $|S_k u - u| \leq 2|u - \bar{u}| \leq 2\epsilon$ ل k كبير بقدر كاف، أي أن $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k u = u$.
 من (19) نستنتج إذن (ب). □

ملاحظة 7. - بصفة عامة $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \infty$ و بالتالي فإن المتسلسلة $\sum u_n$ ليست ناظمية.

تعريف - نسمي قاعدة (أساس) هلبرتية (أو قاعدة، ببساطة عند انتفاء أي خطأ ⁶) كل
 متتالية (e_n) من عناصر H بحيث

$$(أ) \quad |e_n| = 1, \quad \forall n, \quad (e_m, e_n) = 0, \quad \forall m, n, \quad m \neq n$$

(ب) الفضاء المتجهي المولد من (e_n) كثيف في H

ينتج من البرهنة 9.5 أنه إذا كانت (e_n) قاعدة هلبرت فإن كل $u \in H$ يكتب:

⁶ لا تخلط خصوصاً مع قاعدة جبرية، أي، عائلة (e_i) من H بحيث إن كل عنصر من H يكتب بطريقة وحيدة
 كتوفيقية خطية متتهمة من (e_i) .

$$\cdot |u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(u, e_n)|^2 \quad \text{مع} \quad u = \sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n) e_n$$

عكسيا، بإعطاء متتالية $(\alpha_n) \in l^2$ ، فإن المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ تتقارب نحو عنصر نرمز له بـ u ؛ لدينا

$$\cdot |u|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \quad \text{و} \quad (u, e_n) = \alpha_n$$

• مبرهنة 10.5. – كل فضاء هلبرت قابل للفصل يملك قاعدة هلبرتية.

إثبات. – لتكن (v_n) مجموعة جزئية قابلة للعد وكثيفة من H . ليكن F_k الفضاء المتجهي المولد من $[v_1, v_2, \dots, v_k]$. تشكل الـ (F_k) متتالية تزايدية من فضاءات جزئية ذات أبعاد متتالية بحيث إن $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ كثيف في H . نختار قاعدة ناظمية التعامد في F_1 ثم نتممها إلى قاعدة ناظمية التعامد في F_2 وهكذا. نحصل بالتالي على قاعدة هلبرتية في H . □

ملاحظة 8. – إذا كان H غير قابل للفصل، يمكننا أيضا (بواسطة لازمة زورن) إثبات وجود قاعدة هلبرتية $(e_i)_{i \in I}$ غير قابلة للعد. المبرهنة 9.5 تبقى صحيحة إذا عوضنا المتسلسلات المتقاربة بالعائلات القابلة للجمع (انظر [1] Choquet أو [2] L. Schwartz).

ملاحظة 9. – تبين المبرهنة 10.5 أن جميع فضاءات هلبرت القابلة للفصل متشاكلت تقابليا و متقايسة مع l^2 . بطبيعة الحال هذه النتيجة (ذات المظهر المثير!) لا تقلل من أهمية دراسة $L^2(\Omega)$ (أو فضاء صوبوليف H^1).

ملاحظة 10. – سزى في الفصل السادس كيف نشئ قاعدة هلبرتية مكونة من متجهات ذاتية لمؤثرات ذاتية مرافقة متراصة. في $L^2(\Omega)$ نستعمل عادة قواعد خاصة مكونة من دوال ذاتية لمؤثر تفاضلي (انظر المقطع 6.8 و المقطع 8.9). فمثلا في $L^2(0, \pi)$ القاعدة المكونة من الدوال

$$\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos nx \right)_{n \geq 0} \quad \text{أو} \quad \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx \right)_{n \geq 1}$$

تؤدي إلى التمثيل عن طريق متسلسلات فورييه Fourier و التحليل التوافقي Harmonic Analysis ؛ انظر مثلاً [1] Katznelson . بالنسبة للقواعد المرفقة لدوال Bessel ، Hermite ، Legendre ، Jacobi ، Laguerre ، Tchebichev ، الخ ، يمكن للقارئ مراجعة [1] Courant Hilbert ، الجزء 1 .

تعالق حول الفصل الخامس

* (1) تمييز فضاءات هيلبرت

من المهم معرفة ما إذا كان نظيم $\| \cdot \|$ معطى على فضاء متجهي E هو نظيم هيلبرتي، أي ما إذا كان يوجد جداء سلمي $(,)$ على E بحيث

$$(u, u)^{1/2} = \|u\| \quad \forall u \in E.$$

هناك عدة معايير معروفة:

أ) **مبرهنة 11.5 (Fréchet – Von Neumann – Jordan)** . - لنفرض أن النظيم $\| \cdot \|$ يحقق متطابقة متوازي الأضلاع (1) ، إذن $\| \cdot \|$ هو نظيم هيلبرتي .

بالنسبة للبرهان، انظر [1] Yosida أو [EX] .

ب) **مبرهنة 12.5 (Kakutani [1])** . - ليكن E فضاء نظيميا مع $dim E \geq 3$. نفرض أن كل فضاء جزئي ثنائي البعد يملك مسقطا نظيمه 1 (أي أنه يوجد $P : E \rightarrow F$ مؤثر خطي مستمر بحيث إن $Pu = u$ لكل $u \in F$ و $\|P\| \leq 1$) .

⁷ نلاحظ بهذا الصدد أن كل فضاء جزئي F أحادي البعد يملك دائماً مسقطا ذا نظيم 1 (بفضل مبرهنة هان - بناخ).

إذن النظم $\| \cdot \|$ هيلبرتي ⁷.

(ج) **مبرهنة 13.5** ([1] de Figueiredo – Karlovitz) . - ليكن E فضاء نظيميا مع $dim E \geq 3$. نضع

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذا } \|u\| \leq 1 \\ \text{إذا } \|u\| \geq 1 \end{array} \right\} \frac{u}{\|u\|} = Tu$$

نفرض أن

$$\|Tu - Tv\| \leq \|u - v\| \quad \forall u, v \in E.$$

إذن النظم $\| \cdot \|$ هيلبرتي ⁸.

لنذكر أيضاً، في هذا الموضوع، نتيجة ذكرت من قبل (انظر ملاحظة 8.2).

مبرهنة 14.5 ([1] Lindenstrauss – Tzafriri) . - يكون فضاء بناخ قابلاً للهلبرته (أي يوجد نظيم هيلبرتي مكافئ للنظيم الأساسي) إذا كان كل فضاء جزئي مغلق مملك مكملًا طوبولوجيًا ⁹.

⁸ نبرهن أنه في كل فضاء نظيمي لدينا

$$\|Tu - Tv\| \leq 2\|u - v\| \quad \forall u, v \in E$$

و أنه، عموماً، لا يمكن تحسين الثابت 2 .

⁹ الأمر سيان بالقول بأن كل فضاء جزئي مغلق مملك مسقطاً مستمراً P . لاحظ، هنا، أننا لا نفرض أن $\|P\| \leq 1$

بعكس فرضيات المبرهنة 12.5 .

(2) المتباينات التغيرية.

إن مبرهنة ستامباكيا هي نقطة البداية لنظرية المتباينات التغيرية Variational inequalities (انظر [1] Kinderlehrer – Stampacchia)؛ لهذه النظرية تطبيقات عديدة في الميكانيكا والفيزياء (انظر [1] Duvaut – Lions)، في التحكم الأمثل Optimal Control (انظر [2] Lions)، في التحكم الاتفاقي Stochastic Control (انظر [1] Bensoussan – Lions)، إلخ.

* (3) المعادلات غير الخطية المرتبطة بمؤثرات رتيبة.

مبرهنتا ستامباكيا و لاكس - ملغرام تمتدان إلى بعض الفئات من المؤثرات غير الخطية. لنورد مثلا الـ

مبرهنة 15.5 (Minty – Browder) . - ليكن E فضاء بناخ انعكاسيا، ليكن $A : E \rightarrow E'$ تطبيقا (غير خطي) مستمرا بحيث إن

$$\langle Av_1 - Av_2, v_1 - v_2 \rangle > 0 \quad \forall v_1, v_2 \in E, \quad v_1 \neq v_2$$

$$\lim_{\|v\| \rightarrow \infty} \frac{\langle Av, v \rangle}{\|v\|} = \infty.$$

اذن لكل $f \in E'$ ، يوجد $u \in E$ حلا وحيدا للمعادلة $Au = f$.

* (4) القواعد في فضاءات بناخ .

إن مفهوم القاعدة يمتد إلى فضاءات بناخ. نقول إن $(e_n)_{n \geq 1}$ هي قاعدة شاودر Schauder لفضاء بناخ E إذا كان لكل $u \in E$ توجد متتالية $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ من \mathbb{R} وحيدة بحيث $u = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$. إن القواعد تلعب دورا هاما في هندسة فضاءات بناخ (انظر مثلا [2] Lindenstrauss – Tzafriri). كل الفضاءات المألوفة في التحليل (القابلة للفصل) تملك قاعدة شاودر (انظر مثلا [1] I. Singer). هذا ما قاد بناخ إلى طرح السؤال الآتي: هل كل

فضاء بناخ قابل للفصل يمتلك قاعدة شاودر؟ الجواب سلبي ([1] Enflo). حتى إنه يمكننا إنشاء فضاءات جزئية مغلقة من l^p ، $1 < p < \infty$ ، $p \neq 2$ ، بدون قاعدة (انظر [2] Lindenstrauss – Tzafriri). برهن Szankowski مؤخرا بأن $\mathcal{L}(H)$ ليس له قاعدة (H فضاء هلبرت قابل للفصل ببعد لانهائي). سوف نصادف في الفصل السادس سؤالا شبيها عن المؤثرات المتراسة و الذي أجيب عنه بالسلب أيضا.