

## الباب الرابع

تمثيل التراكيب الجيولوجية على الخرائط

### الفصل السادس

تمثيل الطبقات البسيطة

مقدمة :

يمكن اعتبار التراكيب الجيولوجية أجسام لها أبعاد في الفراغ ، وتكون عادة من واحد أو أكثر من مجموعة من النقط أو الخطوط أو المستويات .  
ولما كان علم الهندسة الوصفية يهتم بدراسة توقيع الأجسام ذات الأبعاد الثلاثة على مستوى واحد مع توضيح مواقع هذه الأجسام بالنسبة لبعضها البعض فإنه يمكن استخدام الأسس والنظريات المعروفة في هذا العلم للتمثيل الهندسي للتراكيب الجيولوجية . وفيما يلي بعض المصطلحات المستخدمة لهذا الغرض .

الإسقاط العمودي (Orthographic projection)

وتستخدم في هذا النوع من الإسقاط خطوط نظر متعامدة على مستوى الإسقاط . ويعرف مستوى الإسقاط بأنه المستوى العمودي على خطوط النظر ، ويقع هذا المستوى بين عين الراصد وبين الجسم المطلوب إسقاطه . ويعرف خط النظر بأنه مسار النقطة التي تبدأ من عين الراصد إلى نقطة محدودة على الجسم المراد إسقاطه ، وتتميز خطوط النظر في هذا النوع من الإسقاط بأنها متوازية .

مستويات الإسقاط الرئيسية :

من المعلوم أنه يلزم معرفة مسقطين على الأقل لأي جسم لتحديد شكله

في الفراغ ومعرفة أبعاده الحقيقية . ويمكن إسقاط الأجسام بطريقة الإسقاط العمودي على ثلاثة مستويات رئيسية هي : المستوى الأفقي والمستوى الرأسي والمستوى الجانبي .

### المستوى الأفقي :

هو مستوى تصوري ، تقع فيه جميع النقط على ارتفاع واحد كما هو موضح بالشكل ( ١٣٤ - أ ) . ويحدد المسقط الأفقي لجسم ما بإسقاط جميع نقط هذا الجسم على المستوى الأفقي . وخطوط النظر في هذه الحالة رأسية ولذلك فهي عمودية على المستوى الأفقي .


### المستوى الرأسي :

هو مستوى تصوري ، متعامد على كل من المستوى الأفقي والجانبي كما هو موضح بالشكل ( ١٣٤ - ب ) . ويحدد المسقط الرأسي بإسقاط جميع نقط هذا الجسم على المستوى الرأسي . وخطوط النظر في هذه الحالة أفقية ولذلك فهي عمودية على المستوى الرأسي .

### المستوى الجانبي :

هو مستوى تصوري عمودي على كل من المستوى الأفقي والرأسي كما هو موضح بالشكل ( ١٣٤ - ج ) .

ويطلق على الخطوط التي تتج من تقاطع كل مستويين من المستويات الرئيسية للإسقاط خطوط المحاور (Folding lines) . ويعرف المسقط الذي ينتج عن إسقاط خطوط نظر عمودية على مستوى الإسقاط التصوري المسقط العمودي . وفي بعض الأحيان تستخدم المساط المائلة لأغراض توضيحية وتعرف بأنها تلك التي تتج عن إسقاط خطوط نظر ليست أفقية ولا هي عمودية على مستوى الإسقاط ..



(شكل ١٣٤)

مستويات الإسقاط الرئيسية

(ج) المستوى الجانبي

(ب) المستوى الرأسي

(أ) المستوى الأفقي

## ١ - إسقاط الخطوط المستقيمة :

يعرف الخط بأنه المسار الذي تسلكه نقطة معينة .. وينتج عن مسار هذه النقطة خطاً مستقيماً إذا اتجهت باستمرار في اتجاه ثابت . ويعرف خط الميزان أو الخط الأفقي بأنه خط موازى للمستوى الأفقى التصورى ولذلك فإن جميع النقط التى تقع على هذا الخط لها نفس الارتفاع . وتظهر هذه الخطوط بطولها الحقيقى عند إسقاطها على المستوى الأفقى كما هو موضح بالشكل (١٣٥) . كذلك يعرف الخط الأمامى بأنه خط مواز للمستوى الرأسى وتظهر الخطوط الأمامية بطولها الحقيقى عند إسقاطها على المستوى الرأسى كما يعرف الخط الجانبي


بأنه انخط الموازي للمستوى الجانبي التصوري وتظهر انخطوط الجانبية بطولها الحقيقي عند إسقاطها على المستوى الجانبي ، ويعرف انخط الرأسى بأنه انخط العمودى على المستوى الأفقى ، وتظهر انخطوط الرأسية بطولها الحقيقي عند إسقاطها على المستوى الرأسى أو الجانبي أو أى مستوى آخر عمودى على المستوى الأفقى . ويعرف انخط المائل على مستويين بأنه خط ليس عمودياً ولا أفقياً وقد يظهر بطوله الحقيقي عند إسقاطه على المستوى الرأسى أو الجانبي ولكنه لا يظهر بطوله الحقيقي مطلقاً عند إسقاطه على المستوى الأفقى . أما انخط المائل على المستويات الثلاثة فإنه لا يظهر بطوله الحقيقي عند إسقاطه على أى مستوى من مستويات الإسقاط الرئيسية .

#### الانحراف الكلى والمختصر للخطوط :


هناك طريقتان للتعبير عن اتجاهات الخطوط تعرف بالانحراف الكلى للخط (Azimuth) أو الانحراف المختصر (Bearing) ويقاس (الانحراف الكلى أو المختصر) بالدرجات والدقائق والثواني ابتداءً من اتجاه اختيارى أو خط زوال أو خط مراجعة فى اتجاه عقرب الساعة خلال دورة كاملة (٣٦٠°) ويقال إن انحراف انخط حقيقياً إذا كان الاتجاه الاختيارى هو خط الزوال الجغرافى (خط طول) ، ويقال إنه انحراف مغناطيسى إذا كان الاتجاه الاختيارى هو خط الشمال المغناطيسى . ويوضح الشكل (١٣٦ - ١) العلاقة بين الانحراف الحقيقى والمغناطيسى كذلك علاقة الانحراف الكلى بالمختصر . ويعرف الانحراف المختصر (الذى يطلق عليه عادة بالانحراف الربع دائرى) بالزاوية الحادة بين مسقط أى خط على المستوى الأفقى والخط المتجه من الشمال إلى الجنوب كما هو موضح بالشكل (١٣٦ - ب) ويشير الاتجاه العلوى للوحة الرسم عادة إلى اتجاه الشمال إلا إذا رسم اتجاه الشمال فى أى وضع آخر فى اللوحة ويرمز له عادة بواسطة سهم يتجه رأسه نحو الشمال . ويوضح بالشكل (١٣٧ - ٢) انحراف الخط (٢ ب) ومقداره جنوب



ساقط خط اليزاء أو الخط الأفقوت



ساقط الخط الأمامي




ساقط الخط الجانبي

(شكل ١٣٥)


ساقط الخطوط المتضمة

٤٥° شرق ويعني ذلك أن الزاوية المحصورة بين الخط (ب) وبين الاتجاه الجنوبي ٤٥°. ويعبر عن انحراف الخط (ب) أحياناً، أخرى ابتداءً من النقطة (ب) إلى النقطة (أ) فيقال إن انحراف الخط (ب) مقداره شمال ٤٥° غرب. ويوقع الانحراف غالباً على المستويات الأفقية ولا يؤثر استواء الخط أو ميله على مقدار الانحراف ويوضح


شكل (١٣٧ - ب) أمثلة للتعبير عن انحراف بعض الخطوط .




(أ)



١٣٦ (أ) الانحراف الكلي



(ب)



١٣٦ (ب) الانحراف المقتصر

(شكل ١٣٧)

بعض الأمثلة للتعبير عن الانحراف الملتوي

(شكل ١٣٦)

الانحراف الكلي والمقتصر

### ميل الخط :

يعرف ميل الخط بظل الزاوية التي يصنعها هذا الخط مع المستوى الأفقي .  
ويجب توفر شرطين لتحديد ميل الخط هما إسقاط الخط في المستوى الرأسى  
وظهوره بطوله الحقيقي في هذا المستوى الرأسى .

### بعض الأمثلة على إسقاط الخطوط المستقيمة :

تقسم الخطوط المستقيمة بالنسبة لاتجاهها إلى خطوط رأسية وأفقية ومائلة


ويوضح شكل (١٣٨) بعض الأمثلة التي تبين مساقط خطوط مختلفة الأوضاع في شكل (١٣٨ - أ) مساقط خط أمامي مائل يظهر بطوله الحقيقي في المسقط الرأسي . وفي شكل (١٣٨ - ب) مساقط خط أفقي يظهر بطوله الحقيقي في المسقط الأفقي . وفي شكل (١٣٨ - ج) مساقط خط يميل على مستويات الإسقاط الثلاثة ولذلك فإنه لا يظهر بطوله الحقيقي في أي مسقط منها وفي شكل (١٣٨ - د) مساقط خط رأسي وهو يظهر على شكل نقطة في المستوى الأفقي و بطوله الحقيقي في كل من المسطتين الرأسي والجانبية . وفي شكل (١٣٨ - هـ) مساقط خط جانبي وهو يظهر بطوله الحقيقي في المسقط الجانبي . وفي شكل (١٣٨ - و ، ز) مساقط خطين يميلان على مستويات الإسقاط الثلاثة ولذلك لا يظهران بطولهما الحقيقي في أي مسقط منها . وفي شكل (١٣٦ - س) مساقط خط أفقي أمامي ويظهر بطوله الحقيقي في كل من المسطتين الأفقي والرأسي وفي شكل (١٣٨ - ص) مساقط خط أفقي يظهر على شكل نقطة في المستوى الرأسي ويظهر بطوله الحقيقي في كل من المستويين الأفقي والجانبية .

### تمثيل المستقيمات بواسطة الإسقاط الأفقي المرقوم :

يتيح هذا النوع من الإسقاط العمودي الاكتفاء بالمسقط الأفقي فقط لتمثيل المستقيمات حيث مساقط النقط على مستوى أفقي واحد يسمى مستوى المقارنة (المستوى المتوسط لمنسوب سطح البحر) ، ثم تبين على هذا المسقط الأفقي مناسيب النقط المختلفة أي بعدها للعمودي عن مستوى الإسقاط

### تمثيل المستقيمات باستخدام المسقط الأفقي لنقطتين معلومتين المنسوب :

المعطيات : المسقط الأفقي للنقطتين (أ ، ب) ، على المستوى الأفقي (س) ، وبعدهما للعمودي (عن المستوى س) ، ع = أ ، ب = ٢ سم ، ع = ٤ سم



(شكل ١٣٨)

بعض الأمثلة على إسقاط المستقيمت

أب السقط الرأس


أب السقط الأتني

أب السقط الجانبي



المطلوب : تحديد المستقيم (٢) في الفراغ واستنتاج مسقطه الرأسى  
وابخائبي .

العمل : من كل من النقطة (١) ، ب ، شكل (١٣٩) نقيم عمودين على المستوى (س) ثم نأخذ المسافة ٢ سم على العمود المقام من (١) ونحدد النقطة ٢ وبالمثل نأخذ المسافة ٤ سم من النقطة ب فنحدد النقطة ب ويكون المستقيم ٢ ب هو المستقيم المراد تحديده في الفراغ . وبإسقاط أعمدة من ١ ، ب على كل من المستويين الرأسى (س) والبخائبي (س١) يمكن تعيين ١ ، ب ، ٢ ، ٣ وهما المسقطين الرأسى والبخائبي للمستقيم ٢ ب على التوالي .




(شكل ١٣٩)

الإسقاط الأفق المرسوم

تمثيل المستقيمت باستخدام المسقط الأفقى لنقطة معلومة المنسوب ومتجهة :  
المعطيات : مسقط النقطة ١ ، وبعدها العمودى (عن المستوى الأفقى  
س) ، ع ١ = ٣ سم ومسقط المتجهة ١ ب ، وزاوية ميلها ٣٠° .  
المطلوب : تحديد المستقيم ٢ ب في الفراغ واستنتاج مسقطه الرأسى  
وابخائبي .

العمل : نقيم عموداً من النقطة ١ ، ونحدد عليه البعد ٣ سم فتحدد بذلك

النقطة (أ) في الفراغ . من النقطة أ نرسم المتجهة أ ب التي تصنع زاوية مقدارها ٣٠ مع الاتجاه الأفقي (أ ب) في المستوى (أ ب ح) ويقابل العمود المقام من النقطة ب في نقطة ب وبذلك يكون المستقيم أ ب قد تم تحديده في الفراغ وبتنزال أعمدة من كل من أ ، ب على المستوى من المستوى  $\pi$  يمكن تعيين كل المسقطين الرأسى والجانبى للمستقيم وهما أ<sub>١</sub> ب<sub>١</sub> ، ب<sub>٢</sub> كما هو موضح بالشكل (١٤٠) .




(شكل ١٤٠)

تمثيل المستويات بميلوية المقط الأفق المرقوم لنقطة وتجهة

## ٢ - إسقاط المستويات :

يمكن تقسيم المستويات إلى أفقية ورأسية ومائلة . وتظهر المستويات عند إسقاطها إما على شكل حرف ( خط مستقيم ) أو على شكل مستوى له شكل خارجى يشبه إلى حد كبير المستوى المراد إسقاطه ، فمثلا إذا أريد إسقاط مستوى على شكل مثلث على مستويات الإسقاط الرئيسية فإنه يظهر إما على شكل حرف ( خط مستقيم ) أو على شكل مثلث . وكذلك عند إسقاط مستوى على شكل مربع فإنه يظهر على شكل حرف أ أو على شكل رباعي قد يكون مربعاً أو مستطيلاً أو متوازي أضلاع .




(شكل ١٤١)

ب- ب- المقطع الرأسى أ- ب- المقطع الأفقى ا- ب- المقطع الجانبي

بعض الأمثلة على إسقاط المستويات :

يوضح شكل (١٤١) مساقط مستوى أفقى على شكل مثلث ويظهر المثلث بشكله الحقيقى فى المسقط الأفقى ، بينما يظهر على شكل حرف فى كل من المسقطين الرأسى والجانبي وفى شكل (١٤٢) مساقط مستوى رأسى على شكل مثلث فى ثلاثة أوضاع مختلفة . فى الشكل (١٤٢- أ) يتضح أن مستوى المثلث رأسى وواز للمستوى الرأسى ولذلك يظهر بشكله الحقيقى فى المسقط الرأسى ويظهر المسقطان الأفقى والجانبي على شكل حرف . أما فى شكل (١٤٢- ب) يظهر مستوى المثلث رأسياً ووازيًا للمستوى الجانبي ولذلك فهو يكون على شكل حرف فى كل من المستويين الأفقى والرأسى ، أما المسقط الجانبي فيظهر فيه المثلث بمساحته الحقيقية . وفى الشكل (١٤٢- ج) يتضح أن مستوى المثلث الرأسى مائلا على كل من المستويين الرأسى والجانبي ، ولذلك يظهر المسقط الأفقى على شكل حرف ولا يظهر المثلث بمساحته الحقيقية فى أى مسقط من المساقط .


ويوضح الشكل (١٤٣) بعض المساقط المختلفة للمستوى المائل



(شكل ١٤٢)

سقط مستويات رأسية على شكل مثلث

أ- ب- ج- المخطط الرأسى  
 أ' ب' ج' الأفقى  
 أ'' ب'' ج'' الجانبي



(شكل ١٤٣)

سقط مستويات مائلة على شكل مثلث

أ- ب- ج- المخطط الرأسى  
 أ' ب' ج' الأفقى  
 أ'' ب'' ج'' المخطط الجانبي

ولا يظهر المستوى المائل بمساحته الحقيقية عند إسقاطه على أى مستوى من مستويات الإسقاط الرئيسية وقد تظهر ماقط المستوى على شكل حرف في بعض المواقف الرأسية كما في شكل (١٤٣-٢) أو الجانبية كما في شكل (١٤٣-ب) ولكنه لا يمكن أن يظهر على شكل حرف في المسقط الأفقى ، وفى الشكل (١٤٣-ح) يظهر المستوى المائل فى أكثر الأوضاع وجوداً إذ أنه يميل على مستويات الإسقاط الثلاثة ولذلك يظهر على شكل حرف فى أى مستوى منها .

تمثيل المستويات بطريقة الإسقاط الأفقى المرقوم :


يمكن تمثيل المستويات بهذه الطريقة إذا علم المسقط الأفقى المرقوم مستقيم يقع فى هذا المستوى ومتجهة متعامدة مع هذا المستقيم شكل (١٤٤) :

المعطيات : المسقط الأفقى المرقوم للمستقيم (١، ب، ١) والمتجهة المارة بالنقطة (ح) والمتعامدة مع المستقيم ١ ب وزاوية ميلها ٣٠° .

والمطلوب : تحديد المستوى ١ ب ح فى الفراغ وإيجاد مسقطه الرأسى والجانبي .

الحل : يمكن تحديد موقع المستقيم (١ ب) فى الفراغ بمعلومية مسقطه المرقوم (١ ب ١) من القواعد السابق ذكرها عند تمثيل المستقيمت ومن النقطة ح يمكن رسم المتجهة ح د - المعلوم اتجاهها والمتعامدة على المستقيم ١ ب فتقابله فى النقطة ( د ) . وبفس الطريقة السابق شرحها عند إسقاط المستقيمت يمكن إسقاط النقط الثلاثة ١ ، ب ، ح التى تمثل المستوى على كل من المسقطين الرأسى والجانبي ١، ب، ح ، ١، ب، ح كما هو موضح بالشكل (١٤٤) .

ويمكن كذلك استخدام المسقط الأفقى المرقوم لثلاثة نقت كما هو موضح بالشكل (١٤٥) .



(شكل ١٤٤)

تمثيل المستوى بعملية الإسقاط الأفق المرقوم لمستقيم واتجاهه


المعطيات : المسقط الأفق المرقوم للنقط  $1, 2, 3, 4$  على المستوى من  $1$ .  
ومعلوم البعد العمودى لهذه النقط عن المستوى الأفق من  $1$  وهو على التوالى  
 $1 = 4$  سم ،  $2 = 3$  سم ،  $3 = 4$  سم ،  $4 = 3$  سم .

المطلوب : تحديد المستوى  $1$  ب  $2$  فى الفراغ وإيجاد مسقطه الرأسى  
والخائى .

العمل : نحدد موقع النقط  $1, 2, 3, 4$  فى الفراغ بالاستعانة بمسقطها الأفق  
المرقوم وذلك بإقامة الأعمدة من  $1, 2, 3, 4$  وبالأطوال  $1$  سم ،  $2$  سم ،  
 $3$  سم على التوالى تحدد النقط  $1, 2, 3, 4$  ومنها يمكن إسقاط الأعمدة  
على كل من المستوى الرأسى من  $1$  وتحديد المسقط الرأسى  $1, 2, 3, 4$  والخائى  
 $1, 2, 3, 4$  .

### ٣ - إسقاط الأجسام :

يمكن إسقاط الأجسام بطريقة مشابهة للإسقاط المرقوم للمستويات  
والمستويات وذلك بإيجاد المسقط الأفق المرقوم لنقط سطح الجسم المختلفة




(شكل ١٤٥)

تمثيل المستوى بعملية المسقط الأفقي المرقوم لثلاثة نقط

ذات البعد المتساوي عن مستوى الإسقاط الأفقي (مستوى المقارنة) أى لإيجاد المسقط الأفقي لخطوط تقاطع سطح الجسم المراد إسقاطه مع مستويات أفقية ذات أبعاد ثابتة عن مستوى المقارنة ثم ترقيم خطوط التقاطع بقيم ارتفاعات المستويات الأفقية عن مستوى المقارنة .

ويوضح شكل (١٤٦) الإسقاط المرقوم لمخروط دائري قائم على المستوى  $س_١$  (مستوى قاعدة المخروط أو مستوى المقارنة) وهو عبارة عن المسقط الأفقي للمنحنيات الناتجة من تقاطع المستويات الأفقية  $س_١$  ،  $س_٢$  ،  $س_٣$  مع سطح المخروط . ويبعد المستوى  $س_١$  عن قاعدة المخروط بمقدار نصف ارتفاع المخروط (١٠ سم) كذلك يبعد  $س_٢$  عن  $س_١$  بمقدار ١٠ سم . ويتضح من الشكل (١٤٦) أن المسقط الأفقي المرقوم عبارة عن دائرتين متحدتي المركز تحمل الأولى الرقم (صفر) وتحمل الثانية الرقم (١٠) وهما عبارة عن بعد المستوى الواقع فيه خط تقاطع  $س_١$  ،  $س_٢$  مع سطح المخروط عن مستوى المقارنة (في هذه الحالة مستوى قاعدة المخروط) كذلك يظهر مسقط رأس المخروط كنقطة في مركز الدائرتين تحمل الرقم (٢٠) وهى بعد رأس المخروط عن مستوى المقارنة .



(شكل ١٤٦)

الإسقاط الأفق المرقوم قروط دائرى قائم

وبما سبق يتبين إمكانية تحديد أبعاد القروط فى الفراغ بمعلومية مسقطه المرقوم كذلك يمكن إيجاد مسقطه الرأسى (س٢) والجانبى (س٣) . وقد اتفق على تسمية خطوط تقاطع المستويات الأفقية ذات البعد المحدد عن مستوى المقارنة مع سطح الجسم المراد إسقاطه خطوط الكنتور ويتغير شكل وتوزيع خطوط الكنتور باختلاف الجسم المراد إسقاطه . وقد استعملت خطوط الكنتور فى رسم الخرائط الطبوغرافية والى تعرف بالخرائط الكنتورية لتمثيل التضاريس والمعالم الأرضية .

#### ٤ - الخرائط الجيولوجية :

الخريطة الجيولوجية هى تمثيل هندسى لطبيعة سطح الأرض مبيناً عليه توزيع الصخور وأنواعها فرق سطح الأرض وارتفاعها .  
وتستخدم الخريطة الجيولوجية لخدمة أغراض معينة ، فعلى سبيل المثال تحتاج مشروعات تخطيط الطرق ومد خطوط السكك الحديدية معلومات خاصة عن طبيعة صخور القشرة للسطحية ، بينما تحتاج المشروعات المائية مثل السدود والخزانات أو أساسات المباني والمنشآت تحت السطحية مثل الإنفاق بالإضافة



إلى ذلك معرفة مفصلة بأنواع تراكيب الصخور تحت السطحية . لذلك يختلف نوع الخريطة الجيولوجية اللازمة للخدمة مشروع هندسى أو تعدينى أو بترولى باختلاف المعلومات الجيولوجية المطلوب توضيحها على الخريطة . وأهم أنواع الخرائط الجيولوجية هى ما يأتى :

- ١ - الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية السطحية .
- ٢ - الخرائط الاستراتيجية الجغرافية .
- ٣ - خرائط الكنتورات التركيبية والجيولوجيا تحت السطحية .
- ٤ - الخرائط موحدة السمك ( الأيزوباك ) والخرائط موحدة العمق ( الأيزوباس ) .
- ٥ - خرائط السحنة .
- ٦ - خرائط الجغرافيا القديمة .
- ٧ - خرائط الجيوفيزيائية ( الطبيعة الأرضية ) والجيوكيميائية ( الكيمياء الأرضية ) .

#### ١ - الخرائط الطبوغرافية والجيولوجيا السطحية :

الخريطة الطبوغرافية عبارة عن مسقط أفقى لسطح الأرض أو لجزء من سطح الأرض توضح عليه المعالم الأرضية المختلفة التى تشمل التضاريس مثل التلال والوديان والسهول إلى غير ذلك ، كما تظهر على الخرائط الطبوغرافية المعالم المائية مثل البحار والبحيرات والبرك والأنهار وكذلك تظهر المراتق العامة مثل للسكك الحديدية والطرق والمباني والمنشآت المختلفة .


#### خط الكنتور أو خط المنسوب :

- هو خط مستقيم أو منحني يستعمل فى رسم الخرائط الكنتورية التى تمثل المعالم الطبيعية للمناطق مثل المرتفعات والمنخفضات . والخط الكنتورى يصل بين مجموعة من النقط لها نفس الارتفاع بالنسبة لسطح البحر . ويمكن

تعريف خط الكنتور « بأنه خط تقاطع مستويات أفقية تصورية مع سطح الطبيعة الأرضية » وتسمى المسافة الرأسية بين أى مستويين أفقيين متاليين من هذه المستويات بالفترة الكنتورية .

### الخريطة الكنتورية :

الخريطة الكنتورية عبارة عن مسقط أفقى مرقوم لسطح الأرض وتظهر على الخريطة مجموعة من خطوط الكنتور التي تصل بين نقط السطح ذات البعد المتساوى عن مستوى المقارنة ( منسوب سطح البحر ) ويحمل كل خط كنتور فى الخريطة رقماً يدل على منسوبه بالنسبة لسطح البحر ( ارتفاعاً أو انخفاضاً ) ويوضح شكل ( ١٤٧ ) خريطة كنتورية ( طبوغرافية ) .



( شكل ١٤٧ )


خريطة طبوغرافية ( كنتورية )

### خواص خطوط الكنتور :

١ - خطوط الكنتور لا تقاطع مع بعضها :

لما كان كل خط من خطوط الكنتور يمثل منسوباً معيناً يختلف فى قيمته عن منسوب خطوط الكنتور الأخرى فإنه لا يمكن أن يتقاطع خطين من


خطوط الكنتور لوجودهما في مستويين متوازيين على منسويين مختلفين . ويوضح شكل (١٤٨) هذه الخاصية فمثلا نجد أن خط الكنتور الذي يحمل الترقيم (١٠٠) يمثل جميع النقط التي ارتفاعها ١٠٠ متر عن مستوى سطح البحر ، كذلك خط الكنتور (٢٠٠) يمثل جميع النقط التي ارتفاعها ٢٠٠ متر عن سطح البحر وعلى ذلك فإنه لا توجد نقطة على أحد خطي الكنتور يمكن أن تحمل الترقيم (١٠٠) ، (٢٠٠) في وقت واحد وبذلك فإنه لا توجد نقط مشتركة بين خطي الكنتور ولذلك فإنهما لا يتقاطعا .



(شكل ١٤٨)

خطوط الكنتور


ولكن قد تظهر بعض خطوط الكنتور متقاطعة كما هو موضح بالشكل (١٤٩) حيث يظهر الكنتور (٤٠٠) وكأنه متقاطع مع خط الكنتور (٢٠٠) ولكن إذا تصورنا الشكل في الفراغ نجد أن هذين الخطين غير متقاطعين لكن يقع أحدهما فوق الآخر .



(شكل ١٤٩)  
التقاطع الكاذب لتقاطو الكنتور

٢ - لا تتلمع خطوط الكنتور مع خطوط أخرى لها نفس المنسوب أو مناسيب مختلفة :

عند إسقاط سطح رأسى على المقط الأفقى تظهر خطوط الكنتور وكأنها منلمجة على الرغم من اختلاف قيمها ويرجع ذلك إلى وجودها فى مستوى رأسى واحد والواقع يوجد إحداها فوق الآخر . ويوضح شكل (١٥٠) جرف رأسى تقاربت فيه خطوط الكنتور لدرجة كبيرة مما يجعلها تبدو وكأنها مندمجة ويلاحظ فى الشكل أن خطوط الكنتور التى تحمل أرقام ( ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٤٠٠ ) لها نفس الوضع الأفقى تقريباً ولكن يفصل بين كل منها ارتفاع رأسى قدرة ١٠٠ متر .





(شكل ١٥٠)

جرف رأسى يوضح خطوط الكنتور وكأنها مندرجة


### أنواع المنحدرات :

#### ( ١ ) ربوة أو هضبة بسيطة الانحدار :

عندما تؤثر عوامل التعرية والتآكل على تتابع صخرى يتكون من صخور مختلفة الصلادة وتتفاوت زوايا ميلها بين ١٠ إلى ٢٠° فإنه ينتج عن ذلك تركيب طبوغرافى يعرف بالربوة أو الهضبة بسيطة الانحدار كما هو موضح بالشكل ( ١٥١ ) ويتميز هذا التركيب بعدم تماثله حيث يحتوى على جانب خلقي طويل قليل الانحدار وجانب أمامى شديد الانحدار يعرف بالجرف ، وغالباً ما يتفق الانحدار الخلقى مع اتجاه ميل إحدى الطبقات شديدة المقاومة لتآكل فيطلق عليه الانحدر الميلى الخلقى .



(٩)



(شكل ١٥١)

(أ) هضبة بسيطة الانحدار

(ب) هضبة شديدة الانحدار

(ب) ربوة أو هضبة شديدة الانحدار :

عندما تؤثر عمليات التعرية والتآكل بنشاط على تتابع صخري يتكون من صخور متباينة الصلادة وكان هذا التتابع الصخري له زاوية ميل كبيرة فإنه ينشأ نتيجة لذلك مجموعة من الحضاب والمرتفعات المتأصلة يتميز مقطعها


باستطالة في الاتجاه العمودي على ميل الطبقات ، كذلك فإن عمل مياه الأنهار خلال الأوجه شديدة الانحدار من التركيب قد يزيد من عمقها نتيجة عملية النحر التي تقوم بها المياه لتعميق مجراها مكونة أخاديد عميقة تقسم المنحدرات إلى مجموعة من التلال والمنحدرات على شكل حزام . وتعتبر الهضاب بسيطة كانت أو شديدة الانحدار من المعالم الطبوغرافية التي توجد على نطاق إقليمي بمعنى أنها قد تشمل أكثر من إقليم أو قطر لذلك تعرف بالتضاريس الإقليمية . وجدير بالذكر أن المنحدرات من الظواهر التي تنشأ نتيجة تعرض الصخور لإجهادات شديدة تؤدي إلى نشأة فوالق بها .

٣ - تكون خطوط الكنتور منحنيات مقفلة أو منتهية عند حدود الخريطة :

عند تمثيل تل مخروطي تكون خطوط الكنتور دوائر متحدة المركز كما هو موضح بالشكل (١٤٦) ويلاحظ أن منسوب خطوط الكنتور في هذه الحالة يزداد كلما اتجهنا إلى الداخل في اتجاه المركز كما يلاحظ أن أقطار الدوائر الممثلة لخطوط الكنتور تقل كلما ارتفعنا واقتربنا من قمة التل . ولكن طبوغرافية الأرض غالباً ما تكون غير منتظمة فتكون درجة انحدار التل غير متساوية في الاتجاهات المختلفة لذلك قد يتغير شكل خطوط الكنتور فيتشوه أو يستطيل ولكن في جميع الحالات تكون خطوط الكنتور منحنيات مقفلة كما في شكل (١٥٢ - أ) وتمثل خطوط الكنتور المقفلة التلال والمنخفضات المحدودة ولكنها لا تشمل التضاريس بأكملها ، ولذلك قد يظهر التل على هيئة مجموعة خطوط الكنتور غير المقفلة في حدود الخريطة وتنحدر في اتجاه واحد كما في شكل (١٥٢ - ب) أو بمجموعة من خطوط الكنتور المفتوحة والتي تنحدر في اتجاهين . كما في شكل (١٥٢ - ج) .

**الوديان والأحواض :**

تطلق كلمة وادي على المسطحات المستوية المفتوحة ، بينما تطلق كلمة التراكيب والخرائط الجيولوجية



(أ)



(ب)



(ج)


(شكل ١٥٢)

خطوط الكنتور على شكل منحنيات مغلقة

حوض على المنخفضات المحاطة بمرتفعات من جميع الجهات .  
ويمكن تمثيل المنخفضات وأحواض الترسيب التي تنحدر إلى الداخل في جميع الاتجاهات بمجموعة من خطوط الكنتور المغلقة المتمركزة والتي يزداد منسوبها كلما اتجهنا إلى الخارج (بعيداً عن المركز) كذلك يقل قطرها كلما انخفض منسوبها واقترب خط الكنتور من قاع الحوض كما هو موضح بالشكل (١٥٣) وتمثل وديان الأنهار بمجموعة من خطوط كنتور مغلقة من ثلاث جهات على شكل حرف V يزداد اتساعها كلما اتجهنا ناحية المصب وتشير مقلمتها إلى اتجاه المنبع كما في الشكل (١٥٤) وتتوقف زاوية رأس حرف «V» على مراحل تكوين النهر . فتكون الزاوية حادة وعميقة في المرحلة الأولى لتكوين النهر والتي تعرف بمرحلة الشباب المبكر وتزداد اتساعاً وضخامة في المراحل الأخيرة من دورة تكوين النهر وتعرف بمرحلة البلوغ



والكهولة كما يتضح ذلك من الشكل (١٥٥) . وأهم نظم الصرف التي تتبعها الأنهار في مجاريها السفلية هي : النظام الشعاعي - النظام المركزي - النظام النحري - النظام الشبكي - النظام الحلقي وهي موضحة بالشكل (١٥٦).




(شكل ١٥٣)

خريطة كتورية تبين حوض ترسيب

وتصنف الأنهار تبعاً لتضاريس المنطقة وخواص الصخور السطحية بها والتراكيب الجيولوجية التي تتحكم في شكل النهر ونوع روافده وطريقة تجمعها ونظم الصرف الخاصة بكل منها إلى عدة أنواع أهمها :

#### (١) أنهار لاحقة Consequent stream :

وهي تلك التي تنساب خلال سهول منبسطة تتبع الميل الإقليمي للمنطقة التي يوجد بها النهر وتتميز هذه الأنهار بروافد على شكل تفرعات شجرية كما هو موضح بالشكل (١٥٦) وتتكون مثل هذه الأنهار عادة في المسطحات المستوية سواء كانت تتابعات صخرية من طبقات أفقية لينة متبادلة مع طبقات صلدة أو سطوح تأثرت بعوامل التآكل والتعرية .




(شكل ١٥٤)

نطاق وخريطة كتورية تبين الوديان

ر(ب) أنها تابعة Subsequent Stream

وهي تلك التي تنساب بين تباعات صخرية منحدرية المكونة من طبقات لينة بالتبادل مع طبقات صلدة . وفي هذا النوع من الأنهار يتبع مجرى النهر الطبقات اللينة فيغير من مجراه بعيداً عن الطبقات الصلدة التي تقاوم عمليات التآكل والتحرر ويمتاز هذا النوع من الأنهار بنظام الصرف الشبكي الموضح بالشكل (١٥٦) وقد تكون شدة انحدار الطبقات التي تمر فيها مثل هذه الأنهار سبباً في أن تنحدر مجراها خلال طبقات صلدة قوية .



(شكل ١٥٥)

دورة تكوين الأنهار

- |                |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| (أ) شباب متأخر | (ب) شباب مبكر  | (١) بداية النهر   |
| (و) بلوغ متأخر | (٢) بلوغ متوسط | (د) بلوغ مبكر     |
|                |                | (ز) مرحلة الكهولة |

### (ج) أنهار مطابقة Superposed Stream


وهي تلك التي تشق طريقها في الصخور قوية كانت أو ضعيفة نتيجة ملائمة تضاريس المنطقة . أي أن طبوغرافية المنطقة هي التي تتحكم في تحديد مجرى النهر دون اعتبار لصلادة الصخور .

### (د) أنهار سابقة التكوين Antecedent Stream


هي تلك التي تنساب خلال الشقوق والفواصل والتوالق سابقة التكوين بصخور المنطقة وبذلك يتبع مجرى النهر النظام التركيبي الموجود بالصخور . ويتميز هذا النوع من الأنهار بنظام الصرف التعامدى الموضح بالشكل (١٥٦) .

٤ - تتكرر خطوط الكنتور لنفس المنسوب لتدل على انعكاس في اتجاه الانحدار :


من المعلوم أن خطوط الكنتور تنتج من تقاطع مستويات أفقية مع سطح الأرض . فإذا تصورنا أن هذه المستويات الأفقية تتقاطع مع تل مخروطي منتظم كالموضح بالشكل (١٤٦) لتنتج عن ذلك خطوط كنتورية على شكل




النظام القاعدي




النظام شبه المتوازي




النظام النهرى



النظام الشعاعى



النظام المركزى



النظام المخروطى



النظام الشبائى



النظام الخيبرى

(شكل ١٥٦)

نظم صرف مياه الأنهار

منحنيات مقفلة (دوائر) ولكن إذا كانت التضاريس على شكل منطقتي ارتفاع بينهما منطقة وادي منخفض ، فإن خطوط الكنتور تتكرر على الجانبيين لتفصل بين منطقتي الارتفاع كما هو موضح بالشكل (١٥٤) .

٥ - اقتراب خطوط الكنتور من بعضها يدل على شدة الانحدار وتساوي المساحات المحصورة بين خطوط الكنتور يدل على الانحدار المنتظم :


خطوط الكنتور تعبيرات كمية عن معدل التغير في النسب وبمقارنة المسافة الأفقية الواقعة بين خطوط الكنتور لنفس الخريطة ( ذات فترة كتورية ثابتة ) ، نلاحظ أن تقارب خطوط الكنتور من بعضها دليل على شدة الانحدار كما أن تساوي المساحات بين خطوط الكنتور يدل على وجود انحدار منتظم في طبيعة الأرض ويبين الشكل (١٥٧) مدلولات التغير في الانحدار بالنسبة لتقارب أو تباعد خطوط الكنتور التي تمثل تل مصطبى الشكل .

اختيار الفترة الكتورية المناسبة للخرائط الكتورية :

يعتمد اختيار الفترة الكتورية المناسبة للخرائط الكتورية المختلفة على ثلاثة عوامل هي : ١ - مقياس رسم الخريطة : ٢ - معدل التغير في انحدار المنطقة المطلوب توقيعها على الخريطة ، ٣ - كثافة التفاصيل المراد توقيعها على الخريطة .

في الخرائط الاستلاعية ذات مقياس الرسم الصغير (أقل من ١ : ١٠٠,٠٠٠) ينبغي اختيار فترة كتورية كبيرة نسبياً وذلك لكي يمكن توضيح التغير السريع في طبوغرافية المنطقة المراد توقيعها على الخريطة ، بينما في الخريطة التفصيلية كبيرة المقياس نسبياً (أكبر من ١ : ١٠,٠٠٠) يفضل اختيار فترة كتورية صغيرة يمكن توضيح التغيرات الصغيرة الموجودة في طبوغرافية المنطقة . أي أن الفترة الكتورية تتناسب مع مقياس رسم الخريطة

تناسباً عكسياً . هذا ويجب أن تقل الفترة الكنتورية كلما زادت درجة عدم انتظام سطح الأرض ( معدل التغير في انحدار المنطقة المراد توقيتها على الخريطة ) وأن تكبر الفترة الكنتورية كلما كان سطح الأرض منتظماً .



(شكل ١٥٧)

دلالة اقتراب وابتعاد خطوط الكنتور

- (١) معدل انحدار متوسط (ب) معدل انحدار شديد (ح) سطح أفق

وتتناسب الفترة الكنتورية عكسيًا مع كثافة التفاصيل المراد توقيها على الخريطة فكلما زادت التفاصيل نَحْم أن تقل الفترة الكنتورية حتى يسمح ذلك بتوقيع هذه التفاصيل على الخريطة .

وجدير بالذكر أن اختيار الفترة الكنتورية يعتمد كذلك على عوامل اقتصادية فكلما صغرت الفترة الكنتورية كلما كبر حجم العمل الخفلى اللازم إنجازَه وكذلك ازدياد الوقت اللازم لاستكمال الخريطة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف توقيع الخريطة الكنتورية .

#### تفسير المعالم الطبوغرافية :

تؤثر العوامل الطبيعية والكيميائية والميكانيكية على صخور القشرة الأرضية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات عديدة تنشأ منها الأشكال الطبوغرافية المختلفة ، وأهم هذه العوامل ما يأتي :

١ - عوامل جيولوجية خارجية وتشمل عوامل التجوية والنقل والترسيب وتسمى عمليات التآكل والتعرية .


٢ - عوامل جيولوجية داخلية وتشمل النشاط البركاني والتحول وما يصحبها من حركات أرضية تسبب إجهادات مختلفة في الصخور مما يؤدي إلى تغير شكلها وحجمها وبالتالي ظهور التراكيب الثانوية بها مثل الطيات والقواصل والفوالق .

وسوف نورد فيما يلي أمثلة لبعض الظواهر الطبوغرافية الشائعة :

#### ١ - المصاطب والشرفات الطبوغرافية :

تتكون المصاطب والشرفات أحياناً نتيجة عمليات التآكل والتعرية ويطلق عليها عند ذلك مصطبة أو شرفة طبوغرافية ، أو قد تتكون نتيجة عمليات النَّحْت التي تقوم بها الأمواج البحرية أو النهرية ويطلق عليها شرفات

أو مصاطب التآكل البحري أو النهري .




(شكل ١٥٨)

المصاطب المنحوتة بالأمواج البحرية

المصاطب المنحوتة بالأمواج البحرية :

تحتوي هذه المصاطب عادة على صخور قوية متماسكة ينشئ طرفها جهة الشاطئ بجرف بحري وطرفها الآخر جهة البحر بشرفة أو مصطبة بحرية كما هو موضح بالشكل (١٥٨) . وتغطي هذا النوع من المصاطب عادة




(شكل ١٥٨ ب)

المصاطب المنحوتة بالأمواج

بفتات الصخور . وعندما ينحسر البحر عن المصطبة أو عندما ترتفع الأرض تحت تأثير الإجهادات والحركات الأرضية فتصبح المصطبة المهجورة ثم تبدأ الأمواج في نحت مصطبة أخرى منسوبها أقل من سابقها وهكذا تظهر المصاطب على الخريطة الطبوغرافية على شكل مجموعة مصاطب سلمية كما هو موضح بالشكل (١٥٩) .



(شكل ١٥٨ ب)




(شكل ١٥٩)

المصاطب السليمة

المصاطب المنحوتة بعوامل التعرية


عندما تتعرض تكاوين صخرية من طبقات أفقية لينة متبادلة مع طبقات صلدة لعوامل التآكل والتعرية تحت ظروف مناخية قارية فإن الطبقات اللينة تتآكل بدرجة أسرع من الطبقات الصلدة مما يؤدي إلى نشأة مصاطب صخرية على هيئة سطوح منضدية الشكل كما هو موضح بالشكل (١٦٠). وغالباً ما يتكون السطح المستوي العلوي للمصطبة من طبقة شديدة المقاومة للتآكل وتعرف بالغطاء الواقي ، أما الطبقات اللينة فإنها تتآكل بسهولة وينشأ عنها جروف متفاوتة الانحدار . وفي حالة تآكل طبقة الغطاء الواقي فإن الطبقة اللينة تعلو المصطبة وبذلك يسهل تأكلها عند القمة . ، بينما تتسع قاعدتها المستقرة على طبقة أكثر صلادة فتأخذ شكل المخروط كما هو موضح بالشكل (١٦١) .



صلاصات ■ حجر رملي ■ حجر جيري ■ رولويت

(شكل ١٦٠)

المصاطب المنضدية



(شكل ١٦١)  
المصاطب الحموية

### تفسير المعالم الجيولوجية :

سوف نذكر فيما يلي بعض التعريفات والإشارات المستخدمة على الخريطة الجيولوجية للدلالة على الأنواع المختلفة من الصخور .

**الغطاء الصخري :** ويطلق على طبقة الصخور السطحية التي تتكون غالباً من المواد الترابية المفككة بالإضافة إلى الفتات الصخري الناتج من تأثير عوامل التجوية وترتكز صخور الغطاء الصخري على صخور الأساس المتماصة . ويتكون الغطاء الصخري غالباً من طبقتين هما الطبقة العليا أو السطحية وتتكون من حبيبات دقيقة تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية وتعرف عادة بطبقة التربة . والطبقة السفلى وتتكون من فتات صخري أقل تحللاً وأكثر خشونة وتعرف عادة بالطبقة تحت التربة .

**الأساس الصخري :** يطلق على الطبقات الصخرية التي لم يعثر بها أي درجة من درجات التحلل أو التعمرية ويمكن اعتبارها مصدراً للفتات الصخري الذي يوجد في الغطاء الخارجي الذي يغطي طبقة الأساس .

**التكاوين الصخرية :** يطلق على كل مجموعة من طبقات الصخور المتوافقة والتي تتميز بمواضع صخرية وتركيب معدني واحد وسطح يمكن تحديدها بسهولة وتشابه صخور كل تكوين لدرجة يمكن اعتبارها وحدة صخرية واحدة بمعنى عدم وجود سطوح انفصال بين أي من طبقاتها ويمكن اعتبار طبقات التكوين الواحد مترامنة من ناحية عمرها الجيولوجي .

### سطوح الاتصال بين التكاوين :


سطح الاتصال هو ذلك السطح الذى يفصل بين وحدتين صخريتين مختلفتين في الخواص أو العمر الزمنى وقد تكون سطوح الاتصال ممثلة لسطوح متوافقة أو غير متوافقة فقد يوجد أكثر من سطح اتصال بين طبقات التكوين الواحد فعلى سبيل المثال سطحى اتصال في التكوين الصخرى الذى يحتوى على طبقة من الحجر الرملى تعلوها طبقة طفلية وأسفلها طبقة حجر جبرى .

### تمثيل الطبقات البسيطة

توجد الصخور الرسوبية في أغلب الأحيان على أشكال منتظمة تعرف بالطبقات ، كما توجد أحياناً الصخور النارية على أشكال منتظمة مثل الجدد والقواطع ، وليسهل توقيع هذه التكاوين الجيولوجية البسيطة على الخرائط يمكن اعتبار سمك الطبقات منتظماً في حدود الخريطة .

كما يمكن اعتبار السطح العلوى والسفلى للطبقة مستويين ويطلق على المسافة العمودية بينهما السمك الحقيقى للطبقة وتعرف المسافة الرأسية بين سطحى الطبقة العلوى والسفلى بالسمك الرأسى وأما المسافة بين مكشف سطحى الطبقة العلوى والسفلى فتعرف بالسمك الظاهرى . ويوضح الشكل (١٦٢) العلاقة بين السمك الحقيقى (ح) ، والسمك الرأسى (م) والسمك الظاهرى (هـ) في حالة ميل سطح الطبقة بزاوية بمقدارها  $(\theta)$  وانحدار سطح الأرض بزاوية قدرها  $(\alpha)$  .

فإذا كان سمك الطبقة صغيراً جداً فإنه يمكن اعتبار أن السطح العلوى ينطبق على السطح السفلى عند تمثيلهما على الخريطة أى أنه يمكن اعتبار



(شكل ١٦٢)  
العلاقة بين السمك الحقيقى والرأسى والظاهرى

سمك الطبقات الرقيقة مساوياً للصفر ، وفي هذه الحالة يمكن تمثيل مثل هذه الطبقات بسطح واحد هو السطح المتوسط بين السطحين العلوى والسفلى .

#### مكاشف الطبقات :


لو أن مجموعة من الطبقات ظلت أفقية بعد رفعها من تحت سطح البحر لتكون جزءاً من اليابس فإن أعلى طبقة في هذه المجموعة ستغطى كل الطبقات التى تحته تماماً .

ولكن عوامل التعرية لا تلبث أن تعمل على حفر الوديان ونحت الجبال والتلال ، وعلى منحدرات هذه الجبال والتلال لا بد أن تظهر أجزاء من الطبقات التى تحت الطبقة العليا والتى كانت مخفية في أول الأمر . ويسمى الجزء من الطبقة الذى يظهر على منحدراته الجبال أو على أى جزء من

سطح الأرض عامة بمكشَف الطبقة أو ما يظهر منها على سطح الأرض وهو ذلك الجزء المحصور بين الخطين اللذين يمثلان تقاطع السطح العلوى والسفلى للطبقة مع سطح الأرض .

**خطوط المضرب :** يمكن أن نتصور عدداً لا نهائياً من الخطوط الأفقية على السطح الأفقى فأى خط يرسم على هذا السطح مهما كان اتجاهه يكون أفقياً . ولكن إذا كان السطح مائلاً فإن جميع الخطوط الأفقية التى يمكن رسمها عليه تكون متوازية وفى اتجاه واحد ومتعامدة على الخط الذى يكون فيه السطح مائلاً أكثر ما يمكن وتسمى هذه الخطوط الأفقية المتوازية خطوط المضرب . وتسمى المسافة العمودية بين مسقط أى خطى مضرب متتاليين على الخريطة الفترة المضربية .

**ميل الطبقات :** يسمى الاتجاه الذى يبلغ عنده ميل سطح الطبقة انحناءه « اتجاه الميل » ويعرف أيضاً باتجاه الميل الحقيقى للتمييز بينه وبين الاتجاهات الأخرى فوق سطح الطبقة التى تميل فيها الطبقة بمقدار أقل وتسمى هذه الاتجاهات الأخرى باتجاهات الميل الظاهرى . ويقاس مقدار الميل عادة سواء كان حقيقياً أو ظاهرياً بالزاوية الرأسية بين السطح المائل للطبقة وسطح آخر أفقى وتعرف هذه الزاوية بزاوية الميل ( $\theta$ ) ومن البديهي فإن زاوية ميل خط المضرب تساوى صفرأً وكلما ابتعدنا نحو اتجاه الميل الحقيقى زادت قيمة الزاوية حتى تصل إلى اتجاه الميل الحقيقى (وهو اتجاه متعامد على خط المضرب) حيث تكون الزاوية أكبر ما يمكن إذ أننا لو تعدنا هذا الاتجاه فى الناحية الأخرى لقلت الزاوية تدريجياً إلى أن تصل إلى الصفر مرة أخرى كما هو موضح بالشكل (١٦٣) ويقاس الميل عادة بالدرجات أو بالتر فى الكيلومتر أو — بنسبة مئوية للارتفاع أو الانخفاض الذى يحدث للطبقة المائلة بالنسبة لمستوى أفقى . وعلى سبيل المثال إذا ارتفع سطح طبقة ما بالنسبة لمستوى أفقى ١٠٠ متر فى مسافة مقدارها ٥٠٠ متر وفى اتجاه عمودى على اتجاه مضرب الطبقة ويقال إن النسبة المئوية للميل مقدارها ٢٠٪ .



(شكل ١٦٣)

علاقة السطح المائل بالمستوى الأفقي

(ب) مستوى مائل

(١) مستوى أفقي

خصائص الطبقات :

## (١) الطبقات الأفقية :

يتساوى ارتفاع جميع النقط على سطح الطبقات الأفقية ولذلك فإن مكاشف هذه الطبقات لها صفات خطوط الكنتور كما يتضح ذلك من الشكل (١٦٤ - ١) ويلاحظ أن مكاشف الطبقات الأفقية تطابق أقرب خطوط الكنتور على الخريطة . كذلك تظهر مكاشف الطبقات الأفقية القديمة في الوديان وتعلوها الطبقات الأحدث عمراً مكونة قمم التلال والمرتفعات . وتتميز التتابعات الصخرية الأفقية بوجود نظم صرف متفرعة مثل فروع الشجر وتظهر خطوط الكنتور التي تمثل الوديان وكذلك مكاشف الطبقات الأفقية على شكل حرف (V) وتوجه رؤوسها نحو أعلى الودى أو المنيع ، بينما تفتح الكنتورات ومكاشف الطبقات الأفقية جهة المصب ويحسب سمك الطبقات الأفقية بطرح منسوب سطح الاتصال السفلى من منسوب سطح اتصالها العلوى .


وبدل ظهور مكاشف الطبقات الأفقية على الخريطة على هيئة شريط ضيق على أن الطبقة إما أن تكون رقيقة أو أن مكشفاها يقع على جرف

شديد الانحدار . أما إذا كانت مكاشف الطبقات الأفقية عريضة فإن الطبقة إما أن تكون سميكة أو أن مكشفيها يقع على هضبة بسيطة الانحدار .

وتظهر الطبقات الأفقية التي تعلو قمم المصاطب الطبوغرافية على الخريطة الجيولوجية على شكل حلقات متمركزة في مسطحات من تكاوين صخرية حديثة تحيطها تكاوين أقدم عمراً ويطلق على مثل هذا التركيب عادة «الحديمة» (Outier) بينما تظهر الطبقات الأفقية التي تبطن الأحواض الرسيية على شكل حلقات متمركزة من تكاوين قديمة تحيطها صخوراً أحدث عمراً ويطلق على مثل هذا التركيب عادة «القديثة» (Inlier) ويستعمل هذين التعبيرين أيضاً بالنسبة للطبقات التي تعرضت للطي والتصدع في حالة ظهورها على الخريطة بنفس الأشكال السابق ذكرها .

### (ب) الطبقات الرأسية :

تظهر مكاشف الطبقات الرأسية على الخريطة على شكل خطوط مستقيمة موازية لخطوط مضرب الطبقة كما هو موضح بالشكل ( ١٦٤ - ب ) ويلاحظ أن مكاشف الطبقات الرأسية لا تتأثر بالخطوط الكنتورية .



(شكل ١٦٤)


مكاشف الطبقات الأفقية والرأسية

(ب) مكاشف الطبقات الرأسية

(أ) الطبقات الأفقية

## ( ٣ ) الطبقات المائلة :

لا توازي مكاشف الطبقات المائلة خطوط المضرب ولا تطابق خطوط الكتورية ولكنها تتقاطع مع خطوط الكتور كما في شكل ( ١٦٥ ) . وتظهر مكاشف الطبقات المائلة على هيئة حرف « V » إذا كان ميلها في اتجاه المنبع أى




( شكل ١٦٥ )

مكاشف الطبقات المائلة

عكس انحدار سطح الأرض وتشير رؤوسها في هذه الحالة جهة المنبع كما هو موضح بالشكل ( ١٦٦ ب ) أما إذا كان ميل الطبقة جهة المصب أى في نفس اتجاه انحدار سطح الأرض وبزاوية ميل أكبر فتشير رؤوس حرف ( V ) في هذه الحالة إلى المصب كما هو موضح بالشكل ( ١٦٦ ج ) . أما في حالة الطبقات التي تميل جهة المصب بزاوية أقل من انحدار سطح الأرض فإن مكاشفها تظهر على شكل حرف ( V ) وتتجه رؤوسها إلى المنبع كما هو موضح بالشكل ( ١٦٦ د ) .

ويدل ظهور مكاشف الطبقات المائلة على هيئة شريط رفيع على أن الطبقة رقيقة أو أن المكشف على وجه جرف شديد الانحدار أو أن ميل الطبقة كبيراً ، وقد يرجع ذلك لهذه الأسباب مجتمعة . ويدل ظهور مكاشف الطبقات المائلة على هيئة شريط عريض على أن سطح الأرض قليل





طبقات أفقية



طبقات مائلت

(شكل ١٦٦)


علاقة الطبوغرافيا بمكاشف الطبقات

الانحدار أو أن زاوية ميل الطبقة صغير أو للأسباب الثلاثة مجتمعة كما هو موضح بالشكل (١٦٦).

### توقيع مكاشف الطبقات :

من الواضح أن مكشف الطبقة عبارة عن نقط مشتركة بين سطح الطبقة و سطح الأرض أي أنها عبارة عن مجموعة من النقط يكون فيها منسوب سطح الطبقة مساوياً لمنسوب سطح الأرض. وبما أن خطوط المضرب تبين الارتفاعات على سطح الطبقة كما تبين خطوط الكنتور الارتفاعات على سطح الأرض ،

لذلك فإن أى نقطة يتساوى عندها منسوب خط الكنتور وخط المضرب تعتبر نقطة مكشف أى أن نقطة المكشف هى النقطة التى يتقاطع فيها خط كنتور وخط مضرب لهما نفس الارتفاع ويوضح الشكل (١٦٧) نقطة المكشف والعلاقة بين الفترة الكنتورية والفترة المضربية .



(شكل ١٦٧)

(١) ، (ب) نقطتا مكشف على سطح الطبقة  
(θ) زاوية ميل سطح الطبقة

ويتضح من الشكل أن النقطتين أ ، ب نقطتى مكشف فإذا فرضنا أن ارتفاع النقطة (أ) هو ٥٠٠ متر والنقطة (ب) هو ٤٠٠ متر فإن هذا يعنى أن النقطة (أ) يمر بها كنتور ومضرب ارتفاعهما ٥٠٠ متر وأن النقطة (ب) يمر بها كنتور ومضرب ارتفاعهما ٤٠٠ متر . فتكون الفترة الكنتورية أى المسافة الرأسية بين كنتورين متتالين (أ) تساوى ١٠ متر وهى تساوى المسافة الرأسية بين مضربين متتالين أى ١٠٠ متر . أما المسافة الأفقية بـ ح فهى المسقط الأفقى للمساهمة العمودية بين مضربين متتالين أو ما اصطلاح على تسميته الفترة المضربية فإذا كانت زاوية ميل الطبقة تساوى (θ) فإن مقدارها يمكن حسابه من المعادلة الآتية :

$$\text{ظا } (\theta) = \frac{\text{الفترة الكنتورية}}{\text{الفترة المضربية}} \times \text{مقياس رسم الخريطة .}$$

وبالمثل يمكن إيجاد العلاقة بين زاوية الميل الظاهرى (θ) وهى الزاوية التى يصنعها مستوى الطبقة مع مستوى أفقى فى اتجاه غير اتجاه الميل الحقيقى من المعادلة الآتية:


$$\text{ظا } (\bar{\theta}) = \frac{\text{الفترة الكنتورية}}{\text{الفترة المضربة الظاهرية}} \times \text{مقاس رسم الخريطة} .$$

وتمتاز مكاشف الطبقات المائلة بأنها غير منتظمة وكلما زاد ميل الطبقات كلما زاد عدم انتظام مكشفها . ولقد اتفق على اعتبار الطبقات المائلة منتظمة السمك يحدها من أعلى سطح علوى ومن أسفل سطح سفلى .

وتتبع الخطوات الآتية لرسم مكشف الطبقات المائلة :

- ١ - تحديد نقط مكشف كل من السطح العلوى والسفلى للطبقات كما سبق شرحه وذلك بإيجاد نقط تقاطع خطوط المضرب مع خطوط الكنتور المساوية لها فى الارتفاع .
- ٢ - نبدأ بتوصيل نقط مكشف كل سطح على حدة ابتداءً من النقط الأقل منسوباً إلى النقط الأعلى منسوباً على التوالى وبالترتيب . ويراعى كذلك اتباع قاعدة منحنى جيب الزاوية عند توصيل نقط المكشف .
- ٣ - يلاحظ أن مكشفي السطح العلوى والسفلى لا يقطعان خطوط المضرب أو الكنتور إلا فى نقط المكشف .
- ٤ - عند مرور منحنى المكشف بنقطة ظهور فإنه يمر من إحدى الزوايا إلى الزاوية المقابلة بالرأس وينصف الزاوية بين خط المضرب والمماس لحظ الكنتور عند النقطة .
- ٥ - منحنى المكشف إما أن يكون منحنى مقفل أو ينتهى عند حدود الخريطة .

ويتضح من الشكل (١٦٨) الخطوات التى اتبعت فى رسم مكشف طبقة رقيقة جداً ومائلة (عندما تكون الطبقات رقيقة جداً فإنه يمكن تمثيلها بسطح واحد هو السطح المتوسط بين العلوى والسفلى للطبقة) .



(شكل ١٦٨)

رسم مكاشف الطبقات المائلة

### إسقاط الطبقات المائلة على الخرائط الكنتورية :

يمكن إسقاط الطبقات المائلة على الخرائط الكنتورية إذا أمكن رسم خطوط مضارب هذه الطبقات على الخرائط. ويقاس مقدار ميل ومضرب الطبقات بطريقة مباشرة بواسطة أجهزة قياس الانحراف والميل المختلفة مثل البوصلة ، الكلينومتر ، مسطرة قياس الميل ، ميزان أنبي وغيرها . وفي كثير من الأحيان لا يمكن قياس ميل الطبقات واتجاهها بطريقة مباشرة فيستعان عند ذلك بالطرق غير المباشرة لتحديد ميل الطبقات واتجاهها . كما يستعان كذلك بأسس الهندسة الوصفية في حساب مقدار ميل واتجاه الطبقات بمعلومية بعض القياسات الأخرى. وفيما يلي أهم الطرق المتبعة في حساب ميل الطبقات ومضاربها وذلك لإسقاطها على الخرائط الكنتورية .

١ - معلومية نقطة مكشف واتجاه خطوط المضرب ومقدار الميل الحقيقي للطبقة :

المعطيات : بخريطة كنتورية موضحة بالشكل (١٦٩) معلوم نقطة

مكشّف على سطح طبقة رقيقة بائثة بزاوية قدرها  $(20^\circ >)$  ومعالم كذلك  
اتجاه خطوط المضرب (ش ٩٠ ق) .


المطلوب : إسقاط الطبقة الرقيقة على الخريطة الكنتورية .

العمل :

١ - ارسم خط المضرب  $(> >)$  يمر بالنقطة  $(\nu)$  واتجاهه ش  $90^\circ$  ق  
حيث إن نقطة  $(\nu)$  تقع على خط الكنتور ٨٠٠ متر فإنه يمكن استنتاج  
أن ارتفاع خط المضرب المار بهذه النقطة يساوي ٨٠٠ متر .

٢ - ارسم المقطع الرأسي  $(ا ب)$  عمودياً على خط المضرب  $(> >)$

وارسم الزاوية  $(ب أ هـ)$  تساوي زاوية ميل الطبقة  $20^\circ$  فيمثل الخط  $(ا هـ)$   
أثر سطح الطبقة على المستوى الرأسي ثم قسم الخط  $(ا ب)$  إلى أقسام  
متساوية كل منها تساوي الفترة الكنتورية ١٠٠ متر مستخدماً نفس مقياس  
رسم الخريطة .



(شكل ١٦٩)

رسم مكشّف الطبقة بعملية نقطة مكشّف واتجاه خطوط المضرب ومقدار الميل

- ٣ - من كل نقطة على الخط ( ا ، ح ) ارسم مستقيماً يوازي ( ا ب ) حتى يقطع ( ا ب ) في نقط على سطح الطبقة تبعد كل منها عن الأخرى مسافة رأسية قدرها ١٠٠ متر ومن كل نقطة من نقط التقاطع على الخط ا ب .
- ٤ - ارسم خطوطاً توازي الخط ( ح ، د ) فتكون هذه الخطوط هي خطوط المضرب التي ارتفاعها في اتجاه الجيوب ويزداد في اتجاه الشمال .
- ٥ - اتبع الخطوات السابق شرحها لتحديد نقط المكشف ومنحنى المكشف .

## ٢ - معلومية ثلاث نقط :

إذا أمكن تحديد موقع ثلاث نقط على سطح الطبقة تحديداً كاملاً وبشرط علم وجود هذه النقط الثلاثة على خط واحد كما يشترط علم وجود طيات أو فوالق على سطح الطبقة بين هذه النقط الثلاثة فإنه يمكن استخدام هذه النقط الثلاثة لتحديد ميل سطح الطبقة ومضربها ويوضح المثال الآتي هذه الطريقة :

المعطيات : معلوم النقط الثلاثة ( ا ، ب ، ح ) على سطح طبقة رقيقة مائلة كما هو موضح بالشكل ( ١٧٠ ) الذي يوضح المسقط الأفقي لهذه النقط وارتفاعاتها عن مستوى سطح البحر .

المطلوب : إيجاد ميل سطح الطبقة ومضربها .

العمل : ١ - حدد أي محور ( م ص ) أسفل المثلث ( ا ب ح ) .

٢ - إسقط النقط ا ، ب ، ح عمودياً على الخط م ص فتقطعه في  $\bar{ا}$  ،  $\bar{ب}$  ،  $\bar{ح}$  .

٣ - عين النقط (  $\bar{ا}$  ،  $\bar{ب}$  ،  $\bar{ح}$  ) على امتداد ( ا  $\bar{ا}$  ، ب  $\bar{ب}$  ،

ح  $\bar{ح}$  ) بحيث تمثل هذه الخطوط ارتفاع النقط ( ا ، ب ، ح ) في المسقط

الرأسي ثم وصل المثلث (أ ب ح) فيكون هو المسقط الرأسى للمثلث ،  
( ا ب ح ) .

٤ - ارسم المستقيم ح و موازياً للمحور من ص ليقطع آ ب في و .  
يلاحظ أنه يوجد لدينا الآن نقطتان على سطح الطبقة لها نفس الارتفاع  
وهاتين النقطتين هما ح ، و . ثم نصل الخط ( ح و ) ليكون هو خط  
مضرب الطبقة .

٥ - ولإيجاد ميل الطبقة نستخدم مسقطاً رأسياً آخر تظهر فيه زاوية ميل  
الطبقة بمقدارها الحقيقي .

ارسم المحور (س ص) في الركن الشمالى الغربى من ورقة الرسم عمودياً  
على الخط ( ح و ) ثم اسقط على هذا المحور الخط ( ح و ) فيظهر في  
المستوى العمودى على شكل نقطة (و<sup>م</sup> ، ح<sup>م</sup>) ثم اسقط باقى النقط  
( ا ، ب ، ح ) ثم وصل النقط ( ا<sup>م</sup> ، ب<sup>م</sup> ، ح<sup>م</sup> ) ولاحظ أنها جميعاً  
تقع على خط واحد وتكون زاوية ميل المستوى (  $\theta$  ) هى الزاوية ( ا<sup>م</sup> ب<sup>م</sup> م<sup>م</sup> ) .  
ملاحظة : يراعى عند اختيار المحور (س ص) إن يكون مواجهاً لأكثر  
لنقط ارتفاعاً وبمىث تكون النقطتين الباقيتين على جانبي أكثر النقط ارتفاعاً .

٣ - معلومية ميلين ظاهرين مقداراً واتجهاً :

لا تظهر الطبقة عادة فى الطبيعة بمىث يمكن قياس زاوية ميلها الحقيقى  
والمك نلجأ إلى قياس زاويتين للميل الظاهرى من قطاعين رأسيين ظاهرين  
للطبقة وغير متعامدين على خطوط مضربها .

وما لاشك فيه أننا نفترض فى هذه الحالة أن قياس زاويتى الميل  
الظاهرى فى - القطاعين لنفس الطبقة وأن امتداد سطح الطبقة بين هذين  
القطاعين لا توجد به طيات أو فوالق . وفيما يلى بعض الأمثلة التى تبين  
طريقة حساب مقدار الميل واتجاه المضرب إذا علم اتجاهين للميل الظاهرى .







مضرب على سطح الطبقة .

٤ - نسط (٢ ع) عمودياً على (س ص) ليقطع خط المضرب (س ص) في نقطة (و) ثم نتخذ (٢ ع) كمحور ونرسم (و م) عمودياً على (٢ ع) مساوياً للعمق (هـ) في الطول (١٠٠ متر) وبذلك تصبح لدينا النقطة (م) على بعد مقداره (هـ) أسفل الخط (٢ ع) ولما كان الخط (س ص) تقع على بعد ١٠٠ متر من النقطة (٢) فإن النقطة (م) تقع بالضرورة على الخط (س ص) .


وعلى ذلك فإنه يوجد لدينا نقطتان ٢ ، م يقعان على نفس مستوى التطابق وكذلك في المستوى العمودي على خط المضرب وعلى ذلك فإن الزاوية (ع ا م) لا بد وأن تساوي زاوية الميل الحقيقية .

ومن الشكل يمكن أن نستنتج أن انحراف خط المضرب  $0.20^\circ$  (ش ٢٠ ق) وزاوية الميل الحقيقية تساوي  $(50^\circ)$  .

ويمكن الحصول على مقدار زاوية الميل الحقيقي مباشرة بواسطة زاوية الميل الظاهري باستعمال الخطوط البيانية Nomographs كما هو موضح بالشكل (١٧٢) وذلك إذا كانت الزاوية بين مضرب سطح الطبقة وأثر المستوى الرأسى الذى تظهر فيه زاوية الميل الظاهري معلومة وتستخدم هذه الطريقة في حالة تحويل عدد كبير من زوايا الميل الظاهرية إلى زوايا الميل الحقيقي .  
الخطوط البيانية للميل الحقيقي بمعلومية الميل الظاهري وزاويتي خط القطاع مع مضرب الطبقة .

وفي بعض الأحيان يتعذر قياس زاويتي الميل بأجهزة قياس الزوايا وفي مثل هذه الأحوال يمكن التعبير عن الميل بالنسبة المئوية لارتفاع الطبقات أو انخفاضها . وفيما يلي مثال يوضح طريقة حساب الميل الحقيقي واتجاه خطوط مضرب سطح الطبقة في حالة معرفة النسبة المئوية لميل طبقة في اتجاهين معلومين .

زاوية الميل الحقيقي      زاوية الميل الظاهري      الزاوية بين خط القطع وخط مضرب الطبقة




(شكل ١٧٢)

الخطوط اليازية للميل الحقيقي بعملية الميل الظاهري وزاوية خط القطع مع مضرب الطبقة

المعطيات : معلوم نسبة ميل سطح طبقة رقيقة مقدارها ١ : ١٠٠ في الاتجاه الذي ينحرف  $320^\circ$  (ش  $40^\circ$  غ) ويميل أيضاً بمقدار ١ : ١٧٥ في الاتجاه الذي ينحرف  $25^\circ$  (ش  $25^\circ$  ق) كما هو موضح بالشكل (١٧٣) المطلوب : إيجاد اتجاه وبمقدار الميل الحقيقي للطبقات .

### العمل :

ارسم المستقيمتين  $A$  ،  $B$  ،  $C$  اللذان ينحرفان  $320^\circ$  ،  $25^\circ$  على التوالي . حدد المسافات ١٠٠ متر ، ١٧٥ متر بمقياس رسم مناسب على كل من  $A$  ،  $B$  ،  $C$  على التوالي لنحصل على التقاطعين  $S$  ،  $V$  ثم نصل  $S$  من  $V$  فنحصل على اتجاه مضرب الطبقات نسقط العمود  $A$  ع على  $S$  من  $V$  فنحصل على اتجاه الميل الحقيقي وأما مقدار الميل الحقيقي فنحصل عليه من الشكل بقياس المستقيم  $A$  ع الذي يعطينا مقدار ميل الطبقة الحقيقي ومقداره ١ : ٩٨ .



تحديد اتجاهات الطبقة بمطوية النسبة الثورية للميلين ظاهريين

### ٤ - تحديد ميل وانحراف خط تقاطع مستويين :

يعتبر تحديد ميل وانحراف تقاطع مستويين من المعلومات الهامة التي تترجم عند إسقاط الطبقة وفيما يلي مثال يوضح الطريقة المتبعة لذلك :

## المعطيات :

ينحرف خط مضرب مستوي معين  $0.50^\circ$  (ش  $50^\circ$  ق) ويميل  $45^\circ$  في الاتجاه (ش غ) شكل (١٧٤) والمستوى الآخر ينحرف مضربه  $320^\circ$  ويميل  $60^\circ$  في الاتجاه (ش غ) مع العلم أن هذه الأرصاد أخذت على ارتفاع واحد بالنسبة للمستويين وهو  $500$  متر من سطح البحر .

## المطلوب :

إيجاد ميل وانحراف تقاطع هذين المستويين .


## العمل :

ارسم خطا المضرب (أ ب) ( $0.50^\circ$ ) ، (د ح) ( $320^\circ$ ) من نقطتي مكشف السطحين المراد تحديد خط تقاطعهما (هـ ، و) الواقعتين على منسوب قدره  $500$  متر من سطح البحر . مد خطي المضرب (أ ب ، د ح) حتى يتقاطعا عند نقطة (م) .

٢- ارسم العمودين (س ص) ، (ل ط) ليمثلا محوري دوران المستويين المائلين لينطبقا على المستوى الأفقي ويمران بالنقطتين (هـ ، و) على التوالي .

٣- من هذين العمودين ارسم زاويتي الميل (ع هـ س)  $45^\circ$  ، (ل و م)  $60^\circ$  وفي اتجاه ميل كل سطح منهما ثم حدد النقطتين (ع ، م) بحيث يكون (ع ع) يساوي (م م) يساوي  $100$  متر بمقياس الرسم المستخدم وعلى ذلك فإن (ع ع) ، (م م) يقعان أسفل المنسوب  $500$  متر بمقدار  $100$  متر .

٤- مد المستقيمين (ع ع) ، (ر ر) على استقامتهما حتى يتلاقيا (م) . ثم صل المستقيم (م م) فيكون هو خط تقاطع السطحين وانحرف هذا المستقيم يمثل انحراف خط التقاطع المطلوب .



(شكل ١٧٤)

تحديد ميل وانحراف خط تقاطع مستويين

٥- ارسم المستقيمين ( م م ) ، م ن عمودين على ( م م ) ثم ارسم المستقيم ( م ن ) على أى بعد مناسب ليمثل محور دوران المستوى الرأسى الذى يحتوى على خط التقاطع ( م م ) لينطبق على المستوى الأفقى موازياً للمستقيم ( م م ) ثم وقع المسافة ( ن ن ) تساوى ١٠٠ متر. فتكون الزاوية ( ن م ن ) وهو زاوية ميل خط التقاطع ( م م ) .

ملحوظة :

حصلنا على اتجاه الانحراف فى مستوى رأسى يوازى انحراف الخط ،  
وبما حصلنا على مقدار زاوية الميل فى مستوى رأسى عمودى على المضرب .



## المطلوب :

تحديد الميل والسلك وعرض المكشف الظاهري في مستوى رأسى ينحرف  
أثره على المستوى الأفقى في الاتجاه ( ق غ ) على عمق - ٥٠٠ متر من سطح  
الأرض .

## العمل :

١- نرسم خط المضرب  $\Delta$  ب (  $٠٦٠^\circ$  ) ثم نرسم مستقيماً ينحرف في  
الاتجاه ( ق ع ) في أى مسافة مناسبة على ورقة الرسم ويتقاطع مع (  $\Delta$  ب )  
في النقطة ( م ) .

٢- نرسم محور الدوران ( د ه ) عمودياً على خط المضرب ثم نرسم الميل  
الحقيقى يصنع (  $٤٥^\circ$  ) مع هذا العمود وتوقع السلك الحقيقى ١٠٠ متر عمودياً  
على  $\Delta$  بمقياس رسم مناسب .

٣- ارسم ( د و ) موازياً للمستقيم ( اب ) ليقطع ( ق ع ) في ( س ) .  
ارسم ( س ص ) عمودياً على ( ق غ ) بحيث يكون ( س ص ) مساوياً للطول  
( د و ) .

٤- وصل ( ص م ) فتكون الزاوية ( س م ص ) هى زاوية الميل الظاهري .  
ويكون ( س س ) هو مقدار السلك الظاهري .


ويكون ( م س ) هو عرض المكشف الظاهري للطبقة في المستوى المعلوم .

## القطاع البروفيلى :

هو شكل يوضح هيئة سطح الأرض كما لو كانت تظهر في مستوى رأسى  
تصورى أثره في المسقط الأفقى ( مستوى الخريطة ) هو خط التقطاع الذى  
يطلق عليه أحياناً خط التاعدة أو خط الأساس ( س ص ) فتمثل نهايتى



خط القطاع التقطين س ، ص على الخريطة بخطين في المستوى الرأسى ( مستوى القطاع ) هما (س أ) . ( ص ب ) كما هو موضح بالشكل ( ١٧٦ ) ويطلق على هذين الخطين « خطا النهاية » ويمثل خط البروفيل « وهو الخط العلوى فى مستوى القطاع » خط تقاطع المستوى الرأسى مع سطح الأرض . ويرسم القطاع عادة بحيث يكون مقياس الرسم على الأحداثى الأفقى



(شكل ١٧٦)

القطاع البروفيل

مساوياً لمقياس الرسم على الأحداثى الرأسى وفى هذه الحالة يقال أن القطاع مرسوم بمقياس طبيعى . ولكن يبالغ أحياناً فى مقياس الرسم الرأسى خصوصاً عندما يكون التغير فى شكل سطح الأرض طفيفاً وذلك لتأكيد وتوضيح مواضع التلال والوديان .

### الآبار الاخبارية :

يطلق على البئر الذى ينشأ من سطح الأرض حتى يصل إلى طبقة معينة يراد معرفة بعدها عن سطح الأرض بئراً اختيارياً .

وتحفر هذه الآبار عادة في اتجاه رأسى حتى تصل إلى الطبقة المراد معرفة بعدها عن سطح الأرض . وبحسب العمق الذى لا بد أن تحفر البئر إليه حتى تصل إلى سطح طبقة معينة بطرح ارتفاع سطح الطبقة وهو ارتفاع مكشفيها في حالة الطبقات الأفقية أو ارتفاع خط المضرب المار بالنقطة التي يبدأ فيها الحفر في حالة الطبقات المائلة من ارتفاع خط الكتور المار بنفس النقطة .

ويمكن تحديد عمق الطبقة عند نقطة معينة بمعلومية بعدها عن المكشف :

( أ ) إيجاد العمق ( ع ) إذا كان سطح الأرض أفقياً والبعد ( ف ) مقاساً في اتجاه عمودى على اتجاه خطوط مضرب الطبقة كما هو موضح بالشكل ( ١٧٧ - أ ) .

$$ع = ف \tan \theta$$

حيث  $(\theta)$  = زاوية ميل الطبقة .

( ب ) إيجاد العمق ( ع ) إذا كان سطح الأرض ينحدر في نفس اتجاه ميل سطح الطبقة والبعد ( ف ) مقاساً في اتجاه عمودى على اتجاه خطوط مضرب الطبقة كما هو موضح بالشكل ( ١٧٧ - ب ) .

$$ع = ف (\text{جتا } \theta - \text{جا } \alpha)$$

حيث  $\alpha$  = زاوية انحدار سطح الأرض ( الزاوية المحصورة بين سطح الأرض والمستوى الأفقى ) .

( ج ) إيجاد العمق ( ع ) إذا كان سطح الأرض ينحدر في عكس

اتجاه ميل سطح الطبقة والبعد (ف) مقاساً في اتجاه عمودي على اتجاه خطوط المضرب كما هو موضح بالشكل (١٧٧ - ج) .




$$ع = ف (جتا \theta + \theta \text{ جا } \alpha)$$

(د) لإيجاد للعمق (ع) إذا كان سطح الأرض مائلاً والبعد (ف)

مقاساً في اتجاه غير عمودي على خطوط المضرب ويصنع زاوية قدرها (س)

مع خطوط المضرب كما هو موضح بالشكل (١٧٧ - د) .

$$ع = ف (جتا \theta \text{ ظا } \beta \text{ جا } \alpha \pm \text{ جا } \alpha)$$



(شكل ١٧٧)

عن الطبقة بعملية يبعث عن المكشوف