

## **الفصل الخامس**

# **تكامل ريمان**

# الفصل الخامس

## تكامل ريمان

### 1- تكامل ريمان-ستليجس

قبل التطرق إلى تعريف تكامل ريمان<sup>1</sup> نستهلّ بتعريف تكامل ريمان-ستليجس<sup>2</sup> (Riemann-Stieljes)، ومن ثم نستخلص تعريف تكامل ريمان حيث نبين أنَّ هذا الأخير ما هو إلا حالة خاصة من تكامل ريمان-ستليجس الذي له تطبيقات عديدة نذكر منها استعماله بكثرة في التحليل الدالي ونظرية الاحتمالات والإحصاء. نشير إلى أنه ليس من هدفنا دراسة أيٌّ من التكاملين فلا نتمادي في إثبات كل المبرهنات حتى لا يمل القارئ من نتائج يعرفها سلفاً، ولذا ننصح كل من لديه فكرة عن تكامل ريمان-ستليجس و ريمان أن يذهب مباشرة إلى الفصل القادم.

تعريف 01.5: لتكن  $I = [a, b]$  فترّة محدودة من  $\mathbb{R}$  و  $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}$  دالة متزايدة ولتكن  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  دالة محدودة. نعرف من أجل كل تقسيم  $P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}$  (subdivision) مجموع داربو<sup>3</sup> الأدنى (الأعلى، على الترتيب) كالآتي:

$$s(f, \alpha, P) = \sum_{i=1}^n (\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})) \inf_{t \in I_i} \{f(t)\}$$

$$S(f, \alpha, P) = \sum_{i=1}^n (\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})) \sup_{t \in I_i} \{f(t)\}$$

<sup>1</sup>) جورج فريدريله ريمان [Georg Friedrich Riemann]

<sup>2</sup>) توماس ستليجس [Thomas Joannes Stieltjes]

<sup>3</sup>) جان غاستون داربو [Jean Gaston Darboux]

حيث  $[t_{i-1}, t_i] = [t_{i-1}, t_i] \cap J_i$ ، نسمى العدد  $s(f, \alpha, P)$  مجموع ريمان-ستلوجس لـ  $f$  بالنسبة لـ  $\alpha$  و  $P$ .

نلاحظ أنَّ مجموع ريمان-ستلوجس لا يرتبط بالتقسيم  $P$  وبالدالة  $\alpha$  فحسب بل كذلك بالنقط المختار  $x_i$ . تجدر كذلك الإشارة إلى أنه لا يوجد أيَّ مانع من اعتبار مجموع ريمان-ستلوجس لدوال غير المتصلة عند نقطة من الفترة  $J$  بينما محدودية هذه الدوال هي ضرورية لصحة هذا التعريف.

تعريف: نرمز لأسرة كل تقسيمات الفترة  $J = [a, b]$  بـ  $\mathcal{P}_J$ .

بإمكاننا إثبات بسهولة المبرهنة التالية:

**مبرهنة 02.5:** لدينا حسب معطيات التعريف السابق:

$$s(f, \alpha, P) \leq S(f, \alpha, P) \quad (i)$$

$$\sup_{P \in \mathcal{P}_J} s(f, \alpha, P) \leq \inf_{P \in \mathcal{P}_J} S(f, \alpha, P) \quad (ii)$$

**مثال 03.5:** نعتبر الدالة  $f(x) = x^2$  على الفترة  $[0, 1]$  ونقسم الفترة  $[0, 1]$  كما يلي

$$P = \left\{ 0 = x_0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} \dots < \frac{i}{n} < \dots < x_n = 1 \right\}$$

لدينا من التعريف السابق ما يلي

$$\begin{aligned} s(f, \alpha, P) &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} \right) \inf \left\{ x^2 : x \in \left[ \frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \right\} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)^2}{n^3} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3} \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned} S(f, \alpha, P) &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} \right) \sup \left\{ x^2 : x \in \left[ \frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \right\} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \end{aligned}$$

$$\text{لدينا فوراً} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \alpha, P) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \alpha, P) = \frac{1}{3}$$

**تعريف 04.5:** نقول عن دالة  $f$  إنها قابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان - ستلبيس بالنسبة للدالة  $\alpha$  إذا وجد من أجل كل عدد موجب  $\epsilon$  تقسيم  $P$  للفترة  $J$  بحيث

$$S(f, \alpha, P) - s(f, \alpha, P) < \epsilon$$

تسمح المبرهنة التالية بتعريف تكامل ريمان - ستلبيس حيث لا يتطلب إثباتها سوى استعمال بعض العلاقات والمتراجحات البسيطة.

**برهنة 05.5:** لتكن  $f$  دالة قابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان - ستلبيس بالنسبة للدالة  $\alpha$  على  $J$ ، يوجد عندئذ عدد حقيقي وحيد  $\zeta$  يحقق

$$\zeta = \sup_{P \in \mathcal{P}_J} s(f, \alpha, P) = \inf_{P \in \mathcal{P}_J} S(f, \alpha, P)$$

يدعى العدد  $\zeta$  تكامل ريمان - ستلبيس لـ  $f$  بالنسبة لـ  $\alpha$  على  $J$ ، نكتبه كالتالي:  $\int_a^b f(x) d\alpha(x)$  أو اختصاراً  $\int_a^b f d\alpha$ .

نحصل بالخصوص من أجل التقسيم البدائي  $P = \{a, b\}$  على الحصر التالي:

$$m[\alpha(b) - \alpha(a)] \leq \int_a^b f d\alpha \leq M[\alpha(b) - \alpha(a)]$$

حيث

$$M = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} \quad m = \inf\{f(x) : x \in [a, b]\}$$

يكفي في كثير من الأحيان استعمال مجموعي داربو الأدنى والأعلى لإثبات خصائص تكامل ريمان - ستلبيس، إلا أنه يستحسن أحياناً استعمال مجموع ريمان - ستلبيس خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات نقطية لدالة أو أثناء تعليم مفهوم التكامل إلى الدوال المركبة. إضافة إلى ذلك فإن مجموع ريمان - ستلبيس يساعد على إيجاد مجموع بعض السلسل العددية.

تعريف: سوف نرمز بـ  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$  لمجموعة كل الدوال القابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان-ستلبيس على الفترة  $[a, b] = J$  بالنسبة لـ  $\alpha$ .

**ملاحظة 06.5:** إذا كانت  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  فإن  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J')$  من أجل كل فترة جزئية مغلقة  $J'$  من  $J$ .

**برهنة 07.5:** لتكن  $f, g \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$ ، عندئذ

$$f \leq g, \text{ عندما } \int_a^b f d\alpha \leq \int_a^b g d\alpha \quad (1)$$

$$\left| \int_a^b f d\alpha \right| \leq \int_a^b |f| d\alpha \text{ و } |f| \in \mathcal{RS}(\alpha, J) \quad (2)$$

.  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$  ،  $fg$  و  $\sup\{f, g\}$  و  $\inf\{f, g\}$  عناصر من (3) الدوال

مساعده: استعن بالتطابقات التالية:

$$(f \wedge g) \text{ يرمز أيضاً لهذه الدالة بـ } \min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \bullet$$

$$(f \vee g) \text{ يرمز أيضاً لهذه الدالة بـ } \max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \bullet$$

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2] \bullet$$

.  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$  هو كذلك عنصر من (3).

هذه الآن بعض الخواص التي تتمتع بها الدوال القابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان-ستلبيس وإثباتاتها لا تتطلب الجهد الكبير.

**برهنة 08.5:** نفرض أن  $\alpha(x)$  غير ثابتة على  $[a, b]$ . إذا كانت  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  فإن الدالة  $f$  متصلة عند نقطة  $x_0$  من  $[a, b]$ .

**برهنة 09.5:** لتكن  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  و  $g$  دالة محدودة ورتبية على  $J$ ، عندئذ يوجد  $c \in J$  بحيث

$$\int_a^b f(x)g(x) d\alpha = g(a) \int_a^c f(x) d\alpha + g(b) \int_c^b f(x) d\alpha$$

**برهنة 10.5:** نفرض أن  $\alpha$  و  $\beta$  دالتان متزايدتان على  $J$ ، عندئذ

$\alpha \in RS(\alpha, J)$  إذا وإذا فقط  $\beta \in RS(\alpha, J)$  ، ولدينا في هذه الحالة

$$\cdot \int_a^b \alpha d\beta = \alpha(b)\beta(b) - \alpha(a)\beta(a) - \int_a^b \beta d\alpha$$

برهنة 11.5: لتكن  $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset RS(\alpha, J)$  متتالية محدودة بانتظام على  $J$  وتنقرب ببساطة إلى دالة  $f \in RS(\alpha, J)$  ، عندذا

$$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n d\alpha = \int_a^b f d\alpha$$

نود تتبّيه القارئ أنه بإمكاننا الحصول على خواص هامة أخرى من أجل صيغ خاصة لـ  $\alpha$ . نخت خواص تكامل ريمان-ستلوجس بالبرهنة التالية:

برهنة 12.5: لتكن  $\alpha: J \rightarrow \mathbb{R}$  دالة متزايدة و  $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset RS(\alpha, J)$  دالة متزايدة بانتظام إلى دالة  $f \in RS(\alpha, J)$  ، عندذا

$$\cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n d\alpha = \int_a^b f d\alpha$$

يمكننا تعليم تكامل ريمان-ستلوجس من دوال متزايدة  $\alpha$  إلى دوال "ذات تغيرات محدودة" على  $J$ . من المفيد التذكير به هنا هو إمكانية كتابة كل دالة ذات تغيرات محدودة كفرق لدالتين متزايدتين، وهذا ما سنراه لاحقاً في الفصل التاسع.

سوف نرى في البرهنة المقابلة أن كل دالة متصلة على  $J$  هي قابلة للمكاملة بمفهوم ريمان-ستلوجس.

برهنة 13.5: لتكن  $\alpha$  دالة متزايدة على  $J$  ، عندذا، من أجل كل دالة متصلة  $f$  على  $J$  فإن  $f \in RS(\alpha, J)$ .

إثبات: نفرض أن الدالة  $\alpha$  غير ثابتة. بما أن  $J$  مغلقة و  $f$  متصلة فهي إذن متصلة بانتظام على هذه الفترة. ليكن  $\epsilon$  عدداً موجباً تماماً، يوجد عدد موجب  $\delta$  بحيث أن لكل  $x$  و  $y$  في  $J$  يتحققان  $|x-y| < \delta$  لدينا  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ .

ليكن  $P$  تقسيماً لـ  $J$  بحيث  $\delta < \xi_i - t_{i-1}$ ، عندئذ تدرك  $f$  حدّيها الأعلى والأدنى في كل فترّة  $[t_{i-1}, t_i]$  عند نقطة  $\xi_i$  و  $\eta_i$ ، على الترتيب.

يُنّتَج عن كون  $|f(\xi_i) - f(\eta_i)| < \varepsilon$  أن  $|\xi_i - \eta_i| < \delta$  ، ومنه

$$S(f) - s(f) = \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - f(\eta_i))(\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1}))$$

$$\leq \varepsilon \sum_{i=1}^n (\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})) = \varepsilon (\alpha(b) - \alpha(a))$$

للحصول على  $\varepsilon$  بدلًا من  $\varepsilon$  يكفيأخذ

$\frac{\varepsilon}{\alpha(b) - \alpha(a)}$  من البداية). وهكذا فإن  $f$  قابلة للمكاملة بمفهوم

ريمان-ستلبيس على  $J$ . ■

نلخص فيما يلي أهم الخواص العامة التي يتمتع بها تكامل ريمان-ستلبيس، لدينا

**برهنة 14.5:** (أ) إذا كان  $f_1$  و  $f_2$  عناصران من  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$  فإن  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$

$f_1 + f_2 \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  ولدينا

$$\int_a^b (f_1 + f_2) d\alpha = \int_a^b f_1 d\alpha + \int_a^b f_2 d\alpha$$

(ب) إذا كانت  $c \in \mathbb{R}$  و  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  ثابت فإن ولدينا

$$\int_a^b (cf) d\alpha = c \int_a^b f d\alpha$$

(ج) إذا كانت  $\alpha$  على  $[\xi, b]$  و  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  فإن  $f$  قابلة للمكاملة بمفهوم ريمان-ستلبيس بالنسبة لـ  $\alpha$  على  $[\xi, b]$  ولدينا

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^\xi f d\alpha + \int_\xi^b f d\alpha$$

(د) إذا كانت  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  دالتين متزايدتين و  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  فإن

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f d\alpha_1 + \int_a^b f d\alpha_2$$

**ملاحظة 15.5:** إذا كانت  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  فإن

$$\cdot \int_b^a f d\alpha = - \int_a^b f d\alpha \quad \text{و} \quad \int_a^a f d\alpha = 0$$

سوف نتطرق لكل هذه النتائج في الحالة الخاصة  $\alpha(x) = x$  أثناء تناولنا لتكامل ريمان. بأخذ  $x = \alpha(x)$  في تكامل ريمان-ستلوجس المعرف أعلاه نحصل على ما يُعرف بتكامل ريمان حيث يُعوض  $d\alpha(x)$  بالعنصر التفاضلي المألوف  $dx$ .

## 2- تكامل ريمان

**تعريف 16.5:** إذا كانت  $x = \alpha(x)$  فسمى حينئذ تكامل ريمان-ستلوجس بتكامل ريمان، ونكتبه كالتالي:

$$\mathcal{R} \int_a^b f dx, \quad \text{وذلك } \int_a^b f(x) dx$$

سوف نرمز بـ  $(J)$  لمجموعة كل الدوال القابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان على الفترة  $[a, b] = J = [a, b]$  لنحصل على فضاء متجهات جزئي من فضاء متجهات كل الدوال على  $J$ . نقول عن دالة  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  إنها (ر)-قابلة للمتكاملة إذا كان  $f \in \mathcal{R}(J)$  ("ر" نسبة إلى ريمان).

يأخذ مجموعتي داربو الأدنى (الأعلى، على الترتيب) الصيغة التالية:

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) \inf_{t \in J_i} \{f(t)\}$$

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) \sup_{t \in J_i} \{f(t)\} \quad ,$$

حيث  $J_i = [t_{i-1}, t_i]$

إذا فرضنا أن الدالة  $f$  موجبة فإن المقدار  $(t_i - t_{i-1}) \inf_{t \in J_i} f(t)$

(على الترتيب،  $(t_i - t_{i-1}) \sup_{t \in J_i} f(t)$ ) يمثل مساحة المستطيل الجزئي

$$\begin{aligned} & [t_{i-1}, t_i] \times \left[ 0, \inf_{t \in J_i} f(t) \right] \\ & . \quad [t_{i-1}, t_i] \times \left[ 0, \sup_{t \in J_i} f(t) \right]. \end{aligned}$$

وبتحميم هذه المساحات الجزئية نحصل على حصر لمساحة الحيز الواقع ما بين منحني  $f$ ، محور الفواصل والمستقيمين  $t=a$  و  $t=b$ . إذن، الفرق ما بين تكامل ريمان وتكامل ريمان-ستلجس هو أنَّ في هذا الأخير "عرض" المستطيل الجزئي  $\alpha(t_{i-1}) - \alpha(t_i)$  متعلق بالدالة  $\alpha$  على الفترة الجزئية  $I$  عوض طول هذه الفترة كما هو الحال في تكامل ريمان. بعبارة أخرى، يعتمد تكامل ريمان-ستلجس على "العرض المرجح" عوض "العرض الاعتيادي".

بما أنَّ تكامل ريمان هو حالة خاصة من تكامل ريمان-ستلجس فإنَّ كل نتائج تكامل ريمان-ستلجس تبقى سارية المفعول على تكامل ريمان.

#### أمثلة 17.5:

- كل دالة قابلة للمكمّلة بمفهوم ريمان-ستلجس من أجل كل دالة متزايدة  $\alpha$  هي قابلة للمكمّلة بمفهوم ريمان لأنَّ  $x = \alpha(x)$  دالة متزايدة.
- كل دالة متصلة على  $[a, b]$  هي دالة قابلة للمكمّلة بمفهوم ريمان.

- دالة ديركليه  $\chi_{Q \cap [0,1]} = \psi$  المذكورة في التمهيد ليست قابلة للمكمّلة بمفهوم ريمان على  $[0, 1]$  لأنَّ

$$\sup\{\psi(t) : t \in [t_{i+1}, t_i]\} = 1 \quad \text{و} \quad \inf\{\psi(t) : t \in [t_{i+1}, t_i]\} = 0$$

من أجل كل تقسيم  $P$  لـ  $[0, 1]$ .

قبل التطرق إلى الخواص العامّة لِتكمّل ريمان والدوال القابلة للمكمّلة بمفهوم ريمان سوف نقدم هذه النتيجة الهامة التي تبيّن مدى ارتباط تكمّل ريمان بتكمّل ريمان-ستلجس:

**مبرهنة 18.5:** لتكن  $(J)$  دالة متزايدة، مثصلة على  $J$  وقابلة للاشتقاق على  $[a, b]$ . إذا كانت  $\alpha$  محدودة على  $[a, b]$  وقابلة للتمديد إلى دالة قابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان فإن

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx \quad f \alpha' \in \mathcal{R}(J), \quad f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$$

**ملاحظة 19.5:** إن صيغة المتكاملة بالتجزئة التالية والمألوفة في الحساب التكاملی هي نتیجة مباشرة لهذه المبرهنة وما قبلها

$$\int_a^b \alpha d\beta = \alpha(b)\beta(b) - \alpha(a)\beta(a) - \int_a^b \beta d\alpha$$

**مبرهنة 20.5:** إذا كانت  $J : \mathbb{R} \rightarrow J$  دالة رتبية فإن  $f \in \mathcal{R}(J)$ .

تعطى المبرهنة المقابلة لصاحبها لوبيغ تمييزاً عملياً، سهلاً وصريحاً عن الدوال القابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان حيث تختصر العديد من الخواص، فهي على سبيل المثال تثبت استقرار  $(J)$   $\mathcal{R}$  بالنسبة لضرب الدوال، بمعنى أن ضرب عنصرين من  $(J)$   $\mathcal{R}$  هو كذلك عنصر من  $(J)$ .

**مبرهنة 21.5 [لوبيغ]:** تكون دالة محدودة  $J : f \in \mathcal{R}(J)$  إذا وإذا فقط كانت مجموعة نقاط تقطعها مهملة.

سنعود إلى هذه المبرهنة عند تطرقنا لتكامل لوبيغ ومقارنته بتكامل ريمان في الفصل السادس.

تبين المبرهنة التالية أنه إذا كانت  $f$  دالة  $(r)$ -قابلة للمتكاملة و  $g$  دالة متساوية مع  $f$  إلا من أجل عدد منته من النقاط فإن  $g$  تكون  $(r)$ -قابلة للمتكاملة ويتساوى تكامل  $g$  مع تكامل  $f$ .

**مبرهنة 22.5:** لتكن  $(J)$   $f \in \mathcal{R}(J)$  و  $J \subset \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . إذا كانت  $g$  دالة بحيث  $(\forall x \in J) g(x) = f(x)$ ، فإن

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx \quad \text{و} \quad g \in \mathcal{R}(J)$$

**قضية 23.5:** لتكن  $f \in \mathcal{R}(J)$  دالة موجبة، عندئذ

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

**برهنة 24.5:** إذا كانت  $J \rightarrow \mathbb{R}$ :  $f$  دالة متصلة وموجبة فإن  $\int_a^b f(x) dx = 0$  يستلزم أن  $f = 0$  على  $J$ .

**برهنة 25.5:** لتكن  $J \subset \mathcal{R}(f_n)_{n \geq 1}$  متتالية متقاربة بانتظام إلى  $f$  على  $J$ ، عندئذ  $f \in \mathcal{R}(J)$  ، بالإضافة إلى ذلك لدينا

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

تمثل هذه البرهنة إحدى أهم خواص تكامل ريمان إلا أن هذا الأخير يبقى عاجزاً على التعامل مع المتتاليات التي لا تقارب بانتظام على  $J$ . المثال الآتي يوضح جلياً هذا الإخفاق:

**مثال 26.5:** نعتبر المتتالية  $f_n(x) = x^n$  ، على  $J = [0, 1]$  من السهل التأكد من أن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1[ \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

وبما أن التقارب غير منتظم فإننا لا نستطيع أن نجزم بمقتضى النتيجة السابقة على أن  $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$  على الرغم من صحة هذه النتيجة الأخيرة.

**برهنة 27.5 (المبرهنة الأولى للقيمة الوسطى):** لتكن  $J \rightarrow \mathbb{R}$ :  $f$  دالة متصلة

و  $(J) g \in \mathcal{R}$  دالة ذات إشارة ثابتة على  $J$ ، يوجد عندئذ عدد  $\xi \in J$  بحيث

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

لازم 28.5: إذا كانت  $f$  موجدة على  $[a, b]$  فـ  $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(\xi)$

**مبرهنة 29.5** (المبرهنة الثانية للقيمة الوسطى) : ليكن  $f$  و  $g$  عنصرين من  $(J, R)$  بحيث أن  $f$  موجبة ومتناقصة على  $J$ , يوجد عند عدد  $J \in J$  بحيث

$$\cdot \int_a^b f(x)g(x)dx = f(a^+) \int_a^c g(x)dx$$

نذكر فيما يلي بالمبرهنة الأساسية للحساب المعروفة لدى عموم القراء وهي كثيرة الاستعمال في أوساط المهندسين.

**برهنة 30.5:** لتكن  $f$  دالة مئصلة على  $I$  وقابلة للاشتقاق على  $[a, b]$ . إذا كانت  $f'$  محدودة على  $[a, b]$  وقابلة للتمديد إلى دالة قابلة للمتكاملة بمفهوم ريمان إلى  $I$ ، فإن

$$\cdot \int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$$

**مبرهنة 31.5 (تبديل المتغير):** لتكن  $f$  دالة متصلة على  $J$  و  $J \subset \mathbb{R}$  بحيث  $\varphi \in C^1(J', J)$  حيث  $J' = [c, d] \rightarrow J$ ،  $\varphi(c) = a$  و  $\varphi(d) = b$ . عند ذلك

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(\varphi(y))\varphi'(y) dy \quad , \quad (f \circ \varphi)\varphi' \in \mathcal{R}(J')$$

**مبرهنة 32.5:** لتكن  $(J)$  مenge،  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$  و  $f \in \mathcal{R}(J)$ ، عند ذكر  $x_0 \in J$ ، فإن  $F$  قابلة للإشتقاق في  $x_0$  ولدينا

$$\cdot F'(x_0) = f(x_0)$$

**الازمة 33.5:** تقبل كل دالة متصلة  $f$  على  $J$  دالة اصلية، أي توجد دالة قابلة للاشتقاق  $F$  على  $J$  بحيث  $F' = f$ .

### 3- تكامل ريمان المعتل

لقد سبق لنا أن عرّفنا تكامل ريمان وتكامل ريمان-ستلفس من أجل دوال محدودة على فترات محدودة. وسوف نعمم خلال هذا المقطع مفهوم التكامل إلى دوال غير محدودة على فترات ليست بالضرورة محدودة. الفترات غير المحدودة المعنية بالذكر هي من الشكل  $[a, +\infty)$ ،  $(-\infty, b]$  وحى  $(-\infty, +\infty)$ ، وفيما يخص الدوال غير المحدودة فإننا سوف نركز بالدرجة الأولى على النقاط التي تكون من أجلها الدوال غير محدودة في كل جوار ضيق لهذه النقاط.

يُعرف باختصار التكامل المعتل (*improper integral*) (أو تكامل كوشي - ريمان) لدالة غير محدودة على فترة غير محدودة كنهاية لتكامل دالة محدودة على فترة محدودة.

**تعريف 34.5:** لتكن  $\mathbb{R} \subset J$  فترة اختيارية غير خالية. نضع  $(\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}})$  ،  $\beta = \sup J$  و  $\alpha = \inf J$ .

نقول عن دالة  $J \rightarrow f$  إنها (ر)-قابلة للمكمامة على  $J$  إذا كانت (ر)-قابلة للمكمامة على كل فترة مغلقة ومحدودة  $J \subset J_0$  ، إضافة إلى كون النهاية

$$\lim_{\substack{a \rightarrow \alpha^+ \\ b \rightarrow \beta^-}} \int_a^b f(x) dx$$

نرمز لهذه النهاية بـ  $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$  ، ونسميها تكامل ريمان المعتل لـ  $f$  على الفترة  $J$ .

**ملاحظة 35.5:** في حالة ما إذا كانت  $f$  دالة غير محدودة على  $[a, b]$  ولكنها محدودة على  $[a+\varepsilon, b]$  من أجل كل عدد موجب  $\varepsilon$  صغير بالقدر الكافي و  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx \in \mathcal{R}$  فإننا نرمز للنهاية  $\int_a^b f(x) dx$  إن وجدت، بـ .

كما نعرف بنفس الكيفية التكامل  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$  ، إذا كانت  $f$

دالة غير محدودة على  $[a, b]$  ولكنها محدودة على  $[a, b - \varepsilon]$  ، من أجل كل عدد موجب  $\varepsilon$  صغير بالقدر الكافي و  $f \in \mathcal{R}([a, b - \varepsilon])$  (مع فرضية وجود النهاية).

قد نصادف أحياناً دوالاً  $f$  لا تقبل نهاية منتهية عند نقطة  $c \in [a, b]$  فيكتفي تجزئة التكامل على  $[a, b]$  كما يلي

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

ثم نحسب التكاملين المعتدين  $\int_a^c f dx$  و  $\int_c^b f dx$  بالطريقة المذكورة أعلاه.

## مسألة محلولة

نعرف من أجل كل  $n \geq 0$  المتالية  $\alpha_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

- 1) أوجد علاقة تربط  $\alpha_n$  بـ  $\alpha_{n-2}$  من أجل كل  $n \geq 2$ .
- 2) استنتج قيمة  $\alpha_n$  حسب زوجية وفردية العدد الطبيعي  $n$ .

$$3) \text{ استنتاج أن } \pi = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{4k} (k!)^4}{k [(2k)!]^2}$$

الحل:

1) بالتكاملة بالتجزئة نجد

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x (-\cos x)' dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (\cos^2 x) dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1)(\alpha_{n-2} - \alpha_n)\end{aligned}$$

.  $n \geq 2$  ، من أجل كل  $\alpha_n = (n-1)\alpha_{n-2}$

(2) نستنتج من السؤال السابق أن

$$\begin{aligned}2k\alpha_{2k} &= (2k-1)\alpha_{2k-2} \\ (2k-2)\alpha_{2k-2} &= (2k-3)\alpha_{2k-4}\end{aligned}$$

...

$$2\alpha_2 = \alpha_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{ومنه } (\forall k \geq 1) , \alpha_{2k} = \frac{1.3.5... (2k-1)}{2.4.6... (2k)} \cdot \frac{\pi}{2}$$

ونحصل بنفس الكيفية على

$$(\forall k \geq 1) , \alpha_{2k+1} = \frac{2.4.6... (2k)}{1.3.5... (2k+1)}$$

(3) نعلم أن  $1 \leq \sin x \leq x$  ، وبالتالي

$$(\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]) , \sin^{2k+2} x \leq \sin^{2k+1} x \leq \sin^{2k} x$$

وبالعودة إلى تعريف  $\alpha_k$  نرى أن

$$(\forall k \geq 0) , 0 \leq \alpha_{2k+2} \leq \alpha_{2k+1} \leq \alpha_{2k}$$

إذن المتاليّة  $\{\alpha_n\}_{n \geq 0}$  متاقصّة ومحدودة من الأسفل بالصفر،

وبالتالي فهي متقاربة. لدينا من جهة أخرى،

$$\frac{\alpha_{2k+2}}{\alpha_{2k}} = \frac{2k+1}{2k+2} \leq \frac{\alpha_{2k+1}}{\alpha_{2k}} \leq 1$$

$$\text{ومنه } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{2k+1}}{\alpha_{2k}} = 1$$

بتعويض  $\alpha_{2k}$  و  $\alpha_{2k+1}$  بعبارتيهما المحصل عليهما في 1) نجد

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{[2.4.6\dots(2k)]^2}{[1.3.5\dots(2k-1)]^2(2k+1)} \\ \pi &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{4k}(k!)^4}{k[(2k)!]^2} \quad \text{أي} \end{aligned}$$

## تمارين مقدمة

نفرض فيما يلي أن  $J = [a, b]$ .

**01** أثبت أن  $(J, f) \in \mathcal{RS}(f, J)$  من أجل الدالة

$$J = [0, 2] \quad f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1) \\ +1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

**02** عين كل الدوال المتزايدة  $\alpha$  على  $J$  بحيث تكون دالة ديريكلي عنصراً من  $\mathcal{RS}(\alpha, J)$ .

**03** لتكن  $f$  دالة محددة و  $\alpha$  دالة متزايدة على  $J$ . أثبت أن  
 (ا) إذا وجدت نقطة تقطع عن يمين  $[a, b] \in J$  لـ  $f$  و  $\alpha$  فإن  $f$  غير قابلة للمكاملة بمفهوم ريمان-ستلبيس على  $J$  بالنسبة لـ  $\alpha$ .

(ب) إذا وجدت نقطة تقطع عن يسار  $[a, b] \in J$  لـ  $f$  و  $\alpha$  فإن  $f$  غير قابلة للمكاملة بمفهوم ريمان-ستلبيس على  $J$  بالنسبة لـ  $\alpha$ .

**04** برهن على أن  $f \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$  يستلزم أن  $|f|^p \in \mathcal{RS}(\alpha, J)$ ، من أجل كل عدد حقيقي موجب  $p$ .

**05** لتكن لدينا

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & a \leq x \leq c \\ 1, & c < x \leq b \end{cases}$$

ميز كل الدوال القابلة للمتكاملة على  $J$  بمفهوم ريمان - ستلبيس بالنسبة لـ  $\alpha$ .

**06** لتكن  $\alpha$  و  $\beta$  دالتين متزايدتين على  $J$  بحيث  $\alpha(x) = \beta(x)$

$$\cdot (\forall f \in \mathcal{C}(J)) \text{ ، } \int_a^b f d\alpha = \int_a^b f d\beta \quad (\forall x \in (a, b))$$

أثبت أن

$$\cdot \alpha(b) = \beta(b) \text{ و } \alpha(a) = \beta(a)$$

**07** أثبت أن  $f \in \mathcal{R}(J)$  يستلزم

$$\cdot \int_a^b f(x) dx = \inf \left\{ \int_a^b g(x) dx : g \in \mathcal{C}[a, b]; g \geq f \right\}$$

مساعده: بين أنه توجد من أجل كل تقسيم  $P$  لـ  $J$  دالة خطية  $h$  متصلة بقطع على  $J$  تحقق  $f \leq h$  بحيث يكون المقدار

$$\left| S(f, P) - \int_a^b h(x) dx \right|$$

صغيراً بقدر كاف.

**08** لتكن  $\alpha$  و  $\beta$  دالتين متزايدتين على  $J$  بحيث

$$\cdot (\forall f \in \mathcal{C}(J)) \text{ ، } \int_a^b f d\alpha = \int_a^b f d\beta \text{ و } \alpha(a) = \beta(a)$$

(أ) أثبت أن  $\alpha(b) = \beta(b)$

(ب) أثبت أن  $\alpha(x) = \beta(x)$  عند كل نقطة اتصال لكلا الدالتين  $\alpha$  و  $\beta$ .

**09** لتكن  $f \in \mathcal{R}(J)$

(1) أثبت أن  $0 > f$  على  $J$  يستلزم أن  $0 > \int_a^b f(x) dx$

(2) استنتج أنه إذا كان  $f \geq 0$  على  $J$  و  $\int_a^b f(x) dx = 0$  فإن المجموعة  $D = \{x \in J : f(x) = 0\}$  كثيفة في  $J$ .

**10** أثبت أن  $f \in \mathcal{R}(J)$  إذا وإذا فقط  $(f^+, f^-) \in \mathcal{R}(J)$  (الجزء الموجب والمنسوب له  $f$ )، وفي هذه الحالة فإن  $|f| \in \mathcal{R}(J)$ .

**11** أوجد دالة تتحقق  $|f| \in \mathcal{R}(J)$  بينما  $f \notin \mathcal{R}(J)$

**12** لتكن  $f, g \in \mathcal{R}(J)$ . بدراسة إشارة الدالة  $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  المعروفة بـ

$$\cdot p(t) = \int_a^b (f(x) + tg(x))^2 dx$$

أثبت المتباعدة التالية

$$\cdot \left( \int_a^b f g dx \right)^2 \leq \left( \int_a^b f^2 dx \right) \left( \int_a^b g^2 dx \right)$$

(ندعى متباعدة كوشي - شوارر)

**13** باستعمال تعريف تكامل ريمان احسب النهاية التالية:

$$\cdot u_n = (n+1)(n+2)\dots(n+n), \text{ حيث } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$$

**14** أدرس وجود التكاملين التاليين:

$$\alpha > 0, B = \int_{\sqrt{\alpha}}^{+\infty} \cos x^2 dx, \text{ حيث } (m \in \mathbb{R}), A = \int_0^1 \frac{x^m - 1}{\ln x} dx \quad (ا)$$

عدد مثبت.