

اذا زاد الضغط اربعة اضعاف يزيد مقدار الغاز المذوب اربعة اضعاف

الجزء الثالث

في كيمياء المواد غير الآلية

الفصل الاول

في تقسيم العناصر غير الآلية

قد تقدم صفحة ٥٧ ان العناصر غير الآلية انقسمت بالنسبة الى فعل المادة الكهربائية فيها الى ذوات كهربائية ايجابية وذوات كهربائية سلبية ولكن هذا الانقسام لا يدل على مشابهة او على فرق بين هذه العناصر في صفاتها فلا يوافق درسها على ترتيب هذا الانقسام. وقد انقسمت ايضا الى معدنية وغير معدنية. صحيفة ٦٤. وهذا الانقسام موافق لدرس صفات العناصر الكيميائية غير ان المحدثين المعدني وغير المعدني ليس بواضح. وقد انقسمت ايضا الى شبيهة بالمعدنية ومعدنية ثم انقسم كل من هذين القسمين الى رتب باعتبار كونها ذات جوهر واحد او ذات جوهريين الخ. انظر صحيفة ٧١ - وبمقابلة المحفلين التابعين تُرى اوجه الفرق بين العناصر المعدنية والشبيهة بالمعدنية

معدنية

شبيهة بالمعدنية

- | | |
|--|--|
| (١) لا غاز بينها | (١) بعضها غازات |
| (٢) هي ذات لمعية معدنية | (٢) ليس لها اللعينة المعروفة باللعينة المعدنية |
| (٣) هي صالحة لوصول الحرارة والكهربائية | (٣) هي غير صالحة لوصول الحرارة والكهربائية |
| (٤) كثافتها زائدة | (٤) كثافتها قليلة |
| (٥) أكسيدها اذا تركبت مع الماء في الغالب تولد قواعد وقلما تولد حوامض | (٥) أكسيدها اذا تركبت مع الماء في الغالب تولد حوامض وقلما تولد قواعد |
| (٦) هي ذات كهربائية ايجابية في المركبات التي تتولد منها مع الشبيهة بالمعدنية | (٦) هي ذات كهربائية سلبية في المركبات التي تتولد منها مع المعدنيات |

فاذ قد تقرر الفرق بين هذين القسمين تقسم الشبهة بالمعدنية الى خمس رتب

الرتبة الاولى الشبهة بالمعدنية ذات جوهر واحد وهي الكلور والبروم واليود والفلور والهيدروجين

الرتبة الثانية ذات جوهرين وهي اكسجين وكبريت وسليسيوم وثوريوم

الرتبة الثالثة ذات ثلاثة جواهر فيها مادة واحدة فقط وهي البور

الرتبة الرابعة ذات اربعة جواهر وهي سليكون وزركونيوم وتيتانيوم وقصدير

وثوريوم

الرتبة الخامسة ذات خمسة جواهر وهي نيتروجين وفسفور وزرنيخ واشبمون


وبزموت واورانيوم وتنتاليوم ونيوبيوم

الفصل الثاني

نبذة في كيفية جمع الغازات

اذا امتلأت قنبلة ماء ثم انقلبت في وعاء ملآن ماء يمكن رفع اكثرهما من الماء ولا تزال مملئة لان ضغط الهواء الكروي يمنع خروج الماء منها ثم اذا ادخلت انبوبة تحت فم القنبلة ونفخ فيها بدخاها هواء فيطرد الماء منها وعلى هذا المبدأ يصنع الحوض الكيماوي لاجل جمع الغازات وهو على هيئة شتى ابسطها وعاء من خرف او من خشب شكل ٦١ فيوه لوح ممكن


شكل ٦١



في جانبيه منقوب فيملأ الوعاء ماء حتى يغطي اللوح ثم تملأ قنبلة ماء وتقلب حتى يكون فيها تحت سطح الماء وتوقف على اللوح المشار اليه وفيها فوق الثقب والانبوبة المنصلة بالوعاء الذي ينولد

فيه الغاز يُعَس طرفها تحت الثقب المشار اليه فيصعد الغاز بواسطة الثقب الى القنبلة ويطرد الماء منها


شكل ٦٢



في شكل ٦٢ يُستعمل عوضاً عن اللوح المثقوب قطعة خزف مجوّفة ب داخل الوعاء س وهي مثقوبة من جانبيها لكي تدخل فيها الانبوبة ر ومن اعلاها لكي يصعد الغاز الى القابلة د فمع وجود قطعة خزف مثل هذه يمكن استعمال اي شكل كان من الاوعية حوضاً كيميائياً

شكل ٦٣ حوض كيميائي على هيئة اخرى مصنوع من الفصدير او التوتيا

شكل ٦٣




اعلاه اعرض من اسفله لكي يجعل على كل من جانبيه موقفاً للقوابل وللقطعة المستعرضة المثقوبة التي توضع عليها القابلة عند جمع الغاز فيها ثم ترفع وتوقف على الموقف الجانبي ويوضع موضعها اخرى والماء الفائض المطرود من القوابل يخرج

من ثقب في اعلى احدى زوايا الحوض الى وعاء موضوع لاسنلقائه

اذا اريد جمع مقدار جزيل من غاز وحفظه مدة تُستعمل عوضاً عن الحوض الكيميائي قابلة مصنوعة لهذه الغاية وهي على هيئة شتى اصلحها واكثرها استعمالاً المعروفة بقابلة پيبس نسبة الى مخترعها. شكل ٦٤. وهي مؤلفة من وعاء كبير س فوقه وعاء اصغر ك متصل بالاسفل بانبوبة ذات حنفية ر واخرى ذات حنفية ج نازلة من ث الى اسفل الوعاء الكبير. اما ع فعود لاجل التمكن فقط فاذا صب ما لا في ك وانفخت الحنفتين ينزل الى س حتى ينل ثم يملأ ك ايضاً وتسد الحنفتان ثم يُفتح اللولب د وتدخل فيه الانبوبة المتصلة بالوعاء الذي يولد فيه الغاز فيدخل الغاز الى س وبترد منه الماء الذي يخرج عند د ويوصل بالميزاب ب الى وعاء موضوع لاسنلقائه ومتى امتلأ س بالغاز بسد اللولب د ويملأ ك


شكل ٦٤



ماء وتُفخ الحنفية ج وإذا اريد جمع شيء من الغاز في قابلة صغيرة تملأ ماء وتقلب فوق فتحة ر في ك ثم تُفخ ر فينزل الماء عن طريق ث ج ز فيطرد الغاز عن طريق ر اما م فانبوبة زجاجية من خارج س متصلة بداخلها مفسومة الى اقسام تدل على مقدار الغاز في س امات فحنفية اخرى توصل بها انبوبة لاجل وصل الغاز الى موضع اخر او الى وعاء اخر او لاستعماله في اعمال كيميائية

ثم ان بعض الغازات يمس الماء جانبا كبيرا منها او تتركب مع عناصره فلا تجتمع فوقه فلاجل جمعها يستعمل الزيت عوضا عن

شكل ٦٥



الماء في وعاء قليل العمق على هيئة شكل ٦٥ يُسمى المحوض الزيتي او تجتمع بلا واسطة بطردها الهواء من القابلة التي تجتمع فيها كما سترى

الفصل الثالث

في العناصر من الرتبة الاولى

اي الشبيهة بالمعدنية ذات الجوهرة الواحد

ان هذه الرتبة فيها خمسة عناصر وهي الكلور والبروم واليود والفلور

والهيدروجين


كل
كل

الكلور

وزن جوهره المادي ٧١


سبعة كل. وزن جوهره الفرد ٣٥٥٥

شكل ٦٦




استحضاره . طريقة اولى . ضع في قنينة ذات انبوبة طويلة ملتوية (شكل ٦٦) ٢٤ او ٣٠ درهما حامضاً هيدروكلوريكاً ثم اضع اليه ٨ او ١٠ دراهم أكسيد المنغنيس الثاني واحم القنينة قليلاً بفندبل او حمار رملي وندخل الانبوبة في قابلة الى اسفلها وغطها بفرطاس فيصعد الكلور الى القابلة ولكون اثنان من الهواء الكروي بطرده من القنينة فاذا خفف الحامض الهيدروكلوريك بما يصعد الغاز شيئاً فشيئاً واذا

اضيف اليه قليل حامض كبريتيك يصعد بسرعة وهذا لتبليبل المحل والتركيب



شكل ٦٧





ثنيه . أكسيد المنغنيس الثاني الطبيعي ممزوج معه شيء من كربونات الكلس فيجب غسله اولاً بحامض هيدروكلوريك مخفف لئلا ينور في القنينة و يصعد مع الكلور غاز الحامض الكربونيك

طريقة ثانية . املي قنينة شكل ٦٧ قطع أكسيد المنغنيس صغراً الى ب ثم اضع حامضاً هيدروكلوريكاً تجارياً الى ت فيصعد الكلور بلا احاء ومتى قل صعوده فحسب القنينة فيصعد اكثر ولهذا


الطريقة مزيفة من وجهين الاول ان الكلور الصاعد هو خالٍ من غاز الحمض الهيدروكلوريك بسبب مروره في جانب كبير من الاكسيد والثاني انه اذا رُفعت الانبوبتان وأُفْرِغَ السِبال من القنبنة وأُبقي المنغنيس تكون حاضرة لعمل ثانٍ اي لاستحضار جانب من الكلور في اقرب وقت

طريقة ثالثة . احمِ اُكسيد المنغنيس الثاني و كلوريد الصوديوم وحامضاً كبريتيكاً معاً وهذا لتعليب المحل والتركيب



الكلور المستحضر على هذه الطريقة ممزوج بخار الماء واذا اريد ازالة هذا البخار


شكل ٦٨



وجمع الكلور جافاً تستعمل آلة كالمرسوم في شكل ٦٨ اي بعد توليد الكلور في ر

يعد الى ذ حيث يجمع بعض البخار ماء ثم يمر من هناك في انبوبة د ملانة
كلوريد الكالسيوم الذي يمص ما بقي من البخار فيخرج الكلور جافاً
صفاته - الكلور موجود في الطبيعة مركباً مع الصوديوم على هيئة كلوريد
الصوديوم اي ملح الطعام في جميع المياه المالحة ومعادن الملح وفي بعض المواد
الحويانية والنباتية. كشفه اولاً شيل في ١٧٧٤ وحسب مركباً ثم برهن الفيلسوف
داقي كونه بسيطاً في ١٨٠٨ وهو غاز شفاف مخضر اللون ولذلك سمي كلوراً وهذا
الاسم مأخوذ من لفظة يونانية $\chiλωρος$ اي اخضر وهو الاكثر اعتباراً بين
مواد اربع اي الكلور والبروم واليود والفلور التي لا الفة بينها ولكل منها الفة
شديدة للمواد الاخر فلا توجد غير مركبة ولكنها تولد مع المعادن املاحاً تشبه
ملح الطعام بانها مركبة من معدن مع مادة اخرى غير حامض سميت املاحاً
هالويدية تميزاً بينها وبين الاملاح التي فيها حامض التي سميت أكسي املاح.
ثقله النوعي غازاً ٣.٤٧ واذا ضغط يتحول الى سبال ثقله النوعي ١.٢٣ اذا فرض
الماء واحداً وهذا الغاز سام جداً خائق لا يقبل الاشعال نفسه لكنه مضر
قليلاً . اذا عرض الغاز الرطب على ٢٢°ف تتولد بلورات صفر مركبة من الماء
والكلور والماء على ٦٠°ف يمص مقداراً منه والماء الساخن يمص قليلاً منه واذا
اشبع الماء به فلنا ماء الكلور ولاجل ذلك تستعمل عدة من فناني ولف شكل ٦٩


شكل ٦٩



بها يمر الكلور من واحدة الى اخرى حتى يشبع الماء منه واذا حفظ هذا الماء في
الظلام لا يتغير واذا اصابه نور ولاسيما نور الشمس يبعد الكلور مع هيدروجين

ويكون حامضاً هيدروكلوريكاً والأكسجين يفلت
 إذا مُزج غاز الكلور والهيدروجين وعُرض على نور الشمس فيخمدان بغثة
 بتفرغ شديد وإذا جُعلا في نور متفرق فيخمدان شيئاً فشيئاً وإذا جُعلا في الظلام
 لا يخبذان إن لم يكن الكلور قد عُرض على نور الشمس أولاً فاذا ذاك يخبذان
 بغثة كما لو عُرض على الشمس معاً والكلور المشمس يفرق عن الكلور الاعتيادي
 أيضاً بأنه يولد حرارة أكثر مع الهوتاسا فهو إذا كلور الونروبي . صحيفة ٢٩
 لشدة الفة الكلور والزيت لا يمكن جمعه في المحوض الزيتي . الزرنج والاتبون
 والنصفور تشعل فيه من تلفاء ذاتها وكذلك رق النحاس إذا أُحمي ثم أدخل إلى
 غاز الكلور يشعل

بسبب الفة الكلور والهيدروجين يُحل به الماء ويفلت الأكسجين وهو إذا ذاك
 واسطة قوية للتأكسد وبه يتحول الحامض الكبريتوس إلى حامض كبريتيك
 هكذا



للكلور فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الألوان ويذهب الروائح الردية
 والأبخرة الميازمية باتحاده مع هيدروجينها فيستعمل في الصنائع للتبييض وفي
 الطب لازالة المواد المعدية والميازمية

اعمال بالكلور

كل الاعمال بالكلور يجب ان تكون في محل مهوي خال من اثار بخشي
 ذهاب لونه ويجب الاحتراس من تنفس الغاز واذا تنفس عرضاً بشمّ ضده
 النشادر او يتنفس بخار الكحول او ابشرز وقبل احواء الانبيق لاجل اصعاد الغاز
 يجب ان يتحرك الحامض والاكسيد معاً حتى يمتزجا وحتى يبل اسفل الانبيق كله
 لانه اذا بقي شيء منه جافاً ينكسر عند احوائه

إذا قُصد احراق بعض المعادن في الكلور يجب ان يُجنف بروره على
كلوريد الكلسيوم وجمعه بالطرد في قنينات ذات سدادات
(١) ادخل شمعة مضيئة في قنينة كلور تشعل بلهب ضعيف احمر وبصعد
عنها دخان كثيف فننطفئ*

(٢) ادخل الى الكلور قرطاساً مبتلاً بماء النشادر القليل فيشعل من ذاتو
(٣) بلّ قطعة من قرطاس الترشح بزيت التريبنينا وادخلها في الكلور فتشعل
من ذاتها وبصعد عنها دخان كثيف

(٤) خذ نحو فحة فصفور وجفنها على قرطاس الترشح ثم ادخلها الى الكلور
بواسطة آلة مثل شكل ٧٠ فتشعل من ذاتها بلهب مخضر مكوّنة شكل ٧٠
كلوريد النصفور



(٥) ضع قليلاً من ماء الكلور في وعاء صينيّ والتى فيه قطعة
صوديوم فيشعل على سطح الماء وبدوب وان كان كافياً لكي يفعل بكل
الكلور الذي في الماء بين مذوّب كلوريد الصوديوم اي ملح الطعام
(٦) اذا ادخل الى كلور كافور او كاوتشوك او ابير او ما يشبه
ذلك يشعل من ذاتو

(٧) اذا ادخل مجرى من غاز الكلور في هيدروجين او في غاز الفحم
المجري يشعل

(٨) قطعة پوتاسيوم اذا ادخلت الى قنينة كلور فوق ماء تشعل
(٩) ضع قليلاً من الكبريت في ملعقة مثل شكل ٧٠ واصهره ثم ادخله الى
قنينة كلور فيشعل بسرعة

(١٠) احم قليلاً من الزبيق في ملعقة كما تقدم وادخله وهو سخن في قنينة
كلور فيشعل بلهب محمر مكوّناً كلوريد الزبيق

(١١) اذا ألقي مسحوق الاتيمون او الزرنج في قنينة كلور يشعل الاتيمون
بلهب اصفر والزرنج بلهب ابيض ورق النحاس ايضاً يشعل في الكلور الجاف

(١٢) الذهب الخالص يدوب في ماء الكلور مع انه لا يدوب في حامض
بدر وكوريك وحده

(١٢) اجمع هيدروجيناً مكبرتاً في وعاء فوق ماء ثم ادخل اليوكلوراً فيوضع
كبريت ويتكون حامض هيدروكلوريك وبصعد الماء في الوعاء
(١٤) امزج مقادير متعائلة من الكلور والهيدروجين في قنبنة زجاجها صافٍ
واعرضها على نور الشمس فتتحدان بتفرقع شديد مكوناً حامضاً هيدروكلوريكاً
(١٥) اضع ماء قليلاً الى كلور في قنبنة ثم ادخل الى القنبنة زهوراً او اقشنة
ملونة فتذهب الالوان سريعاً. اما الكلور الجاف فلا يذهب الالوان بل لا بد
من وجود الهيدروجين لان تمام التبييض به

(١٦) لون اللتيموس والنيل والمخبر الاعتيادي يذهب بالكلور
كواشفة - يكشف عن وجود الكلور بواسطة نترات الفضة كما يرى من
وضع قليل من ماء الكلور في قديم ثم اضع اليو قليلاً من مذوب نترات الفضة
فيتولد راسب ابيض هو كلوريد الفضة وهذا الراسب يذوب في ماء النشار ولا
يذوب في حامض نيتريك واذا عرض على النور مدة اسود. رشح السبال واجمع
الراسب وجففه وامزجه بكربونات الصودا واحرقه على قطعة فحم بالبورى فتظهر
الفضة البيضاء المعدنية على الفحم فالكلور اذاً يكشف عن الفضة كما تكشف
الفضة عنه

اما قوة الكلور للتأكسد فتتنفع من هذا العمل - ذوب في انبوبة كاشفة
قابلاً من الزجاج اي كبريتات اول اكسيد الحديد واضف الى السبال قليلاً من
الحامض الكبريتيك ثم اضع الى الكل ماء الكلور واحم الانبوبة فيصفر السبال
وذلك لان ماء الحامض الكبريتيك انحل وهيدروجينه اتحد مع الكلور مكوناً
حامضاً هيدروكلوريكاً اما الاكسجين فلم يفلت بل اتحد مع اكسيد الحديد الاول
فصبره الاكسيد الاعلى فاتحد معه الحامض الكبريتيك مكوناً كبريتات اكسيد
الحديد الاعلى

البروم
ب
ب

سميته ب وزن جوهره ٨٠ وزن جوهره المادي ١٦٠ ثقله النوعي السبال

البروم موجود في ماء الابجر المالحه ولاسيما في ماء بحيرة لوط وفي بعض المياه المعدنية على هيئة بروميد المغنيسيوم . كشفه اولاً بالارد في سنة ١٨٢٦ وكيفية استحضاره مبنية على انه يتركب مع الاثير اذا اضيف الى مذوبه في ماء استحضاره - بعد تبلور الملح من ماء البحر بمره في السبال الباقي مجرى من غاز الكلور . فالكلور يجل بروميد المغنيسيوم مكوناً كلوريد المغنيسيوم ثم يضاف اليه اثير فيذيب البروم ثم اذا ترك بعوم الاثير المذوب الروم فيرفع بواسطة قمع او مص ثم يضاف اليه يوتاسا كاي ويحصى فينولد بروميد اليوتاسيوم وبرومات اليوتاسا ثم يجفف ويحصى الى درجة الاحمرار لكي يجل برومات اليوتاسا ثم يوضع في انبيق مع اكسيد المنغنيس الثاني وحامض كبريتيك مخفف ويحصى الانبيق ويغمس عنقه تحت ماء بارد فيصعد البروم على هيئة بخار احمر فيجمع تحت الماء على هيئة سيال احمر غامق

ويستحضر ايضاً باحماء بروميد الصوديوم في انبيق مع اكسيد المنغنيس الثاني وحامض كبريتيك مخفف بمثل ماء فيحصى الانبيق بجمام مائي ويدخل فكة في قابله مبردة بالمجليد فيصعد البروم على هيئة بخار ويجمع في القابله على هيئة سيال كما تقدم صفاته - هو سيال احمر غامق اثقل من الماء ذو رائحة كريهة منها تسميته من $\beta\rho\omega\mu\omicron\varsigma$ اي كربه . يغلي عند 147°F وعند 19°F يجمد على هيئة بلورات رصاصية اللون . هو كاي ويشبه الكلور في ازالته الالوان النباتية . يذوب شيء منه في الماء واكثر في الكحول واكثر في اثير

مركب الكلور والبروم

يُعرف للكلور مع البروم مركب واحد هو كلوريد البروم . يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في البروم السائل والى الآن قلما درس هذا المركب فلا يُعرف عن خصائصه ما يستحق الذكر

اليود

سبته ي وزنه الجوهري ١٢٧ وزن جوهره المادي ٢٥٤ .
اليود موجود طبيعياً في ماء البحر وفي الاعشاب البحرية والاسفنج وفي بعض

المياه المعدنية على هيئة بوديد الصوديوم والمغنيسيوم وفي بعض الاصناف . كشفه كورتوا في باريس سنة ١٨١٢ في السبال الباقي بعد استخراج الصودا من رماد الاعشاب البحرية

استحضاره - تحرق الاعشاب البحرية وبرشح عن رماها ماء فيذوب الاملاح التي في الرماذ ثم يجفف حتى يتبلور كلوريد الصوديوم وكلوريد اليوتاسيوم و كربونات الصودا فترفع حال تبلورها فيبقى سيال مسود حاو بوديد الصوديوم و بوديد المغنيسيوم فيجئ في انيق رصاص مع اكسيد المغنيس والمحامض الكبريتيك كما تقدم في البروم فيصعد اليود غازاً ويجمع في قابله مبردة ويستحضر ايضاً بانفاد مجرى من غاز الكلور في مذوب بوديد الصوديوم فيولد

كلوريد الصوديوم واليود برسب ثم يجمع بالترشيح

صفاته - هو جامد على هيئة قشور مسودة ذات لمعان يذوب عند ٢٢٢° ف ثقله النوعي ٤.٦٥ واذا احم يصعد عنه بخار بنفسجي ثقله النوعي ٨.٧١٦ ومنه تسميته اي *iodine* معناه بنفسجي كما يظهر من احماه قليل منه في قنبه واذا طرح شي لا منه على سطح حام الى درجة الاحمر يذوب وياخذ الهيئة الكروية . الماء يذوب منه $\frac{1}{7}$ من وزنه واذا ذوب في الماء بوديد اليوتاسيوم اولاً يذوب من اليود جانباً عظيماً اما الكحول فيذوبه مكوناً صبغة اليود و يذوب ايضاً في اثير او كلور فورم . هو سام ذو طعم حريف يلون الجلد اصفر طياراً بينه وبين المعادن الفه شديدة كما يتضح من هذه الاعمال

(١) ذوب قليلاً من بوديد اليوتاسيوم في ماء مستنظر واضف اليه قليلاً من مذوب كلوريد الزبيق فينولد راسب اصفر ثم يغول الى احمر قرمزي هو بوديد الزبيق التالي

(٢) واضف الى المذوب المشار اليه مذوب خلاص الرصاص فينولد راسب اصفر هو بوديد الرصاص

(٣) اضف اليه نترات الزبيق فينولد راسب اخضر هو بوديد الزبيق الاول . اذا ذوب اليود في الكحول غال ثم ترك حتى يبرد تتكون بلورات طويلة حسنة . اذا احمي يوتاسيوم في بخار اليود يشعل بلهب بنفسجي مكوناً بوديد اليوتاسيوم

الكاشف عن حضور اليود هو مذوب النشاء الذي يكون معه لوناً أزرق كما ينضح من اضافة نقطة من صبغة اليود الى ماء ثم يضاف الى المزيج نقطة من مذوب النشاء في ماء غالي فيظهر اللون الأزرق وهكذا اذا كُتب بماء النشاء على قرطاس ثم عُرِض على بخار اليود تترق الكتابة واذا اُضيف الى دقيق المحنطة او غيرها من المحبوب يظهر وجود النشاء فيها

مركبات اليود مع الكلور والبروم

كلوريد اليود الاول ي كل وكلوريد اليود الاعلى ي كل_٣ يُستحضران بفعل الكلور في اليود فان كان الكلور قليلاً يتكون الاول وان كان زائداً يتكون الثاني الاول سيال والثاني جامد

بروميدي اليود — اذا اُضيف الى اليود قليل من البروم يتولد بروميد اليود الاول وهو جامد واذا كثر البروم يتولد بروميد اليود الاعلى وهو سيال

الفلور فل } فل }

سمنه فل وزنه الجوهري ١٩ وزن جوهره المادي (مظنون به) ٢٨. هذا العنصر موجود في الطبيعة مركباً مع الكالسيوم على هيئة الحجر المعروف بحجر دريشير وهو فلوريد الكالسيوم ويوجد قليل منه في الاسنان وفي العظام الحيوانية ومن شدة الفتنه على سائر العناصر لم يتمكن من تجريبه عنها مدة كافية لدرس خصائصه لانه متى انحل عن تركيبه مع مادة يتخذ حالاً مع اخرى فاذا انحل الحجر المشار اليه في وعاء زجاج مثلاً فحالما يفصل الفلور من الكالسيوم الذي كان مركباً معه يتخذ مع سليكون الزجاج مكوناً فلوريد السليكون كما سترى عند الكلام عن مركباته

الهيدروجين ه } ه }


سمنه ه وزن جوهره ١ وزن جوهره المادي ٢

هذا الغاز كشفه اولاً كاشدش الانكليزي سنة ١٧٦٦ وهو موجود في الطبيعة مركباً مع الاكسجين في الماء لان $\frac{١}{١٦}$ الماء وزناً هيدروجين و $\frac{١}{٨}$ اكسجين ومن

وفائدة الحديد انما هي احداث مجرى كهربائي بهيج المحل وهذا لتعليل العمل
 ب + ا - زن - ب - زن ا + هـ


(٤) ضع شريط حديد نظيف او برادة حديد في انبوبة صينية محماة الى الحمورة

٧٢



في كور شكل ٧٢ وامر عليها بخار الماء من قنبنة مسخنة ب فيصعد البخار من القنبنة
 الى الانبوبة فينجد الاكسجين مع الحديد وينفث الهيدروجين فيجمع في القابلة ق


شكل ٧٣



ان الهيدروجين
 مستحضر بهذه الطرق
 ممزوج بخار الماء وبخار
 الحمض المستعمل
 فلاجل تفينته من
 الحمض يجب امراره
 في قنبنة ثانية فيها
 مذوب پوتاسا شكل ٧٣

قبل جمعها في القابلة ولاجل تجفيفه يمر في انبوبة ملائنة كلوريد الكلسيوم او يجمع
 فوق زيتق ولاجل ازالة الكلور منه يجب امراره في انبوبة عوجاء او قنبنة فيها


شكل ٧٤



حجر الخنفان مبلول بمذوب كبريتات الفضة
(٥) يُنخَصَّر هيدروجين صرف اذا انتهى قطبا
بطارية كلفائية في ماء فانه يخل الى عنصره اوكسجين
وهيدروجين اما الاكسجين فيلت عند القطب الايجابي
واما الهيدروجين فعند القطب السلي واذا قلبت
فوق كل قطب قابله ملائمة ماء يجمع الغازان وذلك
يتم بالة مثل شكل ٧٤ واذا اضيف الى الماء قليل من
حامض ما مثل المحامض الكبريتيك يسرع العمل لان
ذلك يجعل الماء موصلأ اصح
صفاته - هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف ثقله
النوعي ٠.٦٩٢. الماء بذوب $\frac{1}{100}$ من جرمه وبسبب

خفته ثلثاً به البلونات للصعود الى طبقات الجو العليا وهو قابل الاشتعال واذا

شكل ٧٥




شعل ثم وُضعت على لهيبه انبوية زجاجية يخرج
منها صوت موسيقي شكل ٧٥ تختلف فوته
باختلاف قطر الانبوية وهو من اضطراب
الهواء فيها بتوليد بخار مائي وضغطه سريعاً
وتوليد البخار هذا بانحداد الهيدروجين مع اوكسجين
الهواء ينضخ من قلب قابله باردة فوق لهيبه
فيجمع البخار على سطحها الداخلي وسوف ياتي
ابضاح ذلك عملاً بعد الكلام عن الاكسجين
واذا مزج معه هواءاً وأشعل بتفرع واذا مزج

معه اوكسجين بتفرع بشدة. لا يعيش فيه حيوان وذلك ليس لكونه ساماً بل
بسبب الانفطاع عن الاكسجين. لم يتمكن من تحويله الى سيال. لا يشعل فيه لهيب
كما ينضخ من ادخال شمعة مشتعلة الى قابله مغاونه ملائمة هيدروجين فانها تنطفئ
اذا رُبي مجرى هيدروجين على اسفنج البلانين يحس الاسفنج الى درجة

الاحمرار ويشعل الهيدروجين وبناءً على ذلك أصطنع قنديل دو برانير وهو وعاء
مثل جرس في وسطه قطعة زنك شكل ٧٦ يقلب في وعاء

شكل ٧٦



ملآن حامض كبريتيك مخفف فنفتح المحنفة في أعلى الجرس حتى يخرج الهواء من الجرس ويصعد الماء إلى أعلاه ثم نسد فن فعل الحامض الكبريتيك في الزنك يتولد هيدروجين يصعد إلى أعلى الجرس ويطرد الماء منه ومتى طرد الماء جميعاً لا يعود يتولد هيدروجين ثم إذا فتحت المحنفة يخرج مجرى من الهيدروجين وبصبي قطعة من اسفنج البلاتين فيشعل ويصعد الماء في الجرس ايضاً فيتولد ايضاً هيدروجين . اذا ترك هذا القنديل مدة يجسر اسفنج البلاتين قوة اشعال الهيدروجين فحينئذ ينقضي احراقه قليلاً حتى يكتسب تلك القوة ثانية

تنبيه - يصنع اسفنج البلاتين بنوع قطعة قرطاس نشاش او قطعة اسبستوس في مذوّب لي كلوريد البلاتين ثم تجفيفها واحماؤها

قوة الغازات على النفوذ - اذا ملئت قنيتان كل واحدة بغاز ثم وُضع فوهة الواحدة على فوهة الاخرى او اُوصل بينها بانبوبة وتركنا مدة يمتزجان ولو جعل اثنى الغازين اسفل واذا انقسمت انبوبة او وعاء طويل قسمين بواسطة حاجب من الجص او من مادة اخرى ذات مسامٍ وأدخل في كل قسم غاز بنفذ كل غاز في المحاجب فيمتزجان في القسمين مزجاً تاماً . غير انه بين الغازات تفاوت من جهة قوتها على النفوذ وهذه القوة هي بالقلب كالجذر المائي من كثافة الغاز مثاله اذا فرض ان الانبوبة قد ملئ قسم منها اكسجين وقسم منها هيدروجين فانه ينفذ من الهيدروجين إلى جانب الاكسجين اربعة قراريط مربعة ومن الاكسجين إلى جانب الهيدروجين فيراط مربع فكثافة الاكسجين إلى كثافة الهيدروجين :: ١٦ : ١ فتكون نسبة قوتها على النفوذ بالقلب :: ٤ : ١ واذا جعل المحاجب من مادة لينة كقطعة رق مثلاً يرى تجمع الغاز الاخف في جانب الاثقل بتدبيب الرق إلى جهة الاخف وهذا المبدأ كثير الاعتبار جداً اذ هو جوهر

يمنع تجمع غازات سامة في مواضع وحدها وبوجهه تم بعض الوظائف الحيوية منها تأكسد الدم في الرية وإخراج غاز الحامض الكربونيك منه

مركبات الهيدروجين والكلور

حامض هيدروكلوريك

عدد ذراته ٣٦٥ ثقله النوعي غازاً ١٨٢٥٠ مترادفات . حامض كلوروهيدريك

حامض مورباتيك روح الملح


استحضاره - يُستحضر بإضافة ٦ أجزاء كلوريد الصوديوم الى ١٠ أجزاء

حامض كبريتيك و ٤ أجزاء ماء ويجب مزج الحامض والماء أولاً وتركها حتى يبردا ثم يضافان الى الملح وهذا لتعليق المحل والترييب

ص كل + ٥ ك ا م - ص ك ا م + ٥ كل

كلوريد الصوديوم حامض كبريتيك كبريتات الصودا حامض هيدروكلوريك وبما ان هذا الغاز يذوب في الماء يجب جمعه فوق زيتق او بالطارد لانه

اثقل من الهواء الكروي واذا اريد تنقيته يمر في شكل ٧٧



انبوبة ملتوية على هيئة شكل ٧٧ فيها حامض كبريتيك

ثقل ثم في انبوبة اخرى فيها قطع حجر الخفان مبنلة

بجاءض كبريتيك ثقيل

و يُستحضر ايضاً بوزج مفادير منعدالة من الكلور

والهيدروجين وتركها ٢٤ ساعة في النور المنفرق

صفاته - هو غاز لا لون له يظهر منه بخار في الهواء الرطب حامض المذاق

كروي ذورائحة حادة خصوصية بطنى لهيباً وبجهر اللذموس وبزبل الحيوية الحيوانية

غير قابل الاشتعال يتحول الى سيال بالضغط والبرد يذوب في الماء بكثرة ابي

مقدار واحد من الماء يمس نحو ٥٠٠ مقدار من الغاز فينتكون حامض هيدروكلوريك

هيدراتي او الحامض المورباتيك الدارج على ثقل نوعي ١٢٢

عمليات - (١) املئ انبوبة حامضاً هيدروكلوريكاً غازياً ثم اغمس طرفها في ماء ملون باللحموس فالغاز يتحد بالماء بسرعة والماء يصعد الى الانبوبة املئ الخلاء واللون الازرق يتحول الى احمر

(٢) قرب قدح فيه نشادر الى آخر فيه حامض هيدروكلوريك فعند مصادمتها يتولد بخار ابيض هو هيدروكلورات النشادر

(٣) املئ قنينة غاز النشادر وغطها فاما بقطعة زجاج ثم املئ اخرى مثلها غاز الحامض الهيدروكلوريك واجعل فوهتها على فوهة الاولى فا دام حاجب الزجاج بينها لا يظهر تغير واذا جذب من بينها يمتلئان بخاراً ابيض هو هيدروكلورات النشادر

(٤) ادخل مقداراً مفروضاً من هذا الغاز في معوجة فكما تحت زبيق ثم ادخل فيه قطعة صوديوم واجها قليلاً بتدليل الكولي فتشعل ويزول نصف مقدار الغاز ويبقى هيدروجين والصوديوم يتحول الى كلوريد الصوديوم فينتضج من ذلك ان غاز الحامض الهيدروكلوريك مركب من كلور وهيدروجين مقادير متعادلة منها اي ٥ + كل - ٥ كل


حامض هيدروكلوريك هيدراتي او حامض مورياتيك - هذا الحامض كبير الاستعمال في الصناعات والمعاملات الكيميائية ويستخسر من الحامض الكبريتيك والملح كما تقدم ثم يمر الغاز في قنالي ولف شكل ٦٩ فيها ماء او بوصل بواسطة انبوبة الى ماء في قنينة مبردة لان تحويل الغاز الى سيال بظهر حرارة شديدة فكل ٧ اجزاء ماء تكوّن ١٠ اجزاء حامض مائي مشبع او بالتدقيق ٧١١ ماء تكوّن ١٠٠٠ من الحامض على ثقل نوعي ١١١٢ وهو سيال صاف لا لون له اما التجاري فمصفى اللون لكونه غير نقي فقد يخالطة حامض كبريتيك وكلوريد الحديد وحامض كبريتوس وزرنيخ وقصدير اما الحامض الكبريتيك فيكشف بنجفيفه وازافة كلوريد الباريوم اليه فيتولد كبرينات الباريوم غير القابل الذوبان اما الحامض الكبريتوس فيكشف بنجفيفه ثم يضاف اليه اول كلوريد القصدير فيتحول السيل الى اون بني او يتولد راسب اسود اما الزرنيخ فسياتي كيفية كشفه واما الكور فيندويو رق الذهب اما كلوريد الحديد فيعرف حضوره من اللون

الاصفر ويكشف باشباع المحامض نشادراً ثم يضاف اليه هيدروسينات البوتاسا
الاصفر فيتولد راسب ازرق

كواشفه - يكشف عن حضور هذا المحامض وعن حضور اي كلوريد كان
اذا كان قابل الذوبان بواسطة نترات الفضة الذي يولد معه راسباً ابيض لا
يدوب في حامض نيتريك ويدوب في نشادر وبسود اذا عُرِض على النور مدة

مركبات الهيدروجين والبروم

حامض هيدروبروميك ه ب عدده ٨١ ثقل غازه النوعي ٤٠٢٥
يُستخَصَّر بواسطة انبوبة عوجاء



شكل ٧٨ يوضع فيها عند د قليل
من البروم وعند ذ بعض قطع
فصنور ويملاً الساق اذ قطع زجاج
صغارا مبتلة بماء ثم يجي البروم قليلاً
فيصعد الغاز ويجمع فوق زيتق


والتعليل هو ان بخار البروم عند ما يصادف الفصنور يكون معه بروميد
الفصنور ف ب م وهو يغفل بالماء مكوناً حامضاً ففصنوروساً الذي يبقي في الانبوبة
وغاز المحامض الهيدروبروميك الذي يصعد اي ف ب م + ١٥٥٢ - ف ٥٣ م +
٥٢ ب. اذا كان الماء في الانبوبة كثيراً يمس الغاز فيصير حامضاً هيدروبروميكاً
هيدراتياً

صفاته - هو غاز لا لون له لا يقبل الاشتعال بطنق اللهب خائق يدوب
في الماء حتى يصير ثقله النوعي ١٢٤٨٦ واذا عُرِض على الهواء يتلون بسبب
انفلات قليل من البروم وذوبانوه في الماء

مركبات الهيدروجين واليود

حامض هيدروبوديك - ه ي عدده ١٢٨ ثقل غازه النوعي ٤٢٤

تُستخَر بوضع جزء من النصفور و٩ أجزاء من اليود في شكل ٧٩



انبوبة شكل ٧٩ اي بوضع قليل من اليود في اسفل الانبوبة ثم قطع زجاج مبتلة بماء ثم بود ثم زجاج وهلم جرا حتى يمتلئ نصف الانبوبة او ثلثاها ثم نحى قليلاً ويجمع الغاز بالطرد فينولد اولاً يوديد النصفور ثم بفعل بالماء فيتكون حامض فصفوروس وحامض هيدرو يوديدك حسب التعديل المتقدم عن الحامض الهيدرو بروميك ولا يجمع فوق زيتي لانه يكون معه يوديد الزيتي وهيدروجيناً

الحامض الهيدرو يوديك الهيدراتي يُستخَر بتعليق يود مسحوق في ماء ثم يُنفذ فيه مجرى من غاز الهيدروجين المكثرت فيفعل اي هيدروجينه يكون مع اليود حامضاً هيدرو يوديكاً والكبريت يرسب وبتدوم العمل حتى بصير السبال غير ملون ثم يحمى لاجل طرد الهيدروجين المكثرت الزائد ثم يبرش ولا يمكن حفظة زمناً لان أكسجين الهواء يجله فيتولد ماء ويود واليود يذوب في السبال ويكسبه لوناً بنياً

الكلور يجله كما ينضج يجمع كلور في قنينة وغاز هذا الحامض في اخرى ثم اجعل فوهة الواحدة فوق فوهة الاخرى فالكلور والهيدروجين يتحدان ويظهر بخار اليود البنفسجي


اذا اضيف اليه نترات الفضة يرسب راسب اصفر هو يوديد الفضة

مركبات الهيدروجين والفلور

حامض هيدرو فلوريك ه فل عدده ٢٠

شكل ٨٠

يُستخَر باحشاء مسحوق فلوريد الكلسيوم



مع مضاعف وزو حامضاً كبريتيكاً في انبوي

من الپلانين او الرصاص ث شكل ٨٠ متصل

بواسطة انبوية ب بفايلة من مثاوت مبردة ت

يجليد او ثلج وهذا تعليل المحل والتركيب

(كلس فل ٢) + (ا م ه م كا م) - (كلس ا م كا م) + (ه فل) صفاته - هو سيال كثيف مدخن طيار لا لون له يغلي عند ٦٠ ف يذوب في الماء شديد الحموضة يحمر اللثوس و يذوب الزجاج كما اذا اصاب الجلد كواه وقرحه اذا صب في الماء يتحد معه بسرعة ويخرج صوتا مثل صوت الحديد الحامي اذا اغمس في الماء. يستعمل للنقش على الزجاج وذلك باكتسائه شمعا ثم ينقش عليه ما يريد ويرش عليه مسحوق فلوريد الكلسيوم ثم يصب عليه حامض كبريتيك ويترك مدة فالحامض الهيدروفلوريك المولد يتحد مع سليكون الزجاج فيعلم فيه حسب النقش. وبخاره ايضا يفعل في الزجاج كما ينضح من وضع الاجزاء المشار اليها في وعاء رصاصي وتغطيته بنقطة زجاج مكسبة بالشع ومنقوش عليها كما تقدم فالبخار الصاعد يفعل في الزجاج كما في العمل الاول

الفصل الرابع

في العناصر من الرتبة الثانية اي المواد الشبيهة بالمعدنية ذات الجوهريين

ان هذه الرتبة فيها اربع مواد وهي اكسجين وكبريت وسليديوم وتلوريوم
اكسجين

سمنه ا وزن جوهره ١٦ وزن جوهره المادي ٢٢ ثقله النوعي ١.٠٥٧
هذا الغاز كشفه اولاً رجل انكليزي اسمه بريستلي في سنة ١٧٧٤ وكشفه شيل الاسوجي في سنة ١٧٧٥ بدون معرفة كشف بريستلي اياه ثم سمي اكسجيناً من لفظتين يونانيتين معناها مولد الحامض لزعيم حيث ان علة كل الحوامض وهو كثير الوجود في الطبيعة مزوجاً او مركباً مع مواد اخرفانه نحو $\frac{1}{8}$ قشرة الارض و $\frac{1}{4}$ الماء وزناً واكثر من خمس الهواء الكروي و $\frac{1}{4}$ البخار المائي وهو جزء معتبر من كل المواد الحيوانية والنباتية وعلة الحيوه والاشتعال اذ بدونها لا يجياحي في هذا العالم ولا تشعل نار

استحضاره - (١) اذا اُحيى اكسيد الزئبق الاحمر في انبوبه مثل شكل ٧٩

وأدخل طرفها تحت قابله ملأته ماء في المحوض الكيمياوي ينحول الى عنصره
فيبقى الزئبق في الانبوبة والاكسجين يصعد الى القابلة وهذا تعليل المحل ٢ (زري) ١
- ٢ زري + ١٢

(٢) باحماؤ أكسيد المنغنيس الثاني في انبيق حديد او خزف في كور فينلت
ثلث اكسجينه وهذا تعليل المحل ٢ (من ٢١) - من ١٢ + ٤ ١٢

(٣) امزج اجزاء متماثلة من كلورات البوتاسا واكسيد النحاس الاسود وجفف
المزيج وضع مقداراً منه في انبوبة زجاجية صلبة مثل شكل ٧٩ واحم على قندبل
الكحولي واجمع الغاز في قابله فوق ماء كما في الاعمال المذكورة انفاً. فكل ١٧٥ قحمة
من المزيج يعطي ١٠٠ عقدة مكعبة من الاكسجين في خمس دقائق وهو جميعه من
حل كلورات البوتاسا الذي يعين عليه اكسيد النحاس بدون ان يتغير نفسه فيبقى
في الانبيق اكسيد النحاس الاسود وكلوريد البوتاسيوم. غسيل هذا الباقي لاجل
ازالة الكلوريد فيبقى اكسيد النحاس للاستعمال ثانية اما تعليل المحل فهو هذا
ب كل ٢١ - ب كل ٢١ +

(٤) احم كلورات البوتاسا وحده في انبيق فينل وبعده عنه اكسجينه كما
تقدم ويبقى كلوريد البوتاسيوم وهذه الطريقة يقضي لها حرارة اكثر من التي تقدم
ذكرها وكثيراً ما يكسرها الانبيق اذا كان من زجاج

(٥) احم مزيجاً من كلورات البوتاسا واكسيد المنغنيس الاسود في انبيق
فالكلورات ينحل وبعده اكسجينه والاكسيد يبقى مع كلوريد البوتاسيوم فيُغسل
الباقي ويسرجع الاكسيد كما تقدم في الطريقة الثالثة اي يستعمل اكسيد المنغنيس
عوضاً عن اكسيد النحاس

(٦) احم اكسيد المنغنيس الثاني في انبيق حديد في كور فينحول الى مسكوي
اكسيد وبعده بعض اكسجينه وهذا تعليل المحل ٢ (من ٢١) - من ١٢ + ٤ ١٢
(٧) احم اكسيد المنغنيس الثاني مع حامض كبريتيك هيدراتي فيصعد نصف
اكسجينه وينولد كبرينات المنغنيس وماء وهذا تعليل المحل والتركيب ٢ (من ٢١)
٢ + (٢ ١ ك ٥) - ٢ (من ٢ ١ ك ٥) + ١٥٥ + ١

وفي هذا العمل يستعمل انبيق زجاج ذو عنق وسداد فيوضع فيه ثلثه حامضاً

كبريتيكا ومثله وزناً من أكسيد المنغنيس الأسود ويهز الأنيق لاجل مزج
المادتين مزجاً تاماً ثم يجرى اجراء متواصلًا لثلاث ساعات من المحوض الى الأنيق
اذا خفت الحرارة فينكسر

ان أكسيد المنغنيس الأسود الطبيعي احياناً يخالطة كربونات المنغنيس فلا
يصلح لجمع الأكسجين اذا طلب الغاز الصرف ويمنح بوضع قليل منه في قرح مع
ماء مستقر ثم يضاف اليه قليل من حامض نيتريك او هيدروكلوريك فان كان
فيه كربونات تصعد عنه ففناقع غاز الحامض الكربونيك

(٨) أكسيد الفضة اذا أحي في انبوبة زجاجية يصعد عنه الأكسجين وتبقى الفضة
(٩) نترات البوتاسا اذا أحي في أنبيق فخار الى درجة الحمرة يصعد عنه
أكسجين غير نقي اي $٣١ - ٢١ - ١$ اي نترات البوتاسا بصور نيتريت
البوتاسا

(١٠) بجل الماء بواسطة المادة الكهربائية كما سبقت الاشارة اليه صحيفة ٩٧

$٢(١٥٥) - ٢(٥٥) + ٢١$ والأكسجين يجمع عند القطب الايجابي

(١١) اذا جعل غصن شجرة خضراء في ماء تحت قابله ووضعت في نور
الشمس يصعد عنه ففناقع غاز وتجمع في اعلى القابلة وهذا الغاز هو أكسجين صرف
صفاته — هو غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم يذوب منه في الماء قابل جداً
اي ١٠٠ مقدار ماء تذوب ٤ مفادير أكسجين. لا يفعل بماء الكلس ولا بالمتوس ولم
يتمكن من احواله الى سيال وهو عاة الاشغال مع انه نفسه لا يشعل. لا يوصل
الكهربائية فلما يكسر شعاع النور وبينه وبين اكثر العناصر الة فينكوّن من
تركيبه معها اكسيد وقلويات وحوامض. اذا عرض بعض المعادن على الهواء او
على الماء تتأكسد شيئاً فشيئاً كما يرى في الحديد والنحاس والزنك والبوتاسيوم
والصوديوم وغيرها اما هذان الآخران فيتأكسدان بسرعة اذا طرحا في الماء كما
سيأتي في محله اما الاشغال فهو الناكسد بسرعة اي أكسجين الهواء يتحد بسرعة مع
المادة المشتعلة ويكون الاشغال متوقفاً على وجوده سمي مضرماً وبعض المواد
التي لا تشعل في الهواء تشعل بسرعة في الأكسجين كما سيأتي من بعض الاعمال الآتية
كيفية استعمال ثقل الغازات النوعي — تصنع قنبلة زجاجية رقيقة جداً ذات

حنفية ضابطة وداخلها ثرمومتر دقيق فتخرج منها الهواء بالمفرغة وتوزن ثم تملأ هواء جافاً وتُسْعلم درجة حرارته وتوزن ايضاً فلنا من ذلك وزن مقدار معلوم من الهواء على درجة معلومة من الحرارة ثم تفرغ ايضاً وتوصل بالآلة المولدة الغاز ويدخل الغاز اليها بعد امراره على كلوريد النكلسيوم او على حجر الخفان مبتلاً بحامض كبريتيك لاجل ازالة البخار المائي منه فلا بد من كون الغاز في القنينة منضغطاً قليلاً فاذا ترك حتى توازي حرارته حرارة الهواء الموزون اولاً ثم فُحيت الحنفية لحظةً يخرج من الغاز ما يجعل الضغط على الباقي معادلاً لضغط الهواء ثم يوزن فلنا وزن مقدار منه يعادل مقدار الهواء الذي استعمل وزنه اولاً ثم اقسام وزن الغاز على وزن الهواء فنخرج هو الثقل النوعي


اعمال موضحة خصائص الاكسجين

(١) املئ قنينة اكسجيناً وركب شمعة على شريطة كما في شكل ٨١ واضمها ثم ادخلها الى الاكسجين فيزيد نورها كثيراً

(٢) اطفئ الشمعة تاركاً على فتيلتها شرارةً وادخلها الى الاكسجين فنلهب.

(٣) املئ قنينة ذات عنق وسدادة اكسجيناً وضعها على صحن فيه ماء وضع

٨١



قطعة فحم مشتعلة في ملعقة مثل شكل ٧٠ وادخلها

في الاكسجين شكل ٨١ فيشعل الفحم بلعان شديد

ان المولد من هذه الاعمال انما هو غاز

الحامض الكربونيك لان المواد المشتعلة هي

كربون فمن اتحادها بالاكسجين تولد غاز الحامض

الكربونيك. ولكي يبرهن ذلك ادخل الغاز

الباقى في القنينة الى ثلاث قوابل صغار وادخل

الى واحدة منها قطعة من ورق اللنموس الازرق

بعد بلها فتحمراً وذاك يدل على حضور حامض

ما. ثم ادخل الى الثانية قليلاً من ماء الكلس الصافي فيتعكر من توليد كربونات


الكلس. وادخل الى الثالثة شمعة مشتعلة فننطفئ

(٤) ضع قطعة كبريت في ملعقة (شكل ٧٠) واشعلها ثم ادخلها الى قنبلة اكسجين فيشعل بلايب بنفسجي ويتكون غاز المحامض الكبريتوس

(٥) ضع قطعة فسفور في فئجان نحاس مركب على راس شريط ذي كسر ووقفه على صحن فيه ماء واشعل الفسفور ثم غطه بقنبلة اكسجين فيحترق بلعان شديد ويتولد دخان ابيض كثيف هو حمض فسفوريك فبصه الماء

(٦) لف قطعة شريط حديد او فولاذ على هيئة لولب

شكل ٨٢




شكل ٨٢ واجعل على طرفه مادة قابلة للاشتعال مثل كبريت او فحم واشعلها ثم ادخلها في قنبلة اكسجين فيحترق الحديد او الفولاذ ويتكون اكسيد الحديد وهكذا اذا اشعل زنك في اكسجين يتكون اكسيد الزنك

(٧) لف درهم شريط حديد نظيف وضعه في وعاء فخار مثل

غليون النبع واحم الى درجة الحمرة ثم ارم عليه مجرى اكسجين من كيس او وعاء معدن لذلك فيحترق الشريط ويتحد بالاكسجين فيتحول

الى اكسيد الحديد ثم زنه فيرى انقل ما كان قبل احتراقه وذاك يبرهن ان المواد تزيد وزنا بانحادها مع الاكسجين

شكل ٨٣



(٨) وهذا يتضح على طريقة اخرى. لتكن ذ

شكل ٨٣ انبوبة زجاج صلب نصفها مملآن

اكسجيناً وهي مقلوبة في حوض زئبق والرقيق

مائها الى ذ ثم بواسطة ملفط طويل ادخل الى

الاكسجين قطعة معدن موزونة مثل زئبق او

پوتاسيوم مثل د واجمها بفندبل الكحولي فيتحد الاكسجين بالمعدن وبصعد الزئبق

في الانبوبة ثم زن الاكسيد فيرى انقل من المعدن الاصلي

(٩) الكاوتشوك والكافور ومواد اخرى كثيرة تشعل في اكسجين بشدة وسرعة

لم يتمكن من احالة اكسجين الى سيال. كثافته ١.٠٥ والماء بدوب منه ٠.٤٦.

من جرمه. لا طعم له ولا لون ولا رائحة ولا يصلح للتنفس الا هو. بينه وبين

الكربون الفة شديدة ومن المعادن بينه وبين الكالسيوم والرو. ديوم والپوتاسيوم

والصوديوم والليثيوم اشد الفة

كواشفه — يُكشف عن الأكسجين بادخال غاز أكسيد النيتروجين الثاني فيو
فيتولد غاز احمر اللون هو غاز الحامض النيتروس بمصه الماء سريعاً

أوزون

اذا جُع أكسجين بجل الماء بواسطة بطارية كلفانية على درجة حرارة واطئة
تظهر له صفات غير صفاته الاعتيادية منها انه يكتسب رائحة خصوصية ويخذ
بالفضة والزيتق بغير واسطة ويجل اليود من بوديد اليوتاسيوم وله قوة عظيمة
النتبيض فاذا وُضع مذوّب كبريتات الليل في وعاء فيه هذا الغاز يذهب لونه
الازرق ويزيل الروائح المنتنة بسرعة واذا اُحي الى درجة فوق درجة غليان
الماء قليلاً بصير أكسجيناً اعتيادياً وبناء على ذلك زعموا انه اكسجين التوتروبي
(صحيفة ٧٩) وقد زعم بعضهم انه أكسيد الهيدروجين الثاني ٢١٥ وسُمي اوزوناً
بسبب رائحته . من الكثرة اي اخرج رائحة

استحضاره — يُستحضر بانفاذ شرارات كهربائية في وعاء فيه هواء او اكسجين
وابضاً بفعل الفسفور باكسجين او بهواء كروي . خذ قطعة فسفور طولها نحو نصف
قيراط وقشر سطحها وضعها في قنبنة نظيفة نسع نحو ٩ اواق واسكب عليها من الماء
ما يغمر نصفها ثم سدّ القنبنة سدّاً غير محكم واجعلها في حرارة نحو ٦٠ ف بعد
خمس او ست ساعات يكون قد تولد في القنبنة اوزون ثم ارفع منها الفسفور
واضف الى الماء ماء قليلاً وهزّ القنبنة لكي يمص الماء ما تولد من الحامض
الفسفوريك ثم افرغه واعد العمل مرتين او ثلاث مرات فالاوزون لا يذهب مع
الماء المفرغ بل يبقى في هواء القنبنة

ضع في قنبنة واسعة قليلاً من الايبير وهزها لكي تنلى من بخاره ثم احم
فضيب زجاج او شريط پلاتين لولي في لهيب قندبل الكهولي واغمسه في بخار
الايبير فيتولد اوزون — تنبيه اذا اُحي الفضيب او الپلاتين كثيراً يتلاشى
الاوزون بالحرارة الزائدة حالما يتولد

كواشفه — يُكشف عن حضور الاوزون في هواء موضع او محلر بوساطة
شئ منها

(١) خذ من بوديد البوتاسيوم جزءا واحداً ومن النشاء ١٠ اجزاء ومن الماء ٢٠٠ جزءه واغلبها معاً قليلاً ثم بلّ بالمزيج فرطاساً مصقولاً واقطعه شرائط واحفظها من الهواء فاذا ابلت وعلقت في هواء فيه اوزون ينحل بوديد البوتاسيوم والبود يكون مع النشاء لوناً ازرق

(٢) خذ قطعة من فرطاس اللتموس المحمر واغمسها في مذوّب بوديد البوتاسيوم فاذا اصابتها اوزون ينحل البوديد والبوتاسيوم ينحل الى بوتاسا ويرجع لون اللتموس الازرق

(٣) اذا ابلّ فرطاس مذوّب كبريتات المنغنيس وعُرض على اوزون ينحل لونه الى لون بنيّ

(٤) اذا اسودّ فرطاس بواسطة كبريتات الرصاص ثم عُرض على اوزون يبيض

(٥) اذا عُرض مذوّب كبريتات النبل على اوزون يذهب لونه الازرق

(٦) اذا عُرض رق الفضة على اوزون بنفتت في نحو ٥ ساعات ويصير مسحوقاً هو اكسيد الفضة

(٧) صبغة الكوباك المجدبة اذا عُرضت على اوزون تترقّ - تنبيه - هذه الصبغة تُصنع بتذويب جزء من راتنج الكوباك في ٣٠ جزءاً الكحول ثقيل ثم تخفف بالكحول اعتيادي

الاوزون لا يتولد الا عند حضور هيدروجين ولذلك زعم بعضهم انه من مركبات الاكسجين والهيدروجين كما تقدم وهو موجود طبعاً في البراري والصحاري والاعياض حيث يكثر النبات ويقل في المدن وبين البيوت وفي كل موضع يكثر فيه الانسان او الحيوان وقبل ايضاً انه يقل عند تسلط الامراض الوافدة ولا يعلم هل قلته هذه هي سبب تلك الامراض او مسببة عنها

انتوزون - حكي بعضهم بحالة الوتروية اخرى للاكسجين سمي انتوزونا اي ضدّ الاوزون. كهربائية الاوزون سلبية وكهربائية انتوزون ايجابية - اذا فعل اكسيد الباريوم الثاني بمزيج من المحامض الكبريتيك واعلى منغنيات البوتاسيوم في البرد يظهر نوع من الاكسجين غير الاوزون بل اذا اضيف الى اوزون برجمة

اكسجيناً اعتيادياً وإلى الآن لم يُعرف عنه إلا القليل


في مركبات الأكسجين ومواد الرتبة الأولى

في مركبات الأكسجين والهيدروجين

الغاز الأكسبهيدروجيني

إذا مُزج أكسجين وهيدروجين وأشعل المزيج يتفرقع بشدة وإذا كانت نسبة الأكسجين إلى الهيدروجين كنسبة ٢:١ جرمياً يتحدان جميعاً ويتولد ماء البوري الأكسبهيدروجيني - قد تقدم في الكلام عن الهيدروجين أنه يشعل في الهواء أي عند حضور أكسجين أما لهيبه فضعيف وأما حرارته فزائدة وتزيد حرارته كثيراً بتشعيله مع أكسجين لأن جميعه يتحرق بسرعة خلاف اللهب الاعتيادي الذي فيه مواد لا تشعل لعدم وصول أكسجين الهواء إليها كما سيأتي

شكل ١٤



بيانه في محله فاذا مُزج الغازان في قابله او في كيس بحيث يُضغَط عليها حتى يخرج مجرى منها من انبوبة دقيقة مثل د شكل ١٤ يشعلان بلهب قوي شديد الحرارة جداً يتحرق فيه الحديد والپلاتين والنحاس وتصهر اصلب المواد واقصاها . ولكن تشعل هذا المزيج خطر جداً من قبل سري اللهب إلى القابله التي فيها المزيج فينتفرقع ولاجل ذلك

تستعمل البوري الأكسبهيدروجيني على هيئة اخرى اي يُحفظ كل من الغازين في قابله على حدتها احدها منصلة بواسطة انبوبة من الكاوتشوك او الكوناپرخا بالبوري عند ر والاخرى منصلة به عند م فيخرج الغازان معاً من س. اما داخل البوري عند ف فملآن شرائط نحاس دقيقة فصار بهذه الوساطة جوفه مولفاً من انابيب كثيرة دقيقة تمنع سري اللهب إلى نحو القابلتين على مبدأ فنديل الامانة استنباط الفيلسوف دافني

إذا جعل تجاه لهيب هذا البوري مادة مؤكسدة غير قابله للاشتعال مثل

كلس او مغنيسا (انظر ل شكل ٨٤) يقوى النور جداً حتى لا تحتل العين النظر اليه وقد شوهد هذا النور على مسافة ١٠٨ اميال في النهار مندفعاً عن مرآتي شلمبية الشكل وسُمي نور دروموند انتساباً الى رجل انكليزي اول من استعمله للإشارة الى بعيد

اكسيد الهيدروجين الاول اي الماء

سبعة ١٥٥ او { اعدده ١٨


قال الفيلسوف اليوناني ثالس ان الماء هو اول المخلوقات ومبدأ سائر المواد ثم بعد ذلك قالوا انه واحد من العناصر الاربعة وهي النار والهواء والتراب والماء ثم قال فان هلموت بامكانية احالة الماء الى تراب وبني قوله هذا على انه اذا اقتلعت شجرة من الارض وانغرست في الماء لا تنال تموت وتحول الماء الى الجوامد اللازمة لتموتها واذا تصعد ماءً بخاراً في وعاء تبقى في الوعاء مادة ترابية وفي سنة ١٧٠٤ بينا كان الفيلسوف اسحق نيوتون يدرس قواعد النور وجد ان الماء والماس يكسران النور مثل بعض المواد القابلة للاشتعال فانها بقابلية الماس للاشتعال وبحل الماء الى عناصر بعضها قابل للاشتعال ايضاً

وفي اواخر الجبل الماضي اخذ الفيلسوف لافواسير بمنع رأي فان هلموت فاخذ انيقاً ووضع فيه ماء ورتبه حتى يتحول البخار المولد الى ماء ويرجع الى الانيق فلا بفلت منه شيء وابقى الماء على درجة الغليان ١٠٠ يوم ايللاً ونهاراً وعند نهاية هذه المدة لم يكن مجموع الآلة والماء قد خسرت شيئاً من وزنه اما الانيق وحده فخسر ١٧ قحمة والماء اكتسب وزناً وظهرت فيه مواد عكرة فحفف الماء فبقيت ٢٠ قحمة مادة ترابية ١٧ منها اكتسبها من الانيق اما الثلاث قحمت الباقية فمن مواد كانت ذائبة في الماء من اول الامر وكان ذلك اول استعمال الميزان في المعاملات الكيميائية وابتداء افساد الآراء القديمة

وبعد ذلك بقليل اكتشف غاز الاكسجين ثم كشف كافنديش الهيدروجين ثم كشف تركيب الماء بعقوب واط مخترع الآلة البخارية وكافنديش ولافواسير اما

واط وكافنديش فباشعال هيدروجين في اكسجين واما لانفوسير فيجل بخار الماء
قد تقدم (صحيفة ٩٧) ان الماء يغل بواسطة بطارية كلفانية وان الاكسجين
يجمع عن انقطب الايجالي والهيدروجين عند القطب السلي (شكل ١٤) فيكون
جرم الهيدروجين مضاعف جرم الاكسجين وان خلّت هذه النسبة بهذه الآلة

شكل ١٥




فلان الماء يمس بعض الاكسجين

ويُعلّل عن تفريق هذين

العنصرين بالمادة الكهربية بانها

متعدان في الماء وضعاً كالدوائر في

شكل ١٦



شكل ١٥ اي كل جوهر اكسجين فردي ا


قد ارتبط معه جوهر هيدروجين مادي

فعند مرور الجرى الكهربائي بها يمزج الاكسجين نحو القطب الايجالي والهيدروجين
نحو السلي فحالمما ينك احدهما عن الاخر يصعد كما ينضح من شكل ١٦ وهما على
سبيل التوضيح لا على سبيل التعليل الخفيفي

ويجل الماء ايضاً بامرار بخاره على برادة حديد محماة في انبوبة صينية كما تقدم

صحيفة ٩٦

شكل ١٧ اما توليد الماء بتريكب عنصره فيتم على طرُق شتى وينسهل



العمل بواسطة قابلة منقسمة الى اقسام ذات حنفية لاجل نقل

الغاز منها لي وعاء اخر. شكل ١٧ ذ قابلة منقسمة الى عقد مربعة

منها يعرف مقدار الغاز فيها ولها من اعلاها حنفية وتصل بلوالب

عند رفقينة د ذات حنفية ايضاً وهذه الآلة تُستخدَم ايضاً في

استعلام ثقل غاز النوعي. اما لاجل تركيب الماء فيدخل في القابلة

جرم من الاكسجين وجرمان من الهيدروجين ثم منها ينتقل المزيج


الى آلة اخرى صالحة انشعلها كما سياتي

اذا اشعل هيدروجين في حضور اكسجين او اكسجين في

حضور هيدروجين بتولد ماء - ركب آلة كالمرسومة في شكل ١٨

ولكن ت انبوبة صغيرة فيها ماء بارد داخله في جوف الكبيرة


وعند ب يُشعل الهيدروجين الجاف فيجذب مع الأكسجين الهواء ويتولد بخار ماء
شكل ٨٨



وعند مصادمته برد الماء البارد في ت يتحول الى ماء فيجمع عند د وينتروجين
الهواء يفلت عن جوانب ت وهذه الآلة يجمع الماء المولد بنشعل اية مادة كانت
فيها هيدروجين مثل قنديل الكحولي او زيتي او شمعة او غاز الفحم كما سيأتي في
الكلام عن الكربون

لاجل توليد الماء لا بد ان تكون نسبة جرم الهيدروجين الى جرم الأكسجين
كسبة ١:٢

شكل ٨٩ شكل ٩٠



لاجل امتحان هذه الفضية استحضرت آلة سميت
الاقديومتروهي على هيتين احدها اقديومتر قولنا
شكل ٨٩ والاخرى اقديومتر أوراو المصفي شكل ٩٠
وهي انبوبة مفتوحة من طرف ومسدودة من الطرف
الاخر منقمة الى عقد مربعه وعند الطرف المسدود
شريطان من البلاطين نافذتان الى داخلها لكي ينفذ
بها شرارة كهربائية . املء الانبوبة شكل ٨٩ زيتاً
واقليها في المحوض الزيتي او ماء واقليها في المحوض
المائي ثم ادخل فيها مقداراً قليلاً من الأكسجين
الصرف واغمس الانبوبة في الماء حتى يسوي سطح
الماء في داخلها وخارجها واستعلم مقدار الأكسجين
بالدرجات المرسومة عليها ثم ادخل اليها مقدارين من


الهيدروجين وانفذ فيها شرارة كهربائية بوصل خارج جرة ليدينية معبأة باحدى الشربطين وادخلها بالاخري فيتحد الغازان بتفرقع وبصعد الماء او الزيت الى اعلى الانبوبة وان لم تكن نسبة الاكسجين الى الهيدروجين كنسبة ٢:١ تماماً يبقى الزائد في الانبوبة فبممكن امتحانه انكي بعلم هل هو هذا او ذاك

واذا استخدم اقدومتر اور فبعد ادخال الغازين الى الانبوبة ارفع من الماء في الساق المفتوحة ما يجعل سطحه و سطح الماء في الساق الاخرى مستويين وعند انفاذ الشرارة الكهربائية فيها سد الطرف المفتوح بالابهام لئلا يطرد بعض الغاز الى الخارج بالتفرقع فيفسد العمل

طريقة اخرى — ادخل الغازين كما تقدم في الاقدومتر فوق زيتى وركب على طرف شريطة طويلة مزيجاً من الپلاتين الاسفنجي جزء واحد ومن الدلغان ٤ اجزاء وادخله الى مزيج الغازين في الانبوبة فانها بشندان شيئاً فشيئاً بلا تفرقع.

اما الدلغان فلجل تخفيف فعل الهيدروجين بالپلاتين ينولد ماء بتركيب اكسجين وهيدروجين بامرار مجرى من الهيدروجين الجفاف

شكل ٩١



على اكسيد النحاس الاسود محيى وهذا العمل يتم بواسطة آلة مرسومة في شكل ٩١ وهي مثل شكل ٨٨ غير البلبوس ر الذي يوضع فيه اكسيد النحاس ويحى الى درجة الحمرة ثم يمر عليه مجرى من الهيدروجين الجفاف فيتحد مع اكسجين الاكسيد ويكون بخار الماء الذي يجمع عند

صفات الماء — الماء الصرف سبال لا لون له ولا طعم ولا رائحة يجهد عند


٢٢٢ ف وبغلي عند ٢١٢ ف وينحول الى بخار فيصير كل جرم ماء ١٧٠٠ جرم بخار
 والماء غير قابل الانضغاط او بالاحرى ينضغط من جرمه لكل عمود
 هوا وهذا قليل جداً لا يعتد به . و ١٧٠٠ قيراط مربع من الهيدروجين تتركب مع
 ١٥٠ قيراط مربع من الاكسجين فينولد ١٧٠٠ قيراط مربع من البخار الذي ينضغط
 الى قيراط مربع من الماء . ثقل بخاره النوعي ٦٢٢٤ . وثقل المجليد النوعي ٩٤ .
 اما الثلج فمما تبلور على هيئة بلورات الشكل الثالث (صحيفة ٧٦) وللماء قوة
 عظيمة على تذويب مواد كثيرة غير الدهنية وغير المواد الآلية الكثيرة
 الهيدروجين او الكربون

الماء لا يوجد في الطبيعة صرفاً . اما ماء المطر ففيه هوائا كروي وغازات اخر
 من الغازات المنفرقة في الهواء وفيه احيانا حامض نيتريك اما مياه الينابيع ففيها
 مواد معدنية مختلفة وغاز الحامض الكربونيك تكسبها من الاتربة والصخور التي
 ترشح فيها وان كثرت فيها بعض هذه المواد كالحديد او الكبريت او املاح المغنيسيا
 سميت مياه معدنية وبعض الينابيع الصاعدة من اراضي بركانية تخرج مياه ساخنة
 اما مياه الانهر والجيرات فصالحة للشرب ولكنها ليست لذبة كماء الينابيع لان
 الحامض الكربونيك فيها اقل والمواد الآلية النباتية والمحيوية اكثر وكل ما
 كثرت هذه المواد في الماء فسد . اما ماء البحر فمذوب فيه اليود والبروم وكلوريد
 الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم وبعض مركبات اليوتاسيوم والكلسيوم وكل ما
 تحمله اليو الانهر التي تصب فيه

اذا كان الماء مذوباً جانباً من الجص اي كبريتات الكلس لا يرغي بالصابون
 فلا يصلح للغسل وهذا النوع من الماء سمي قاسياً والذي يرغي بالصابون سمي
 ناعماً فاذا قصد تذويب مادة في الماء يجب استعمال الماء الناعم كما في القهوة
 والشاي واذا قصد نضجها بالمحارة فقط بدون تذويب شيء منها فالقاسي افضل
 كما في سلق بعض النبات للطعام


في كل المعاملات الكيميائية التي يُستخدَم فيها الماء يجب ان يكون صرفاً

شكل ٩٢



وهو يتنى بالاستقطار اي بتحويله الى بخار بالحرارة ثم اعادته الى الحالة السائلة ببرد وتُسعمل لذلك الآلة المعروفة بالكركي والانبيق وفي شكل ٩٢ رسم آلة بسيطة تُستعمل بها الماء اي يُجعل الماء في اوعاء غليانه يصعد بخاره في الانبوبة ب اما القمع رفيدخل اليه مجرى ماء بارد من وعاء موضوع لذلك فيحيط الانبوبة ويخرج عند د وهكذا يتحول البخار الى ماء ويقطر من طرف الانبوبة عند ت او تُسعمل لذلك مع اي وعاء كان اغليان الماء الآلة المرسومة في شكل ٩٢

شكل ٩٣



المسماة مكثف ايبغ نسبة الى مخترعها فيوصل ا بالوعاء الذي يُغلى الماء فيه والماء البارد لاجل تكثيف البخار يدخل في القمع د ويخرج عند ر والماء المستقطر يقطر عند ب وبما ان الانبوبة ا ب هي زجاج تصلح هذه الآلة لاستقطار بعض الحوامض والمواد الطيارة.

قبل استعمال الماء المستقطر في الاعمال الكيمياوية يجب امتحانه لكي يتحقق

خلاصته وذاك بهذه الطرق

(١) امحنة بورق التلموس الازرق والمحمر لئلا تكون فيه مادة قلوبية او حامضة

(٢) جفف قليلاً منه على قطعة بلاتين نظيف فان كان صرفاً لا يبقى على سطح

البلاتين شيء

(٣) اضف اليه قليلاً من ماء الكلس فان كان فيه حامض كربونيك يتعكر

بتوليد كربونات الكلس

(٤) اضف اليه قليلاً من كلوريد الباريوم فان كان فيه كبريتات الكلس او

قاعدة اخرى مركبة مع حامض كبريتيك بتولد كبريتات الباريوم الابيض الذي

لا يدوب باضافة حامض نيتريك اليه

(٥) اضف اليه قليلاً من نترات الفضة فان كان فيه كلوريد ما مثل كلوريد

الصوديوم يتكون راسب ابيض هو كلوريد الفضة لا يدوب في حامض نيتريك

بل يدوب في ماء النشادر

(٦) اضف اليه قليلاً من أكسالات النشادر فان كان فيه كلس يتعكر

بتوليد راسب ابيض هو أكسالات الكلس

المواد الهيدراتية — اذا تركب الماء على نسبة معلومة مع مادة اخرى سميت

تلك المادة هيدراتية ولا بد من اظهار حرارة عند اتحادها مثال ذلك اذا اضيف

الى كلس جديد ماء يتحد معه باظهار حرارة كثيرة ويحول الى كلس هيدراتي وهكذا

الصودا والپوتاسا وبعض المحوامض كالحامض الكبريتيك الهيدراتي والحامض

النصفوريك الهيدراتي وبعد تركيب الماء مع مادة اخرى على هذا الاسلوب لا

يُطرد عنها بالحرارة وحدها فلو استنقظ الحامض الكبريتيك الهيدراتي مثلاً بفعل

بعض الماء الى بخار اولاً ثم اذا زادت الحرارة يصعد معه الحامض ايضاً ولكن

يُفسخ احدها عن الاخر بتقديم قاعدة للحامض الفته لها اشد من التو للماء فلو

عرض على الحامض الهيدراتي پوتاسا مثلاً لا يتحد معه الحامض غير الهيدراتي اي

الصرف وبسهل حينئذ طرد الماء ويبقى كبريتات الپوتاسا غير الهيدراتي

امتزاج السيات — اذا وُضع سيال ما ثقله النوعي اكثر من ثقل الماء


النوعي في وعاء اسطواني الشكل ثم صب فيه ماء بلطافة بحيث لا يتزج الاخف

بالاقل فللمادة المذوّبة في الاول تنفذ في الثاني شيئاً فشيئاً وان لم تزد الحرارة ولم يتحرك الوعاء. وقد وُجد بالامتحان ان سرعة هذا النفوذ تختلف باختلاف المواد على افراض كثافة واحدة للسبيل مثالة الحماض الهيدروكلوريك اسرع نفوذاً من مذوّب كلوريد اليوتاسيوم وهذا الاخير اسرع نفوذاً من كلوريد الصوديوم وهذا الاخير اسرع من كبريتات المغنيسيا اما الغري والزلال والعسل فبطيئة النفوذ جداً والمواد المتبلورة في الغالب اسرع نفوذاً من غيرها اما الحماض الهيدروكلوريك والكحول فمن اسرع المواد نفوذاً وبناء على سرعة نفوذ المواد المتبلورة ويطو نفوذ الغري سُميت كل المواد السريعة النفوذ شبيهة بالمتبلورة والبطيئة النفوذ شبيهة بالغرويات

واختلاف سرعة النفوذ يفتح باباً لفسخ مادة عن اخرى مثالة اذا امتزج كلوريد اليوتاسيوم وكلوريد الصوديوم في مذوّب وصب عليه ماء بلطافة حتى لا يمتزج بالمذوّب فكلوريد اليوتاسيوم بما انه اسرع نفوذاً من كلوريد الصوديوم يصعد جانب منه الى الماء قبل فيمكن رفعه

ذبا ليس — قد وُجد بالامتحان ايضاً ان بعض الانسجة كالرق مثلاً تنفذ فيه المواد الشبيهة بالمتبلورة ولا تنفذ فيه الشبيهة بالغروية اذا اصاب جانباً

شكل ٩٤



منه وكان على الجانب الاخر ماء صرف وتفريق المواد بهذه الوساطة سمي ذبا ليس *διαλύσις* وبناء على هذا المبدأ اصطنعت الآلة المرسومة في شكل ٩٤ فان اقطعة رق ممدودة على اطارة على هيئة دفتّ وب وعاء فيه ماء مستنقظ فالسبيل المذوّب فيه المواد المختلفة يصب في ا

ثم يعم على الماء في ب فالمواد الشبيهة بالمتبلورة تنفذ في الرق الى الماء المستنقظ والشبيهة بالغرويات تبقى في ا وهذه الوساطة تفرز المواد السامة مثل استرئين ومورفين وزرنيخ من المواد الآلية التي تخرج بها في المعدة فيكشف عن حضورها بسهولة بواسطة كواشفها

أسموس واكسوسموس — اذا توسط بين سبيلين مختلفين حاجب مسامي

ينفذ فيه كل من السيلين الى الجهة المتقابلة ولكن على مقادير غير متساوية مثال ذلك خذ ثلاث اسطوانات زجاجية مجوفة مفتوحة الطرفين واربط على الطرف الواحد منها قطعة ورق او قطعة مشاة واملي واحدة منها مذوب كبريتات النحاس ثقبلاً والثانية مذوب كلوريد الصوديوم والثالثة الكحول واغمس كل واحدة في ماء بحيث يستوي سطح السيل في الاسطوانات و سطح الماء فيرى بعد مدة سطح السيل داخل الاسطوانات اعلى من سطح الماء ثم اعكس العجل واملي الاسطوانات ماء واغمسها في ثلاثة اوعية في الواحد مذوب كبريتات النحاس وفي الثاني مذوب كلوريد الصوديوم وفي الثالث الكحول فيرى بعد مدة الماء في الاسطوانات يقل اي الماء الذي ينفذ في الرق الى مذوب كبريتات النحاس الخ اكثر من المذوب الذي ينفذ الى الماء فامتزاج سيلين على هذا المنوال قد سمي أسموس (من $\omega\sigma\mu\sigma\varsigma$) والنفوذ الاكثر سمي اكوسموس والنفوذ الاقل سمي اندوسموس. وهذه الظواهر متوقفة على الفة بين السيلين واختلاف الالفة بين احدها والمحاجب وبين الآخر والمحاجب وبهذا المبدأ يعال عن افعال كثيرة حيوية تذويب غازات في الماء - الماء بذوب الغازات كما يذوب السيليات والمجوامد وهذا التذويب سمي امتصاصاً ان لم يحدث منه مركب جديد وقوة الماء على تذويب الغازات تختلف حسب اختلاف الغاز واختلاف الحرارة واختلاف الضغط فعلى افتراض الضغط ٢٠ من البارومتر يمض جرم من الماء الاجرام من الغازات المذكورة في هذا المجدول

حرارة	اكسجين	نيروجين	هيدروجين	حامض كربونيك	كلور
٢٢°ف	٠.٠٤١	٠.٠٢٠	٠.٠١٩	١.٢٨٠	
٥٠°ف	٠.٠٣٣	٠.٠١٦	٠.٠١٩	١.٤١٨	٢.٥٩
٦٨°ف	٠.٠٢٨	٠.٠١٤	٠.٠١٩	٠.٢٩٠	٢.١٦

فيرى من هذا انه كل ما زادت الحرارة يقل مقدار الامتصاص ووجد ايضا انه كل ما زاد الضغط يزيد الامتصاص واذا امتزج غازان يمتص من الواحد اكثر من الاخر كما برى من امتصاص الهواء بالماء فانه يمتص من الاكسجين اكثر ومن النيتروجين اقل فيكون اكسجين الهواء المذوب في الماء اكثر من اكسجين الهواء

الاعتيادي وذلك ممكن لكون الهواء مزيجاً لا مركباً

أكسيد الهيدروجين الثاني ٢١٥٥

هذا المركب سمي أيضاً ماء موكسداً وهو يستحضر بنذوب أكسيد الباريوم الثاني في حامض هيدروكلوريك مخفف مبردًا بالجليد با ٢١ + ٥٢ كل - كل ٢ با + ٢١٥٥ ثم يضاف الى السيلال حامض كبريتيك هيدراتي فيرسب كبريتات الباريتا ويبقى الحامض الهيدروكلوريك مذوباً في الماء مع أكسيد الهيدروجين الثاني ثم يضاف أكسيد الباريوم الثاني ايضاً ويكرر العمل عدة مرات واخيراً يفرز الحامض الهيدروكلوريك بواسطة كبريتات الفضة ويفرز الحامض الكبريتيك بكاربونات الباريتا فيبقى سيلال هو أكسيد الهيدروجين الثاني

صفاته - هو سيلال لا لون له ولا رائحة ذو قوة عظيمة للتبييض مره الملاق كالسريع الانحلال. اذا اُحي قايلاً بفور من سرعة ذهاب الاكسجين منه وعند ٢١٢° ف يتفرغ. لم يتمكن من تجميده. اذا وُضع فيه پلاتين او فضة مسحوفة بنخل الى اكسجين وماء اما الپلاتين او الفضة فلا يتغير واذا وُضع فيه زنك او استرونسيوم او ما مثلها من المعادن يتأكسد واذا وُضع فيه أكسيد الفضة يتحسر اكسجينه وينحول الى فضة وهو ينحول الى ماء وجوهري اكسجين

مركبات الاكسجين والكلور

يتولد من تركيب الاكسجين والكلور خمس مواد وهي
حامض هيبوكلوروس كل ١٢ وحامض كلوروس كل ٢١٢ وحامض هيبوكلوريك
او أكسيد الكلور الاعلى كل ٢١ وحامض كلوريك كل ٢١٥ وحامض كلوريك اعلى
كل ١٥ وقد ذكر بعضهم أكسيد الكلور كل ١ ولا يعلم عنه الا القليل

(١) حامض هيبوكلوروس

سميته كل ١٢. عدده ٨٧ ثفل بخار النوعي ٢٤٩٩٧


استحضاره وصفاته - يُنفذ مجرى من غاز الكلور الجاف على أكسيد الزينك الاحمر موضوعاً في انبوبة مغروسة في ماء وتلج. اما الغاز فمصفى اللون واذا تحول الى سيلال بالبرد كما تقدم فهو احمر اللون ذو رائحة مثل رائحة الكلور. الماء يذوب منه

نحو ٢٠٠ مرة جرمه وهذا تلييل المحل والتركيب


٢ (زي ١) + ٢ كل - (زي ٢ كل ٢) اي أكسيد كلوريد الزئبق + كل ٢
هو ذو قوة عظيمة على التأكسد والتبييض ومخاره يتفرع اذا أحي قليلاً
ويُسخر مذوبه بوضع مذوب أكسيد الزئبق في قنبنة كلور وهزها
(٢) حامض كلوروس

سبينة كل ٢١٢ عدد ١١٩ ثقل الغاز النوعي ٢٢٦٤٦

استحضاره - امزج حامضاً زرينخوساً ٢ اجزاء وكلورات البوتاسا ٤ اجزاء
واسحقها واضف اليها ماء كافياً لجليها ثم اضف اليها حامضاً نيتريكاً مخففاً ١٢ جزءاً
باربعة اجزاء ماء واملي بالمزيج قنبنة الى عنقها وركب عليها انبوبة تنفذ الى
قابلة وغط القنبنة بفاش وقاية من التفرع واحمها بحمام مائي واجمع الغاز بالطرد
وهذا تلييل المحل والتركيب



كلورات البوتاسا حامض نيتريك نترات البوتاسا حامض كلوريك




حامض كلوريك. حامض زرينخوس. مالا. حامض زرينيك. حامض كلوروس
صفاته - هو غاز مخضر مصفر ذو قوة عظيمة على التبييض لا يتحول الى
سيال يبرد امزجة مجلدة يذوب منه قليل في الماء مكوناً سيالاً ذا لون اصفر
جميل والغاز سريع التفرع بجملة قليلة وبيعض المعادن مثل الكبريت والسليسيوم
والتلور والبود والفسفور والزئبق الخ التي تتأكسد به اذا ادخلت فيه

(٢) حامض هيبوكلوريك او أكسيد الكلور الاعلى


سبينة كل ٢١ عدد ٦٧٢٥ ثقل الغاز النوعي ٢٢٣١٥

استحضاره - يُسخر بجبل حامض كبريتيك ثقيل وكلورات البوتاسيوم
وتبريد المزيج ثم يجمد في انبوبة في حمام مائي ويجمع الغاز بالطرد في قنبلة مبردة

لان الزيتي بجله والماد يمسه وهذا نعليل المحل والتركيب



كلورات الپوتاسيوم حامض كبريتيك ماء اعلى كلورات الپوتاسيوم



حامض هيبوكلوريك كبريتات الپوتاسيوم

صفاته - هو غاز اصفر سريع التفرع جدا استحضاره خطر ذورائحه خصوصيه يتحول الى سيال احمر بالبرد يدوب في الماء ومدوبه بيض. يستحضر ايضا قليل منه بوضع درهمين من كلورات الپوتاسا في قدح عال ثم اضف اليها نحو ٢٠ درهم حامض هيدروكلوريك ثقله النوعي ١.١٢ فيصفر المزيج ويفلت الغاز واذا رُمي فيه قطع فصفور صغار مثل حبة سمسم تشعل

وبري فعل هذا الغاز ايضا بوضع قليل من كلورات الپوتاسا في قدح عال فيه ماء ثم برمي على الكلورات قطع فصفور صغار ثم يلقى عليها حامض كبريتيك من انبوبة فوهتها واصلة الى اسفل القدح فينولد حامض هيبوكلوريك الذي يشعل الفصفور تحت الماء واذا مزج سكر وكلورات الپوتاسا واصابها نفطة حامض كبريتيك يشعل المزيج بسرعة توليد الغاز الذي نحن في صدده

(٤) حامض كلوريك

سبته كل ٢١٥ - استحضاره - لم يتمكن من استحضار غير الهيدراتي اما الهيدراتي فيستخلص من مذوب كلورات الپوتاسيوم باضافة حامض هيدروفلورسليسيك اليه الذي يولد مع الپوتاسا راسبا غير قابل الذوبان فيبقى الحامض الكلوريك ذائبا في الماء وكذلك بعض الحامض المذكور الذي لم يتحد مع الپوتاسا فيرشح السيال ويضاف اليه باريتا فينولد كلورات الباريتا وهيدروفلورسليكات الباريتا الذي لا يقبل الذوبان فيرسب ويبقى كلورات الباريتا في الماء فيرشح ويضاف اليه حامض كبريتيك فينولد كبريتات الباريتا الذي يرسب ويبقى الحامض الكلوريك

فيركح عن اسبنوس ولا يرشح عن قرطاس لثلاث شعله ثم يجفف بعض الماء تحت
قابلة على مفرغة الهواء

صفاته — الحمض الكلوريك الهيدراتي هو سيال ثقيل مصفر اللون بسبب
الكلور المتزوج معه المحاصل من حل بعضه بجهر اللثوس اولاً ثم بزيل لونه تماماً
وهو سريع الانحلال فاذا اُحميت نقطة منه على قرطاس تشعله واكثر المواد
الآلية تحله

(٥) حامض كلوريك اعلى

سمنه كل ١٥

استحضاره — يستحضر باستنفار جزء من كلورات البوتاسيوم واربعه اجزاء
حامض كبريتيك

صفاته — الحمض الهيدراتي سيال لا لون له ثقله النوعي ١٢٧٨٢ عند
٦٠°ف ولا يجهد عند ٢١°ف ويتغير لونه ويغل بعد قليل ولو حُفظ في الظلام
ويتفرق عند انحلاله فلا يحفظ مدة واذا وقعت نقطة منه على قرطاس او على
فحم او على خشب يتفرق وهو كاو اذا اصاب المجلد فرحه ولم يتمكن من استخلاص
غير الهيدراتي منه

مركبات الاكسجين والبروم

يتركب من الاكسجين والبروم ثلاثة حوامض

(١) الحمض الهيبوبروموس HBrO_2 (٢) الحمض البروميك HBrO

(٣) الحمض البروميك الاعلى HBrO_3

(١) الحمض الهيبوبروموس HBrO_2

استحضاره — يضاف بروم الى مذوب نترات الفضة في ماء فيرسب بروميد
الفضة وللسيال الباقي قوة التبييض فاذا استنطر في الهواء يغل وبعده عنه بروم
واذا استنطر في خلاء يبعده عنه سيال طيار يبيض المواد الآلية وقوته هذه

منوقفة على الحامض الهيبوبروموس اللائب فيو.

(٢) الحامض البروميك ه ب ٢١ ا

استحضاره - يُضاف بروم الى مذوّب يوتاسا كاو ثقيل فينولد بروميد
الپوتاسيوم و برومات الپوتاسا اما البرومات فقلما يذوب في الماء فيرسب
فبُستخلص الحامض البروميك من برومات الپوتاسا كما بُستخلص الحامض
الكلوريك من كلورات الپوتاسا (انظر صحيفة ١٢٢) اي برشح السبال المذكور
ويجمع البرومات ويضاف اليو باريتا فينولد برومات الباريتا الذي يجلّ بحامض
كبريتيك

(٢) الحامض البروميك الاعلى ه ب ٢١ ا

استحضاره - يُستحضر باضافة حامض كلوريك اعلى الى البروم فالبروم
يطرد الكلور ويجلّ محله

مركبات الاكسجين واليود

(١) الحامض اليودي ي ا ٢١ (٢) الحامض اليودي الاعلى (ي ٢٥ ١٠٥)

(١) الحامض اليودي

استحضاره - يُستحضر باضافة ٥ اجزاء يود جاف الى ٢٠٠ جزء حامض
ينريك ثقله النوعي ١٢٥ ويحوي المزيج الى ٢١٢ ف عدة ساعات اي الى ان
يجفئ اليود جميعه ثم يُستقطر السبال بحرص والباقي الجاف يذوّب ايضاً في ماء ثم
ينبلور

ويُستحضر ايضاً بانفاذ غاز الكلور في ماء ممزوج بيود ثم يجفئ السبال فينبلور
الحامض اليودي

صفاته - ينبلور على هيئة صفائح ذات ستة سطوح فيها ماء . يذوب في الماء

بجمر اللشموس ثم يزيل لونه وإذا أحيى بخل الى بود وأكسجين وإذا اضيف اليه حامض هيدروكلوريك يتولد حامض هيدروبوديك وينفك الكلور

(٢) الحامض اليوديك الاعلى

استحضاره — يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بودات الصودا وصودا كاو فينولد كلوريد الصوديوم واعلى بودات الصودا الذي يرسب فيجمع فيذوب في حامض نيتريك ثم يضاف اليه نترات الفضة ثم يغلى في حامض نيتريك فتنبور منه بلورات صفراء اعلى بودات الفضة ثم يضاف اليها ماء بارد فتخل الى اعلى بودات الفضة غير قابل الذوبان وحامض بوديك اعلى ذائب في الماء فيرشح الماء عن الراسب ويجفف فينبور الحامض صفاته — لا يخل في الهواء على الحرارة الاعتيادية وإذا أحيى بخل الى بود وأكسجين لا يعرف مركب من الاكسجين والفلور

الكبريت

سينه ك وزنه الجوهري ٢٢ وزن جوهره المادي ٦٤
الكبريت موجود في الطبيعة مركباً وصرفاً اما المركب ففي الجص اي كبريتات الكلس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا ومع الحديد على هيئة كبريتات الحديد وفي بعض المواد النباتية والحيوانية اما الصرف ففي جوار البراكين في سبيليا وامبركا الجنوبية ويستخلص من المواد الغريبة المزوجة معه بالاصهار او بالتصعيد اما التصعيد فباحثو في انيق فكه داخل في غرفة واسعة مبنية من القريد وله فوهة خارج الغرفة لادخال الكبريت فيه بدون توقيف العمل فان كانت الحرارة كافية لتصعيد ١٨٠٠ كيلوكرام منه في ٢٤ ساعة نحى حيطان الغرفة فيبقى الكبريت مصهوراً وعند اخراجه يصب في قوالب اسطوانية فهو الكبريت العمودي التجاري وان كانت الحرارة كافية لتصعيد ٢٠٠ كيلوكرام في ٢٤ ساعة يجمع على حيطان الغرفة على هيئة مسحوق وهو المعروف بزهر الكبريت صفاته — الكبريت جامد اصفر بلوراته الطبيعية على هيئة ذي ثلثي زوايا على قاعدة معينة وهكذا ايضا اذا تبلور من مذوبه في كبريت الكربون الثاني

وإذا صُهر ثم تُرك حتى يبرد سطحه ثم كُسِرَت القشرة الباردة وأفرغ ما بقي مصهوراً
تحتها يتبلور على هيئة منشورات مستطيلة ذات زوايا قائمة. أما الشكل الأول فنقطة
النوعي ٢٠٤٥ وأما الثاني فنقطة النوعي ١٩٨٢. يصهر عند ٣٣٣° ف وإذا أُحِي
إلى ٢٢٠° ف يصير لزجاً ويكتسب لوناً بنيّاً وإذا أُلقي والحالة هذه في ماء باردٍ
يبقى ليناً كالعجين مدة ثم يعود إلى حالته الأولى وإذا أُعيد هذا العمل سبع مرات
متابعة يكتسب لوناً بنيّاً ثابتاً ثم إذا اغتسل كبريت الكربون الثاني يبقى باقٍ لا
يدوب في كبريت الكربون الثالث ولا في زيت التريبنينا ولا في إثير ولا في
كلوروفورم فهو حالة الوترولية للكبريت (صحيحة ٧٩) وإذا أُحِي إلى نحو ٣٦٦° ف
يعود إلى حالته الاعتيادية

الكبريت يشعل في الهواء بلهب أزرق وبولد باشتعاله غاز الحامض
الكبريتوس الذي هو علة رائحته المخصوصية لأن الكبريت نفسه لا رائحة له. بينه
وبين الكلور والفسفور والكربون وأكثر المعادن الفة فيتركب معها

راسب الكبريت — إذا أُغلي مسحوق الكبريت في مذوّب بوتاسا كاو ثغيل
يدوب فيه بعض الكبريت ويكتسب السيل لوناً بنيّاً ثم إذا اضيف إليه قليل
من الحامض الكبريتيك يتحد مع البوتاسا فيرسب الكبريت على هيئة مسحوق ناعم
مصفر هو راسب الكبريت وقد سمي أيضاً لبن الكبريت وإذا أُغلي كبريت في قينة
ذات عنق طويل حتى تمتلئ من بخاره يشعل فيه مسحوق النكل ورق الفحاس
والپوتاسيوم ورق الفصدير

مركبات الكبريت ومواد الرتبة الأولى

مركبات الكبريت والهيدروجين

(١) الحامض الهيدروكبريتيك أو الهيدروجين الكبريت { ك

(٢) كبريت الهيدروجين الثاني { ك٢

(١) الحامض الهيدروكربنيك او الهيدروجين المكبريت - سبيته

استحضاره - (١) امزج في قنينة جزئين من برادة الحديد وجزءا من زهر الكبريت وماء ما يكفي لجعل الكتل واحم المزيج ثم اضع اليه حامضاً هيدروكلوريكاً ثقيلًا واحم الجميع واجمع الغاز فوق ماء فاتر - التعليل هو ان الحامض الهيدروكلوريك ينحل فيتركب كلوره مع الحديد ويكون كلوريد الحديد وهيدروجينه يتركب مع الكبريت فيكون الهيدروجين المكبريت

(٢) امزج في قنينة مسحوق كبريت الالتيمنون واربع او خمس مرات وزنه حامضاً هيدروكلوريكاً واحم المزيج واجمع الغاز فوق ماء فاتر او ماء مالحة او زيتق والتعليل هو ان الحامض ينحل ويتكون كلوريد الالتيمنون والغاز الذي نحن في صدده

(٣) اصنع كبريتت الحديد باحما جزء ونصف من الكبريت وجزئين من برادة الحديد معاً منقطعاً عن الهواء في بوظقة مغطاة او خذ كبريتت الحديد الطبيعي وضعه مع ماء في آلة توليد الهيدروجين شكل ٧١ صحيفة ٩٥ واضف اليه بواسطة الفم حامضاً كبرنيكاً

بما ان هذا الغاز كثير اللزوم في الاعمال الكيمائية على سبيل كاشف بوضع كبريتت الحديد في وعاء مثل جرس قنديل دوبرينر شكل ٧٦ صحيفة ٩٨ والماء والحامض في القنينة فينولد الغاز عند اللزوم اليه كما تقدم في الهيدروجين

صفاته - هو غاز كربه الرائحة مثل رائحة البيض الفاسد ذو حوضه قليلة يجمر اللئوس ويشعل في الهواء بالهبب ضعيف فيولد ماء وحامضاً كبريتوساً ثقلاً النوعي ١٢١٩١٢ يتحول بالضغط الى سيال ثقله النوعي ٠.٤٩ الماء بدوب منه ثلاث مرات جرميه واذا عرض مذوبه في الماء على الهواء ينحل بانحد هيدروجينه مع اكسجين فيرسب الكبريت . هو سام اذا كان في الهواء جزء منه اكل ١٠٠ جزء من الهواء يقتل نفسه . ينولد في بعض المياه المستنقعة وفي الكف وفي بعض المياه المعدنية الكبريتية . بينه وبين القواعد الفة فيولد معها املاحاً وكذلك الكلور والبروم واليود تحله بانحادها مع هيدروجينه وارساب كبرينه

(١) اكتب على قرطاس مذبوب خلاص الرصاص او نترات الفضة او نترات
الزئبق فلا تظهر الكتابة ثم اعرض القرطاس على هيدروجين مكبرت فتسود
الكتابة بتوليد كبريت المعدن المستعمل

(٢) اغمس قرطاساً في حامض نيتريك ثم اعرضه على هذا الغاز فيصفر
برسوب الكبريت عليه

(٣) اذا مزج هذا الغاز ومثله اكسجين واشعل المزيج ينفرع

(٤) اذا اُحى فيه بوتاسيوم بشعل ويتحد مع الكبريت فيبقى هيدروجين
يكشف عن حضور هذا الغاز املاح الرصاص بتوليدها معه راسباً اسود هو
كبريت الرصاص كما يظهر من العمل الاول المذكور انفاً

(٢) كبريت الهيدروجين التالي

استحضاره — يُغلى كلس راو مع مثله زهر الكبريت في ستة اجزاء ماء نصف
ساعة فينولد سيال برطفالي اللون مذوب فيه اعلى كبريت الكلسيوم فبرش
ويضاف الى حامض كبريتيك مخفف ومحرك المزيج حركة دائمة الى ان تنتهي
الاضافة فيرسب كبريتات الكلس وكبريت ويجمع في اسفل الوعاء سيال زيتي
اصفر هو كبريت الهيدروجين التالي

تنبيه — اذا اُضيف الحامض الكبريتيك المخفف الى السيل المذكور لا
يتولد غير الكبريت الراسب وهيدروجين مكبرت

صفاته — هو سيال ثقيل اصفر غير قابل الذوبان في ماء له رائحة الهيدروجين
المكبرت ثقلة النوعي ١٧٦٩ يغلى من ذاته شيئاً شبيهاً فشيئاً الى كبريت وهيدروجين
مكبرت واذا اُحى او اذا اصابه اكاسيد المعادن يغلى بسرعة


مركبات الكبريت والاكسجين

يتركب من الكبريت والاكسجين سبعة حوامض

- (١) الحمض الكبريتوس غير الهيدراتي ك ا م
 (٢) . الكبريتيك . . ك ا م . والهيدراتي ك ه م ا ع
 (٣) . الهيبوكبريتوس . . ك ا م . . ك ه م ا م
 (٤) . الهيبوكبريتيك . . ك ه ا ه . . ك ه م ا ه
 ويُسمى ايضاً الحمض الدثيونيك
 (٥) . الهيبوكبريتيك المكبرت غير الهيدراتي ك ه ا ه . ك ه م ا ه
 ويُسمى الحمض الثريثيونيك
 (٦) . الهيبوكبريتيك المكبرت مرتين غير الهيدراتي ك ه ا ه . ك ه م ا ه
 ويُسمى الحمض التتراثيونيك
 (٧) . الهيبوكبريتيك المكبرت ثلاث مرات غير الهيدراتي ك ه ا ه . ك ه م ا ه
 ويُسمى الحمض البنتااثيونيك

(١) الحمض الكبريتوس غير الهيدراتي ك ا م
 استحضاره - هذا الغاز يتولد باحترق كبريت في أكسجين او في هواء جاف
 ويُستحضر باحماة كبريت ومركب اكسجيني ضعيف الثبوت ومن طرق استحضاره

شكل ٩٥



(١) ضع في قنينة او
 في انبيق د شكل ٩٥
 اوزاناً متماثلة من زبيق
 وحمض كبريتيك ثغيل
 واجمها بكانون او بقمنديل
 واجمع الغاز فوق زبيق
 او بالطرديلان الماء يمصة
 وتعليل المحل والتركيب
 هو ان جانباً من الحمض

يغل فيذهب بعض اكسجينه الى المعدن الذي يتأكسد فيتولد ماء وحمض
 كبريتوس وكبرينات الزبيق . وبما ان الغاز يحمل معه قليلاً من الحمض
 الكبريتيك يجب غسله قبل جمعه ولذلك يمر في قنينة ماء ر شكل ٩٥

(٢) استعمل عوضاً عن الزئبق في الطريقة المذكورة برادة النحاس والتعليل


كما تقدم

(٣) امزج ثلاثة اجزاء أكسيد النحاس الاسود وجزءاً واحداً من الكبريت وضع المزيج في انبوبة وضع فوقه نصف مقداره من أكسيد النحاس واحم هذا الاخير الى درجة المحمورة اولاً ثم احم المزيج فيصعد حامض كبريتوس صرف ويتولد كبريت النحاس

(٤) امزج ثلاثة اجزاء أكسيد المنغنيس الاسود وجزءاً من الكبريت المسحوق واحم المزيج في انبوبة وامرّ الغاز في ماء كما في شكل ٩٥ والتعليل هو ان جوهرى الاكسيد بنخلان واكسجينها يذهب الى الكبريت فيتولد حامض كبريتوس ويبقى أكسيد المنغنيس الاول

صفاته — هو غاز لا اون له ذورائحة خائفة غير قابل للاشتعال غير مضر يطفى اللهب يجمد اللبوس ويبيض بعض المواد النباتية والحيوانية فيستعمل في الصنائع لتبييض قش البرانيط واقمشة الصوف. كثافته ٢٢٤٧ الماء يمتص منه ٥٠ مرة جرميه ومدوبه في الماء اذا عرض على الهواء يمتص اكسجيناً فيتولد حامض كبريتيك واذا ضغط الغاز او برّد الى ٤° ف يتحول الى سيال يغلي عند ١٤° ف وذلك بجمعه جافاً ثم امراره في انبوبة مغموسة

شكل ٩٦



في مزيج مجلد من الثلج والملح شكل ٩٦ او من الثلج وبلورات كلوريد الكلسيوم فاذا جعل هذا السبال على بلبوس ثرمومتر بواسطة قطعة صوف او قطن يحط الحرارة الى ٤٠ — او ٥٠ بسرعة نحو بله الى بخار

اذا مزج هذا الغاز وكلورو وضع المزيج في نور الشمس يتحد الغازان ويتولد مادة عبارتها ٢٢ كل ٢ سميت سابقاً الحامض الكلوروكبريتيك واسمها الآن كلوريد الكبريتيل. من خصائصها انها اذا عرضت على الماء يتولد منها حامض هيدروكلوريك وحامض كبريتيك

هذا الحامض يولد مع الفلويات املاحاً مثل كبريتيت الباريتا والسترونيتا

والكلس الخ كلها غير قابلة الذوبان في ماء وتذوب في حامض هيدروكلوريك وكل منها يتحول بالحامض النيتريك الى كبريتات فاعدتو

(٢) الحامض الكبريتيك غير الهيدراتي ك٢١٠ والهيدراتي ك٢٥١

استحضاره - الحامض الكبريتيك الهيدراتي التجاري على شكلين الاول المعروف بزيت الزاج والثاني حامض كبريتيك نورد هوسني نسبة الى نورد هوسن في سكسونيا . اما زيت الزاج او الحامض التجاري الدارج فيستحضر باحراق كبريت وادخال بخاره الى غرف مبطنة برصاص في اسفلها ماء . و باجماع نترات الپوتاسا او نترات الصودا مع حامض كبريتيك وادخال بخار الحامض النيتريك المولد الى الغرفة نفسها . لان نترات الصودا او نترات الپوتاسا اذا اُحي مع حامض كبريتيك يغل فبخار الحامض النيتريك يصعد والحامض الكبريتيك يتركب مع الپوتاسا او الصودا مكونا كبريتات الپوتاسا او الصودا . اما احراق الكبريت فيولد غاز الحامض الكبريتوس كما تقدم فيكون في الغرفة غاز الحامض النيتريك وغاز الحامض الكبريتوس وماء وهوا كروي . فغاز الحامض الكبريتوس ياخذ اكسجيناً من الحامض النيتريك ن ا ه و يحوله الى اكسيد النيتروجين الثاني ن ٢١ وهو نفسه بصبر حامضاً كبريتيكاً ويمصه الماء اما اكسيد النيتروجين الثاني فيصعد الى اعلى الغرفة وهناك بصيبة الهوا الكروي فياخذ منه اكسجيناً ويتحول الى حامض هيبونيتريك ن ٤١ وهذا ايضا بسلم جوهرين من اكسجينه الى غاز الحامض الكبريتوس ويعود كما كان اكسيد النيتروجين الثاني . اما الماء فلا يزال يمس الحامض الكبريتيك المولد حتى بصير ثقله النوعي ١٠٤٥ ثم يرفع من الغرف ويجفف في اوعية رصاص حتى بصير ثقله النوعي ١٠٧٢ ثم يغلى في اوعية زجاج او بلاتين حتى بصير ثقله النوعي ١٠٨٤٥ وهو زيت الزاج التجاري وهو اثقل انواع الحامض الهيدراتي


اما الحامض الكبريتيك النورد هوسني فيستحضر باستفطار الزاج الاخضراي كبريتات الحديد اي يجمع في انايق فخار متصلة بقوابل مبردة فيها ماء قليل فالحامض يصعد مع بعض ماء التبلور ويجمع في القوابل وثقله النوعي اذ ذاك

١٢٩ يُعرف بالحمض الكبريتيك المدخن . أكثر استعماله في الصناعات لتذويب
النيل

امتزج ستة اجزاء كبريت وجزء واحد من نترات البوتاسا واجعلها في وعاء
فوق ماء واشعلها وغطها بقالبه فيتحول الماء الى حامض كبريتيك خفيف كما
يبرهن من امتحانه بالكواشف

اغمس خيطانا في كبريت مصهور ثم لفها على قطعة شريط حديد واشعل
الكبريت في فنيئة مسدودة فيها ماء قليل وما دام في الفنيئة بخار الحمض
الكبريتوس ادخل اليها قطعة خشب مبلولة بحامض نيتريك فينحل ويتولد
حامض نيتروس واكسيد النيتروجين التالي كما تقدم والحمض الكبريتوس
يتحول الى حامض كبريتيك فيمصه الماء فيصير حامضا كبريتيكا خفيفا
ركب آلة كالمرسومة في شكل ٩٧- اما ا فهي فنيئة كبيرة سطحها الداخلي مبلول

شكل ٩٧



بماء واما ب ففنيئة لاجل استحضار بخار الحمض الكبريتوس بواسطة برادة النحاس
والحمض الكبريتيك الثقيل كما ذكر (صحيفة ١٢٠) واما د ففنيئة لاجل استحضار
اكسيد النيتروجين التالي باضافة ١٠٠ قحمة برادة نحاس الى ٢٠٠ قحمة حامض
نيتريك مخفف بمثل ماء فعند امتزاج الغازين في ا التي فيها موالا وبخار ماء
يتولد حامض كبريتيك هيدراتي والتعليل كما تقدم شرحه

صفاته - هو سبال ثقيل يتجلد عند 31°C و يغلي عند 117°C ف سام
 كاو بينه وبين المواد الآلية اللة فيتحد مع أكسجينها وهيدروجينها تاركاً كربونها
 فتنسود كما يتضح من مزج أجزاء متائلة من شراب السكر وهيدروجينها فبعض المزيج
 ويسود أي يتولد ماء من أكسجين السكر وهيدروجينها لكي يتحد مع الحمض
 ويبقى الكربون ومن اللة التي بينه وبين الماء بمص رطوبة من الهواء ولذلك يصلح
 لتجريد الغازات عن البخار المائي بامرارها فيه وإذا أُضيف إليه ماء سخن المزيج
 ويقل جرمه فاذا وُضع ماء قليل في انبوبة زجاجية رقيقة وأغمست في جزء من
 هذا الحمض مع ٥ أجزاء ماء يغلي الماء في الانبوبة من حرارة المزيج
 هذا الحمض كثير الاستعمال في الصناعات وفي الاعمال الكيمياء والطبية
 ويكشف عن حضوره بتولده راسباً ايض مع نترات الباروم او كلوريد
 الباروم وهذا الراسب لا يذوب في حامض نيتريك

الحمض غير الهيدراتي - اذا استنظر الحمض النورد هوسني بجمارة قليلة
 وتبردت القابلة بهزيج مجلد يجمع فيها مادة طيارة على هيئة بلورات بيض تشبه
 اسبنسوس واذا طرحت في الماء تصوت كصوت الحديد الحامي اذا طرحت في الماء
 واذا عُرض على الهواء بمص ماء منه ويتحول الى الحمض الهيدراتي

(٣) الحمض الهيبوكبريتوس غير الهيدراتي ك٢١٢ والهيدراتي ك٢١٢٥٢
 هذا الحمض لم يتجدد عن القواعد التي يتركب معها وهو يتولد اذا أُغلي كبريت
 مع كبريتيت الصودا المتعادل ثم يرشح السبال ويجفف فينولد هيبوكبريتيت
 الصودا ومن خصائص املاح هذا الحمض تذويب املاح الفضة غير القابلة
 الذوبان مثل كلوريد الفضة ولذلك تُستعمل في الاعمال الفوتوكرافية وتُستعمل
 ايضاً في النشرج لحفظ المواد الحيوانية

(٤) الحمض الهيبوكبريتيك غير الهيدراتي ك٢١٢ والهيدراتي ك٢١٢٥٢
 هذا الحمض هو اول طائفة تسمى الطائفة الثيونية التي لا تُعرّف غير هيدراتية
 الا قياسياً وقد سمي هذا الحمض الديثيونيك
 استحضاره - يُستحضر بوضع مسحوق أكسيد المنغنيس التالي في ماء ثم يُنفذ
 فيه مجرى من غاز الحمض الكبريتوس فالأكسيد ينحصر جوهراً من أكسجينه وكل

جوهري منة تعطي جوهري أكجيت بها يتحول الغاز المشار اليه الى حامض هيبوكبريتك فيتركب مع المنغنيس مولداً هيبوكبريتات المنغنيس فيضاف اليه باريتا هيدراتي الذي يتركب مع الحامض ويرسب المنغنيس . ثم يضاف الى السيل حامض كبريتيك فيرسب كبريتات الباريتا والحامض الهيبوكبريتوس يبقى في السيل فيجفف حتى يصير ثقله النوعي ١.٢٤٧ واذا زيد التخفيف يغل ويتولد منة حامض كبريتيك وحامض كبريتوس

صفاته - هو شديد الحموضة لا رائحة له ويولد مع الباريتا والكلس واول اكسيد الرصاص املاحاً قابلة الذوبان في ماء

(٥) الحامض الهيبوكبريتك المكبرت غير الهيدراتي ك ١٣ ه والهيدراتي

ك ٦١٢٥٢

استحضاره - هذا الحامض يسمى ايضاً الحامض التريثيونيك ويُستحضر بتقع زهر الكبريت في مذوب كبريتات الباريتا الثاني عدة ايام على نحو ٧٠° ف يتولد تريثونات الباريتا فيضاف الى السيل حامض كبريتيك فيرسب كبريتات الباريتا والحامض المذكور يبقى في السيل

(٦) الحامض الهيبوكبريتك المكبرت مرتين غير الهيدراتي ك ١٤ ه

والهيدراتي ك ٦١٢٥٤

استحضاره - هذا الحامض يسمى ايضاً الحامض التتراثيونيك ويُستحضر باضافة يود الى مذوب هيبوكبريتات الصودا او هيبوكبريتات الباريتا فيذوب اليود ويتولد في السيل تتراتيونات الصودا او الباريتا ويوديد الباريتا او يوديد الصوديوم

(٧) الحامض الهيبوكبريتك المكبرت ثلاث مرات غير الهيدراتي ك ١٥ ه

والهيدراتي ك ٦١٢٥٥

استحضاره - هذا الحامض يسمى ايضاً الحامض الپنتااثيونيك ويُستحضر بمزج غاز الحامض الكبريتوس والهيدروجين المكبرت ومرارها في ماء فيرسب كبريت والسيل يكتسب لون اللبن فيصفي باضافة برادة الفخاس اليه وهزه ثم مني برد يُشبع كربونات الباريتا فيتولد بنتااثيونات الباريتا والحامض يُستخلص باضافة

حامض كبريتيك الى السبال كما تقدم

مركبات الكبريت مع الكلور

كلوريد الكبريت الاول كل ٢ ك ٢ - يُستخضر باموار الكلور على سطح
كبريت مصهور في انبيق زجاج متصل بفايلة مبرّدة فيستقطر سيال اصفر
پرطغالي اللون ذو رائحة كريهة يغلي عند ٢٨٠° ف ويغلي بالماء الى حامض
هيدروكلوريك وحامض هيبوكريونوس
كلوريد الكبريت الثاني كل ٣ ك ٣ يُستخضر بعرض السبال المتقدم ذكره على
فعل الكلور ثم يُستقطر تحت مجرى من الكلور كما تقدم - هو سيال ذو لون
احمر اغل من الماء ويغلي عند ١٧٤° ف

سل }
سلينيوم }
سل }

وزنه الجوهري ٧٦٢٥٠ وزن جوهره المادّي ١٥٩

هذا العنصر كشفه برزيليوس في سنة ١٨١٧ وسماه سلينيوم من $\Sigma\epsilon\lambda\eta\nu\eta$ اي
الغمر وهو قليل الوجود ولا يوجد في الطبيعة غير مركب مع الحديد او النحاس او
الفضة او الرصاص واكثر وجود هذه المركبات في اسوج ونروج وجبال الهارتز
في جرمانيا


صفاته - هو جامد محمر اللون ذو لمعان معدني قليل ثقلة النوعي ٤٢٨
يُصهر عند ٢١٢° ف ويغلي عند ٦٥٠° ف لا يذوب في الماء واذا أُحي في الهواء
بفج رائحة كريهة . لا يذوب في الكحول ويزوب قليلاً في ثالي كبريت الكربون
ويشبه وبين الكبريت مشابهة في خصائصها الكيمياء

مركبات السلينيوم والاكسجين

- (١) حامض سلينيوس غير هيدراتي سل ١٣ والهيدراتي سل ٢١٢٥
- (٢) سلينيك . . . سل ٢١ . . . سل ٤١٣٥
- (٣) الحامض السلينيوس يُستخضر بواسطة آلة مثل المرسومة في شكل ٩٨

فتوضع قطعة سلينيوم عند د في الانبوبة الملتوية ثم يُنفذ عليها أكسجين من الانبيق
وتُحوّل بمقديل الكحولي فيشعل

شكل ٩١



السلينيوم ويحترق بلهب أزرق
والحمض السلينيوس يجمع في اعلى
الانبوبة عند ذ على هيئة بلورات
ابرة بيض
و يُستحضر ايضاً بتذويب سلينيوم
في حامض نيتريك ثم تخفيف
السيال

(٢) الحمض السلينيك — هذا الحمض لا يُعرّف غير الهيدراتي منه إلا
قياسياً وأما الهيدراتي فيُستحضر باحراق سلينيوم مع نترات البوتاسا فيتولد
سليينات البوتاسا فيضاف اليه نترات الرصاص فيرسب سليينات الرصاص فيمزج
بماء وينفذ في المزيج هيدروجين مكبريت فيرسب كبريت الرصاص ويبقى الحمض
السلينيك الهيدراتي وهو يشبه الحمض الكبريتيك في صفاته وإذا أُحي كثيراً ينحل
الى أكسجين وحامض سلينيوس

سلينيوم وهيدروجين

الحمض الهيدروسلينيك } سل

استحضاره — يُستحضر باحمااء سلينيور البوتاسيوم او سلينيور الحديد مع حامض
هيدروكلوريك

صفاته — هو غاز لا لون له رائحة كريهة جداً كرائحة الملفوف الفاسد سام
يلدوب في الماء ومع المعادن يولد املاحاً مثل سليينات البوتاسا وغيره

سلينيوم وكبريت

سلينيور الكبريت الاول سل ك ٢ — يُستحضر بانفاذ غاز الهيدروجين المكبريت
في مذوّب حامض سلينيوس

سليثور الكبريت الثاني سل ك ٢ - يُستخضر باحساء كبريت وسليثور معا

تلو } تلور يوم
تلو }

سببنة تلو وزنه الجوهري ١٢٩ وزن جوهره المادّي ٢٥٨

هذا العنصر قد حُسب سابقاً من المعادن ولكنه يوافق الكبريت والسليثور
أكثر وهو قليل الوجود في الطبيعة مركباً مع الفضة والذهب والرصاص وأكثر
ما يكون مع البزموت والكبريت في نواحي شماتن من بلاد الهيار
استحضاره - يُستخضر بسحق معدنه ومزجوه مع منلو وزناً من لي كربونات
الصودا ثم يجبل المزيج بزيت ويجحى الى درجة البياض في بوظفة فينولد تلور يد
الصوديوم وكبريت الصوديوم والبزموت الصرف بنفرد فيذوب الاولان في ماء
ويعرض السبال على الهواء فينولد صودا كاي وهيبوكبريت الصودا وينفرد
التلور يوم

صفاته - هو جامد لونه كلون الفضة ذو لمعان مثل الفضة كثافته ٦٤٢٦
بصهر بجمارة تحت درجة الحمرة قليلاً وينصعد اذا زادت الحرارة ويحترق اذ
أحي في الهواء ويناكسد بفعل الحامض النيتريك

تلور يوم و أكسجين

حامض تلوروس هيدراتي تلوا ٢٥ ٢١ غير الهيدراتي تلوا ٢١

حامض تلوريك " تلوا ٤٥ ٣١ " " تلوا ٣١

الحامض التلوروس يُستخضر باحراق تلور يوم في الهواء او باحساء مسحوقه في
حامض نيتريك ثقله النوعي ١٢٢٥ فترسب منه بلورات بيض ذات ثنائي زوايا
هي حامض تلوروس غير هيدراتي اما الهيدراتي فيُستخضر باضافة حامض نيتريك
الى تلوريت اليوتاسا وهو مسحوق ابيض يجمهر اللنوس و يذوب في الماء قليلاً

الحامض التلوريك يُستخضر باصهار اجزاء متعائلة من حامض تلوروس
وكربونات الصودا ثم يذوب المحاصل في ماء ويضاف اليه قليل صودا هيدراتي
ثم يُنفذ في السبال مجرى من غاز الكلور ثم بشع بالنشادر ويضاف اليه مذوب

كلوريد الباريوم فيرسب راسب ابيض غير قابل الذوبان في ماء هو تلوورات
الباريتا فيرشح وينفع في ربع وزنه حامضاً كبريتيكاً مخففاً ثم يرشح السيلال ويجفف
فينيلور منه بلورات كبيرة هي حامض تلوريك
صفاته - يذوب في الماء ويحجر اللتيموس واذا أُحميت بلوراته تخسر ماء
التبلور فيتحول الى الحامض غير الهيدراتي وحينئذ لا يذوب في الماء ولا في سيلال
قلوي غالي واذا أُحي كثيراً يخسر جوهراً من اكسجينه فيتحول الى حامض
تلوروس

تلوريوم وهيدروجين

الحامض الهيدروتلوريك H_2Te < تلو

هذا الحامض غاز يضاحي الحامض الهيدروكبريتيك والهيدروسيلينيك ويستحضر
مثلها باحماء تلوريد ما مع حامض هيدروكلوريك
تلوريوم وكبريت
كبريت التلور الاول TeO_2 والثاني TeO_3 يستحضران بارساب حامض
تلوروس او تلوريك بواسطة هيدروجين مكثرت

مركبات تلوريوم اخر

كلوريد التلوريوم كل TeCl_4 و بروميد التلوريوم TeBr_4 تلو و بوديد
التلوريوم TeI_4 تلو

الفصل الخامس

في العناصر من الرتبة الثالثة

اي الشبيهة بالمعدنية ذات ثلاثة جواهر
ان في هذه الرتبة مادة واحدة فقط معروفة وهي البور

البور B ؟

سميته بو وزن جوهرة الفرد 11 وزنة المادي مجهول

البور في الطبيعة مركب مع أكسجين على هيئة حامض بوريك و يوجد هذا الحامض غير مركب ومركباً مع الصودا على هيئة بورات الصودا وهو البورق المعروف

استحضاره - (١) يُجْلُ الحامض البوريك غير الهيدراتي باحاته مع صوديوم الى درجة الحمرة ثم يُرمى الكل في ماء محض بحامض هيدروكلوريك فيتولد بورات الصوديوم و بورو هو بهذه الطريقة بني اللون ليست له هيئة خصوصية (٢) يُتخذ مجرى من كلوريد البور على الومينيوم مصهور فيتولد كلوريد الالومينيوم الذي يتحول الى بخار و يصعد واما البور فيذوب في باقي الالومينيوم و متى شبع منه برسب البور على هيئة بلورات منشورية ذات ست زوايا مظلمة بنية اللون

(٣) يكاس حامض بوريك غير هيدراتي مع الومينيوم فيتولد أكسيد الالومينيوم و يبقى البور فيبغلي المزيج في مذوب بوتاسا ثم في حامض هيدروكلوريك فيتفرد الواحد عن الاخر

صفاته - البور على هذه الطريقة شفاف مصفر على هيئة بلورات منشورية على قواعد مربعة يشبه الماس في صلابته وقوته على تكسير شعاع النور كثافته ٢٠٦٧ لا يبهر مطلقاً و اذا أُحمي الى درجة احتراق الماس يتحول الى حامض بوريك غير هيدراتي و اذا أُحمي في كلور الى درجة الحمرة يتولد كلوريد البور الغازي. لا يذوب في المحامض الا في الحامض النيترو هيدروكلوريك الذي يذوب منه قليلاً و اذا مزج معه نترات البوتاسا و أُحمي يتفرغ

مركبات البور و مواد الرتبة الاولى اي ذات الجواهر الواحد

كلوريد البور كل ٢ بو - يُستحضر بحرق حامض بوريك غير هيدراتي و فحم و جبلها بنشاء ثم يُصنع من المزيج كرات صفار و تنكس في بوظنة لاجل احراق النشاء ثم نوضع في انبيق فخار موضوع في كوري فبحي الى درجة الحمرة ثم يدخل الى داخله مجرى غاز الكلور و فك الانبيق متصل بانبوبة عوجاه مغمومة في مزيج مبرد يجمع فيها كلوريد البور و التعليل هو ان أكسجين الحامض البوريك

يتركب مع الكربون مولدًا أكسيد الكربون والحمض البوريك نفسه يتركب مع الكالسيوم ويصعد الى القابلة

صفاته — هو غاز يتحول بالبرد الى سيال يغلي عند $62.6^{\circ}\text{ف} - 17^{\circ}\text{س}$ اذا اصابه ماء يغلي فيتولد حامض بوريك وحامض هيدروكلوريك اي كلوره يتركب مع هيدروجين الماء وبوره مع الكالسيوم

بروميدي البوريم بو — يُزعم انه يُستخضر على طريقة استخضار كلوريد البروم كما تقدم وبالفعل قد استخضر بفعل بخار البروم بالبور نفسو محي الى درجة الحمرة

فلوريد البور فل م بو — استخضاره — يُزج جزءا فلوريد الكالسيوم وجزءا من الحمض البوريك غير الهيدراتي ويستقطر المزيج بواسطة اتيق صيني محي الى درجة الحمرة فيتولد بورات الكالسيوم وفلوريد البور

صفاته — هو غاز ذو شراهة زائدة للماء فاذا اصاب الهواء يمس بخاره المائي ويولد حامضًا قويًا اذا ادخل اليه فرطاس ابيض يسود حالًا بانحد الحمض مع عناصره غير الكربون واذا اشبع منه الماء فهو الحمض البور وفلوريك

مركبات البور مع مواد الرتبة الثانية اي ذات الجوهريين

الحمض البوريك غير الهيدراتي بو ام والمثلور بو ام ه
الحمض البوريك موجود في الطبيعة ويحلب اكثر من طسكانا حيث يستخضر بتخفيف مياه مجيرات هو ذائب فيها وعلى هيئة بورات الصودا في مياه مجيرات في تيت يستخضر بورات الصودا بتخفيف تلك المياه ويسمى هناك تنكال وهو البورق المعروف

استخضاره — ذوب من البورق اي بورات الصودا ٢ اجزاء في ماء سخن ١٢ اجزاء ورشح السيل ثم اضف اليه رويدا رويدا جزءا من الحمض الكبريتيك حتي يكسب السيل طعما حامضًا ثم انركه لكي يبرد فيرسب منه الحمض الهيدراتي على هيئة بلورات دقيقة — اغسلها بماء بارد وجففها على فرطاس نشاش واذا اجمبت الى درجة الحمرة تخسر ماء التبلور وتحول الى مادة زجاجية هي الحمض

غير الهيدراتي وهو يستعمل في الصنائع مسيلاً ولاجل اصطناع جواهر كاذبة - اما الهيدراتي فيجمر اللبوس ولكنه يفعل في قرطاس الكرم مثل القلوبات واذا أحرق في لبيب يكسبه لونا اخضر وهذا من جملة كواشفه . اما بورات الصودا فسياتي ذكره بعد الكلام بالصوديوم

الفصل السادس

في عناصر الرتبة الرابعة اي ذات اربعة جواهر

ان في هذه الرتبة ستة عناصر وهي سليكون وكربون ووزكونيوم وتيتانيوم
وفصدبر وثوربيوم

سليكون او سليسيوم

سبعة س وزن جوهره ٢٨ وزن جوهره المادي مجهول

هذا العنصر كبير الوجود في الطبيعة مركباً مع اكسجين على هيئة رمل وصوان وكوارتز ومع اكسجين وبوتاسيوم في قشر القصب وساق القمح وفي سائر الحبوب
والمحشاش

استحضاره - يستحضر على طريقتين وخصائصه تختلف حسب اختلاف طرق

استحضاره

(١) يجي فلوريد السليكون والپوتاسيوم مع مثلي وزنه بوتاسيوم في انبوبة زجاجية فينولد فلوريد الپوتاسيوم ويبقى السليكون وحده فيغسل المزيج بماء فيذوب فلوريد الپوتاسيوم ويستخلص السليكون وهو اذ ذاك على هيئة مسحوق بني اللون لا يصهر ولا يذوب في مادة من المواد المذكورة واذا أحي في الهواء يكتسي قشرة حامض سليسيك ويبقى سليكوناً من داخل

(٢) يستحضر بامرارة بخار كلوريد السليكون على ألومينيوم مصهور كما ذكر


في البور وهو اذ ذاك على هيئة قشور لامعة

(٣) يجل بخار كلوريد السليكون بواسطة صوديوم مصهور وهو اذ ذاك لا

هيئة خصوصية له واذا أُحِي إلى درجة عالية مع ملح يُصهر وينبلور على هيئة بلورات الماس تقطع زجاجاً وتُعرف بالسليكون المبلور

مركبات السليكون مع مواد الرتبة الاولى

كلوريد السليكون من كل ٤ - يُستخضر بامرار كلور على حامض سليبيك وكربون هكذا. استخضر مسحوق سليكا مجمل سليكات الهوناسا بمحاضر ما واجيلة بزيت مع مَبَاب واقطع المجلة كرات كرات ودحرجها في فحم مسحوق واحمها الى المحمرة في بوظقة ضابطة ثم ركب الآلة المرسومة في شكل ١١. اما الفينة عن



اليسار فلاجل توليد غاز الكلور وفينة ولف لاجل نقيته والانبوبة العوجاه فيها مادة لتجفيفه والكرات المشار اليها توضع في الانبوبة التي في وسط الكور والانبوبة العوجاه عن اليمين مغروسة في مزيج مجلد ولها فرع من اسفلها يوصل السبال الماؤد الذي هو كلوريد السليكون الى فينة موضوعة لاسنلقائو اما اكجين السليكا فيتركب مع الكربون ويتولد حامض كربونيك الذي يفلت من طرف الانبوبة عن اليمين


صفاته - هو سبال لا لون له ذو رائحة حامضة حريفة . الماده مجله فيتولد

حامض هيدروكلوريك وحامض سليسيك هيدراتي
بروميدي السليكون س ب ٤ - يُستحضر على كيفية استحضار الكلوريد كما مرَّ
صفاته - هو سيال مثل الكلوريد بجملة الماء فينولد حامض هيدروبروميك
وحامض سليسيك

بوديد السلكون س ي ٤ - يُعرَّف قياسياً ولم يُستحضر فعلاً
فلوريد السليكون او حامض فلوروسليسيك س فل ٤ - يُستحضر بفعل
حامض هيدروفلوريك بحامض سليسيك وذلك بمزج حامض كبريتيك وحامض
سليسيك وفلوريد الكالسيوم على هذه الطريقة اي امزج اجزاء متماثلة وزناً من
فلوريد الكالسيوم وزجاج مسحوق او صوان مسحوق واجعل مقداراً من المزج في
قنبنة واضف اليه من الحامض الكبريتيك الثقيل ما يكفي لبلو وحرك الكتل
فينتفخ ويزيد جرماً وبصعد عنه غاز ثم احمه قليلاً فيزيد صعود الغاز وهو
فلوريد السليكون فيجمع فوق زيتق لانه بفعل بالماء والقوايل التي يجمع فيها
يجب ان تكون جافة تماماً


صفاته - هو غاز لالون لث شفاف بدخن اذا اصاب الهواء والماء بجملة
فينولد حامض سليسيك وحامض اخر قد سمي الحامض الهيدروفلوروسليسيك
الحامض الهيدروفلوروسليسيك (٢ ه فل ٤ سل فل) اذا اُمِرَّ فلوريد السليكون
في ماء يخل كما تقدم ذكره فينولد هذا الحامض وحامض سليسيك هيدراتي اما
الاول فيذوب في الماء واما الثاني فينفرد على هيئة مادة غروية واذا طُلب مقدار

شكل ١٠٠



قليل منه يُستحضر بأنة كالمرسومة في شكل ١٠٠ فيوضع في الانبيق المواد اللازمة

لتوليد فلوريد السليكون كما ذكر سابقاً ويضبط الوصل عند ت و يوضع في
الانبوبة ت ب زيت ما يكفي لسدها عند منحناها فعند احاء الانبيق وصعود
الغاز ومروره بالزيت الى ب يري دخانه المولد باصابتها الهواء ويختم بالشموس
ثم تملأ ب ماء فيتحول الغاز الى حامض هيدروفلوروسليسيك و يرسب الحامض
السليسيك كما تقدم ذكره



وإذا طلب من هذا الحامض مقدار اعظم ما اشير اليه تستعمل الآلة المرسومة
في شكل ١٠١ وهي قنبلة لاجل توليد الغاز الذي يصعد في انبوبة د تحت زيت
فوقه ماء وذلك لكي لا تسند فوهة الانبوبة بالسليكا الذي يتولد عند ما يصب
الغاز الماء كما تقدم ذكره اما ذ فلوح توتيا للوقاية

وإذا طلب جانب عظيم من هذا الحامض او من السليكا تستعمل الآلة
المرسومة في شكل ١٠٢ وهي مثل شكل ١٠١ بزيادة قمع للوقاية من التفرقع اذا
استندت فوهة الانبوبة ذ


بعد نهاية العمل يصفى عن السليكا بنقطة قماش اما الحامض
الهيدروفلوروسليسيك فلا يجرد عن الماء ومدوَّب في الماء حامض المذاق بحمر
الشموس ولكن لا يذيب الزجاج مثل الحامض الفلوروسليسيك فيحفظ في اوعية
زجاجية مسدودة. ينحول الى بخار عند ١٠٤°ف ولا يبقى منه أثر وإذا كان ذلك

من وعاء زجاجي يُفسد الزجاج بالحمض الفلوروسليسيك الذي يتولد
هيدروجين وسليكون أو هيدروجين مُسكّن س ٤٥ - يتولد إذا انفج
سليكونيد المغنيسيوم بواسطة حامض هيدروكلوريك وإلى الآن لم يحصل عليه
صرفاً - هو غاز لا لون له إذا أصاب الهواء يشتعل بلهب ابيض ويتولد دخان
ايض هو حامض سليسيك

مركبات السليكون ومواد الرتبة الثانية

سليكا أو حامض سليسيك غير هيدراتي س ٢١ - هو كثير الوجود في الطبيعة
على هيئة رمل وصوان وكوارتز وبلور وجانب كبير من الحجارة الكريمة هي سليكا
ملون باكسيد بعض المعادن فالجيمشت هو سليكا متبلور ملون باكسيد المغنيس
الاول والبشم والبشب والعقيق الابيض والاحمر هي سليكا متبلور داخله أكثر
او اقل من أكسيد المعادن وهو ضروري لنبو بعض النبات كما ذكر انفاً وهو
داخل ايضاً في تركيب الشعر والريش وقد وُجد منه اثر في الدم
استحضاره - قد تقدم ذكر كيفية استحضاره ويزاد على ما قيل هذه الطريقة
ايضاً. احم بلورات كوارتز الى درجة الحمرة والنها في ماء وهي حامية ثم اسحقها
واصهرها مع ثلاثة او اربعة امثالها
وزناً من كربونات الصودا
في بوظقة من البلاتين في كوري
ثم ذوب الكك في حامض
هيدروكلوريك في وعاء من
الخزف الصيني - جفف المزيج
واكسر القطع التي تولد بقضيب
زجاج ومتى صار الباقي على هيئة
مسحوق ايض جاف فبله بحامض

شكل ١٠٢




هيدروكلوريك واتركه نحو ٢٠ دقيقة ثم اضع اليه ماء وضعه على ورق ترشيح
في قمع ب شكل ١٠٢ وانفذ عليه بخار ماء من قنبلة أ فالبخار يتحول الى ماء سخن
في القمع ويدوب كل المواد القابلة الذوبان فيترك الحامض السليسيك وحده

صفاته - السليكا المستخرجة على هذه الكيفية هو مسحوق ناعم ايض لا طعم له ثقلة النوعي ٢٦٦ لا يذوب في الماء ولا في الحوامض ولا يٌصهر إلا بالبوري الأوكسيدروجيني وهو في الكيفية حامض اذا أُحي مع الفواعد القلوية يولد معها املاحاً بعضها قابلة الذوبان في ماء اذا كانت القاعدة زائدة وإذا زاد السليكا يتولد زجاج اما مسحوقة فكثير الاستعمال لاجل عمل الخزف الصيني وسياتي ذكر انواع الزجاج والخزف بعد الكلام بالالومينوم. اما الزجاج القابل الذوبان في ماء غالي فمصنوع باصهار ٨ اجزاء كربونات الصودا (او ١٠ اجزاء كربونات البوتاسا) و ١٥ جزءاً من الزول النقي وجزء واحد من الفحم كبريت السليكون س ك ٢ - يُستخرج بامرار بخار كبريت الكربون على سليكا محي الى درجة الحمرة - الماء بجملة فيتولد حامض هيدروكبريتيك ونوع من الحامض السليسيك قابل الذوبان في ماء وبهذه الظاهرة يعلل عن وجود السليكا في بعض المياه المعدنية كما في الينابيع الحامية في جزيرة ايسلاند وفي اماكن آخر


الكربون كـ

سبته كـ وزنة الجوهري ١٢ وزن جوهري المادي مجهول
الكربون موجود في الطبيعة على هيئات شتى ذات صفات مشتركة وصفات خصوصية. اما الصفات المشتركة فهي ان الكربون لا يٌصهر ولا يذوب في مادة معروفة ويتركب مع الاكسجين فيتولد أكسيد وحامض كلاهما غاز وهو داخل في كل المواد الآلية حيوانية كانت او نباتية . اما اشكال الكربون فهي (١) الماس (٢) الپيلومياجو (٣) الفحم الخشبي والحجري (٤) الفحم الحيواني (٥) الهَبَاب (٦) فحم السكر (٧) الكوك
شكل ١٠٤



(١) الماس - هو كربون صرف متبلور على هيئة من هيئات الشكل الاول (صحيفة ٧٥) وكما في شكل ١٠٤ اما محل الماس الجيولوجي فغير معروف لانه لا يوجد في غير الرمال او بين حصا قد حُملت من بعيد بسبب فلا يُعلم موقعها الحقيقي بين طبقات الصخور. هو اصلب المواد المعروفة لا يجرح الألباس مثله او ببلورات البور. في الغالب لا لون له ونادراً يتلون لونا اسود او ازرق كاللماسة الزرقاء التي عند رجل من اغنياء انكلترا قيمتها ٣٠٠٠٠٠ ليرا استرلينة . هو شفاف واغوى المواد على تكسير شعاع النور ثقله النوعي من ٣٤٥٠ الى ٣٤٥٥ وقد تحققت مادته باحتراقه في اكسجين فينولد حامض كربونيك واذا أُخفي الى درجة عالية يتحول الى شيء شبيه بالبلومباجو وذلك برهان على انه لم يتبلور بواسطة الحرارة اكثر هذا الجواهر الكريمة تجلب من جزيرة بورنيو وهندستان وبرازيل وقد


شكل ١٠٥



وُجدت منه جواهر منفرده في اماكن كثيرة في جبال اورال وفي بلاد اميركا المتحدة وفي مكسيكو ولا تصلح للمصاغ على هيئتها الطبيعية فتقطع في الغالب على هيئة من الهيئات المرسومة في شكل ١٠٥

ان اشهر جواهر الماس المعروفة الجوهرة المسماة ماسة پت وُجدت في هندستان فاشتراها حاكم مدراس الانكليزي اسمه پت


شكل ١٠٦



يبلغ ٢٠٤٠٠ ليرا استرلينة واشتراها بعد ذلك الحكومة الفرنسية في سنة ١٧١٧ بمبلغ ٢٢٥٠٠٠٠ فرانك - حينئذ ١٣٠٠٠٠ ليرا. ركبها نابوليون الاول في مقباض السيف الملكي الاحفالي وهي اكرم الجواهر وهيئتها قبل قطعها وبعده مرسومة في شكل ١٠٦

ثانية هذه الكريمة ماسة دوك طسكانا اشترها انسان في سوق فيورنسا

شكل ١٠٧




بمن جزئي جداً زاعماً انها قطعة بلور وهي ماسة صفراء اللون قيمتها ١٥٢٦٨٢ ليرا استرلينة وهي الآن بين جواهر اوسنريا الملكية وهيبتها مرسومة في شكل ١٠٧

ومن الجواهر المشهورة ماسة امبراطور المسكوب مركبة على راس صولجان

قدرها قدر بيضة حمامة قبل سرفها رجل فرانسوي من عين صنم في الهند واشترها الملكة كاترينا بمبلغ ٩٠٠٠ ليرا استرلينة ومبلغ ٤٠٠٠ ليرا تدفع سنوياً مدة الحياة

ومن اشهر الجواهر ابضاً الماسة المسماة قوو نور اي جبل النور ووجدت في هندستان كانت بين ايادي سلاطين الهند زماناً طويلاً وفي سنة ١٨٤٩ وقعت في يد الحكومة الانكليزية وهي الآن بين جواهر دولة انكلترا الملكية قيمتها ٢٨٦٧٦٨ ليرا استرلينة

شكل ١٠٨



وفي شكل ١٠٨ رسم جوهرة حسنة كانت في يد رجل من الاتراك قيمتها ٢٥٠٠٠ ليرا اعدتها صاحبها لثلاثع في ابي اعدائه ا.ا ماسة ملك پرتوكال وهي اكبر الجواهر

المعروفة فنيها شك والبعض بزعمون انها ليست ماسة بل نوع من الجزع (٢) الپلومباجو او الپلومباجين - هذا النوع من الكربون موجود في الطبيعة مزوجاً بالحديد وقد سمي كرافيت من استعماله في اصطناع الاقلام المسماة اقلام الرصاص مع انه ليس فيها من الرصاص شيء. يُسحق الپلومباجين ثم يكبس في مكبس ماء حتى يلتصق بعضه ببعض ثم يُقطع قطعاً قطعاً حسب المطلوب. الپلومباجين لا يصر باشد الحرارة الصناعية فتصنع منه بواطق لاجل احماء المعادن او اصهارها ويستخدم مسحوقة في صناعة الالكترونيبي لكي يكسى به قوالب الشمعة كسوة برسب عليها المعدن المنصود ارسابه. وقد يُستخسر صناعياً باصهار

المحديد في الفحم فينوب بعض الكربون وإذا برد المحديد بالتدرج يتبلور الكربون على هيئة قشور لامعة هي بلومباجين


(٣) الفحم الخشبي يُصنع باستقطار الاخشاب في انايق ضابطة او احراقها تحت التراب فيتطير عنها المواد المختلفة النباتية ويبقى الكربون اي الفحم ومن خصائصه مص الغازات لاسيما اذا اصطنع من اخشاب صلبة كالبنس وإذا شُبع من غاز ما فقلما يمس من اخر حتى بعد ما يحمى لكي يُطرد الذي قد مصه قبل و بناء على هذه الخاصية يزيل الروائح المنتنة ويبطل فعل المواد المعدية فاذا ترشح عنه ماء فاسد تزول رائحته وإذا اصبغ فحم جديد الى ماء فيو هيدروجين مكبرت تزول رائحته الكريهة ويزيل الالوان الآلية فيستعمل لتصفية الخمور وغيرها من السيات

اما الفحم الحجري او المعدني فهو من المواد النباتية التي نمت على سطح الارض في الدور الجيولوجي المعروف بالدور الكربوني ثم انطمت بالتقلبات التي حصلت ومن الضغط والحارة تحولت الى فحم وهو انواع مختلفة حسب اختلاف المواد النباتية التي تولد منها واشهرها الفحم المعدني النفطي وهو كثير المواد الراتنجية والنفطية يشعل بلهب صافي ودخان والفحم المعدني المسمى انثراكينا وهو كربون صافي خال من المواد المشار اليها يشعل بلا لهب ولا دخان وقد يخالط الفحم المعدني كبريت ومواد اخر

(٤) الفحم الحيواني يُستخضر بنكليس عظام في انايق ضابطة ثم يزال عنه كربونات الكلس وفضفات الكلس بالغسل وهو كثير الاستعمال لاجل ازالة الالوان فيستعمل في تكرار السكر وتصفية الخمور وما يشبه ذلك

(٥) الهباب بصطنع باحراق فطران ومواد اخر راتنجية وادخال دخانها في غرفة مبطنة بجلد شكل ١٠٩ يحنرق الهيدروجين فقط واما الكربون فيعمل بالهواء السخن الصاعد فيجمع على حيطان الغرفة على هيئة مسحوق ناعم اسود مثل السدوس اي الثور غير انه انعم وهو كثير الاستعمال في الصنائع لاجل اصطناع الحبر وانواع الاصبغة

شكل ١٠٩




(٧) فحم السكر - يُستحضر بنكليس السكر وهو كربون نقي غير ان مساماته اقل من مسامات سائر انواع الكربون فليس له قوة كثيرة على مص الغازات

(٨) الكوك - هو الباقي بعد استنفطار الفحم المعدني الرائحي لاجل جمع الهيدروجين المكارين اي غاز الضوء وهو نقي صلب ذو لمعة معدنية يصلح للاشغال مثل الفحم الخشبي موصل للحرارة وللكهربائية ويستعمل كثيرا لاجل اصطناع

صفائح كربونية تُستخدم في بطاريات كهربائية من نوع بطارية بنسن تنبيه - اذا كانت المادة المطلوب

شكل ١١٠



احراقها عسرة الاشغال فضعها في بوظقة من الخزف الصيني شكل ١١٠ ذات غطاء مثقوب لكي تنفذ فيه انبوبة وبواسطتها انفذ على المادة وهي حامية مجرى من الاكسجين

صفة حبر غير قابل الحو - الحبر الاعتيادي اكثره عفصات الحديد

فيصفي بالكور وبخامض اكساليك وبكل مادة تحل عفصات الحديد واما الحبر غير القابل الحو فيجب ان يكون اكثره كربونا لانه لاشيء يزيل الكربون بدون افساد القرطاس ايضا والصعوبة هي في تمكين الكربون على القرطاس حتى لا يزال عنه مجرد الفك او المحف وهذا المقصد يتم بالمزيج الآتي ذكره

خذ من الحبر المعروف بالحبر الصيني جزءين ومن الماء ٢٠ جزءا ومذوب يوتاسا كاوي جزءا واحدا ورُبّع جزء ومذوب صودا كاوي نصف جزء و امزج الجميع مزجا تاما. ان هذا المزيج يمس رطوبة من الهواء فلا ينفك الكربون حتى يقشر

عن سطح القرطاس فلا يزال ولا يُبقي


صفة حبر للطبع على اقمشة باحرف الطبع — ذوب جزءا من الحمر في ٤ اجزاء زيت التريبتينا ثم اضع الى المذوب هبابا ما يكفي لتجميد الحبر حتى يصلح للطبع صفة حبر لا يفسد بالحوامض — خذ زيتا من الزيوت الطيارة ٢٠٠ جزء وراتنج الكوپال ٢٥ جزءا وهبابا ٢ اجزاء. ذوب الكوپال في الزيت ثم اضع اليها الهباب وامزج الكل في هاوون واطفئ اليه من الزيت الطيار ما يكفي واذا طُلب حبرا جافا اضع اليه زنجفرا مسحوقا عوضا عن الهباب

مركبات الكربون ومواد الرتبة الاولى

ان مركبات الكربون مع الكلور والبروم واليود والهيدروجين سيأتي ذكرها عند الكلام بالكيمياء الآلية غير اننا نذكر هنا مركبين من الكربون والهيدروجين الهيدروجين المكربن الخفيف كره ٤

هذا الغاز يتولد في المياه المستنقعة بجل المواد النباتية الناجمة فيها وايضا في معادن الفحم المعدني ومن تفرقه خطر جليل على الفعلة ولاجل التوقية منه اخترع الفيلسوف دافى قنديل الامانة وهو يصعد من الآبار في بعض الاماكن استحضاره — هذا الغاز من نتائج انحلال المواد الآلية ويستحضر باحماض مزيج مركب من خلاص الصودا المتبلور ٤٠ جزءا وهيدرات الهوتاسا المجامد ٤٠ جزءا وكلس كاو

شكل ١١١




مسحوق ٦٠ جزءا فيوضع الكل في انبيق ويحُمى ويجمع الغاز فوق ماء كما في شكل ١١١

وهذه صورة المحل والتركيب

كر ٢٥٢ ص ٢١ + پ ١٥ - ك ر ص پ ٢١ + ك ر ٤٥
 خلاص الصوديوم بوتاسا كربونات الصودا والهوتاسيوم هيدروجين مكرين
 صفاته - هو غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم لا يفعل في الشمس لا يصلح
 للتنفس ولكنه ليس ساما وإذا مزج معه مقدار من الأكسجين يتنفس بدون اذى
 يشعل بلهب اصفر وإذا مزج معه هواء او أكسجين وأشعل ينفزع . ثقله النوعي
 ٥٥٩ . اذا أضيف اليه كلور فوق ماء لا تحصل نتيجة اذا احتجب النور عن
 المزيج واذا اصابة نوراً ينحل فيتولد حامض هيدروكلوريك وحامض كربونيك
 واكسيد الكربون

هيدروجين مكرين ثقيل كرم ٥٤ وسمي اثيلين

هذا الغاز لا يتولد في الطبيعة بل يتكون في استقطار مواد آلية كالزيت
 والدهن والراتنج والنفط والغم المعدني
 استحضاره - يُستحضر باحماة جزء من الكحول واربعة اجزاء حامض كبريتيك
 في فنية شكل ٧٣ فيمزج اولاً في مذوب بوتاسا ثم في حامض كبريتيك لاجل
 امتصاص الاثير الذي يصعد معه في اول العمل او تستعمل آلة كالرسومة في
 شكل ٦٨ ويجمع الغاز فوق ماء وهذه صورة المحل والتركيب



صفاته - هو غاز شفاف لا لون له ذو رائحة كرائحة الثوم يدوب في الماء ثقله
 النوعي ٩٨١ . يشعل بلهب صاف قوي . اذا مزج معه أكسجين وأشعل ينفزع
 بشدة . اذا مزج معه كلور ينجد الغازان على مقادير متعادلة فيتولد سبال ثقيل
 زيتي حلو المذاق ومن ثم سمي هذا الغاز مواد الزيت والسيال المشار اليوسمي
 السبال الفلنكي او الهولاندي نسبة الى جنسية كاشفيه اولاً . واذا مزج من هذا
 الغاز جزء مع جزئين من الكلور في قابلة طويلة ثم أشعل ينجد الكلور

والهيدروجين وبنلت الكربون على هيئة دخان كثيف . وهذا الغاز هو جزء من
غاز الضوء الآتي ذكره


فصل

في غاز الضوء والاشتعال والاصهار

الغاز المستعمل في المدن للانارة يُستخضر باستفطار الفحم المعدني النفطي. اذا احترق
هذا الفحم في الهواء يتولد منه حامض كربونيك وماء ويبقى رماد واذا استنطرق في
انابيب ضابطة يتولد منه غازات وسيال مائع وسيال خثر اما الغازات فهي
هيدروجين مكرين خفيف وهيدروجين مكرين ثقيل وحامض كربونيك وكبريت
الكربون وكبريت الهيدروجين ونشادر وسيانوجين (كرن) وغازات اخر مركبة
من الكربون والهيدروجين على مقادير مختلفة. اما السبال المائع فهو المعروف بالنفط
الفحمي وسباني ذكره في الكيمياء الآلية واما السبال الخثري فهو المعروف بقطران
الفحم وسباني الكلام به ايضا ويبقى في الانبيق الكوك (انظر صحيفة ١٥٠) فيهم
الغاز على مواد تمص الغازات الكريهة والمؤذية التي لا تزيد نوراً مثل الكلس
واكسيد الحديد وحامض كبريتيك وفي الانابيب الحاملة الغاز منافذ تخرج منها
المواد السائلة والخثرة فتجمع للاستعمال في الصنائع واستخراج بعض المواد
الكيميائية منها اما الغاز نفسه فبعد تنقيته على هذا المنوال يجمع في قوابل كبيرة
فوق ماء ومنها تفرق بواسطة انابيب الى الازقة والبيوت

وتضع قوة هذا الغاز على الانارة بتعبية غليون التبغ فحمًا وتطيينه ثم احماؤه
فتخرج الغاز من طرف قصبته فيشعل . ويجمع ايضا بواسطة آلة كالمرسومة في
شكل ١١٢ اي بوضع الفحم في انبوبة من الزجاج الصلب عند افتتاح المواد
السائلة عند ب و يمر الغاز بالانبوبة ت الى القابلة د القائمة في المحوض ذ

شكل ١١٢



الاشتعال - الاشتعال هو اتحاد أكسجين والمادة المشتعلة بسرعة فتظهر حرارة

ولهيب ويتضح ذلك من رسم لهيب قندبل شكل ١١٢ فبرى شكل ١١٢



فيه ثلاثة اجزاء اي مركز مظلم ر وجزء نير د ولهيب ازرق خارجي ن فيذوب الشمع او الشم و يصعد في الفتيبة بالمجاذبية الشعرية او يصعد الزيت بهذه المجاذبية نفسها اذا كان القندبل زيتياً و ينحول الى بخار الذي يملأ المركز اي الفسحة المظلمة ر في وسط اللهب وعند محيطه بصيب الهواء فيتحد مع اكسجينه وان كان الهواء كافياً بشعل جميعه والا فيصعد بعض كربونه بلا اشتعال على هيئة دخان واشتعال الكربون هو علة النور اللامع

الاصفر المحيط بالمركزي د ثم بشعل الهيدروجين وهو علة اللهب الازرق المحيط بالاصفراي ن وعند راس اللهب يحترق هيدروجين وكربون معا . اما حرارة اللهب فمتوقفة على مقدار الاكسجين الذي يتحد مع المادة المشتعلة فجزء من الهيدروجين يتحد مع ٨ اجزاء من الاكسجين وجزء من الكربون يتحد مع جزئين ونصف جزء من الاكسجين فاشتعال الهيدروجين يولد من الحرارة ثلاثة اضعاف ما تتولد من اشتعال الكربون

المادة ونختلف أيضاً للمادة الواحدة حسب سرعة ذلك الاتحاد مثال ذلك اتحاد الفسفور والأكسجين عند ٦٧° ف تدرجياً وعند ١٤٠° بسرعة
 إذا احترقت مادة لا يتلشى منها شيء بل إذا جمعت المواد المحاصلة ووزنت يزيد وزنها عما كان قبل احتراقها بمقدار وزن الأكسجين الذي تتركب معها ووزن الهواء اللززم لاحتراق مادة هو أثقل من المادة نفسها مثالة لاجل احتراق رطل فحم بلزم ١١٤٥ رطلاً هواءً وذلك يشغل نحو ٧٠٠ قدم مكعب ووقبتان ونصف وقبة فحم باحتراقها إذا انحصرت حرارتها تحول رطلين ونصف رطل ماء إلى بخار على ٢١٢° ف

وإذا نُسج شريط حديد نسجاً شبكياً بحيث تكون ٤٠ مسامةً في كل قبراط طولاً وجعل هذا النسج فوق لهيب قندبل أو لهيب غاز الأتارة لا ينفذ اللهب في المسام لان النسج يخفض الحرارة إلى ما تحت درجة الاشتعال وإذا أشعل الغاز النافذ فيه المسام فوق النسج يشعل ولكن ليس من اللهب الذي تحت النسج . وعلى هذا المبدأ اخترع الفيلسوف دافني قندبل الأمانة للفعلة في معادن الفحم للوقاية من تفرق الهيدروجين المكرين وهو قندبل اعتيادي محاط بنسج من الشريط وبما ان هذا الغاز لا يشعل بجمارة دون حرارة لهيب والنسج يخفض الحرارة حتى لا ينفذ اللهب في مسام الشريط فلا يشعل به الغاز بل يزداد نور القندبل من الغاز القليل الذي يدخل إلى داخل الشريط فينتبه حامله ويرجع عن الخطر

الصهر - الصهر أو الأصهار هو إذابة الشيء بالجمارة وبما ان بعض المواد يفتضي لصهرها جمارة زائدة فتسعمل وسائط شتى لزيادة الحرارة المتولدة بالمواد المشتعلة وقد ذكرنا ان الحرارة المتولدة هي بالنسبة إلى مقدار الأكسجين الذي يتحد مع المادة المشتعلة فالامر الام اذا هو تقديم أكسجين كافٍ لكي يتحد بسرعة مع الوقيد وذلك يتم بواسطة المنفاخ الذي هو برمي مجرى هواء على الوقيد او بتركيب المداخن بحيث يصعد الهواء المحامي ويأتي من اسفل مجرى هواء ليلاً الخلاً فيقوم مقام منفاخ. واذا طلب صهر مادة بوقيد قليل فالواجب حصر الحرارة حتى لا يذهب منها شيء ولا يذهب شيء من الوقيد بدون احتراق لا على هيئة دخان

ولا على هيئة غاز فاذا انحصرت حرارة لهيب قنديل كراسيني وتقدم له هواء بالكفاية بصهره مقدار من الحديد او النحاس او الفضة او الذهب بقية غرشين من الكراسين

مركبات الكربون ومواد الرتبة الثانية


كربون وأكسجين

أكسيد الكربون كرا ١ يُستخضر (١) باحراق كربون في أكسجين قليل (٢) بامرار غاز الحامض الكربونيك على كربون حام او على حديد حام فيخسر جوهراً من كربونه وينحول الى أكسيد الكربون وهذا يبرى كثيراً في نيران الفحم لان الهواء واصل بغير مانع الى اسفل النار فينولد غاز الحامض الكربونيك فيجعله مجري الهواء الساخن ويمر به على الفحم المحامي في اعلى النار فينحول الى أكسيد الكربون الذي لهية ضعيف ازرق

(٣) بجعل حامض اكساليك بواسطة مادة ذات شراة للماء مثل الحامض الكبريتيك. اغل بلورات حامض اكساليك وحامض كبريتيك في انبوبة وقرب الى فوهتها لهيب شمع فيشعل الغاز الصاعد بليسب ازرق ضعيف ويجمع بواسطة آلة مثل شكل ٩٥ فيمر في مذوّب بوتاسا كاو لاجل ازالة الحامض الكربونيك وهذه كيفية المحل والتركيب

(كرا ٢ + ٤ | ٢٥ | ٢ - ماء) > ٢ | ٥ | ١ + كرا + كرا ٢
حامض اكساليك مبلور ماء أكسيد الكربون حامض كربونيك
(٤) ضع مسحوق فروسيانيد البوتاسيوم الاصفر في قنينة مثل المرسومة في شكل ٦٦ (صحيفة ٨٦) واضف اليه ٨ او ١٠ امثال وزنه حامضاً كبريتيكاً ثقيلاً واحم الكل فينحل الملح وبصعد أكسيد الكربون بكثرة صرفاً فيجمع فوق ماء حسب العادة وهذه صورة المحل والتركيب

ح (كرا ٢ + ٤ | ٢٥ | ٢) + ٢١ { ٢١ | ٥ | ٢٥ } + ٢١ { ٢١ | ٥ | ٢٥ }
فروسيانيد البوتاسيوم حامض كبريتيك ماء كبريتات الحديد



كبريتات البوتاسيوم كبريتات الامونيوم أكسيد الكربون

صفاته— هو غاز لا لون له ولا طعم ذو رائحة ضعيفة يشعل بلهب أزرق ضعيف ثقلة النوعي ٠٠٦٦ لم يتحول الى سيال سام جدا اشد سماً من الحمض الكربونيك. اذا مزج مع كلور ووضع المزيج فيضياء الشمس يتولد منها غاز حريف خائق حامض سمي غاز الفصيحيت او حامضاً كلوروكربونيكاً وهو يغل بالماء الى حامض هيدروكلوريك وحامض كربونيك


حامض كربونيك كرا ٢١ — استحضاره (١) باحراق كربون في اكجين كلور (٢) بجل كربونات ما بواسطة حامض ثقيل . يوضع كربونات الكالسيوم اي الرخام مسحوقاً في انبيق ويضاف اليه حامض هيدروكلوريك او نيتريك او حامض كبريتيك مخفف فيجمع فوق ماء او بالطرد واذا طلب جافاً يتر على كلوريد الكالسيوم ويجمع بالطرد — اذا حلل الكربونات بحامض كبريتيك يتولد كبريتات الكالسيوم اي الجص غير القابل للدوبان فيعسر اخراجه من القنينة . وهو يتولد ايضاً بالاختار كما يتضح من وضع مزيج من العسل او السكر والخمير والماء في قنينة ثم تترك على فوهتها انبوبة طرف منها تحت قابلة مقلوبة في المحوض الكيمياوي فيصعد الغاز المولد بالاختار ويجمع في القابله

صفاته — هو غاز لا لون له ذو رائحة حادة وطعم حاد سام جداً اذا تنفس ثقلة النوعي ١٠٥٢٤ فمن ثقله يفرغ من وعاء الى وعاء ويجمع في اماكن منخفضة . يتحول الى سيال صاف بالضغط والبرد . ثم اذا تحول هذا السيل الى بخار بغنة يجمد بعضه بالبرد المحاصل من ذلك فهو الحمض الكربونيك الجامد ويشبه قطع الثلج واذا اضيف اليه ابير ووضع تحت قابلة على مفرغة الهواء تهبط الحرارة الى ٠١٠٠ ر يطفى اللهب ويدوب في الماء بكثرة فالماء البارد يدوب منه ما يماثل جرمه . يجمد الشمس و يولد مع الفواعد املاحاً قلوية مثل كربونات البوتاسا وكربونات الصودا وكربونات الكلس . يتولد من اشتعال النار لاسيما نار الفحم

ويتولد أيضاً في بعض المعادن والمخائر والآبار فيقتل الذي يتزل اليها ويتولد من
تنفس الحيوان والذي يتولد منه بهذه الطرق بمصّة النبات وبمحلّة ويتغذى من
كربونيه ويدفع أكسجينه

ركب آلة مثل المرسومة في شكل ١١٤ وأملئ د ماء وضع في الانبوبة ب ماء
الكلس ثم افتح المحنفة دفجري الماء ويدخل هوذا ماراً على ب فينتعكراه الكلس
يتولد كربونات الكلس من حضور الحامض الكربونيك المزوج مع الهواء

شكل ١١٤



وهكذا يحدث أيضاً اذا أشعل قنديل او شيء آخر نحت الفم عند ا اي
يتولد حامض كربونيك فينتعكراه الكلس ب و اذا جعل في ب ماء ملون
بالتموس مجهر ذلك يبرهن ان هذا الغاز حامض واذا وُضع ماء الكلس
الصافي في وعاء وأُفخ فيه بواسطة انبوبة طرفها تحت سطح الماء يتعكر الماء بتوليد
كربونات الكلس وذلك يدل على ان الغاز الخارج من الرية هو حامض كربونيك
وعلى هذه الكيفية أيضاً يبرهن وجود هذا الغاز في المواد المختمرة

املئ انبوبة طويلة مسدودة من احد طرفيها حامضاً كربونيكاً ثم اغمس
الطرف المنفوخ في مذوّب يوتاسا كاي او نشادر فالسيال بمص الغاز ويصعد في
الانبوبة ثم بعد صعود القليل منه سدّ طرف الانبوبة باصبع وهزها قليلاً ثم افتحها
ايضاً فيدخل اليها السيل بغنة لكي يملأ الخلاً الحاصل من امتصاص الغاز
بالسيل

هذا الغاز كثير الامتعال في الطب على هيئة اشربة فائرة فيها يستحضر الغاز

من كربونات ما بحامض ضعيف مثل مزيج من مذوّب كربونات الصودا
وحامض الطرطير او حامض اللبون

مركبات الكربون والكبريت

كبريت الكربون الثاني كرك ٢ - يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم
جاف محوّ الى درجة المحمرة ويستلقى في قابله مبرّدة

صفاته - هو سيال لالون له ذو رائحة كريهة ثقلة النوعي ١٢٧٢ طيار
بغلي عند ١١٠°ف يشعل بلبب ازرق وينولد من اشتعاله حامض كربونيك
وحامض كبريتوس. بذوّب الكبريت والبود والفسفور والكافور والكهرباء ومواد
اخر آلية . يتركب مع مركبات المعادن والكبريت كانه حامض فينولد من ذلك
املاح مثال ذلك كبريت الكربون كرك ٢ + كبريت اليوتاسيوم پ م ك
- كبريتو كربونات اليوتاسيوم (كرك ٢ پ ٢ ك ٢) وهذه الاملاح تترسبها املاح
الرصاص القابلة الذوبان فيتولد كبريتو كربونات الرصاص

كبريت الكربون كثير الاستعمال في الصنائع لاجل تذيب الكاوتشوك
والكوتا پرخا ورائحته مضرّة جداً على الصناع . اذا اشعل في كاس يحنرق شريط
الفولاذ في لهيبه . اذا لف بلبوس ثرمومتر يقطن ثم اقبل بهذا السبال وتحرك في الهواء
ينخط الزيتق الى الصف من سرعة تحويله الى بخار

التصدير

سبته ق - وزنه الجوهري ١١٨ وزن جوهره المادي مجهول
التصدير موجود في الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريت في سكسونيا وبوهيميا
وانكلترا وملغا ومكسيكو وامريكا الجنوبية ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل
ازالة المواد الترابية ثم محي لكي يطرد الكبريت والزرنيخ المختلطان معه ثم يصهر
بنار الفحم فالكربون يتحد مع اكسجين الاكسيد فيتولد اكسيد الكربون ويبقى
التصدير الصرف فيصّب على هيئة قطع كبار او على هيئة قضبان قصار او على
هيئة تُسمى تصديراً مبرغلاً وهو انفي اشكاله الثلاثة
صفاته - التصدير ذو لون فضي لين قابل التطرق منبلور اذا التوى

فضيئة يُخرج صوتًا خصوصيًا سُمي الصراخ القصديري ثغلة النوعي ٢٤٢ بصهر عند ٤٤٦°ف. إذا أُحْمِيَ فوق درجة الصهر بناكسد على هيئة مسحوق أبيض كثير الاستعمال في الصناعات للصلل وإذا أُحْمِيَ إلى درجة الحمرة يشعل بلعان شديد ويتولد حامض قصديريك (ق ٢١) غير هيدراتي. يذوب في حامض هيدروكلوريك فينفلت هيدروجين ويبقى كلوريد القصدير الأول أما الحامض النيتريك فينفلت به بشدة ويتولد أكسيد القصدير الثاني الهيدراتي

القصدير ومركباته كثير الاستعمال في الصناعات لاجل كسائه الاوعية الحديدية والنحاسية المستعملة في الطبخ وعلى هيئة ملغم مع الزئبق لاجل اصطناع المرايا ومركبا مع معادن اخرى لاجل توليد انواع من اللحام اما المركب المعروف بالذهب الموسوي والمستعمل في الطبع بلون البرونز فهو كبريتت القصدير الثاني والمعدن المعروف بالبريطاني هو مركب من قصدير ونحاس اصفر واثيمون وبزموت من كل شكل كية واحدة واللحام الاعتيادي مركب من قصدير اربعة اجزاء ورمصاص جزه واحد

لاجل كسائه سطح معدن قصديرا ذوب اعلى اكسيد القصدير في مذوب يوتاسا كاي ورشح السيلال ثم اضف اليه خراطة قصدير وضع على الخراطة القطعة المطلوب كسائها واغل المزيج فينجح مجرى كهربائي يجل الاكسيد فيكسي القصدير القطعة

لاجل اظهار فعل الحامض النيتريك بالقصدير اسحق بلورات نترات النحاس محققا خشنا وضعها على قطعة رق القصدير ثم بلها بماء ولها بالرق سريعا انما ضابطا يمنع دخول الهواء فينفلت الحامض النيتريك وبفلت غاز الحامض النيتروس ويخترق الرق بسرعة اتحاده مع بقية اكسجين الحامض النيتريك اذا صهر ٨ اجزاء بزموت و ٥ اجزاء رمصاص و ٢ اجزاء قصدير معا يتولد مزيج بصهر في ماء على درجة الغليان

مركبات القصدير مع المواد المتقدم ذكرها

كلوريد القصدير الاول - ق كل ٢ - يُسحق بذبوب قصدير صرف في حامض هيدروكلوريك ويضاف القصدير الى الحامض بحيث يكون القصدير

دائماً على زيادة لثلاً يتولد الكلوريد الأعلى ثم متى كف صعود الهيدروجين جف السيل وانركه حتى ينبلور - ذوب البلورات في ماء واضف قليلاً من المحامض الهيدروكلوريك حتى يصفى المذوب . يستعمل كاشفاً وبقنضي استحضاره جيداً كل مرة لانه لا يثبت بل يتحول الى حامض هيدروكلوريك واكسيكلوريد القصدير . اذا اُحي مع حامض هيدروكلوريك وحامض كبريتوس يتولد راسب اصفر هو بي كبريت القصدير واذا اضيف اليه كلور يتحول الى اعلى كلوريد القصدير واذا اصابه اكسجين يتحول الى اعلى كلوريد القصدير وحامض قصدير كلوريد القصدير الاعلى ق كل ٤ - هو سيال صافٍ لالون له مدخن يغلي عند ٢٤٨^٢ف واذا اضيف اليه ثلثه ماء يجمد على هيئة قطعة منبلورة . يستحضر بامرار مجرى من غاز الكلور على قصدير محمي وايضاً باستقطار جزء من القصدير وخمسة اجزاء كلوريد الزئبق الثاني . اذا اضيف اليه حامض هيدروكبريتيك يتولد راسب اصفر هو كبريت القصدير بذوبه نشادر وهيدروكبريت النشادر اما كلوريد الذهب فلا يولد معه راسباً . يستعمل في صناعة الصبغ لاجل تثبيت الالوان

بروميد القصدير الاول والاعلى - يستحضران على طريقة استحضار الكلوريد الاول والاعلى وبشبهاتها في الصفات
يوديد او بودور القصدير الاول والاعلى يتولدان باتحاد اليود والقصدير بغير واسطة وبشبهان الكلوريد والبروميد

فلوريد القصدير الاول ق فل ٢ والاعلى ق فل ٤ يتولد الاول باضافة حامض هيدروفلوريك الى اكسيد القصدير والثاني باضافته الى حامض قصدير كلوريد
اكسيد القصدير الاول ق ١ - هو مسحوق اسود يجترق بسهولة فيتحول الى الاكسيد الثاني (ق ٢١) يستحضر بمزج الكلوريد الاول وكربونات اليوتاسا فيرسيب الاكسيد الاول على هيئة مسحوق ابيض هيدراتي فاذا اغتسل وتجفف واُحي في حامض كربونيك ينحسر ماءه وبعير مسحوقاً اسود هو الاكسيد غير الهيدراتي

اكسيد القصدير الثاني ق ٢١ وقد سُمي الحامض القصدير كلوريد - يستحضر

بإضافة قلوي الى الكلوريد الثاني فيرسب راسب ابيض هيدراتي قابل الذوب
في حوامض وهو الاكسيد الثاني او الحامض الفصدريك
حامض مناصدريك ق ١٥ : ١ - اذا أُغلي الكلوريد الثاني في مقدار
زائد من الحامض النيتريك برسب راسب ابيض لا يذوب في الحوامض
كبريت الفصدبر الاول (ق ك) - يتولد بانفاذ مجرى من الهيدروجين
المكثرت في الكلوريد الاول ويتولد ايضاً باحماض الفصدير والكبريت معاً الى
درجة عالية

كبريت الفصدبر الثاني ق ٢٢ - يُستخضر بمزج ١٢ جزء فصدبر و ٦ أجزاء
زيتق و ٦ أجزاء ملح النشادر و ٧ أجزاء زهر الكبريت واحماض المزيج وهو المعروف
بالذهب الموسوي

كواشف - يكشف عن املاح الاكسيد الاول بهذه الوسائط
(١) القلوبات الكاوية تولد راسباً هيدراتياً ابيض يذوب في زيادة القلوي
(٢) كربونات النشادر او نشادر او كربونات اليوتاسا او كربونات الصودا
يولد راسباً هيدراتياً لا يذوب في زيادة الكاشف الا القليل منه
(٣) هيدروجين مكثرت او هيدروكبريتيت النشادر يولد راسباً اسود هو
الكبريت الاول

اما الاكسيد الثاني فيُكشف عن املاحه بهذه الكواشف
(١) القلوبات الكاوية تولد راسباً ابيض يذوب في زيادة الكاشف
(٢) النشادر يولد راسباً ابيض يذوب منه القليل في زيادة الكاشف
(٣) املاح كربونات قلوية تولد راسباً يذوب القليل منها في زيادة
الكاشف

(٤) كربونات النشادر يولد راسباً ابيض هيدراتياً لا يذوب في زيادة
الكاشف

(٥) الهيدروجين المكثرت يولد راسباً اصفر
(٦) هيدروكبريتيت النشادر يولد راسباً اصفر يذوب في زيادة الكاشف
الكلوريد الاول يُكشف عنه بواسطة كلوريد الذهب الثالث فيولد معه

راسياً بنفجياً بفعل بالحرارة الى ذهب واكسيد القصدير الاول وهذا الراسب قد سمي بنفسي كاسبوس . يُستعمل في الصناعات لاجل تلوين الزجاج وكساء بعض المواد كسوة زجاجية

تيتانيوم

سمنته في وزنه الجوهري ٥٠

هذا العنصر قليل الوجود وحياتياً يَرى بين المواد الباقية في الكور بعد صهر الحديد المعدني على هيئة كعوب صفار نحاسية اللون صلبة تجرح الزجاج عسرة الاضهار جداً هي مركبة من التيتانيوم والسيانوجين او النيتروجين واذا سُخِّت واضيف اليها يوتاسا هيدراتي ثم أُحِيت تُصهر وينولد تيتانات اليوتاسا اما التيتانيوم فيُستخلص باحماة فلوريد التيتانيوم واليوتاسيوم مع يوتاسيوم كلوريد التيتانيوم الثاني في كل ٢ - هو سيال طيار مدخن لا لون له بشبه كلوريد القصدير الثاني ينولد بانفاذ مجرى من غاز الكلور على حامض تيتانيك وفحم على حرارة عالية

حامض تيتانيك في ٢١ - هو موجود في الطبيعة بين الحديد المعدني ويُستخلص بسحق معدنه ثم يُضاف اليه مثلاً كربونات اليوتاسا مذوّب في حامض هيدروفلوريك مخفف فيتولد فلوريد التيتانيوم واليوتاسيوم ثم يُضاف اليه نشادر فيرسب تيتانات النشادر واذا أُحِيت يُطرَد النشادر ويبقى الحامض التيتانيك

زركونيوم

سمنته ز وزنه الجوهري ١٩٢٦

يُستخلص من فلوريد الزركونيم واليوتاسيوم باحماة مع يوتاسيوم - لونه اسود يلمع قليلاً اذا صقل ويشعل اذا أُحِيت في الهواء اكسيد الزركونيم او زركونيا ز ٢١٢ نادر الوجود في بعض الاتربة

ثوريوم

سمنته ث وزنه الجوهري ٢٣١٠٥

هو نادر الوجود ممزوج بمواد اخرى في حجر يسمى ثوربيت
أكسيد الثوريوم او ثوربات ا

الفصل السابع

في عناصر الرتبة الخامسة اي المواد الشبيهة بالمعدنية ذات
الخمسة الجواهر


ان في هذه الرتبة ستة عناصر وهي نيتروجين وفصفور وزرنيخ وانتيمون
وبزموت واورانيوم

نيتروجين } ن اوزوت

سيمنه ن وزنه الجوهري ١٤ وزن جوهر المادي ٢٨
هذا العنصر كشفه الدكتور روثفورد في سنة ١٧٧٢ وسمي نيتروجينا لكونه جزءا
من النيتراي نيترات البوتاسا وسماه لاقواسير اوزوتا من عدم صلاحيته للحياة
النيتروجين كثير الوجود في الطبيعة لانه $\frac{1}{5}$ الهواء الكروي وهو جزء من
اجزاء النشادر ومن الفحم النفطي وملح البارود والناثرون ومن المواد الحيوانية
ومن بعض المواد النباتية لاسيما من نبات الطائفة الصليبية والفطرية


استحضاره - يُسَخَّر (١) بوضع قطعة فصفور تحت قابلة مقلوبة فوق
ماء وتركها الى ان لا يرتفع الماء في القابلة بعد اي الفصفور يناكسد شيئا فشيئا
فيفني أكسجين الهواء ويبقى النيتروجين

شكل ١١٥



(٢) باشعال فصفور تحت قابلة فوق
ماء شكل ١١٥ فالماء يمتص الحماض
الفصفوريك ويبقى النيتروجين وهذا العمل
يقضي له قهقه فصفور لكل ١٠ عقد مكعبة
هواء واذا استخدمت القابلة والانبوبة
المرسومة في شكل ١١٦ يسهل نقل النيتروجين
الى اربعة اخر لاجل امتحان ولاجل

شكل ١١٦



غاية اخرى

(٣) انفذ مجرى من الهواء في انبوبة صينية مملّنة برادة نحاس محماة الى درجة دون المحبرة قليلاً واجمع الغاز في قابلة فوق زبيق ولاجل ازالة الحامض الكربونيك الذي في الهواء يجب امراره اولاً على حجر الخفان مشبعاً بمذوّب اليوتاسا ثم على حجر الخفان مشبعاً بحامض كبريتيك لاجل ازالة البخار المائي

صفاته - هو غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم ثقله النوعي ٠٩٧٣. غير سام في نفسه ولا يصلح للحياة لعدم وجود اكسجين معه لا يذوب في الماء الا

قليلاً لا يفعل في الشمس ولا في الكرم ولا في ماء الكلس لا تشعل فيه نار ولا يشعل هو نفسه ومع ان صفاته سلبية فهو جزاً من مواد فعالة مثل النشادر والحامض النتريك والاطعمة والاشربة كالخبز واللحم والخمر والقهوة والشاي والاشربة المختمرة كلها ومن المورفين والاستركين والكيما والبارود اما كلوريد الازوت ويوجد الازوت فيها من اشد المواد تفرقاً وخطراً ومن خصائص المواد التي النتروجين جزاً منها عدم الثبوت

مركبات النتروجين والمواد المتقدم ذكرها

كلوريد النتروجين - ن كل ٢ - اذا ذوّب هيدروكلورات النشادر او نترات النشادر في ماء وقُلب فوق المذوّب قابلة غاز الكلور ينص الغاز ويجمع على سطح الماء سيال زبيبي اصفر برسب اخيراً الى اسفل الوعاء هو كلوريد النتروجين وهو اشد المواد المعروفة تفرقاً وخطراً ثقله النوعي ١٢٦٥٣ وكاد يُقتل به دولون وداقي

يوجد النتروجين ن ي ٢ - يُستخضر بسحق بود في ماء النشادر الكاوي فيذوب بعضه ويبقى راسب اسود يجمع على مرشحة هو بوديد النتروجين وهو

شدبد التفرقع جدًّا ومعاملته خطرة


نيتروجين وهيدروجين

نشادر ن ٣٥ - إذا تكلست مواد آليّة ازوتية أو تركت للفساد بفلت هيدروجين ونيتروجين وينركبان في حالة الولادة وينحدان مع قاعدة موجودة في المواد المشار إليها فتولد املاح عبارتها ن ٥ ، كفيها ك - اية قاعدة كانت مثال ذلك ملح النشادر اي كلوريد الامونيوم وسبائي ذكره وإذا انفطرت هذه الاملاح مع قاعدة بفلت غاز النشادر مثال ذلك امزج كلسا هيدراتيا ومسحوق ملح النشادر في انبيق واحمها فيصعد غاز النشادر فيجمع بالطرء ويبقى في الانبيق كلوريد الكلسيوم وماء وإذا طلب الغاز جافًا يمرُّ على قطع بوتاسا كاي في انبوبة ويجمع فوق زبيق (شكل ٦٨)

صفاته - هو غاز لا لون له ذو رائحة حريفة حادة وطعم حاد ثقلة النوعي ٥٨٩. لا يصلح للتنفس بل يزيل الحياة الحيوانية بحول قرطاس الكرم الى لون اسمر يزول اذا عُرِض على الهواء مدة - يتحول بالبرد والضغط الى سيال لا لون له . يطفى اللهب . لا يشعل في الهواء بل يشعل في اكجين صرف فيتولد ماء ونيتروجين . يرجع اللشموس المحمر الى اللون الازرق . الماء بمص منه ٦٠٠ مرة جرمو فيتكون ماء النشادر المستعمل كثيرًا في الطب ويُستخضر بامرار الغاز في ماء بواسطة عدة قنينات وُلف لانظر شكل ٦٩)

شكل ١١٧


تضع شراة الماء الى هذا الغاز يجمع قابله



منه فوق زبيق في صحن ثم اغمس الصحن وفم القابلة في ماء شكل ١١٧ ثم انقل الصحن عن فم القابلة تحت سطح الماء فيصعد الماء في القابلة بزحم يكسرها ان لم تكن متينة فواجب تغطيتها بفاس دفعا للضرر من كسرها كما يرى في الشكل

ويتضع ذلك ايضا يجمع الغاز في قنبنة مثل شكل ١١٨ ذات انبوبة دقيقة فعند ما يفتح طرفها

شكل ١١٨



في ماء اتموس محمر يتكون خلافاً بسرعة امتصاص
الغاز فيسبب الماء الى داخل القنبنة لكي يملأ الخلاء
اذا ابتل قضيب زجاج حامضاً هيدروكلوريكاً
وأدخل الى قابلة غاز النشادر تمتلئ دخاناً ابيض هو
كلوريد الامونيوم او ملح النشادر واذا أدخل اليه
حامض كربونيك يتحولان الى ملح ابيض هو كربونات
النشادر

اعرض كلوريد الفضة المجاف على غاز النشادر
المجاف فيص الكلوريد الغاز ويزيد وزنه ثلثاً. ضعه
مسحوقاً في ساق انبوبة ملتوية شكل ١١٩ وسد طرفه
سدّاً هرمسياً ثم احم الطرف الذي فيه المسحوق وبرّد
الاخر بواسطة مزيج مجلد فيجمع في الطرف المبرد
سبال لا لون له هو نشادر


شكل ١١٩



غير هيدراتي واذا نقصت
الحرارة الى -10.3°C فيجمد
على هيئة جامد بلوري نصف


شفاف واذا ارتفع الضغط والبرد يعود الى هيئة المسحوق الاول

شكل ١٢٠




يُستحضر قليل من ماء النشادر بوضع ماء صرف في
انبوبة ملتوية د شكل ١٢٠ وانفاسها في ماء بارد ب
وبنفذ فيه غاز النشادر فيمصه الماء ويزيد جرمه ٧٥ في
المية ومعنى شبع الماء منه يصعد الغاز في الساق التالي ويفلت
واذا طلب الغاز الصرف يجب امراره اولاً في انبوبة اخرى
شكل ١٢١ فيها بوتاسا كلور او مذوّبة
اذا طلب مقدار جزيل من ماء النشادر التي تُستعمل

شكل ١٢١



آلة كالمرسومة في شكل ١٢٢ اي قنينة
كبيرة كروية ذُبُلًا نصفها مزيجًا من
الكلس ومسحوق كلوريد النشادر من
كل صنف كمية واحدة وانبوبة ا ب
ناقلة في قنينة ماء بارد د فيصب قليل
ماء في ذ بواسطة القمع ومن الحرارة

شكل ١٢٢



المتولدة بائحاد الماء والكلس بفلت الغاز واما القنينة د فيسخن الماء فيها وعند
ذلك يجب تبديلها باخرى باردة ومتى قل صعود الغاز نُحَوِّ القنينة د قليلاً بجمام
رولي يكشف عن نقاوة ماء النشادر بهذه الطرُق

- (١) اذا تخفف عن صحن زجاج نظيف لا يبقى باق
- (٢) اذا تولد راسب باضافة ماء الكلس اليه فيوه حامض كربونيك
- (٣) شبعه حامضاً نيتريكاً صرفاً ثم اصف اليه مذوب نترات الفضة فان
تعكر يدل ذلك على حضور الكلور
- (٤) اصف اليه مخفف نترات الباريتا فان تولد راسب ايض يدل على
حضور حامض كبريتيك

- (٥) اذا تولد مع أكسالات النشادر راسب ابيض يدل على حضور كلس
 (٦) اذا تولد مع هيدروجين مكبرت راسب اسود او اسمر يدل على حضور
 رصاص او نحاس

مزيج النيتروجين والاكسجين الهواء الكروي


زعم القدماء ان الهواء الكروي عنصر من العناصر الاربعة المعدودة عندهم
 وفي سنة ١٦٦٢ حكى بعضهم بوجود اهوية غير الهواء الكروي بناء على موت
 بعض الفعلة في المعادن بعضهم اخناقًا من تنفس الغازات السامة وبعضهم من
 تفرقها فنسب ذلك فان هلمونت الى فعل الارواح Ghosts Geists الراصدة
 المعادن ومن هذه اللفظة تسمية هذه الاهوية اي غاز وقد اتفق الفلاسفة الآن على
 ان الغازات انما هي ابخرة سيالات تغلي على درجة من الحرارة واطنة جدًا وتلك
 السيالات هي عن جوامد تسيل بدرجة من الحرارة واطنة فلا نهاية لاشكال
 الغازات كما انه لا نهاية معروفة لاشكال السائلات والجوامد
 الهواء الكروي مزيج من اكسجين ونيتروجين ومعها عرّصًا حامض كربونيك
 ونشادر وبخار الماء وهيدروجين مكربن. اما الاكسجين والهيدروجين فعلى نسبة
 واحدة ابدًا اي

بالجزم	بالوزن	
٢٠٤٨١	٢٢	اكسجين
٧٩٤١٩	٧٧	نيتروجين
١٠٠	١٠٠	

اما الحامض الكربونيك والمواد الاخر المشار اليها فتختلف كمياتها في الهواء
 نارة تزيد ونارة تقل حسب اختلاف الاماكن والاسباب العارضة والحرارة . اما
 الحامض الكربونيك وبخار الماء فلا يخلو الهواء منها ولا بد من ازالتها او استعلام
 مقدارها قبل استعلام نسبة اكسجين الهواء الى نيتروجينه
 اذا حبس مقدار معلوم من الهواء في انبوبة مقسومة الى درجات فوق
 حامض كبريتيك وأدخل اليها قطعة من رق النحاس وترك الكل مدة فاكسجين

الهواء يتحد مع النحاس المبلول ويبنى النيتروجين
اما استعمال مقدار بخار الماء والحامض الكربونيك في الهواء فيتم بواسطة آلة

شكل ١٢٢




مركبة على هيئة شكل ١٢٢ وهي مؤلفة من قابلة كبيرة
تسع ما بين ١٠٠٠ و ٥٠٠٠ قيراط مكعب لها مقياس مثل
قابلة بييس ولها ثرمومتر د بلموسة في داخلها فنملاً ماء
وتوصل بها انايب ملتوية ا ب في بعضها حجر الخفان
مشع حامضاً كبريتيكاً لاجل مص بخار الماء وفي البعض
حجر خفان مشع مذوب بوتاسا كاري لاجل مص الحامض
الكربونيك فتوزن التي فيها الحامض الكبريتيك معاً
والتي فيها البوتاسا معاً ثم بعد تركيبها كما في الرسم تُفتح
الحفنيات لكي يجري الماء من القابلة فيأتي هواء لكي يملاً الخلاء ويمرور في الانايب
المذكورة يُزال منه البخار المائي والحامض الكربونيك ويعرف مقدار الهواء المار
من مقدار الماء الجاري من القابلة المدلول عليه بالمقياس ثم توزن الانايب ايضاً
كما تقدم فزيادة وزنها يدل على مقدار البخار المائي والحامض الكربونيك في مقدار
الهواء الذي دخل القابلة اما الانبوبة القريبة الى القابلة فلا توزن مع البقية لانها
لاجل ازالة البخار المائي المكتسب من مرور الهواء في مذوب البوتاسا بعد ازالته
بالحامض الكبريتيك

استعلام كمية اكسجين الهواء ونيتروجينه

(١) اولاً بالفصفور — قس مقداراً من الهواء بواسطة انبوبة متقسمة درجات
فوق زيبيق — اصهر قليلاً من الفصفور تحت ماء واسكبه في قالب كروي مثل


شکل ١٢٤ قالب رصاص البواريد وأغمسة في ماء وما دام لدينا ادخل فيه طرف شريط بلاتين ثم بواسطة هذا الشريط ادخل كرة النصفور الى الهواء المحصور في الانبوبة المذكورة انفا كما برى في شکل ١٢٤ فبعد نحو ٢٠ او ٢٠ ساعة يكون النصفور قد تركب مع جميع اكسجين الهواء فيتزع من الانبوبة ويقاس الباقي الذي هو النيتروجين

شکل ١٢٤



(٢) ثانياً بالنحاس المحي الى المحبرة — هذا العمل يتم بواسطة

آلة كالمرسومة في شکل ١٢٥ وهي انبوبة




شكل ١٢٥ ا ب من زجاج غير قابل الاضرار في كل طرف منها حنفية وفيها خرطة

نحاس فنوضع في كور وبوصل طرف منها بقبالة د تسع نحو ١٠٠٠ قيراط مكعب والطرف الآخر بوصل بانبوبتين ملتويتين في احدهما حجر خفان مشع حامضاً كبريتيكاً وفي الاخرى حجر خفان مشع مذوب بوتاسا كاو ثم انبوبة اخرى ذات بلايس على هيئة شکل ١٢٦ فيها مذوب بوتاسا كاو وهذه الانابيب هي لاجل ازالة الحامض الكربونيك والبخار المائي من الهواء المارة فيها ثم توصل

الانبوبة ا ب والقبالة د بمفرغة الهواء فيخرج الهواء منها وتوزن كل واحدة على حدها ثم توضع الانبوبة في الكور ونحى ثم تفتح الحنفية التي عن اليمين لكي يدخل هواء الى الانبوبة بعد مروره على مذوب البوتاسا والحامض الكبريتيك كما

شكل ١٢٦




تقدم فالتحس المحي يتحد مع أكسجين الهواء ويبقى
النيتروجين ثم تفتح المحنفة التي عن اليسار قليلاً
لكي يمرّ النيتروجين الى القابلة ومتى امتلأت
القابلة لا يعود يدخل هواء الى الانابيب وبدل
على ذلك عدم مرور فقاع هواء في الانبوبة
الاولى ثم توزن القابلة د وزيادة وزنها بدل على
مقدار النيتروجين الذي دخلها وتوزن الانبوبة
ا ب وزيادة وزنها بدل على مقدار الاكسجين
الذي اتحد مع التحاس

(٢) ثالثاً بواسطة الاقديومتر (شكل ٩٠) يدخل فيه مقدار معلوم من الهواء
ثم مقدار معلوم من هيدروجين نقي ثم تمرّ بها شرارة كهربائية فاكسجين الهواء يتحد مع
الهيدروجين ويبقى النيتروجين اما الاكسجين فالجزم الواحد منه يتحد مع جرمين
من الهيدروجين فيكون تلك خسارة الهواء الذي كان في الانبوبة من ذهاب
اكسجينه فلنفرض الهواء في الانبوبة ١٨٠ جراماً وليدخل الى الانبوبة هيدروجين
١٢٠ جراماً فيكون مجتمعا ٢٠٠ جرم ولنفرض انه بقي بعد التفرع ١٨٨ جراماً اي
الخسارة ١١٢ جراماً ثلثها $\frac{1}{3}$ ٣٧ اكسجين ثم ١٨٠ : ٣٧ : ١٠٠ :: ٢٧ : ٢٠٢

الهواء الكروي فيه بخار ماء ابداً كما ينضح من هذه الامتحانات (١) اذا عرض
كربونات البيوتاسا الجاف او كلوريد الكلسيوم على الهواء مدة يمضان ماء من

شكل ١٢٧




الهواء فيدوبان فيه (٢) اذا عرض
مقدار معلوم من الحامض الكبريتيك
الثقل على الهواء ٢٤ ساعة يزيد
جرمه بمصو ماء من الهواء (٣)
اذا وُضع وعاء فيه ماء بارد او مزيج
من الملح والتلج في محلّ دافئ فيجمع
عليه ندى من تكثيف البخار المائي
الذي في هواء المحل

لاجل استعمال رطوبة الهواء اي كم من البخار المائي في مقدار مفروض من الهواء ركب آلة كالمرسومة في شكل ١٢٧ - في الانبوبة امستوس مبلول بحامض كبريتيك فزنها بتدقيق ثم افخ الحنفية فكل ما جرى ماء من القنينة يدخل هواء لكي يملأ الخلاء وبمروره في الانبوبة يترع منه البخار المائي وبعد مرور مقدار معلوم منه مدلول عليه بسعة الوعاء الذي يجري منه الماء زن الانبوبة ايضاً فزيادة وزنها يدل على مقدار البخار المائي في كمية الهواء الذي مر فيها

ان تنفس الحيوانات يفسد الهواء الكروي بتزع اكسجينه ووضع حامض كربونيك موضعه كما يتضح من هذا العمل. املئ قنينة ولف ماء الكلس الى نصفها وركب انبوبة على احد عنقها نافذة الى الهواء الذي في اعلى القنينة وعلى العنق الاخر ركب انبوبة نافذة الى اسفل القنينة تحت سطح الماء ثم مص الهواء من القنينة بوضع الفم على الانبوبة الاولى فياتي هواء من الخارج بواسطة الثانية لكي يملأ الخلاء ولا يتغير به ماء الكلس ثم ضع الفم على الانبوبة الثانية وافخ لكي يمر الهواء الخارج من الرية في ماء الكلس فينعكس بالمحال من توليد كربونات الكلس واذا عرض ماء الكلس على الهواء في وعاء مفتوح يكنسي سطحه قشرة رقيقة هي كربونات الكلس من قبل الحامض الكربونيك الموجود غالباً في الهواء ولو بكمية جزئية وفي مجاورة بعض المدن الكبار حيث يشعل جانب كبير من الفحم المعدني يتولد مقدار جزيلة من الحامض الكبريتيك الغازي فينتزع مع الهواء فيجمره به قرطاس اللنبوس اذا عرض عليه. اما الاوزون في الهواء الكروي فقد تقدم

الكلام به وبطرق اكتشافه (صحيفة ١٠٨) شكل ١٢٨



الهواء الكروي قابل الانضغاط واذا ضُغِط كثيراً بغنة تظهر حرارته الحنفيه وهو خاضع للقانون المعروف بقانون ماريوط نسبة الى مكتشفه اي ان جرم كل غاز هو بالقلب كالضغط عليه اما قابلية الهواء للضغط فتوضح باللعبية المرسومة في شكل ١٢٨ وهي قنينة زجاجية طولها ملائمة ماء الا قليلاً وعلى فوهتها رق الكاوتشوك وفي الماء صنم من زجاج فارغ مثقوب من اسفل ظهره فيدخل الى جوفه من الماء ما يتركه يعوم على سطح الماء ثم اذا ضُغِط على الكاوتشوك

يضغط الماء فيضغط الماء الهواء الباقي في جوف الصنم فيدخل اليه ماء أكثر فيفرق ثم متى ارتفع الضغط عن الكاونشوك يعود الهواء في الصنم الى حاله ويطرد الماء الزائد الذي دخله فيعود ايضا

بسبب قابلية الهواء الضغط يكون هواء الاماكن العالية الطف من هواء الاماكن السفلى ومن اسباب وقتية تارة تزيد كثافة هواء موضع وتارة تنقل وقد بنيت على ذلك آلة لقياس كثافة الهواء او ثقله النسبي سمي

شكل ١٢٩



البارومتر الزينبي شكل ١٢٩ وهو مؤلف من انبوبة زجاجية ا ب طرف منها مسدود والطرف الاخر مفتوح طولها ٢١ او ٢٢ عقدة فتملأ زيبقا ثم تُقلب في وعاء فيه زيبق ذ ويركب عليها مقياس د فعلى مساواة سطح البحر يكون علو الزيبق في الانبوبة ٢٠ عقدة وكلما ارتفع عن سطح الارض هبط الزيبق في الانبوبة على هذا النسق

العلو اميالاً	جرم الهواء	علو الزيبق في البارومتر
٠	١	٢٠
٢٢٧٠٥	٢	١٥
٥٢٤١	٤	٧٢٥
٧٢١١٥	٨	٢٢٧٥
١٠٢٨٢	١٦	١٢٨٧٥
١٢٢٥٢٥	٢٢	٢٩٢٧٥
١٦٢٢٢	٦٤	٤٦٨٧٥

وهذا يبرهن ايضا ان أكثر جرم الهواء الكروي هو بالقرب من سطح الارض

براهين على كون الهواء مزيجاً غير مركب

(١) اذا تركب غاز مع آخر فين جرمها نسبة بسيطة وعند التركيب يتقلصان. اما اكسجين الهواء ونيروجينه فليس بين جرمها هذه النسبة الثابتة ولا تقلص في جرمها اي مجتمع جرمها هو جرم الهواء المؤلف منها

- (٢) اذا مزج اكسجين ونيروجين على النسبة المذكورة انفا فخاصيات المزج هي خاصيات الهواء تماما ولا يبدل الترمومتر على تغير في حرارتها ولا الاكتروسكوب على حركة كهربائية الامران اللانمان في كل تركيب كيميائي
- (٣) في الهواء الكروي الاكسجين والنيروجين باقيا كل واحد منها على قابلية الذوبان المختصة به واذ كانت قابلية الاكسجين للذوبان في الماء اكثر من قابلية النيروجين لذلك يكون اكسجين الهواء المستخرج من الماء اكثر من اكسجين الهواء الاعتيادي ولم يكن ذلك ممكنا لو كان الهواء مركبا
- (٤) قوة المركب على تكسير النور هي اشد من مجتمع قوت عناصره اما الهواء فتوته على تكسير النور تعادل مجتمع قوتي عنصريه

مركبات اكسجين ونيروجين


- (١) اكسيد النيروجين الاول ن ٣ ا
 (٢) . . . الثاني ن ا
 (٣) الحامض النيروس غير الهيدراتي ن ٣ ا م
 (٤) . الهيبونيتريك ن ا م وبسبب اكسيد النيروجين الاعلى
 (٥) الحامض النيتريك غير الهيدراتي ن ٣ ا ه
 تنبيه . في هذه العبارات المقدمة ن ١٤ و ١٦ -
 (١) اكسيد النيروجين الاول ن ٣ ا
 استحضاره - (١) يُستحضر باحما نيترات النشادر في انبيق زجاج شكل ٦٦
 ويجمع الغاز فوق ماء فنيترات النشادر ينحل بالحرارة ويتولد ماء واكسيد
 النيروجين الاول وهذه صورة التعليل



نيترات النشادر ماء اكسيد النيروجين الاول
 يجب ان تكون الحرارة بين ٤٠٠° و ٥٠٠° ف واذ زادت عن ذلك تظهر في

الانبيق ابخرة بيضاء ويقع خطر التفرقع . اذا قُصِدَ تنفسه يجب تركه فوق ماء بعض الساعات وامرارة في انبوبة ملتوية شكل ١٢٠ فيه مذوب اول كبريتات الحديد-٢٢ درهما من نيترات النشادر تولد قديما مكعبا من هذا الغاز

(٢) باحما نيتروكبريتات ما مثاله



نيتروكبريتات كبريتات اكسيد النيتروجين الاول
الپوتاسيوم الپوتاسيوم

صفاته - هو غاز لا لون له ولا رائحة حلوا المذاق كثافته ١٠٥٢٧. الماء يذوب منه $\frac{٤}{٥}$ جرم. بالبرد والضغط يتحول الى سائل واذا وُضِعَ السائل تحت قابله على مفرغة الهواء يتحول الى بلورات تشبه قطع الثلج . يشعل فيه قنديل بنور لامع مخضر ويشعل فيه فصفور وكبريت وفحم وشريط حديد اذا ادخلت اليه وهي حامية . الپوتاسيوم يشعل فيه من نفسه فوق ماء . مع الهيدروجين يشعل بتفرقع . اذا اضيف الى البلورات المذكورة انفا مادة اخرى سريعة التحول الى بخار مثل بي كبريت الكريون تحط الحرارة الى -٢٢٠°ف

هذا الغاز لا يصلح للحياة ولكن يمكن تنفسه فاذا تُنَفَسَ منه قليل تزيد الافعال المحبوبة ويحصل نوع من الهديان في الغالب ملذ لصاحب ومن ذلك سمي الغاز الضحك واذا تُنَفَسَ اكثر يرفع السيات التام فيستعمل في بعض الاعمال الجراحية عوضا عن الكلوروفورم . تنفسه يكون من كيس ذي حلمة شكل ١٢٠

مثل شكل ١٢٠ ذات ثقب من جانبها لانه بعض الاحيان لا يمكن نزع الكيس من يد المتنفس فاذا فُتِحَ الثقب في جانب الحلمة يدخل الهواء الكروي فيقطع فعل الغاز اذا بقي منه شيء في الكيس



(٢) أكسيد النيتروجين الثاني ن ا

استحضاره - (١) ضع في قنبنة استحضار الهيدروجين (شكل ٧١) ١٠٠ قنبنة خراطة النحاس واضف اليها ٢٠٠ قنبنة حامض نيتريك مخففاً بمثلو ماء واجمع الغاز الصاعد فوق ماء ومقي قل صعوده احم القنبنة قليلاً حتى يبطل صعوده تماماً فيبقى في القنبنة سيال ازرق هو مذوب نترات النحاس فلجفظ . التعليل



(٢) ذوب برادة حديد في حامض هيدروكلوريك الى الشبع . صف السيل واضف اليه مثله حامضاً هيدروكلوريكاً . ضع الكل في انبيق واضف اليه نترات البوتاسا فيصعد أكسيد النيتروجين بكثرة . يتولد بهذا العمل كلوريد الحديد وكلوريد البوتاسيوم وماء وأكسيد النيتروجين الثاني

صفاته - هو غاز ثابت لا لون له كثافته ١٠٠٢٩ . يذوب في ٢٠ مرة جرمو ماء يطفى * لهيب شمعة ولكن الفصنور يشعل فيه . اذا جمع في وعاء فيه ماء اللنموس او فرطاس اللنموس لا يجمره . اذا اضيف اليه بعض النقط من كبريت الكريون تشعل فيه شمعة بلهب مزرق . اذا اصابه اكسجين او هواء يتحول الى غاز احمر اللون هو الحامض النيتروس . اذا امزج هذا الغاز على مذوب اول كبريتات الحديد بمنص بكثرة فيتكون سيال اسمر اللون مسود بمص اكسجيناً بشرارة

(٣) الحامض النيتروس غير الهيدراتي ن ا م


استحضاره - يستحضر بمزج اربعة اجزاء أكسيد النيتروجين الثاني وجزء اكسجين في قابله ثم عرضها على درجة صفر ف - - ١٧٤٨ س فيتولد سيال مائع اخضر بخاره احمر برطفالي هو ن ا م يستحضر ايضاً بسحق حامض زرنفوس مع حامض نيتريك ثقيل واحماؤها قليلاً فيصعد غاز الحامض النيتروس ويبقى حامض زرنفيك هذا الحامض بحلة الماء فيتولد حامض نيتريك وأكسيد النيتروجين الثاني ولذلك لا يتركب بنفسه مع القواعد المعدنية . اما نيتريت البوتاسا فيتكون باحماها

نترات البوتاسا فيطرد بعض أكسجينه وهكذا يتولد نترات الصودا ايضاً

(٤) الحامض الهيبونيتريك او أكسيد النيتروجين الاعلى ن ٢١

استحضاره — يستحضر باحما نترات الرصاص الجفاف في انبيق من الزجاج الصلب وجمع الغاز الصاعد في قنبلة مبردة . شكل ١٢١ يبقى في الانبيق أكسيد الرصاص الاول ويصعد أكسجين وغاز الحامض الهيبونيتريك الذي يجمع في القنبلة على هيئة سبال لا لون له في الاول ثم يصفر عند ارتفاع الحرارة ثم يجمر وعند ٨٢°ف — ٢٧٢°س يغلي

شكل ١٢١




ويصعد عنه بخار احمر — عند ٤°ف يجمد على هيئة بلورات منشورية بيض — مجمر اللئوس وبلون المواد الحيوانية لونا احمر ولكن لا يولد املاحاً فلا يجق له ان يسي حامضاً

(٤) الحامض النيتريك غير الهيدراتي ن ١٢ هـ

اذا مزج أكسجين ونيترجين واضيف اليهما مالا او قاعدة ما واسعة الالفة

شكل ١٢٢



ثم أمر بها المادة الكهربائية بتحدان ثم يتحد المركب مع القاعدة فيتولد نترات وهذا العمل يتم بواسطة آلة كالمرسومة في شكل ١٢٢ وهي مؤلفة من انبوبة ملتوية ملانة زيتاً وكل واحد من طرفيها د و ذ في وعاء فيه زيت.

ادخل الى ملتوي الانبوبة هواء ومدوب بوتاسا كالي ثم اوصل احد الوعائين بالآلة كهربائية والآخر بالارض بواسطة سلسلة حديدية ثم شغل الآلة مدة فبعد مرور شرارات كهربائية كثيرة يوجد في الانبوبة مذوب نترات البوتاسا . وعلى هذا المبدأ يتولد حامض نيتريك في الارض ثم يتحد مع بوتاسا التراب لاسيما في الحطب والابنية القديمة فاذا تغسلت ترينها يذوب نترات البوتاسا في الماء ثم

عند تخفيف الماء ببلور الملح واستفطاره مع حامض كبريتيك يُستحضر الحامض
النيتريك الهيدراتي كما سيأتي . أما غير الهيدراتي فقد استُحضرَ بامرار مجرى من
الكور المحاف على نترات الفضة الجفاف

صفاته . هو جامد بلوري بلوراته من نوع المنشور المعين تُصهر عند 10°
ف و يغلي السيل عند 113° ف . غير ثابت عند حضور الماء يتحول الى الحامض


$$\left. \begin{array}{l} \text{الهيدراتي مكثا ن ن ا ه} \\ \text{١٥٥} \end{array} \right\} - \begin{array}{l} \text{٢١ ن ه} \\ \text{٢١ ن ه} \end{array}$$

حامض نيتريك هيدراتي ه ن ا ه

استحضاره . — يُستحضر باستفطار ١٠٠ جزء من نترات اليوتاسا مع ١٠٠ جزء
من الحامض الكبريتيك وإذا أخذ من الحامض ٥٠ جزءا فقط يتم العمل غير
انه يقتضي له حرارة أكثر وبعض الحامض النيتريك يغلي بها فيخالط الحامض
النيتريك حامض نيتروس . لاجل استحضار قليل منه ضع الملح في انبيق وصب عليه
الحامض بواسطة قمع حتى لا ينزل به عنق الانبيق ثم ادخل فكة الى وسط قنينة
كبيرة منكبة على جانبها وارم عليها مجرى ماء بارد من حنفية واحم الانبيق
بحمام رملي الى درجة 360° . ويجمع منه قليل ايضا بواسطة الآلة المرسومة في

شكل ١٠٠

شكل ١٠٠



لاجل جمع مقادير جزيلة من هذا الحامض نستعمل آلة كالمرسومة في شكل ١٢٣

وهي مؤلفة من الانبيق ا موضوع في حمام رملي فوق كوري وقابلة كروية ب مكسية شبكة لتفريق الماء البارد النازل من الحنفية ز على سطحها وهي جالسة في حوض ماء بارد د د يخرج فائضة من ذالى الوعاء ر وبعد تمام العمل يبقى في الانبيق كبريتات الپوتاسا

الحامض النيتريك المدخن مزيج من حامض نيتريك وحامض نيتروس بسبب استعمال الحامض الكبريتيك على نصف وزن الملح كما تقدم واذا استعمل منها اوزان متعائلة او كان الحامض الكبريتيك زائداً بنولد حامض نيتريك اكثر ويبقى في الانبيق بي كبريتات الپوتاسا ثم يبقى الحامض النيتريك المحاصل باستنظاره عن نترات الرصاص الذي يزيل الحامض الكبريتيك المخالطة صفاته - هو سيال ثقيل مدخن لا لون له يغل بالتور كاو يفسد المواد الحيوانية ويلونها لونا اصفر ثقلة النوعي نحو ١٥٢١ عند ٦٠ ف يغلي عند ١٨٤ ف وهو مركب من ٥٤ جزءا من الحامض الصرف و ٩ اجزاء ماء

الحامض النيتريك يفعل بجميع المعادن الا الذهب والپلاتين و ارديوم و روديوم و روثينيوم. اي المعادن تتركب مع بعض اكسيده فنصير قواعد ثم تتركب مع باقي الحامض وتصير املاحا وهذا العمل هو من قبل الحامض الهيدراتي بواسطة نحو بلو الى حامض نيتروس واكسيد النيتروجين اما الحامض النيتروس فينحل بالماء وينولد حامض نيتريك واكسيد النيتروجين الثاني ولعدم وجود الماء في الحامض غير الهيدراتي لا يفعل بالمعادن كما يفعل الهيدراتي الحامض النيتريك وحده لا يفعل بالذهب كما ذكر واذا اضيف اليه حامض هيدروكلوريك ينولد المركب المعروف بماء الذهب عند الصياغ المستخدم لتذويب الذهب

كاشفه - كشف الحامض النيتريك في سيال ما اعسر من كشف سائر الحوامض لان مركباته قابلة الذوبان في الماء فلا تولد الكواشف معه راسبا ومن افضل طرق كشفه ان تُغلى المادة التي تحت الفحص في ماء ثم يضاف اليه مثله من الحامض الكبريتيك الثقيل ثم يبرد المزيج يضاف اليه مذوب اول كبريتات الحديد ثقيلآ ويضاف اليه بلطافة حتى يعوم على سطح السيال فان كان الحامض

النيتريك كثيراً بسود سطح السبال أولاً ثم بسود كله وإن كان الحامض النيتريك قليلاً يكتسب السبال لوناً اسمر محمراً أو بنفجياً وذلك بأحالة الحامض الى أكسيد النيتروجين الثاني الذي يذوب في مذوب أول كبريتات الحديد ويكسبه لوناً قاتماً

فعل الحامض النيتريك في تاكسد بعض المواد — الحامض النيتريك مربع الانحلال فيعطي بعض اكسجينه الى غيره وهو اذ ذلك يُستخدم لاجل تاكسد بعض المواد وهذه بعض امثلة فعله من هذا القبيل

(١) احم قليلاً من زهر الكبريت مع حامض نيتريك ثقيل في انبوية فيغلي المزيج ويصعد بخار احمر هو أكسيد النيتروجين الاعلى ويزوب الكبريت فيكون في السبال حينئذ حامض كبريتيك كما ينضح من امتحانه بكواشفه

(٢) على هذه الطريقة ايضاً يتحول فصفور الى حامض فصفوريك

(٣) صب حامضاً نيتريكاً ثقيلاً على فصد بر صرف شيئاً فثيقاً فيصعد البخار الاحمر المهود ويتحول الفصد بر الى مسحوق ابيض هو أكسيد ولا يذوب لان أكسيد الفصد بر غير قابل الذوبان في الحوامض

(٤) احم مسحوق كبريت الرصاص الاسود في قنينه مع حامض نيتريك ثقيل فيصعد البخار الاحمر المهود ويتحول الكبريت الاسود الى مسحوق ابيض هو كبريتات الرصاص غير قابل الذوبان في الماء

(٥) اذا اضيف حامض نيتريك الى المردسك اي أكسيد الرصاص لا يصعد البخار الاحمر المهود لانه من كونه أكسيداً يتركب مع الحامض بدون حل بعضه لكي يتحد مع اكسجينه


الفصفور } ف ٢
ف ٢

سبمة ف وزن جوهره ٢١ وزن جوهره المادي ١٢٤

هذا العنصر كشفه أولاً براندت من هامبرج سنة ١٧٦٩ في البول الانساني وهو موجود في الطبيعة مركباً مع الكلس في العظام وفي بعض الصخور والانزربة وفي النبات والجهاز العصبي الانساني

استحضاره — يستحضر باستطار عظام مكلنة مع فحم على هذه الكيفية — امزج

شكل ١٢٤



ثلاثة اجزاء من العظام المكلنة و ٢٠ جزءاً من الماء وجزئين من الحامض الكبريتيك وضع المزيج في موضع دافئ و اتركه ٢٤ ساعة فيكون قد تولد فيه كبريتات الكلس و فوق فصاف الكلس. اضف اليه ٥٠ جزءاً من الماء فيلذوب فوق فصاف الكلس في الماء و يبقى كبريتات الكلس غير ذائبة . صف السائل وجففه في


وعاء من الحديد حتى يصير على كثافة العسل ثم اضف اليه من الفحم المسحق ما يعادل ربع وزن العظام . امزج الكل جيداً واجه الى الحمرة ثم انقله حالاً الى انبيق فخار ذي شكل ١٢٤ فكه داخل في انبوبة نحاسية د نازلة في ماء بارد . احم الانبيق شيئاً شيئاً فيصعد الفسفور بخاراً و يجمع في الماء البارد و يبقى في الانبيق فصاف الكلس المتعادل . ثم يصهر الفسفور في الماء الساخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان . و يجب حفظه في الظلام تحت ماء .

صفاته — هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع ثقلة النوعي 17° و ثقل بخاره النوعي نسبة الى الهواء 0.425 . يصهر عند 108° ف — 22° س و يغلي عند 500° ف — 287° س . هو سريع الاشتعال لا يذوب في الماء و يذوب في الزيت و النفط و في بي كبريت الكربون . اذا شعل في الهواء يتولد حامض فسفوريك . في الظلام يضي و يصعد عنه بخار مضي لا سيما اذا وُضع قضيب منه في حامض نيتريك بحيث يكون بعضه فوق سطح الحامض . رائحته تشبه رائحة النوم وهو سام جداً و ترياقه زيت الترهنتينا

فسفور مسحق — هو حال المونروبي من الفسفور وقد سمي فسفوراً بلا

هيبه ومسحوق الفسفور . هو مسحوق احمر بني لا يضيء في الظلام ولا يدخن
لا رائحة له ولا يذوب في النفط ولا في بي كبريتت الكربون ثقلة النوعي ٣١٤
قابل الاحماء في الهواء الى ٥٠٠°ف بدون ان يشعل وعند ٥٠٠°ف يعود الى
فسفور اعتيادي وهكذا ايضا اذا اُحمي في انبوية ضابطة منقطعاً عن الهواء .
يُسَخَّر باحمااء فسفور في حامض كربونيك بعض الساعات الى درجة ٤٥٠°ف
او ٤٦٠°ف ويُستخَر على نوع على الطريقة الآتي ذكرها في الاعمال بالفسفور
كما ترى

شكل ١٢٥



استفطار الفسفور - يُستفَطَّر بآلة

كالرسومة في شكل ١٢٥ اي بوضع
الفسفور في انبيق واسع ذ وبيغ
القائبة ا د ماء قليل فعند احمااء
الانبيق يطرد الهواء الماء الى
الساق ا ويخرج منه فقائيع فقائيع
ثم يصعد الفسفور ويجمع في الماء

على هيئة سبال ما دامت حرارة الماء فوق ١٠٤°ف وهذا العمل لا يخلو من خطر
التفرقع الموزي

اعمال بالفسفور - تنبيه - كل الاعمال بالفسفور منها خطر الاحتراق
به فيجب غاية الحرص فيها

(١) يَصْهَر الفسفور بوضع قطعة منه في اِماء سخنة
(٢) تظهر سهولة التهاب الفسفور (١) اذا التفت نحو قهنتين منه في قرطاس
ثم فُرك يشعل (٢) اذا التفت في قطن وطريق بمطرقة يشعل (٣) اذا وُضع على
زجاج ثم وُضع الزجاج على فلين عائم على ماء سخن يشعل (٤) اذا وُضع على بود
يشعل

(٣) ضع قطعة فسفور في ماء بارد في قده عبيق ثم اصف اليه ماء سخناً حتى
يصر الفسفور ولا يلتهب ثم انقل عليه مجرى اكسيجين فيشعل الفسفور تحت الماء
ويتولد حامض فسفوريك الذي يذوب في الماء

(٤) ضع قطعة فسفور في انبوبة زجاج طولها نحو ثلاثة اقدام وقطرها نحو نصف فيراط وليكن الفسفور نحو نصف قدم من طرف الانبوبة. ثم اصهره بتدليل الكحولي ثم انفخ بقوة في الطرف الاقرب الى الفسفور فيلهب لهباً قوياً وتكنسي داخل الانبوبة مسحوقاً احمر هو فسفور الوتروبي وقد سببت الاشارة اليه تنبيهه — هذا العمل لا يخلو من خطر على العامل لانه اذا استنشقت الهباء ولو قليلاً عند وضعه على طرف الانبوبة يمتزق احتراقاً شديداً

مركبات الفسفور ومواد الرتبة الاولى


كلوريد الفسفور الثالث ف كل م — يُستحضر باحماض فسفور في كلور جاف هو سيال لالون له مدخن ذوراثة كريمة ثقلة النوعي ١٩٤٥ . اذا أُلقي في ماء يفرق فيه ويغل رويداً رويداً فيتولد حامض فسفوريك وحامض هيدروكلوريك كلوريد الفسفور الخامس ف كل ه — يُستحضر باحراق فسفور في مقدار جزيل من الكلور — هو جامد بلوري ابيض طيار وبالماء يتحول الى حامض فسفوريك وحامض هيدروكلوريك بروميد الفسفور وبوديد الفسفور — يُستحضران بتدويب الفسفور في بي كبريت الكريون واضافة بروم او بود اليه ثم بطير في كبريت الكريون . وعبارتها هي ف ب ٢ وف ب ه وف ٢ ي ٤ وف ي ٢

هيدروجين وفسفور

يتولد من تركيب الهيدروجين والفسفور ثلاث مواد

- (١) غاز الهيدروجين المنفسر او فسفيد الهيدروجين الغازي ف ه م
 - (٢) سيال الهيدروجين المنفسر او فسفيد الهيدروجين السائل ف م ه
 - (٣) الهيدروجين المنفسر الجامد او فسفيد الهيدروجين الجامد ف ه م
- (١) غاز الهيدروجين المنفسر او فسفيد الهيدروجين الغازي ف ه م
استحضاره — (١) يُستحضر باضافة حامض هيدروكلوريك الى فسفيد الكلسيوم او الى فسفيد آخر معدني فيتولد كلوريد الكلسيوم وهيدروجين منفسر

(٢) توضع قطعة صغيرة من الفسفور في انبيق شكل ١٢٦ ثم يملأ الانبيق لبن
شكل ١٢٦



الكلس اي كلس راي حديثا وبضآف اليه ماء حتى يشبه اللبن الرائب ثم
يُحى بجمام ماء وملح ويغس فكه تحت ماء فبعض الماء يغل ويذهب أكسجينه الى
بعض الفسفور فيتولد حامض هيبوفسفوروس الذي يتركب مع الكلسيوم فيتولد
هيبوفسفيت الكلسيوم والهيدروجين يتحد مع بعض الفسفور فيتولد هيدروجين
مفسر غازي الذي يصعد ويشعل حالما يصيب الهواء

(٣) ارم- قطعة صغيرة من فصيد الكلسيوم في قذح ماء
شكل ١٢٧
فاتر فيتولد الغاز الذي نحن في صددِه ويصعد ويشعل عند ما
يصيب الهواء كما يظهر في شكل ١٢٧



(٤) ضع في قذح عميق جزءا من كلورات البوناسا وجزئين من
فصيد الكلسيوم على هيئة قطع لا على هيئة مسحوق وكل قطعة نحو
مقدار حبة حمص او قطع فسفور صفارا على قدر حبة السهم عوضا
عن فصيد الكلسيوم واملء القذح ماء ثم بواسطة قمع طويل الساق

واصل الى اسفل القذح ارم- على المواد المذكورة نحو ٧ او ٨ اجزاء حامض
كبريتيك ثقيل فيخرج لهب من سطح الماء ويظهر في اسفل القذح نور مخضر
صفاته- هذا الغاز لا لون له ثقلة النوعي ١٢١٨٥ قلما يذوب في الماء بشعل
سريعا عند اصابته الهواء واذا اشعل في اكسجين صرف يخرج منه نور ابيض شديد
وهو الصاعد اجاتا من مواد حيوانية في حالة الفساد فيضي في الظلام باشتعاله

(٢) فصفيد الهيدروجين السائل ف ٤٥٢
استحضاره - يُستحضر بتبريد الغاز المولد حسب الطرق السابقة في انبوبة
ملتوية مثل شكل ١٢٠

صفاته - هو سيال لا لون له يشعل من نفسه اذا اصاب اكسجيناً

(٣) فصفيد الهيدروجين الجامد ف ٢٥٤
استحضاره - يُستحضر بادخال الغاز السابق ذكره مع السيلال المذكور في
حامض هيدروكلوريك فيرسب راسب يُجمع بالترشيح
صفاته - هو جامد اصفر اللون لا يذوب في الماء ولا يضيء في الظلام مثل
النصفور ويشعل عند ٣٠٠ ف

مركبات النصفور والاكسجين


(١) حامض هيبوفصفوروس هيدراتي ف ٢١٢٥
(٢) . فصفوروس . ف ٣١٢٥ وغير الهيدراتي ف ٣١٢
(٣) . فصفوريك . ف ٤١٢٥ . ف ٥١٢٥
(١) حامض هيبوفصفوروس هيدراتي ف ٢١٢٥
استحضاره - يُستحضر باغلاء فصفور في مذوب بوتاسا او باريتا فينخل الماء
ويتولد هيدروجين منصفر وحامض فصفوريك وحامض هيبوفصفوروس
اللذان يتركبان مع الباريتا اما فصنات الباريتا فيرسب واما الهيبوفصفيت فيبقى
ذائباً في السيلال فيرشح ثم يضاف اليه حامض كبريتيك فيرسب كبريتات الباريتا
ويبقى الحامض الهيبوفصفوروس في السيلال فيجفف بالحرارة حتى يصير مثل
شراب ولا يُعرف غير الهيدراتي منه
من صفاته شراهنه للاكسجين فيستعمل لاجل حل الاكاسيد بانحاده مع اكسجينها
جميع املاحه قابلة الذوبان في الماء

(٢) حامض فصفوروس هيدراتي ف ٣١٢٥ وغير الهيدراتي ف ٣١٢
استحضاره - يُستحضر بتذويب كلوريد النصفور الاول في ماء ثم تخفيف
السيلال بجمرة لطيفة لاجل طرد الحامض الهيدروكلوريك والماء الزائد
ويتولد ايضاً بتأكسد النصفور في اكسجين او في هواء بالتدرج وهذا العمل

يتم بوضع فسفور في انابيب صغار زجاجية وصفها على قمع فوق ماء وتغطية الكل
بقابلة فيمض الماء الحامض الفسفوروس المتولد فيصير هيدراتيا. اما غير الهيدراتي
فيتولد بناكد الفسفور في مقدار من الاكسجين ليس كافيا لتوليد الحامض
الفسفوريك

(٣) حامض فسفوريك هيدراتي ف ١٢٥ ٤ وغير هيدراتي ف ١٢٥
استحضارها - الحامض الفسفوريك غير الهيدراتي يستحضر باحراق فسفور
في اكسجين او في هواء جاف فيظهر دخان كثيف يجمع على هيئة مسحوق ايض
هو حامض فسفوريك غير هيدراتي. لاجل تجفيف الهواء اقلب قابلة فوق صحن
كلس كاو واتركها بعض الساعات ثم اقر القابلة واجعلها فوق قطعة فسفور
مشتعلة في وعاء صيني فيجمع الحامض على هيئة مسحوق ايض كما تقدم ويحفظ في
قناني جافة مسدودة سدا محكما

شكل ١٢٨



ويستحضر ايضاً بواسطة آلة كالرسومة في شكل ١٢٨ وهي مؤلفة من كرة
كبيرة ح نبع نحو ٢٠ وقيّة ذات ثلاثة اعناق كما في الرسم اما ا فانبوبة نافذة في
الفلين الى وسط الكرة ومن طرفها الاسفل معلق وعاء فيه يجرّق الفسفور اما

العُنُق ث فمتصل بفنينة د وهي منصلة بفنينة اخرى غير ظاهرة في الرسم بواسطة
ت ب والقيينة غير الظاهرة هي مثل شكل ١٢٧ فاذا انفتحت حنفتها وجرى الماء
منها يحصل خلاص في د فياتي الهواء من ح والهواء يدخل الى ح عن طريق
الانبوبة رزد ماراً على حجر خفان مشبع حامضاً كبريتيكاً فيصل الى ح جافاً
فاذ قد تركبت الآلة على هذه الكيفية تُسقط قطعة فصفور الى الوعاء عند ح
وتشعل بشربطة حامية مدخلة في الانبوبة ا ومتى احترق الصفور تُسقط في
الوعاء قطعة اخرى من الانبوبة ا وبعاد العمل حتى يجمع ما يكفي من هذا
الحامض

صفاته — هو مسحوق ايض ناعم مثل الملح بصهر عند درجة المحمرة وينطير
عند درجة البياض من الحرارة. اذا طرح في ماء فمن شراسته له بعطي صوتاً مثل
صوت الحديد الحامي اذا طرح في الماء فيتحول الى الحامض الهيدراتي ولا يعود
يُستخلص غير الهيدراتي منه بواسطة الحرارة

اما الهيدراتي فيستحضر بتذويب غير الهيدراتي في ماء كما تقدم ثم يجفف الماء
فينبلم الحامض ثم يحمى الى المحمرة في وعاء من الپلاتين فيصهر ومتى برد يبقى
على هيئة جليد او زجاج ايض صاف وهو المعروف بالحامض النصفوريك
الزجاجي ومن شراسته الى الماء يجب حفظه في قناني مسدودة سداً محكماً

ويُستحضر ايضاً باستفطار جزء من الصفور مع ١٣ جزءاً من الحامض
النيتريك مخففاً به حتى يصير ثقلاً النوعي ١٢٢. يوضع الكل في انبيق فكه داخل
في قابله مبردة فالحامض النيتريك الذي يصعد الى القابلة يرجع الى الانبيق اما
الحامض النصفوريك الهيدراتي فغير طيار فلا يصعد اما الصفور فيذوب في
الحامض النيتريك ثم يُغلى السبال حتى يتخثر ثم يحمى في وعاء صيني ويجفف
ويصهر كما تقدم

اذا ذوّب حامض فصفوريك غير هيدراتي في ماء لا يتولد الهيدراتي بل
حامض متي فصفوريك وهو حامض فصفوريك قد خسر جوهراً من مائه واذا
أُحي بعض املاح الحامض النصفوريك مثل فصفات الصوديوم بطرد جوهراً
من الماء ويتولد ملح مركب من الحامض الپيروفصفوريك مع القاعدة

كواشفة - الحامض النصفوريك والبيروفسفوريك والمتافسفوريك
تُكشَف بواسطة الزلال ونيترات الفضة . لان الحامض المتافسفوريك يَحْتَر
الزلال والنصفوريك والبيروفسفوريك لا يَحْتَرانِهِ اَما نِترات الفضة فَيُرسِب
الحامض النصفوريك على هيئة راسب اصفر والمتافسفوريك والبيروفسفوريك
على هيئة راسب ابيض كما يتضح في هذا الجدول

حامض متافسفوريك يَحْتَر الزلال ويكون مع نترات الفضة راسبًا ابيض
• بيروفسفوريك لا يَحْتَر الزلال • مع نترات الفضة راسبًا ابيض
• نصفوريك لا يَحْتَر الزلال • مع نترات الفضة راسبًا اصفر
ان كان مركبا مع قاعدة على هيئة فصاف فارسبه باضافة مذوب خلاص
الرصاص اليه فيتولد راسب ابيض . اجمعه على مرشحة وغسله وجفنه واصهره على
فحم بلهيب البورسي المخارجي فتمت برد تبلور على هيئة بلورة فاتمة مظلمة ذات
سطوح كثيرة وبذلك يمتاز فصاف من زرنجات
اضف الى مذوب فصاف كبريتات المغنيسيا ثم اضف اليها نشادر فيرسب
راسب ابيض

اضف حامضًا نيتريكًا او حامضًا هيدروكلوريكًا الى ملبدات النشادر
فيتولد اولًا راسب ثم يذوب في السيلان نفسه . اضف قليلًا من السيلان تحت
الفحص الى هذا المركب واغلبه فان كان فيه حامض فصفوريك يتولد راسب اصفر

مركبات النصفور والكبريت

يُعرَف للنصفور مع الكبريت خمس مواد هذه عباراتها ف ٤ كوف ٢ ك
وف ٢ ك ٢ وف ٢ كه وف ٦ ك يُعَسَّر استخراجها من النصفور الاعتيادي وبسهل
استخراجها من النصفور الالوتروبي

الزرنج }
زرر }
زرر }

سبته زر وزن جوهره ٧٥ وزن جوهره المادي ٢٠٠

الزرنج موجود في الطبيعة ممزوجًا بالحديد او الكوبلت او النكل او النحاس
او القصدير واكثره يُجَلَّب من سليسيا من جرمانيا حيث يوجد معدنه ممزوجًا

بالنكل والكوبلت فاذا اُهميت هذه المعادن يصعد بخار الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق ابيض ومنه يُستخلص الزرنيخ المعدني باحماض هذا المسحوق مع مسحوق الفحم في بوظقة مسدودة سدًا محكمًا او في انبوبة طويلة. يوضع الحامض المسحوق في اسنل الانبوبة ويغلى بفحم مسحوق فيجس الفم الى الحمرة ثم يحمى الحامض الزرنيخوس فيصعد الزرنيخ المعدني ويجمع على جوانب الانبوبة الباردة

صفاته — هو جامد مزرق اللون ذو لمعان معدني بلوري الهيئة يكمد سطحه اذا عُرِض للهواء ثقلة النوعي ٥٧٠ او ٥٩٠ اذا أُحمى يتصعد بدون ان يصهر واذا اصاب الهواء يتأكسد ويولد الحامض الزرنيخوس. رائحة بخاره تشبه رائحة الثوم. يذوب في حامض نيتريك فينولد حامض زرنيخوس وفي الحامض الهيدروكلوريك يذوب ويولد حامضاً زرنيخيكاً. هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدًا لاسيما الهيدروجين المزرنيخ في الكلور الجاف يشعل من نفسه مكوناً كلوريد الزرنيخ

مركبات الزرنيخ ومواد الرتبة الاولى

الهيدروجين المزرنيخ

الهيدروجين المزرنيخ الغازي زر ٢٥ — يُنحضر بفعل الحامض الهيدروكلوريك على زنك مع حضور مركب زرنيخي فالهيدروجين في حال الولادة يتوحد مع الزرنيخ

صفاته — هو غاز لا لون له ذو رائحة كريهة كرائحة الثوم ثقلة النوعي ٦٩٥ ٢٢٠ يذوب في الماء قليلاً سام الى الدرجة القصوى تنفسه ولو قليل منه خطر جداً. يشعل في الهواء ويولد ماء وحامضاً زرنيخوساً غير هيدراتي واذا كان الاكسجين قليلاً كما هو الحال دائماً في وسط هيب ينولد ماء وزرنيخ معدني فاذا وُضع في هيب هذا الغاز جسم بارد يجمع عليه الزرنيخ المعدني وذلك من جملة طرق كشفه كما سياتي بيانه

الهيدروجين المزرنيخ الجامد زر ٢٥٤ — ينولد اذا اضيف حامض نيتريك

مها كان قليلاً الى المزيج المذكور انفاً فيجمع توليد الهيدروجين المزيج الغازي ويتولد عوضاً عنه الجامد وإذا اضيف الى هذا المزيج الاخير مواد آليه يمنع توليد الجامد ويتولد الغازي كما لو لم يكن الحامض النيتريك حاضراً

مركبات الزرنج مع الكلور والبروم واليود والفلور

كلوريد الزرنج الثالث زر كل م — يُستحضر باستفطار جزء من الزرنج وسنة اجزاء في كلوريد الزبيق . هو سيال لالون له طيار يغلي عند ١٢٢°س ويجمد عند -٢٩°س ويحول بالماء الى حامض زرنجنوس وحامض هيدروكلوريك . اذا طرح مسحوق الزرنج في كلور جاف يشعل ويكون كلوريد الزرنج الثالث يوديد الزرنج الثالث زري م — يُستحضر باحما زرنج ويود معاً . هو جامد نحر بلوري طيار قابل التصعيد

بروميد الزرنج زرب م — هو جامد على حرارة الهواء الاعتيادية يُصهر عند ٢٠°س
فلوريد الزرنج سيال

مركبات الزرنج والأكسجين

- (١) حامض زرنجنوس غير هيدراتي او أكسيد الزرنج الابيض زر م ا
- (٢) زرنجيك . . . زر م ا
- (١) حامض زرنجنوس او أكسيد الزرنج الابيض زر م ا — قد ذكرت كيفية استحضار هذا المركب انفاً وهو يتولد كل ما احترق زرنج في الهواء صفاته — هو جامد ابيض زجاجي على غير هيئة معلومة واحياناً يتبلور على هيئة ذبي ثنائي زوايا قياسي كثافة الاول ٢٢٢٣٨ وكثافة الثاني ٢٢٦٩٩ والاول يذوب منه في الماء اكثر من الثاني وإذا تمخض الماء بحامض هيدروكلوريك يذوب اكثر من هذا الحامض وعلى المعدل ١٠٠ جزء ماء على ٢١٢°ف تذوب ١١٢٥ جزءاً من الشكل المتبلور . يتركب مع الفلويات فتتولد املاح مثل زرنجات النشادر والهوناسا والباربنا والكلس والمغنيسيا وغيرها . بخاره لالون له وإذا جمد يتبلور

على هيئة ذي ثمالي زوايا قياسي. طعمه حلوقا بضع وهو سام جداً. يُستعمل في الطب غالباً على هيئة مذوّب زرنيجيت البوتاسا. اما زرنيجيت النحاس فمُعرف باخضر شبل وهو مستعمل في صناعة التدهين. الصابون الزرنيجي مستعمل لاجل حفظ المواد الآلية مثل جلود الخيول والطير المحشية وهو مركب من صابون ١٠٠ جزء و حامض زرنيجوس ١٠٠ جزء و كربونات البوتاسا ٢٦ جزءا و كافتور ١٥ جزءا و كلس كلور ١٢ جزءا. بدوّب الصابون بماء فانر قليل ثم يُضاف اليه البوتاسا و الكلس و يُمزج الكل مزجاً جيداً ثم يُضاف اليه الحامض الزرنيجوس ثم يسخن الكافتور و يُضاف الي المزيج. يصعد عنه دائماً هيدروجين مزيج قيمت الهوام و الحلم و بزورها

(٢) حامض زرنيجيك غير هيدراتي زرر ٥١ - استحضاره - يُستحضر بدوّب حامض زرنيجوس في حامض هيدروكلوريك سخن ثم يُضاف اليه حامض نيتريك شيئاً فشيئاً حتى يبطل صعود البخار الاحمر ثم يجفف وهو اذ ذاك ايض غير هيدراتي و اذا تعقد فقط السبال المذكور و ترك في حرارة تحت ١٥٠°س يتبلور الحامض و بلوراته تخسر ماء التبلور عند ١٠٠°س و اذا أُحميت الى ١٨٠°س يتولد حامض بيرو زرنيجيك و اذا ذوّب منه الى الشبع و حُفظ المذوّب في ٢٠٥°س او ٢٠٦°س ترسب منه بلورات عبارتها زرر ١٢ وهي حامض متازرنيجيك

مركبات الزرنيج و الكبريت

يُعرف للزرنيج مع الكبريت خمس مواد هذه عبارتها زرر ٢٢ ك زرر ٢٢ ك
 زرر ٢٢ ك زرر ٢٢ ك زرر ٢٢ ك ١٨ ك ولا نذكر منها غير هذه الثلاث الآتية
 (١) كبريت الزرنيج الاحمر زرر ٢٢ ك - هو موجود في الطبيعة و يُستحضر صناعياً باحما كبريت مع نصف وزنه من الحامض الزرنيجوس. هو جامد احمر مصفر زجاجي سهل الاصهار طيار و يُستعمل في صناعة الشهب لاجل توليد النار الايض

(٢) كبريت الزرنيج الاصفر او طعم النار زرر ٢٢ ك - هو موجود ايضاً في الطبيعة و يُستحضر صناعياً بارسابو من مذوّب الحامض الزرنيجوس سخناً بواسطة

هيدروجين مكبرت. هو جامد اصفر سهل الاصحار طيار
 (٣) كبريت الزرنج الخامس زر ٢ كـه - يُستحضر بارسابه من مذوب
 حامض زرنجيك بارداً بواسطة هيدروجين مكبرت فيرسب شيئاً فشيئاً راسب
 اصفر

كيفية الكشف عن الزرنج

(١) كشف الزرنج في الحامض الكبريتيك - اذا استحضر الحامض الكبريتيك
 باستفطار كبريت الحديد الطبيعي بمخالطة احياناً زرنج فيجب الحذر من ذلك

ويكشف عن حضوره في هذا الحامض بهاتين الطريقتين

طريقة ا - اغل الحامض الكبريتيك بعد اضافة قليل من السكر اليه ثم
 خففه بماء ثم انفذ فيه مجرى من الهيدروجين المكبرت فان كان فيه زرنج يتولد
 راسب اصفر وان كان قليلاً جداً يظهر اذا عمل العمل المذكور بالحامض وهو
 سخن الى درجة الغليان

طريقة ب - خفف الحامض الكبريتيك بماء ثم شبعه كربونات اليوناسا
 فيرسب كبريتات اليوناسا. رشح السبال واغل الراسب . عقد السبال الباقي
 بالتخفيف وحمضه باضافة حامض هيدروكلوريك اليه واغله ثم امنحه بالهيدروجين
 المكبرت كما تقدم

(٢) كشف الزرنج في الحامض الهيدروكلوريك - خفف الحامض الثقيل
 بمليو ماء واغل الحامض الخفف ثم انفذ فيه هيدروجيناً مكبرتاً وهو في حال
 الغليان فان كان الزرنج حاضراً يتولد راسب اصفر. وهذا الراسب الاصفر يجب
 امتحانه لئلا يكون كبريتاً صرفاً لا كبريت الزرنج وذلك حسب ما سياتي في العمل
 الثامن من هذا الباب

(٣) كشف الزرنج في حامض فسفوريك - اذا خالط الزرنج هذا الحامض
 يكون على هيئة الحامض الزرنجيك فاغل الحامض بعد اضافة قليل من
 هيبوكبريت الصودا اليه حتى ينهي صعود رائحة الحامض الكبريتوس ثم امنحه
 بماء الهيدروجين المكبرت

(٤) في ما يجب الحذر منه — اذا كان مقدار الزرنج قليلاً جداً يجب انفاذ الهيدروجين المكثرت في السبال مدة ست ساعات بالافلّ ويجب ان يكون السبال حامضاً لا قلوياً ولا متعادلاً. واذا اُضيف اليه ماء الهيدروجين المكثرت يجب ان يكون المزيج في قنبنة مسدودة وان توضع على جانب مدة في موضع دافئ ثم يُجمع الراسب على مرشحة ويُغسل ثم يوضع في بلورة ساعة ويدوّب في قليل ماء النشادر ثم يجفّف بجار مائي حتى يجفّ كبريتت الزرنج ثم ينحول الى المعدن نفسه حسب العمل الثامن والتاسع من هذا الباب

(٥) كشف الزرنج في مذوّبات متعادلة — (١) يُضاف اليه مذوّب نترات

الفضة النشاردي فيتولد راسب اصفر يدوب في حامض نيتريك وفي نشادر تنبيه — يُستحضر هذا الكاشف اذا اُضيف الى مذوّب نترات الفضة من ماء

النشادر ما لا يكفي لتذويب كل أكسيد الفضة الراسب ثم يرشح السبال ويُحفظ (ب) اُضيف الى السبال كبريتات النحاس النشاردي فيتولد راسب اخضر

يدوب في الحوامض وفي نشادر — تنبيه — لاجل استحضار هذا الكاشف اُضيف نشادراً الى مذوّب كبريتات النحاس حسب الشروط المذكورة انفاً

(٦) استخلاص الزرنج المعدني من الحامض الزرنيجوس — ضع قليلاً من

شكل ١٢٩



الحامض الزرنيجوس في طرف انبوبة ا شكل ١٢٩ وعند ب د ضع قطعة فحم طويلة دقيقة بعد تجفيفها باحائها في انبوبة اخرى. احم الانبوبة بفنديل الكحولي من ب الى د ومتي حُمي الفحم الى درجة المحمرة فاحم الحامض عندها فالفحم يتحد مع اكسجينه والزرنج المعدني يتصعد ويجمع عند د

(٧) الحامض الزرنيجوس وكل مركبه فيوزرنج اذا اُضيف اليه كربونات الصودا وأحمي على فحم في لميب بوري الداخلي يصعد عنه رائحة الزرنج المخصوصية التي هي مثل رائحة الفوم

(٨) استخلاص الزرنج المعدني من كبريتتو — ضع الكبريتت في طرف انبوبة


مثل ب شكل ١٤٠ وفوقه قليلاً من طرطرات الكلس الجفاف المحروق جديداً
شكل ١٤٠



واحد ومتى حُمي فاحم الكبريت عند ب فبخل وجمع الزرنيخ المعدني عند ا
(٩) امزج جزءاً من الكبريت وثلاثة اجزاء سيانيد الهوتاسا وتسعة اجزاء
كربونات الصودا الجفاف وضع المزيج في انبوبة من الزجاج الصلب واصلها
بقنبنة لتوليد حامض كربونيك جاف وامرّ عليه الغاز شيئاً فشيئاً واحم المزيج
فجمع الزرنيخ في طرف الانبوبة البارد


(١٠) استخلص الزرنيخ من زرنيخت الكلس ومن زرنيخت الكلس
اضف الى الزرنيخت او الزرنيخت ثلاثة امثاله اكسالات الكلس محروفاً

شكل ١٤١



جديداً وقليلاً من الحامض البوريك وضع المزيج في بلبوس صغير ا شكل ١٤١
بدون ان يصبب الانبوبة شيئاً منه ثم احمه الى درجة الاشتعال فجمع الزرنيخ
عند ب. تنبيه. يجب ان تكون الانبوبة مائلة على سطح الافق خلاف ما في الرسم
لكي يجري منها الماء المستخلص من الزرنيخت لتلا برجع الى البلبوس الحامي
فيكسره. وتصلح لهذه الاعمال انابيب صغار


شكل ١٤٢



شكل ١٤٣

مثل شكل ١٤٢ من الزجاج البوهيمي الصلب
المخالي من الرصاص او انبوبة برز بلبوس

شكل ١٤٤




كشف الزرنج في امزجة من المواد الحيوانية او النباتية

تُفرز المواد الحيوانية او النباتية بواسطة ذبا ليس كما تقدم (صحيفة ١١٨) او بغلي السبال و بُرُش و يُقسَم الى اقسام لاجل الامتحان بالطرق الآتية

(١) طريقة رينش - حمض السبال تحت الفحص باضافة حامض هيدروكلوريك اليه ثم اغلوه مع بعض القطع من ورق الخاس الصرف المصفول اللامع فان كان الزرنج حاضراً يجمع على الخاس - اغسل الخاس ونشفه واطوره وضعه في انبوبة طويلة من الزجاج البوهبي قطره مثل قطر المرسومة في شكل ١٤١ مفتوحة الطرفين ثم احوه بتدليل الكحولي واجعل الانبوبة مائلة على سطح الافق فيتأكد الزرنج وينصعد ويجمع في جزء الانبوبة البارد على هيئة بلورات حامض زرنجوس

(٢) طريقة مارش - استحضرات آلة كالمرسومة في شكل ١٤٤



شكل ١٤٤ وضع في الساق الاقصر قطعة زنك صرف ثم اصف اليه الحامض الهيدروكلوريك الصرف حتى يملئ نصف الساق الاقصر ثم اصف اليه السبال تحت الفحص فان كان الزرنج حاضراً يتولد هيدروجين مزرنج. اشعل الغاز وهو خارج من الحنفية واستلق لهية على صحن صيني بارد فيجمع عليه الزرنج المعدني تنبيه - الانتيمون يجمع ايضاً على هذه الكيفية من

الهيدروجين الانتيموني ولكن اذا اُحي الزرنج بتصعد ويزول واما الانتيمون فيثبت واذا عُرض على لهب البوري يتحول الى اكسيد الانتيمون الاصفر واذا برد يبيض. الزرنج يذوب في مذوّب كلوريد الكلس خفيف. واما الانتيمون فلا يذوب فيه واذا ذوّب كبريت قليل في كبريت الشادر واضيف الى الانتيمون يذوب واذا جُفّف يبقى باقير طفاقي اللون اما الزرنج فلا يتاثر بذلك

انت م } انتيمون
انت م }

سبعة انت وزنه الجوهري ١٢٢ وزن جوهر المادي ٤٨٨

الانتيمون موجود في الطبيعة على هيئة كبريتته . وصفه أولاً باسيلوس
قلنتينوس وهو راهب في ارفورت من جرمانية في اواخر القرن الخامس عشر . قبل
انه امتحن فعله في المختابر فنفعهم ثم امتحنه في رفقائه الرهبان فمات بعضهم من فعله
فسمي انتيموناً اي ضد الراهب

يُستخلص باصهاره لاجل ازالة المواد الثرايية منه ثم يُجوى مع حديد او مع
كربونات اليوتاسا لاجل ازالة الكبريت

صفاته — هو معدن مزرق لامع سهل الانحاق ثقلة النوعي ٦.٨ يصهر عند
١٤٠°ف واذا اُحمي الى درجة الحمرة ينصعد واذا سُحق وادخل في كلور جاف
يشعل من ذاته . الحامض الهيدروكلوريك قلما يفعل فيه فيفرز به القصدير عن
الانتيمون . الحامض النيتريك يحوله الى اكسيد غير قابل الذوبان . الحامض
النيترهيدروكلوريك يذوبه تماماً واذا اُضيف الى هذا المذوب ماء يرسب
راسب ابيض . اذا اُصهر قليل منه بالبورني ثم رُمي على سطح صلب ينجر الى عدة
كرات صغار تندفع الى كل الجهات وكل واحدة مذبذبة بذيل دخان ابيض .
قلما يُستعمل في الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فمع
الرصاص يكون معدن احرف الطبع الذي يمتد عند ما يجهد بعد اصهاره .

مركبات الانتيمون ومواد الرتبة الاولى

الهيدروجين الانتيموني انت ه م — اذا وُضع زنك في مذوب اكسيد
الانتيمون واُضيف اليها حامض كبريتيك يتحد بعض الهيدروجين الصاعد
بالانتيمون وهو حينئذ يشعل بلهب مزرق واذا اسُئل في بصحن صيني بارد يجمع
عليه الانتيمون المعدني وقد تقدم ذكر كيفية تمييزه عن الزرنيخ

كلوريد الانتيمون الاول او الثالث انت كل م — سمي ايضاً زبدة الانتيمون
وهو يتولد عند استحضار الهيدروجين المكثرت بفعل حامض هيدروكلوريك
بكبريت الانتيمون الثالث ويتولد ايضاً بفعل الكلور نفسه بمسحوق الانتيمون
نفسه . ويُستحضر ايضاً باستقطار ٨ اجزاء كلوريد الزئبق الثاني و ٢ اجزاء انتيمون
صفاته — هو جامد لين سهل الاصهار يتبلور اذا برد . يوص ماء من الهواء

فيول - يُستعمل في الطب كإوتيا وفي الصناعات لكي يكسب حديد البواريد لون البرونز

كلوريد الانتيوم الخامس أو الأعلى أنت كل ه - يُستحضر بامرار غاز الكلور على انتيوم حام . هو سيال طيار لا لون له يحل الماء فيتولد حامض هيدروكلوريك وحامض انتيونيك

بروميد الانتيوم وبوديد الانتيوم بشبهان كلوريد ه الأول

مركبات الانتيوم ومواد الرتبة الثانية

أكسيد الانتيوم الأول أو الثالث أنت م م - يُستحضر باحراق الانتيوم في الهواء أو بارسائه من الكلوريد بإضافة فلوي اليه فاذا اضيف بوتاسا الى مذوب كلوريد الانتيوم يتولد ستة جواهر كلوريد اليوتاسيوم وجوهر أكسيد الانتيوم وثلاثة جواهر ماء

صفاته - هو مسحوق ابيض بصفر إذا أحمي وإذا أصر وبرد يتبلور. إذا أغمي مع مذوب ملح الطرطير ايه في طرطرات اليوتاسا يذوب ثم إذا جف السيل يتبلور منه ملح مزدوج هو طرطرات الانتيوم واليوتاسا اي الانتيوم المقي . إذا أصر كبريت الانتيوم في كور يتولد أكسيد غير نقي يعرف بزجاج الانتيوم

أكسيد الانتيوم الاوسط أنت م ا ع - يُستحضر بإجهاء الكبريت حتى لا يعود بمص أكسجيناً

صفاته - هو مسحوق رمادي عسر الاصهار لا يذوب في الماء ولا في الحوامض إلا إذا كان جديداً

حامض انتيونيك غير هيدراتي أنت م ا ه - يُستحضر بذبوب انتيوم في حامض نيترو هيدروكلوريك ثم يجفف ويكلس الباقي

صفاته - هو مسحوق مصفر لا يذوب في الماء ولا في الحوامض إذا انحل كلوريد الانتيوم الأعلى بواسطة ماء يتولد حامض متا انتيونيك وهو يتولد مع اليوتاسا ملحاً بر سب املاح الصودا فيستعمل كاشفاً لها

مركبات الانتيمون والكبريت

(١) كبريت الانتيمون الثالث انت م كم . هو موجود في الطبيعة . لونه مثل لون الرصاص . يُصهر بدون تغير . يُستحضر صناعياً باحمااء انتيمون وكبريت وبارسابه بواسطة انفاذ هيدروجين مكبريت في مذوّب الانتيمون المقيء وهو اذ ذاك مسحوق احمر على لون القرميد . اذا اُغلي مع كربونات الصودا وترشح وبرد السيل يرسب منه راسب احمر كان كثيرا استعمال في الطب هو مزيج كبريت الانتيمون واكسيده الاول و يُعرّف بالقرمز المعدني . يستعمل في عمل الشهب التي تشعل بلهب ازرق المستخدمة للاشارة ليلاً عند النواتي وهي مركبة من نترات اليوتاسا جافا ٦ اجزاء وكبريت جزئين وكبريت الانتيمون الثالث جزء واحد

(٢) كبريت الانتيمون الخامس انت م كـ - يُعرّف بالكبريت الذهبي . يُستحضر بمزج ١٨ جزءا من مسحوق الكبريت الاول و ١٧ جزءا من كربونات الصودا الجاف و ١٢ جزءا من الكلس الراوي و $\frac{1}{2}$ اجزاء كبريت فيغلي المزيج في ماء بعض الساعات فيتولد كربونات الكلس وانتيونات الصودا وكبريت الصوديوم وكبريت الانتيمون الخامس . اما الاولان فيرسبان ثم يرشح السيل ويضاف اليه حامض كبريتيك فيتولد كبريتات الصودا وهيدروجين مكبريت ويرسب راسب اصفر ذهبي اللون هو الكبريت الخامس

كواشفه - املاحه القابلة الذوبان في الماء تُكشّف بتوليدها راسبا پرطقاليا او قرميدي اللون بواسطة الهيدروجين المكبريت وهذا الراسب يذوب في كبريت النشادر ثم يرسب ايضا بواسطة حامض

اما المعدن فيظهر حسبما تقدم اذا مزج ما تحت القمص مع كربونات الصودا الجاف ثم اُحي بالبورني فيجمع المعدن على هيئة كرات يصعد عنها دخان ابيض

الزموث وهو المارقشينا

بز ٢

سبته بز وزن جوهره ٢١٠ وزن جوهره المادي ٨٤٠ تحت الشك

الزيموث موجود في الطبيعة صرفاً على هيئة كبريتو ويستخلص من الانثربة المزوجة معه بالاصهار ثم لاجل تنقيته يذوب في حامض نيتريك ويضاف الى المذوب ماء فيرسب على هيئة نحت نيتراته فيغسل الراسب ويجفف ثم يتكلس في بوظفة مع فحم فيجمع الزيموث الصرف في اسنل البوظفة

صفاته — هو جامد محمر اللون سهل الانسحاق كثافته ٩.٩ يصهر عند ٥٠٠°ف
— ٢٦٠°س وإذا زادت الحرارة ينحول الى بخار . لا يتأكسد في هواء جاف ويتأكسد قليلاً في هواء رطب وإذا أحمى في الهواء يتأكسد بسرعة . الحامض النيتريك البارد يذوبه فيتولد نترات الزيموث الثالث — املاح الزيموث لا تُرسب من مذوبها بواسطة حامض كبريتيك ولا بحامض هيدروكلوريك . اما النشادر فيرسبها على هيئة راسب ابيض يذوب في زيادة النشادر والهيدروجين المكثرت برسبها على هيئة راسب اسود لا يذوب في كبريتت النشادر ويذوب في حامض نيتريك على درجة الغليان

الزيموث يستعمل في الصنائع ممزوجاً مع بعض المعادن فالزجاج المعروف المعدن الصهير مركب من زيموث ٨ اجزاء وورصاص ٥ اجزاء وقصدير ٢ اجزاء . هو يصهر تحت ٢١٢°ف — ١٠٠°س

مركبات الزيموث والمواد المتقدمة ذكرها

كلوريد الزيموث بز كل م — هو جامد يتولد من اتحاد الكلور والزيموث يذوب في ماء محمض بالحامض الهيدروكلوريك

اكسيد الزيموث الثالث بز ٣ م — يستحضر باحمااء النترات — هو مسحوق اصفر غير هيدراتي اما الهيدراتي بز ٥ م فيستحضر بارسابه من بعض املاحه بواسطة بوتاسا

حامض بزموثيك غير هيدراتي بز ٣ م ا ه — يستحضر باضافة الاكسيد المذكور الى مذوب بوتاسا ثقيل ثم ينفذ في السبال غاز الكلور فيتولد حامض هيدروكلوريك وحامض بزموثيك فيرسب على هيئة مسحوق احمر

كبريتت الزيموث بز ٣ م ك م — يتولد بانفاذ هيدروجين مكثرت في مذوب

ملح من املاح الزموت وايضا باصهار الزموت والكبريت معا
 نترات الزموت الثالث بز ٣٠٠ م ٣ ن ا ه + ١٥١٠ - يُستخضر بنذوب
 زموت في حامض نيتريك غير ثقيل الى السبع ثم يترك مدة فينبور النترات
 على هيئة بلورات كبار . واذا ذوّبت هذه البلورات في ماء تحول الى مسحوق
 ابيض هو نترات اكسيد الزموت الثالث بز ٣٠٠ م ٣ ن ا ه + ١٥٢
 هو مستعمل في الطب وايضا لتحسين البشرة
 كربونات الزموت بز ٣٠٠ م ٣ ن ا ه - يُستخضر باضافة مذوّب نترات الزموت
 في حامض نيتريك الى مذوّب كربونات الصودا - هو مسحوق ابيض مصفر
 يُستعمل في الطب عوضاً عن النترات

اورانيوم } ا ٢ ا ٢

سينه ا و وزن جوهره ١٢٠ وزن جوهره المادي ٤٨٠
 هذا العنصر موجود في الطبيعة في بعض انواع الحجارة وهو يُستخلص مجل اول
 كلوريد بوساطة يوتاسيوم اي توضع بعض قطع اليوتاسيوم في انبوبة زجاج
 صلب وفوقها كلوريد الاورانيوم ثم يحمى الكل فينبود كلوريد اليوتاسيوم وينفرد
 الاورانيوم فتكسر الانبوبة لاجل استخراجها منها

صفاته . اذا استخضر كما تقدم فهو مسحوق رمادي قائم واذا اُحي الى درجة
 المحمرة مع كلوريد الصودوم يتحول الى جامد ابيض مصفر قابل النطرق كثافته
 جيند ١٨٢٤ يزيد اصفرارا اذا عُرض على الهواء ومسحوقه يشعل في غاز
 الكلور ويتربك مع الكبريت الغالي باشتعال . الحوامض تذيبه ويفلت جيند
 هيدروجين

مركبات الاورانيوم والمواد المتقدمة ذكرها

كلوريد الاورانيوم او ٢ كل ٣ - يتبلور على هيئة بلورات ذات ثنائي زوايا
 سريعة الذوبان في ماء تبلورها وسهلة الذوبان في الماء

سكوي أكسيد الاورانيوم او U_2O_5 - هو موجود في الطبيعة جزءاً من بعض الحجارة في بوهيميا ويُستخلص بتذويبها في حامض نيتريك فينولد سيالاً اصفر هو مذوّب نترات الاورانيوم فيجفّف ويضاف اليوايثيرالذي يذوّب النترات ويترك بقية المواد المزوجة معه فيطير الايثير ويتكلس الملح الباقي فيتكوّن الاكسيد الذي نحن في صدده.

أكسيد الاورانيوم الاسود أو UO_2 - يتولد باحماض الاكسيد الاول في نترات سكوي أكسيد الاورانيوم أو $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ - يتولد باضافة حامض نيتريك الى حجروه كما تقدم ومنه تتولد مركباته المعروفة

كواشفه - القلوبات الكاوية تولد مع املاح سكوي أكسيد الاورانيوم راسباً اصفر يتحول بالحرارة الى أكسيده الاسود

كبريتت النشادر تولد معها راسباً بني اللون - الهيدروجين المكثرت لا يولد معها راسباً - اذا اضيف الى ما تحت الفحص حامض نيتريك يتولد النترات فيُنغص بهذه الكواشف

الاورانيوم يُستعمل في الصنائع لاجل تكوين بعض الالوان بتلون بها الزجاج فالأكسيد الاول بكسبه لونا اسود والسكوي أكسيد بكسبه لونا اصفر وقد استعمل في الفوتوكرافية

الفصل الثامن

في المعادن

المعادن هي عناصر تنازعاً سواها بلعان يُعرف باللعان المعدني وبكونها موصلات جيدة للحرارة والمادة الكهربائية وقد انقسمت الى اقسام فمنهم من يقسمها باعتبار قلوية أكسيدها او الفتها للحوامض وهي بذلك ستة اقسام

(١) معادن القلوبات

پوتاسيوم	صوديوم	كيسيوم
روبيديوم	ليثيوم	امونيوم (وهي)

(٢) معادن الاتربة القلوية

باريوم	استرونتيوم
كلسوم	مغنيسيوم

(٣) معادن الاتربة الحقيقية

الومينوم	برليوم	بيريوم	اريوم	تريوم	زركونيوم
نوربوم	ثوربوم	سيربوم	لانثانوم	ديديوم	

(٤) معادن اكاسيدها قواعد قوية

منغنيس	حديد	كروم	نيكل	كوبلت	نحاس
زنك	كدميوم	بزموت	رصاص	تاليوم	اورانيوم

(٥) معادن اكاسيدها قواعد ضعيفة او حوامض

قناديوم	توتنجستن	مليدنوم	تنتالوم	نيوبيوم	تينانيوم
قصدير	انتيهون	زرنج	تلوربوم	ازميوم	

(٦) معادن تنحل اكاسيدها بالحرارة - معادن كريمة

ذهب	زبيق	فضة	پلاتين
-----	------	-----	--------

پلاديوم	أرديوم	روثينيوم	روديوم
---------	--------	----------	--------

وقد قسمها بعضهم باعتبار فعل الحرارة باكاسيدها وهي بذلك على جنسين

الجنس الاول معادن لا تنحل اكاسيدها بالحرارة وحدها

وفيه اربعة انواع

النوع الاول معادن تنحل ماء بارداً

پوتاسيوم	صوديوم	ليثيوم	باريوم
سترونتيوم	كلسيوم	كيسوم	روديوم

النوع الثاني معادن تفل الماء على ١٠٠°س

مغنيسيوم سيريوم لانتانوم ديدميوم كلوسينوم
 بيريوم اريوم تريوم زركونيوم ثوريوم الومينوم
 النوع الثالث معادن تفل الماء على درجة الحمرة وتفل الهيدروجين من الماء
 البارد اذا اضيف اليها حوامض مخففة

مغنيس زنك حديد نكل
 كوبلت قناديوم كدميوم كروم
 النوع الرابع معادن تفل الماء على درجة الحمرة ولا تفل الهيدروجين من
 الماء البارد اذا اضيف اليها حوامض مخففة

فصدير انيمون اورانيوم تينانيوم ملبدنوم
 نيجستن يلوپيوم نيويوم تنالوم ازميوم
 النوع الخامس معادن تفل الماء على درجة البياض من الحرارة فقط ولا تفل
 الهيدروجين من الماء البارد بمساعدة حوامض
 نحاس رصاص بزموت

الجنس الثاني

معادن تفل اكاسيدها بالحرارة وحدها

النوع السادس - معادن لا تفل الماء على اية حرارة كانت وتمص اكسجيناً
 على بعض درجات الحرارة وتفل اكاسيدها بجمارة شديدة

زبيق روديوم
 النوع السابع - معادن لا تمص اكسجيناً على اية حرارة كانت ولا تفل الماء
 اما اكاسيدها فتفل بالحرارة

فضة ذهب يلاديوم
 پلاتين روثنيوم ايرديوم
 وقد انقسمت المعادن على نسق انقسام المواد الشبيهة بالمعدنية المار ذكره

في الفصل الاول (صفحة ٨٢) اي باعتبار كونها ذات جوهري واحد او ذات جوهريين
او ذات ثلاثة جواهر (انظر صفحة ٧١) وهي بذلك اربع رتب

الرتبة - الاولى معادن ذات جوهري واحد

فضة ليشيوم صوديوم

پوتاسيوم روبيوم كيسيوم

الرتبة الثانية - معادن ذات الجوهريين

كلسيوم باريوم سترونتيوم مغنسيوم سيريوم لثانوم

ديسيوم يوروبيوم ارييوم ترييوم ثوريوم ذلك

كديسيوم نحاس زئبق

الرتبة الثالثة - معادن ذات ثلاثة جواهر

ذهب ثاليوم قناديوم

الرتبة الرابعة - معادن ذات اربعة جواهر

الومينوم كلوسينوم منغنيس حديد كروم

كوبلت نكل رصاص پلاتين پلاديوم

الرتبة الخامسة - معادن ذات خمسة جواهر

الى الآن لم يُكشَف عن معادن من هذه الرتبة

الرتبة السادسة - معادن ذات ستة جواهر

مليديوم تونجستن ايرديوم روديوم روثينيوم

خصائص المعادن المشتركة

ان جميع المعادن مظلمة واذا تطرقت حتى ترق نصير نصف شفافة كما يرى
في رق الذهب فان الشعاع المخضر تنفذ فيه . فاذا كان ترقيق معدن ممكنا
بواسطة الطرق او الضغط بين اسطوانتين سمي قابل الطرق او الترقيق والاع
قسي مشيما او فصفا اي سهل الانقصاص والكسر اما القابلة الترقيق فيمكن سحبها
ايضا على هيئة شريط وهاك ترتيب المعادن القابلة الترقيق والسحب حسب
قابلية كل واحد

رتبة المعادن حسب قابليتها التريق	رتبة المعادن حسب قابليتها السحب
(١) ذهب	(١) ذهب
(٢) فضة	(٢) فضة
(٣) نحاس	(٣) پلاتين
(٤) قصدير	(٤) حديد
(٥) پلاتين	(٥) نكل
(٦) رصاص	(٦) نحاس
(٧) زنك	(٧) زنك
(٨) حديد	(٨) قصدير
(٩) نكل	(٩) رصاص

جميع المعادن صالحة لوصل الحرارة والكهربائية غير انة بينها تفاوت من هذا القبيل وجميعها قابلة الاصهار بعضها بجمارة قليلة وبعضها بجمارة عالية جداً وقد تحول اكثرها الى بخار بواسطة البوري الاكسيدروجيني وكثافتها تفوق كثافة الماء ما عدا المعادن القلوية

الفصل التاسع


في المعادن من الرتبة الاولى اي ذات الجوهر الواحد

{ پوتاسيوم پ

سبعة پ وزنة الجوهري ٣٩ وزن جوهر المادي ٧٨
الپوتاسيوم موجود في بعض الصخور مركباً مع السليكون على هيئة سليكات
الپوتاسا ومن تفتت تلك الصخور من قبل فعل الشمس والهواء والمطر ينتج
بالتراب فتمصه النبات واذا احترقت يبقى الپوتاسا في رمادها ومنه يستخلص
بالغسل والتجفيف كما سيأتي. اما الپوتاسيوم فكتشفه اولاً دافني سنة ١٨٠٧ مجل
الپوتاسا بواسطة بطارية كلفانية قوية

استحضاره - يكس الطرطير التجاري في وعاء حديد مغلى ومتى برد يُسحق
ويضاف اليه عشرة فم على هيئة قطع صغار ثم بوضع حالاً في انبيق حديد ذي
انبوبة نافذة الى قابله مبردة فيها نطف فيصلى الى قرب درجة البياض فيتولد

أكسيد الكربون وپوتاسيوم اما الاكسيد فينلت واما الپوتاسيوم فيصعد ويطير
قطرات قطرات الى النفط وهذا تعليل المحل والتركيب



صفاته - هو معدن لامع ايض بسود سطحه سريعاً اذا عُرِض على الهواء
لين كالشمع على حرارة الهواء الاعتيادية وقصف وبلوري عند ٢٢°ف - س
يُصهر عند ١٢٦°ف - ٥٧٢°س وبتسقطر على حرارة دون الحمرة قليلاً ثقله
النوعي ٢.٨٦٥ له شراهة زائدة الى الأكسجين فينضي حفظة تحت سائل خالٍ
من الأكسجين مثل النفط واذا طُرِح في الماء يعوم على سطحه ويجل الماء ويشعل
من سرعة اتحاده مع أكسجينه وتهيئه بنفسي وهذا اللون مما يميز الپوتاسيوم ومركباته
عن الصوديوم ومركباته فان لهيها اصفر وعند نهاية الاحتراق تسقط في الماء قطعة
صغيرة من الپوتاسيوم كان رافعها الهيدروجين المشعل وهي حامية جداً فنحول
الماء الذي تمس الى بخار بغنة ومن هذا القبيل التفرع المحاصل عند نهاية احتراق
قطعة پوتاسيوم على سطح ماء واذا طُرِح على سطح ماء لتوس محمر يرجعه الى
اللون الازرق بتوليد پوتاسا وذوبانه في الماء

مركبات الپوتاسيوم والمواد الشبيهة بالمعدنية ذات الجوهر الواحد

كلوريد الپوتاسيوم پ كل - اكثره يُستخلص من رماد اعشاب البحر
فيحصل منه على نحو ٢٠ جزءاً من كل مئة جزءه . يشبه كلوريد الصوديوم في
صفاته الظاهرة ومثله ينلور على هيئة كعوب . ثقله النوعي ١.٨٤ طعمه مالح مر
يدوب في ثلاثة امثاله وزناً من الماء البارد ويعول الى بخار بجمارة عالية

بوديد الپوتاسيوم پ ي - هذا المركب يُستحضر على طرق شتى

(١) يدوب يود في مذوب پوتاسا كاو خالٍ من كربوناته فينولد منها سائل
لاألون له فيه بوديد الپوتاسيوم ويوديد الپوتاسا ومتى ابداً الماء بتلون يُجفّف

ويُحوّل إلى الحمرة وبذلك يتحول بوديد البوتاسا إلى بوديد البوتاسيوم ثم يذوّب في ماء وبرشخ وينبلور

(٢) توضع برادة حديد أو قطع زنك ويود في ماء ويُترك الكل في موضع دافئ حتى يفتح اليود والمعدن فيكون السيل صافياً لا لون له ثم يرشخ ويضاف اليه مذوّب كربونات البوتاسا صرفاً شيئاً فشيئاً حتى يغفل اليوديد تماماً فيكون في السيل بوديد البوتاسيوم ذاتياً ويرسب كربونات اول أكسيد الحديد أو الزنك فيجفف السيل حتى ينبلور بوديد البوتاسيوم

صفاته - بلوراته على هيئة كعوب مرّة المذاق منها شفافة ومنها بيضاء خالية من ماء النبلور تصهر إذا أُحميت وتذوب في الماء وفي الكحول ومذوّبة في ماء يذوّب اليود كثيراً ما يمزج به كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم ويكشف عنها بتدويب قليل منه في ماء ثم يضاف إلى المذوّب نترات الهلأديوم حتى لا يعود يرسب منه راسب وبذلك يُترع اليود من السيل ثم يرشخ ويضاف إلى السيل بعد ترشخه نترات الفضة فإن تعكركون من قبل كلوريد ما بروميد البوتاسيوم پ پ - يُستحضر على طريق استحضار اليوديد وبشبهه في صفاته الخارجية

مركبات البوتاسيوم ومواد الرتب ذات أكثر من جوهر واحد

أكسيد البوتاسيوم الاول پ م ا - يُستحضر بإحماة هيدرات البوتاسيوم وبوتاسيوم في بوظفة فضة - هو قاعدة غير هيدراتية قوية يولد مع الماء بوتاسا هيدراتياً ومع المحامض املاحاً ولا اعتبار له إلا من هذا القبيل
هيدرات البوتاسا أو بوتاسا كاو پ ه ا - إذا أُحرق بوتاسيوم في هواء جاف يتحول إلى مادة بيضاء طيارة قابلة الاصحار هي البوتاسا غير الهيدراتي المار ذكره وإذا اهل ماء تظهر حرارة كثيرة ويتحول إلى بوتاسا هيدراتي
يُستحضر بحل كربونات البوتاسا بواسطة هيدرات الكلس - يذوّب ١٠ أجزاء كربونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويحوّل المذوّب إلى درجة الغليان في وعاء مبيّض أو وعاء فضة ثم تُروى ٨ أجزاء كلس جيد في وعاء مغلي وهذا الكلس

الهيدراتي بضاف شيئاً فشيئاً الى المذوب الاول في حالة الغليان ويحرك دائماً ومتى اضيف اليه كل الكلس بقليلاً ايضاً ثم يغطى ويرفع عن النار وبعد برهة يسيرة يكون السبال قد راق فيصنّى من كربونات الكلس الراسب ويُنخّن بعض السبال هل يفور اذا اضيف اليه حامضٌ ما ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء عنه فالباقي هو بوتاسا هيدراتي كاو

صفاته - هو جامد ايض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون تحت اللس يمص الماء من الهواء ويزوب فيه . هو قاعدة قوية بعيد لون اللثيموس الازرق بعد تخميره بمحامض وبشبع اثقل الحوامض . كاو واذا صبّ في قوالب اسطوانية يستعمل في الطب والمجراحة للكوي . يتركب مع الحامض الكربونيك في الهواء فيجب حفظه في اوعية محكمة السدّ والماء لا يطرد منه بالحرارة وحدها بل اذا اُحي الى درجة عالية يتحول الى بخار او اذا بقي شيئاً من الاكسيد الاول يمص اكسجيناً من الهواء حالاً ويتحول الى الاكسيد الرابع پ اء .
اكسيد البوتاسا الرابع پ اء - هو مسحوق اصفر اذا عرض على الهواء يجسر بعض اكسجينه ويمص ماء ويتحول الى بوتاسا هيدراتي

كربونات البوتاسيوم المتعادل
 كرا
 پ اء - يستحضر بترشيح ماء عرن
 رماد مواد نباتية ابي بوضع الرماد في براميل مثقوبة من اسافلها ويصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب منه الاملاح القابلة الذوبان لاسبابا كربونات البوتاسيوم ثم يجفف الماء فينبغي كربونات البوتاسا التجاري غير النقي ابي المزوج معه سليكات البوتاسا وكبريتات البوتاسا وكلوريد البوتاسيوم فيوضع عليه ماء بارد الذي يذوب الكربونات وحده ثم يرشح ويجفف فينبيلور الكربونات الصرف حاملاً جوهرين من ماء النبلور

صفاته - هو ملح ايض يذوب في ماء تبلوره قلوي يذوب في اقل من وزنه ماء ولا يذوب في الكحول . اذا اُحي بطرد عنه ماء النبلور . يتركب مع جميع الحوامض وينت منه الحامض الكربونيك وهو كثير الاستعمال في الصنائع
 لي كربونات البوتاسيوم كر پ اء ه - يستحضر بانفاذ مجرى حامض

كربونيك في مذوب كربونات الهوتاسا ثقيل فيرسب اليكربونات على هيئة بلورات بيض فيجمع وينوب ايضاً في ماء سخن ثم يتبلور صفائه - قابليته للذوبان في ماء اقل من قابلية الكربونات لذلك فيذوب في اربعة امثال وزنه ماءً وإذا اغلي بفلت منه حامض كربونيك وإذا احميت بلوراته تتحول الى الكربونات

نترات الهوتاسيوم پ { ٢١ ن ١ - قد تقدم ذكر كيفية توليده في الاتربة

فتغسل بعض الاتربة لاجل تذييبها منها ثم يجفف السيل فيتبلور الملح وهو موجود على سطح الارض في بعض الاماكن ويستخرج ايضاً بحل نترات الصوديوم الطبيعي بواسطة كلوريد الهوتاسيوم اى يغلى هذان المركبان معاً فيتولد كلوريد الصوديوم ونترات الهوتاسيوم فيرسب الاول ما دام الماء سخناً ويبقى الثاني ذاتياً فيصفي الماء عن الراسب ما دام سخناً ثم يجفف فيتبلور نترات الهوتاسيوم

صفائه - هو ملح متعادل يتبلور على هيئة منشورات ذوات ستة اضلاع اطرافها اهرام ذوات ستة اضلاع . يذوب في سبعة امثاله ماء عند ٦٠°ف - ١٥٥°س وفي مثله ماء على ٢١٢°ف . يصهر بجملة دون درجة الحجرة ويحل بجملة عالية . اذا طرح على حجر ينفرع تفرعاً ضعيفاً واذا مزج مع مواد قابلة للاشغال واصابته شرارة ينحل بسرعة ويتفرع بشدة وبناء على ذلك يستعمل في اصطناع البارود

البارود - البارود مزيج مركب من نترات الهوتاسيوم وكبريت وفحم مسحوق على هذه النسبة اى

٧٥	علا	٧٤٠١	نترات الهوتاسا كيمياوياً
١٥	.	١٣٤٢	فحم
١٠	.	١١٢٩	كبريت
<hr/>		<hr/>	
١٠٠		١٠٠	

قوة البارود الدافعة متوقفة على احالة هذه المواد الى غازات بغنة لاسيا

توليد نيتروجين وحامض كربونيك وجرم هذه الغازات المتولدة يعدل نحو ٢٠٠ مرة جرم البارود نفسه على الحرارة الاعتيادية وبالحرارة المتولدة من اشتعالها يزيد جرمها كثيراً حتى يعدل بالاقل ١٥٠٠ مرة جرم البارود

كلورات البوتاسيوم كل $\left. \begin{array}{l} \text{ك} \\ \text{پ} \end{array} \right\} \text{ا} - \text{بُستخضر بانفاذ مجرى من غاز}$

الكلور في مذوب بوتاسا كاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يحفف السيلال ويبرد فينبور منه الكلورات على هيئة صفائح خالية من ماء التبلور صفائه - يشبه نترات البوتاسا في بعض صفاته - يذوب في ٢٠ جزءا ماء بارداً وجزئين ماء سخناً. اذا اُحي بخسر اكسجينه ويبقى كلوريد البوتاسيوم فيستعمل لاجل استخراج اكسجين. اذا اضيفت اليه مواد قابلة للاشتعال يغفل بفرقع فاذا مزج مع مثله كبريتاً وسحق او طرُق بفرقع بشدة فلا يصلح لاصطناع البارود عوضاً عن النترات واذا مزج مع مسحوق السكر واضيف اليه قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة وهكذا ايضاً مزيج من الكلورات والكبريت والليكو بوديوم

هيوكلوريت البوتاسيوم كل $\left. \begin{array}{l} \text{ك} \\ \text{پ} \end{array} \right\} \text{ا} - \text{هو المسمى سابقاً اعلى كلورات البوتاسا} - \text{بُستخضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بوتاسا كاو خفيف فينولد كلوريد البوتاسيوم وهيوكلوريت البوتاسا ولا يمكن افراد الواحد من الآخر وقد سمي السيلال ماء جاقال فاذا اصابه حامض ما يخسر كل كلور فيستعمل للتبييض ولازالة المواد المعدية$

وبُستخضر ايضاً بطرح مسحوق الكلورات في حامض نيتريك سخن فينحل الحامض الكلوريك وينولد اكسجين وحامض كلوريك اعلى الذي يتركب مع البوتاسيوم

كبرينات البوتاسيوم المتعادل $\left. \begin{array}{l} \text{ك} \\ \text{پ} \end{array} \right\} \text{ا} - \text{الحامض الباقي في}$



الانبيق بعد استخراج الحامض النيتريك يذوب في ماء ثم يشع كربونات البوتاسا فتمت برد السيلال بنبور منه الكبرينات المتعادل.

صفائه - هو ملح متعادل يذوب في ١٠ اجزاء ماء بارد. لا يذوب في

الكحول وبلوراته خالية من ماء البلور ومع ذلك يتفرغ إذا طُرِح في النار

في كبريتات البوتاسيوم كما $\left\{ \begin{matrix} \text{ا} \\ \text{پ} \\ \text{ه} \end{matrix} \right\} \text{م} -$ يُستحضر باحمااء الكبريتات

المتعادل مع نصف وزنه حامضاً كبريتيكاً في وعاء پلاتين ومتى كَفَّ صعود بخار الحامض يترك حتى يبرد ثم يذوّب الباقي في ماء سخن ثم يترك حتى يتبلور اول كبريتات البوتاسيوم پ م ك - يذوّب بوتاسا هيدراتي في ماء ويُقسم المذوّب الى قسمين ثم يشبع قسم واحد منها حامضاً هيدروكبريتيكاً ويزاد الحامض فوق شبع البوتاسا ثم يضاف اليه القسم الآخر فيتولد في الاول هيدروكبريتات البوتاسيوم وعند ما يضاف اليه القسم الثاني يتولد كبريتات البوتاسيوم وماء وهذا تعليل المحل والتركيب



يُستحضر ايضاً باحمااء بوتاسيوم مع كبريت

صفاته - هو جامد بلوري احمر يذوب في الماء ومذوّبه كربه الطعم حريف ينحل بسهولة بالحوامض حتى بالحامض الكربونيك فيصعد عنه هيدروجين مكثرت اما المادة المعروفة بكبد الكبريت فهي مزيج من پ ك م وپ ك ه مع قليل من هيوكبريتيت البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم ويستحضر باحمااء كربونات البوتاسا وكبريت معاً فاذا كانا متماثلين وزناً ولم تكن الحرارة فوق ٤٨٢° ف - ٢٥٠°س يتولد ٢ (پ ك ه) + پ ا ك م ا و إذا زادت الحرارة الى قرب درجة الاشتعال يتولد پ ك ه + ٢ (پ ا ك م) و إذا اضيف الى كل من

هذين المزيجين الكحول بذوب الكبريت الخماس (ب ك ه) وإذا كان وزن الكبريت نصف وزن الكربونات يتولد ب كم
كواشف املاح البوتاسيوم (١) هي جميعها لا لون لها ان لم يخاطها أكسيد ما ملون او حامض ملون

(٢) لا ترسب بواسطة كربونات قلوي

(٣) الحامض الطرطريك يرسبها على هيئة راسب ابيض هو في طرطرات البوتاسا اي ملح الطرطير ويزيد الراسب اذا انهر السبال

(٤) مذوب في كلوريد البلاتين مع قليل حامض هيدروكلوريك يولد معها راسباً اصفر بلوري وهو ملح مزدوج مركب من في كلوريد البلاتين وكلوريد البوتاسيوم واحياناً لا يحتاج الى الحامض الهيدروكلوريك لكي يظهر هذا الراسب ويعين العمل اضافة قليل الكحول الى المذوب لان في طرطرات البوتاسا وهذا المركب كلاهما بذوب في نحو ٦٠ جزءاً من الماء البارد

(٥) الحامض الكلوريك الاعلى والحامض الهيدروفلوسيليك بولتان معها راسب أيضاً بذوب القليل منها في ماء

(٦) املاح البوتاسا اذا كانت صرفاً تكسب هيب البوري المخارجي لونا بنفسياً

(٧) اذا نظرت الى هيبها بالسيكتروسكوب برى خطان الواحد بوافق A والاخر B من خطوط فراونهوفر (انظر صحيفة ٢٩) وخط في اللون البنفسجي بقرب خط H غير ان الذي عند B ضعيف لا يرى ان لم يكن النور شديداً

{ صود يوم ص

سبعة ص وزنة الجوهري ٢٣ وزن جوهر المادي ربما ٤٦

هذا العنصر كشفه دافني بعد كشف البوتاسيوم بقليل بواسطة البطارية الكلفانية. اما وجوده في الطبيعة فكثير جداً على هيئة كلوريد الصوديوم اي ملح الطعام في المياه المالحة وفي معادن ملح وفي النبات لاسباب الاعشاب البحرية على هيئة كربونات الصودا

استحضاره - يستحضر على طريقة استحضار البوتاسيوم اي تذوب ستة اجزاء

كربونات الصودا غير الهيدراتي في ماء سخن قليل ويضاف اليه جزءان من الفهم المحقوق سحقاً ناعماً وجزء واحد من الفهم غير المحقوق على هيئة قطع صفار فيجفف الكل ثم يُنقل الى انبيق حديد له فك داخل في وعاء تحت سطح نبط صرف كما ذكر في الهوناسيوم فيجئى الى درجة البياض فيستنظر الصوديوم ويسقط في النفط

صفاته — هو معدن ابيض فضي ابن على حرارة الهواء الاعتيادية بصره عند ١٩٤°ف — ٩٠°س ويتأكسد سريعاً في الهواء . ثقله النوعي ٢٧٢.٠٤ اذا ألقي في ماء بارد يجمد بسرعة واذا ألقي في ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون . يتركب مع المواد ذوات الجوهري الواحد والجوهريين

كلوريد الصوديوم ص كل — هذا المركب اي ملح الطعام موجود في الطبيعة بكثرة كما تقدم في مياه البحر ومياه بحيرات مالحة ويستحضر بتخفيف هذه المياه فينبلور الملح على هيئة كعوب غير هيدراتية لكنها تنفرق اذا طرحت في النار بسبب الماء المحصور بين صفائح بلوراتها وهو موجود ايضاً في معادن منها معادن الملح الصخري في كراكو من بلاد بولونيا . ثقله النوعي ٢١٢.٢ يدوب في نحو ٢ ١/٢ جزء ماء عند ٦٠°ف — ١٥°س والحرارة لا تزيد الماء قوة على تذويبه

بوديد الصوديوم ص ي — يستحضر بارسايه من مذوب بوديد المحديد او زنك بواسطة كربونات الصودا . ينبلور على هيئة كعوب غير هيدراتية سهلة الذوبان في الماء

بروميد الصوديوم ص ب — يستحضر كما ذكر في البوديد . بلوراته على هيئة كعوب غير هيدراتية سهلة الذوبان في الماء مثل البوديد

أكسيد الصوديوم او صودا غير هيدراتي ص ا — يستحضر باجاء صوديوم في الهواء الجفاف فيشعل ويتحول الى مادة بيضاء هي الصودا غير الهيدراتي

صودا هيدراتي ص ه ا — يستحضر بتذويب الكربونات في ماء ثم حله بواسطة كلس هيدراتي كما تقدم في الهوتاسا

جدول دال على مقدار الصودا في مذوبه حسب كثافة السيلال

كثافة	كمية الصودا	كثافة	كمية الصودا	كثافة	كمية الصودا
في المئة	في المئة	في المئة	في المئة	في المئة	في المئة
٢٤٠	١٤٤٤	٢١٠	١٤١٢	١٤٠	١٤٠٧
١٤٨٥	١٤٤٠	٢٩٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦
١٤٧٢	١٤٣٦	٢٦٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦
١٤٦٣	١٤٣٦	٢٣٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦
١٤٥٥	١٤٣٦	١٩٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦
١٤٥٠	١٤٣٦	١٦٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦
١٤٤٧	١٤٣٦	١٣٤	١٤٠٦	١٤٠	١٤٠٦

أكسيد الصوديوم التالي ص ١٢٠ - يُستخضر بإحساء صوديوم في هواء جاف إلى درجة ٣٩٢°ف - ٢٠٠°س. لونه ابيض واذا أُحمي بصفرة ثم يبيض أيضاً اذا برد واذا أُحمي مذوباً على حمام مائي يخل الى الكسجين واول أكسيد الصوديوم اي صودا

كربونات الصودا المتعادل كرا } صا - يُستخضر بغسل رماد الاعشاب

البحرية وايضاً من كلوريد الصوديوم ومن كبريتات الصودا. يوضع نحو ٦٠٠ ليبرا من ملح الطعام على بلاط فرن او كوري يحمى من تحتو ويصّب عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزناً من الحامض الكبريتيك على ثقل نوعي ١٤٦ فيصعد غاز الحامض الهيدروكلوريك وبفلت من المدخن او مجمع بواسطة مناسبة فيجول الملح الى كبريتات الصودا وهذا العمل يقتضي له نحو ٤ ساعات وينبغي ان يصنع بغاية الحرص والتدقيق ثم يُسحق الكبريتات ويمزج بما يماثل وزناً من الكلس او الطباشير ونصف وزنه من الغم المسحق ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويترك دائماً ومنى تم المحل والتركيب تُسحب المادة المصهورة من الكور الى حوض ويترك حتى يبرد ثم يكسر ويغسل بماء ويحذف السيلال ثم يكلس مع نشارة الخشب في كور فالمحاصل هو كربونات الصودا التجاري فيه من الصودا ما بين ٤٨ و ٥٢ في

المئة من الصودا الصرف وإذا ذُوب هذا الملح في ماء سخن وترشح وترك حتى يبرد
تدرجاً تبلور منه الكربونات على هيئة بلورات صافية - يذوب في جزئين من
الماء البارد وفي أقل من وزنه من الماء السخن

في كربونات الصودا كرا } ص ١٥ - هو موجود طبيعياً في بعض المياه

المعدنية منها ماء قبيجي ويُستحضر بانفاذ مجرى من الحامض الكربونيك في مذوب
الكربونات بارداً وهو موجود أيضاً على شطوط بعض البحيرات في أفريقيا ويسمى
حينئذ ناظرونًا - هذا الملح يذوب في ١٠ أجزاء ماء على ٦٠°ف - ١٥°س ولا
يرسب مذوب مغنيسا من مذوب املاحه وإذا أُحيى ينحول الى الكربونات المتعادل

كبريتات الصودا المتعادل كرا } ص ١٥ - يُستحضر بإضافة حامض

كبريتيك الى كربونات الصودا الى الشبع وهو الباقي في الانساق بعد استحضار
الحامض النيتريك بواسطة نترات الصودا وحامض كبريتيك - يذوب في مثلي
وزنه ماء بارداً والماء يزيد قابلية على تذويبه الى ١١°ف - ٢٢°س وفوق هذه
الدرجة تقل قابلية الماء الى تذويبه . هو مر المذاق مسهل وعليه تتوقف افادة
بعض المياه المعدنية

في كبريتات الصودا كرا } ص ٢ + ماء - يستحضر بإضافة ٧ أجزاء

حامض كبريتيك الى ١٠ أجزاء الكبريتات المتعادل ثم يجفف ويحوى . هو كثير
الذوبان في الماء ويحترق اللنموس وإذا أُحيى كثيراً يخسر جوهراً من الحامض
غير الهيدراتي وينحول الى الكبريتات

هيبوكبريتيت الصودا كرا } ص ١٥ - يُستحضر بانفاذ مجرى من غاز

الحامض الكبريتوس في مذوب الكربونات ثم يضاف الى المذوب كبريت ويحوى
قليلاً مدة ايام ثم يجفف السبال فينبلور الملح . وهو كثير الاستعمال في الفوتوكرافية
لانه يذوب كلوريد وبروميد ويوديد الفضة

نترات الصوديوم } ٢١ ن
 ١ - هو موجود في الطبيعة في بلاد بيرو من
 اميركا الجنوبية - يذوب في ماء تبلور والماء يذوب منه جانباً عظيماً و يذوب
 في الكحول وأكثر استعماله لاجل استخراج الحامض النيتريك عوضاً عن نترات
 البوتاسا ولكنه لا يصلح لاصطناع البارود

فصفات الصودا ذو القواعد الثلاث ٢ ص ١٥١ ف ا ٥ + ١٥٢٤ - يُستحضر
 باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وفي صفات
 الكلس ثم برسب في صفات الكلس باضافة كربونات الصودا الى السيل ثم
 تجفف فينبلور الملح على هيئة منشورات معينة ماثلة على قواعدها

فصفات الصودا والنشادر والماء ص ان ٥ ٤ ا ه ا ٥ + ١٥٢٤ (١٥) -
 يعرف بالملح المكروكوسي ويُستحضر باحماه ستة اجزاء صفات الصودا وجزئي ماء
 حتى يذوب كل الفصفات ثم يضاف الى المذوب جزءاً من مسحوق ملح النشادر
 فيرسب كلوريد الصوديوم ويتزع بترشيح السيل ثم يجفف فينبلور الملح الذي نحن
 في صدده اي صفات الصودا والنشادر . هو سهل الذوبان في ماء ويستعمل في
 احماه بعض المواد بالبورى مسيلاً . يتكون ايضاً في البول اذا ترك حتى يفسد
 فصفات الصودا ذو القاعدتين او بيروفصفات الصودا ٢ ص ا ف ا ٥ ١٠
 (١٥) - يُستحضر باحماه الفصفات الى درجة عالية ثم يذوب الباقي في ماء ثم
 يبلور . بلوراته لامعة ثابتة في الهواء ومذوبها قلوي

فصفات الصودا ذو القاعدة الواحدة او متافصفات الصودا ص ا ف ا ٥ -
 يُستحضر باحماه الفصفات ذي القواعد الثلاث

في بورات الصودا او بورات الصوديوم ٥ ص ١٢ + ١٠ ماء - قد
 ذكر وجوده في الطبيعة (صحيفة ١٤٠) في بلاد تبت واميركا الجنوبية على
 هيئة بلورات مسدسة الاضلاع تُعرف بالنيكال ويُستحضر باضافة كربونات الصودا
 الى الحامض البوريك المستحضر بنجفيف مياه بعض البحيرات في طسكانا كما تقدم
 صفاته - يزهر في الهواء و يذوب في ١٠ اجزاء من الماء البارد و ٦ اجزاء من
 الماء سخن . اذا اُلقي على معدن حامٍ يذوب و يذوب أكسيد المعدن فيكسي

سطحها حتى لا يتأكسد بعد ولذلك يُستعمل مسيلاً أو لاجل الاعانة على الحمام بعض المعادن ببعض اذ يحفظ السطوح التي يُقصد الحمامها من التآكسد. ويُستعمل ايضاً كاشفاً عن بعض المعادن تحت البوري فاذا اُصهرت بلورة منه على راس شريط پلاتين في لهيب البوري واُضيف اليه شيء من المادة تحت الفحص تُعرف باللون الذي يكسبه البور منها فمع اكسيد الكروم يكسب لوناً اخضر زمردني ومع الكوبلت يصير ازرق ومع المنغنيس بنفجياً ومع الحديد اصفر وقس على ذلك

كبريت الصوديوم ص ك - يُستخضر على طريقة استخضار كبريت الپوتاسيوم - هو جزء من اجزاء اللازورد الصناعي على ما يُزعم - كاواين ٢٧ جزءا وكبريتات الصودا ١٥ جزءا وكربونات الصودا ٢٢ جزءا وكبريت ١٨ جزءا وفحم ثمانية اجزاء. يُمجى الكل في بواطق كبار ٢٤ او ٣٠ ساعة ثم يُمجى في صناديق حديد حتى يكتسب اللون الازرق المطلوب ثم يُسحق ويُغسل ويُجفف فيصير اللازورد التجاري غير الطبيعي

هيوكلوريت الصوديوم كل ص ا - لم يُستخلص منفرداً بل يتولد في السيال المعروف بسيال لابرانك الذي هو مزيج من كلوريد الصوديوم وهيوكلوريت الصوديوم يُستعمل للتبييض ولاصلاح الالهوية الفاسدة المعدية

كواشف املاح الصودا - (١) املاحه مثل املاح الپوتاسا لا تُرسب بواسطة قلوبات كربونية وكلها قابلة الذوبان في الماء الا انيونات الصودا (٢) في كلوريد الپلاتين لا يُرسب املاحه ولا تُرسب بواسطة حامض طرطريك ولا كلوريك اعلى ولا هيدروفلوسليسيك

(٣) في منا انيونات الپوتاسا بولد معها راسباً ايضاً بلورياً

(٤) اذا كانت املاح الصوديوم كثيرة في سائل ما يرسبها الحامض اليوديك الاعلى على هيئة اعلى بودات الصوديوم

(٥) اذا اوقدت املاح الصوديوم ونُظر الى نورها في السبكتروسكوب يرى خط اصفر يوافق خط D من خطوط فراونهوفر (انظر صحيفة ٢٩)

لثيوم

سبته ل وزن الجوهري ٧ وزن جوهره المادي ٧
 أكسبه موجود في الطبيعة في بعض الحجارة وبعض المياه المعدنية
 صفاته - هو معدن ابيض مثل الصوديوم يصهر عند ٢٥٦°ف - ١٨٠°س
 ثقله النوعي ٢٥٩. فهو اذا اخف الجوامد المعروفة. املاحه تلون لهيب البوري
 الخارجى احمر قرمزيًا وبالسبكروسكوب كُشف عنه في صخور كثيرة وفي ماء
 البحر ورماد النبات وفي اللبن والدم الانساني وهو يُعرف بخط اصفر ضعيف بين
 B و C وآخر احمر قان بين A و B

روبيديوم

سبته روب وزن الجوهري ٨٥٢٦٦ وزن جوهره المادي ٨٥٢٦٦

كيسيوم


سبته كي وزن جوهره ١٢٢٢٠٢٦ وزن جوهره المادي ١٢٢٢٠٢٦
 هذان المعدنان موجودان في بعض الحجارة وبعض المياه المعدنية كشفها
 بونسن وكركهوف بواسطة السبكروسكوب اما الروبيديوم فيعرف بخطين
 بنفجيين بين G و H وخطين احمرين قبل A واذا كان صرفاً ترى ايضا
 خطوط اخر خضر وحمروصفر بين C و F اما الكيسيوم فيعرف بخطين ازرقين
 بين F و G وخطوط حمروصفر وخضر بين B و E

امونيوم

سبته ن ه ٤ - هذا المركب قد ذُكر بالكفاية صحيفة ١٦٦ وهو يتركب
 مع غيره كانه عنصر ولندكر هنا مركباته مع غيره اما سبب الزعم بوجود عنصر
 معدني يسمى امونيوم فهو هذا - اذا وُضع قليل من الزئبق على قطعة پوتاسا
 كاو مبلولة على صحن پلاتين ثم اوصل الزئبق والپوتاسا بقطب بطارية سلفي
 واوصل الپلاتين بالاجاي فينجل الپوتاسا ويتولد ملغم الزئبق والپوتاسيوم ثم اذا


جُعِلَ في هذا العمل ملح النشادر عوضاً عن البوتاسا يتولد ملغم ايضاً سمي الملغم النشادري. ضع ١٠٠ جزء زيتي وزناً وجزءاً واحداً من البوتاسيوم او الصوديوم في انبوبة كثيف واحمهما على قندبل الكحولي فينخدان باشتعال ثم متى برد الملغم ضعه في كاس من الخنزف الصيني وضع عليه مذوب ملح النشادر ثقيلًا فينتفخ الزيت ويزيد جرماً ويتولد ملغم ولا يزيد الوزن الا نحو $\frac{1}{1800}$ او $\frac{1}{3000}$ واذا ترك هذا الملغم لنفسه يغفل الى زيتي ونشادر وهيدروجين وراي الاكثرين الآن هو ان المركب ن ه ل ه بعض خصائص المعادن العنصرية كما ان المركب ميانوجين (كن) له بعض خصائص الكلور

كبريتت الامونيوم وهيدروكبريتات الامونيوم - اذا مزج جزءان من غاز الحامض الهيدروكبريتيك واربعة اجزاء من غاز الامونيا الجاف تتولد مادة



واذا مزج منها جزءان فقط من كل واحد تتولد مادة صفراء طيارة هي هيدروكبريتات الامونيوم ن ه ل ه ك ولا يستعملان الا مذوبين في ماء فاذا

خفف ماء النشادر بماء ثم اشبع غاز الهيدروجين المكبرت يتولد هيدروكبريتات النشادر وهو لونه اولاً ثم بصفره واذا اضيف اليه مثله ماء النشادر يتحول الى الكبريتت هكذا




ولهذين المركبين خاصية ارساب اكثر المواد المعدنية المذوبة فكثيراً ما تستعملان في الكشف عن تلك المواد

كلوريد الامونيوم ن ه ل ه كل - يتولد من تركيب غاز الحامض

الهيدروكلوريك وغاز النشادر هكذا



نشادر حامض هيدروكلوريك كلوريد الامونيوم
 وكان يُستخضر سابقاً من زبل الجبال وحيثما صُطِّع أولاً بقرب هيكل زفس امون
 في شمالي افريقيا سي امونيا نسبة اليه وهو الآن يُستخضر من العظام والبول والمواد
 الباقية بعد استنفار غاز الفحم باضافة حامض هيدروكلوريك اليها
 صفة - هو ملح من عسر الانحاق بلوراته كعوب او ذوات ثلثي زوايا
 متجمعة حتماً يذوب في $\frac{2}{3}$ جزء ماء بارداً وفي اقل من ذلك ماء ساخناً وبالحرارة
 يتصعد بدون تغير وبلوراته غير هيدراتية وتتولد املاح مزدوجة منه مع كلوريد
 المغنيسيوم والنكل والكوبلت والمنغنيس والزنك والنحاس اما الاكسيد القلوية
 والاثريه القلوية فتتولد كلوريد معدني مثال ذلك



كبريتات الامونيوم كا ٢ } ان ٥٤ - يُستخضر باشباع كربونات
 الامونيوم حامضاً كبريتيكاً } ان ٥٤
 او باضافة حامض كبريتيك الى البواقي بعد استنفار غاز الفحم
 صفة هو ملح بلوراته منشورات مستطيلة ذوات ستة اضلاع ينحل بالحراة وينحل
 بعض الحمل اذا طال اغلاقه في الماء وهو من المواد الجيدة لاصلاح الاثريه من
 ينحس ثمنه وسهولة حله

كربونات الامونيوم المتعادل غير الهيدراتي كا ٢ (ن ٥٤) ٢ - يُستخضر
 مزج غاز الامونيوم الجاف وحامض كربونيك جاف اما كربونات الامونيوم
 التجاري فمختلف التركيب فقد يكون سسكوي كربونات ٢ (ن ٥٤) ١ (كا ٢)
 وقد يكون لي كربونات اما الاول فيستخضر باحماة كبريتات الامونيوم وكربونات
 الكلس في انبيق حديد هو ابيض حريف يصعد عنه غاز الامونيوم على حرارة
 لهواه الاعتيادية واذا عُرِض للهواء مدة يبول وينحول الى لي كربونات الامونيوم


نترات الامونيوم (ن ا م ن . ٤) ا - يُستحضر باضافة كربونات الامونيوم الى حامض نيتريك مخفف قليلاً الى الاشباع ثم يخفف السائل فينبلور الملح على هيئة منشورات مسدسة الاضلاع مثل بلورات نترات البوتاسا - أكثر استعماله لاجل استحضار غاز اكسيد النيتروجين الاول
 كواشفه - املاح الامونيوم تُكشف باحماؤها مع كلس هيدراتي فيصعد الامونيوم ويُعرف من رائحته وكلها اذا أُحميت تحت او تنطير
 التي في انبوبة كشف قطعة بوتاسا وذوب الملح الذي تحت الفحص في ماء قليل واطفة الى البوتاسا وضع في اعلى الانبوبة قطعة قرطاس اللتموس محمّرة وأحم - الانبوبة فاذا كان امونيوم حاضراً ينطير بالحرارة والفلوي فيرجع لون اللتموس الازرق ويشعر برائحته ايضاً

فصل في قياس الحوامض والقلويات

الدرجة الاولى في هذا العمل هي احضار حوامض وقلويات في حالة السائلة ذات قوة معروفة لان التجارة منها مختلفة المحبوضة او القلوية كما تقدم ولاجل تطبيق هذه القياسات على حساب عشري قد اتسمت الاوزان الى سبعات او عشرات واصطنعت اوعبة زجاجية بنفسية الى سبعات او عشرات لاجل اعداد السائلات المشار اليها. اما السبعة فهي تعدل ٧ قحجات ماء مستنظراً على ٦٢° ف وكل ١٠٠٠ سبعة تعدل ليبراً ماء او ١٦ وقية طيبة سيالة وانبوبة مثل ث شكل ١٤٥ تسع ١٠٠ سبعة. اما العشرة فهي تعدل ١٠ قحجات على ٦٢° ف و ١٠٠٠ عشرة - ١٠٠٠٠ قحجة ماء مستنظرة فتعد السيلالات المعتمد عليها للكشف حتى يكون في كل عشرة او في كل سبعة $\frac{1}{1000}$ من الاصل المعتمد عليه

فكل	٧٠٠٠	قحجة -	١٠٠٠٠	سبعة او	٧٠٠٠	عشرة
.	٧٠٠٠	.	١٠٠٠	او	٧٠٠	.
.	٧٠٠	.	١٠٠	.	٧٠	.
.	٧٠	.	١٠	.	٧	.
.	٧	.	١	.		.

الوقية السبالة	-	٦٣٥	سبعة
الاستيمر المكعب	-	٣٢	.
القبراط المكعب	-	٣٢٠.٦٥٤٢	.



١٤٥ او نحو ذلك (انظر صحيفة ١٣١) يكون في كل ٤٩ قحمة منه ٤٠ قحمة
حامض صرف ونسبة ٤٠:٤٩ :: ٧٠٠٠:١٥٧٥ قحمة حامض فاضف اليه ماء حتي
بصير ٧٠٠٠ قحمة او ٤٠:٤٩ :: ٧:١٤٥ اي زن ١٤٥ قحمة حامض واضف
اليه ماء حتي نصير ٧٠ قحمة فيكون في ١٠٠٠ قحمة وزناً من السبال ١٠٠ قحمة
حامض صرف او ٤٩:١٠٠ :: ٤٩:١٠٠ قحمة حامض تُزاد ماء حتي نصير ١٠٠٠ عشرة
في الوعاء ا او ت مثلاً (شكل ١٤٥) او ٤٩:٧ :: ٢٤٢:١٠٠ قحمة حامض تُزاد ماء
حتى نصير ١٠٠٠ سبعة فيكون السبال اذا أُعد على هاتين الطريقتين علم قوة


واحدة لان العشرة فيها $\frac{1}{1000}$ من ٤٩٠ قحمة والسبعة فيها $\frac{1}{1000}$ من ٢٤٣ قحمة اي في كليها جزء من الاصل في ١٠٠٠ جزء من السبال اي في ١٠٠٠ عشرة او في ١٠٠٠ سبعة

وان لم يكن الحامض الكبريتيك على ثقل نوعي ١٤٨٥ فيقضي استعمال مقدار الحامض الصرف فيه وذلك يتم باعداد كربونات الصودا الصرف غير الهيدراتي باحماه في كربونات الصودا الى الحمرة بدون صهره فكل ٥٣ قحمة منه اي جوهر واحد مادي فيها ٢١ قحمة صودا وهي تشبع ٤٠ قحمة حامض كبريتيك صرف - زن منه وزنا ما واضفه شيئاً فشيئاً الى ١٠٠ قحمة من الحامض مخففاً بغيره ٤ او ٥ مرات جرعه ماء الى ان يصير السبال متعادلاً ثم زن ما بقي من الكربونات فيعلم كم منه اضيف الى الحامض فلنفرض انه ١٠٥ قحمة فاذاً

٥٣ : ٤٠ :: ١٠٥ : ٧٩٢٢٤ اي مقدار الحامض

كربونات
الصودا
حامض
كبريتيك

شكل ١٤٦ شكل ١٤٧



الصرف في ١٠٠ مئة قحمة ثم ٧٩٢٢٤ : ١٠٠ :: ٧٠ :

١. ٧٠ قحمة ثم اضف اليها ماء مستقطراً حتى تصير ٧٠
٢. قحمة او ٨٤٨ حتى تصير ٨٠ قحمة كما تقدم انفاً. ثم اعد
٣. وعاء على شكل ١٤٦ او ١٤٧ مقسوماً الى سبعات او
٤. عشرات اي اذا ملئ بالسبال المذكور تكون في
٥. كل درجة قحمة من الحامض الصرف. فاذا طلب
٦. معرفة كم من الصودا الصرف في مقدار من الصودا
٧. التجاري فلنوزن ٥٠ قحمة منه وانذوب في ماء فاتر
٨. وليرشح اذا اقتضى الامر ثم اضف الحامض اليه شيئاً
٩. فشيئاً من الوعاء الملائن وكل ما اضيف اليه شيء من
١٠. الحامض امثله باللحموس حتى يصير متعادلاً ولنفرض
- انه قد نثرغ من الوعاء ٢٣ درجة اي ٢٣ قحمة من

الحامض الصرف فاذاً ٤٠ حامض كبريتيك : ٢١ صودا :: ٢٣ : ٢٥٠٥٧ في ٥٠ قحمة

فيكون في المئة ٥١٢ من الصودا

اما لاجل قياس المحامض فيعكس العمل . فلنفرض المطلوب معرفة الحامض
الصرف في نوع من الحامض النيتريك التجاري ناه - زن ١٥٠ قحمة من
الرخام المسحوق وضعه في صحن وضع عليه نحو ١٦ درم ماء مستنظر ثم عبر وعاء
صغيراً واجعل فيه ١٠٠ قحمة من الحامض واضفه الى الرخام بالتدرج ومنى
انتهى العمل رشح السائل واضف ماء الى الباقي على المرشحة حتى يذوب كل نيترات
الكلس المولد ثم جفف الباقي وأطرح وزنه من الكمية الاصلية اي ١٥٠ قحمة
ثم قل

٥٠ : ٥٤ :: ما زال من الرخام : ك

{ وزن كربونات
الكلس المادي }
{ وزن الحامض
المادي }
وان كان الحامض هيدروكلوريكاً فقل

٥٠ : ٢٧ :: ما زال من الرخام : ك

واما لاجل استعمال كمية الحامض الصرف في حامض كبريتيك تجاري فقد تقدم
الكلام بذلك فليراجع (صحيفة ٢٢٤)

لاجل استعمال كمية الحامض الكربونيك في كربونات ما اعد قنبنة وانبوبة
فيها كلوريد الكلسيوم كما في شكل ١٤٨ . ضع في القنبنة




شكل ١٤٨

٥٠ قحمة من الكربونات تحت الفحص مع قليل ماء
ثم ضع في انبوبة اخرى حامضاً كبريتيكاً وانكثها في
القنبنة ثم عبر الجميع بميزان ثم امل القنبنة حتى
يخرج الحامض بالماء فيتربك مع القلوبج وبطبر
الحامض الكربونيك ثم احدها قليلاً وانركها لكي تبرد
ثم زنها ايضاً فחסارها وزناً تدل على كمية الحامض

الكربونيك في ٥٠ قحمة من الملح الذي تحت الفحص واذا كان ذلك كربونات
الكلس فليستعمل حامض هيدروكلوريك عوضاً عن الحامض الكبريتيك

و يتم هذا العمل ايضاً بقنيتين شكل ١٤٩ ا و ب ومن انبوبة ر واصله الى

شكل ١٤٩




اسفل ب. ضع ٥ قعقة من الكربونات في ا مع ماء واملئ ب الى نصفها حامضاً كبريتيكاً وزن المجمع ثم اذا امتص قليل من الهواء بواسطة ز بلطف الهواء في ا ايضاً ومتى دخل الهواء ب ايضاً بصعد بعض الحامض ا ر و يقطر الى ا ويتركب مع الكربونات والحامض الكربونيك يخرج الى ب ويفلت من ز بعد ازالة البخار المائي منه برور في الحامض الكبريتيك ومتى تم العمل بوزن الكل ايضاً فتستعلم كمية الحامض الكربونيك الذي فلت

فصل في حل الاملاح بالمادة الكهربائية

ضع مذوب كبريتات الصوديوم ملوتاً بالتموس في انبوبة ملوثة كما في الرسم

الرسم



واغمس في كل ساق قطعة نحاس وارصلها ببطارية كلفانية فيجعل الملح ويجمع الحامض في الساق الواحد فيجبر التموس والفلوي في الساق الآخر فيمكنك ان تمنح كل واحد بالكواشف -

او ضع في الانبوبة يوديد البوتاسيوم مذوباً في مذوب النشاء واغمس فيه قطعتي النحاس كما

تقدم وارصلها بالبطارية فيجمع اليود في الساق الواحد كما يظهر من اللون

الارقي المتكون ويجمع البوتاسيوم في الساق الآخر

علق قطعة نحاس في مذوب كبريتات النحاس وعلق تجاهها شيئاً تريد ان

تكسوه نحاساً وارصل النحاس بالقطب الايجابي وما تريد ان تكسوه بالقطب السليبي

بعض كساء سطحه بلومباجيناً وانرك الكل بعض الساعات فيجعل كبريتات النحاس

ويرسب النحاس على القطعة المتصلة بالقطب السليبي

الفضة } فض فض }

سميتها فض وزن جوهرها ١٠٨ وزن جوهرها المادي ٢١٦
الفضة موجودة في الطبيعة صرفاً ومركبة مع الكبريت مزوجة مع كبريت
الرصاص والانتيمون والزرنيخ وتُستخلص بتملغها مع زيتق فيسحق المعدن ويمزج
معه ملح ويجس فبحول الكبريت الى كلوريد ثم يوضع الكل في براميل ماء تدور
على محاورها فيها قطع حديد فيعد ادارتها مدة يتحول كلوريد الفضة الى فضة
معدنية ويتولد كلوريد الحديد ثم يضاف اليه زيتق فينكون ملغم ويستفرد
بالتنقية بواسطة قماش متين ثم يستفطر فيصعد الزيتق وتبقى الفضة
اذا كانت الفضة مزوجة بنحاس تنقى باصهارها مع جانب من الرصاص ثم تبريد
المزيج بغثة على هيئة اقراص فتحوى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص
ولا تكفى لاصهار النحاس فيسبل الرصاص ويجعل الفضة معه ثم بصهر في كور
وبرمي عليه مجري هواه فيناكسد الرصاص وبسبل الاكسيد ويجري عن الفضة
لاجل تنقية الفضة الى النمام ذوبها في حامض نيتريك . اذا خالطها نحاس
يكسب السبال لونا ازرق . اذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق
اسود . اضف الى المذوب ملحاً او حامضاً هيدروكلوريكاً فيرسب كلوريد الفضة
ويستفرد بالترشيح ثم يغسل ويجفف ويضاف اليه مثلاً وزن كبرونات الصودا غير
الميدراتي ويجس في بوظقة الى درجة البياض فينطرد الاكسجين والحامض
الكاربونيك وتبقى فضة وكلوريد الفضة

لنا طريقة اخرى اسهل ما ذكر وهي ان يغير الكلوريد بهام ثم بعلق فيه
قرص من الزنك فينحل الكلوريد ويتركب الكلور مع الزنك وتبقى الفضة الخالصة
رمادية اللون واستفجبة الشكل

صفاتها- الفضة ذات لون ابيض لامع وهي قابلة النطرق والسحب وهي اصلح المواد
وصلاً للكهربائية والمحارة . ثقلها النوعي ١٠٢٤٢٤٣ . نصهر عند نحو ١٨٧٢°ف-
١٠٢٣°س . لا تناكسد في الهواء ولا في الماء . اذا احميت في اكسجين او في هواه
تص اكسجيناً كثيراً ثم تفسده عند ما تبرد وذلك يحدث على سطحها مثل نفس

اشجار او نبات وإضافة جزئين في المئة من النحاس اليها يمنع امتصاص الأكسجين
المشار اليه. اذا أُحميت مع مواد قابلة الصهر فيها حامض سليسبك تناكسد فنلون
الزجاج لونا اصفرا و برطقاليا من توليد سليكات الفضة - الحامض
الهيدروكلوريك بفعل فيها قليلاً والحامض الكبريتيك الحن يولد معها
كبريتات. الحامض النيتريك بذوبها - اسوداد سطحها في الهواء هو من قبل
الهيدروجين المكثرت لان لها الفة شديدة للكبريت

كلوريد الفضة فض كل - يتولد باضافة كلوريد ما الى مذوب ملح من
املاح الفضة فترسب على هيئة مسحوق ايض لا يذوب في الماء ولا في حامض
نيتريك و يذوب في ماء النشادر وفي مذوب هيبوكبريتيت الصوديوم او سيانيد
الپوتاسيوم. اذا أُحمي بصهر ثم منى برد يتحول الى شكل رمادي اللون قاسي مثل
القرن فسي فضة قرنية . يغل في النور بالتدرج و اذا حضرت مواد آلية يغل
بسرعة وقد ذكر حلة بالماء والزنك انما

يوديد الفضة فض ي - يُستحضر باضافة نترات الفضة الى يوديد
الپوتاسيوم. هو راسب اصفر لا يذوب في ماء النشادر الا قليلاً ويتحول بالنور
عن لونه الاصفر الاصلي فيصير اسمر اولاً ثم اسود
بروميد الفضة فض ب - يُستحضر باضافة ملح من املاح الفضة الى
بروميد ما. اذا استحضر على نور صناعي فهو ابيض وفي نور الشمس بصفراً لا يذوب
في ماء النشادر الا قليلاً

كبريت الفضة فض ك - هو موجود في الطبيعة ويصنع باحما
الفضة والكبريت معاً او بانفاذ هيدروجين مكثرت في مذوب ملح من املاحها
وقد يوجد في الطبيعة مركباً مع الانتيمون والزرنيخ. ثقله النوعي ٧.٢

أكسيد الفضة الاول فض ا - يُستحضر على هيئة مسحوق اسمر ثقيل
باضافة يوتاسا هيدراتي او صودا هيدراتي الى مذوب ملح من املاحها . يذوب
في ماء النشادر و يذوب قليلاً في الماء. اذا أُحمي يغل الى اكسجين وفضة. اذا تجم

في ماء الشادر يتولد مركب مجهول التركيب شديد التفرقع جداً سمي الفضة المتفرقة اذا كان رطباً يتفرقع بالفرك واذا كان جافاً يتفرقع اذا لمس بربشة - قبل هو فض ٥٥ ن وقيل فض ٣ ن

نترات الفضة $\left\{ \begin{array}{l} ٢١ ن \\ فض \end{array} \right.$ ١ - يستحضر بنذوب فضة في حامض نيتريك

ثم يجفف حتى يتبلور عند ما يبرد السيل فاذا كانت الفضة نقية يكون النترات نقياً واذا استعملت فضة المعاملة بمخاطب النترات نترات الخحاس ثم اذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحجر جهنم المستعمل عند الجراحين لاجل الكي به. اذا عرض على النور ينحل لاسياً اذا حضرت مواد آلية فيسود ولذلك يستعمل في تركيب حبر لا يبعث بسهولة واصبغ الشعر

كبريتات الفضة - يستحضر باغلاء فضة في حامض كبريتيك

كربونات الفضة - يستحضر بمزج مذوب نترات الفضة ومذوب كربونات

الصودا. هو راسب ابيض لا يذوب في الماء وبسود وينحل بالغليان

ان بعض المواد الآلية مثل زيت الفرفة وزيت القرنفل ومذوب سكر العنب اذا اضيفت الى مذوب ملح من املاح الفضة تترسب الفضة المعدنية فقد استخدمت لاجل تقييض الزجاج - خذ ماء الشادر ٢٠ منها ونترات الفضة المبلور ٦٠ قمية والكحول ٩٠ منها وماء مستقراً ٩٠ منها وذوب النترات ثم رش المزيج واضف اليه ١٥ قمية سكر العنب وذوب الكل في ١٢ درهم ماء و ١٢ درهم الكحول فاذا تراكمت قطعة زجاج في هذا المزيج ثلاثة او اربعة ايام تكسي فضة

كواشف الفضة (١) املاح الفضة القابلة الذوبان هي بيضاء اذا كانت صرفة واذا عرضت على النور تسود

(٢) ملح من املاح الكلور بولد معها راسباً ابيض لا يذوب في حامض نيتريك ويذوب في ماء الشادر (تنبيه . كلوريد الرصاص يذوب في ماء سخن وبذلك يمتاز عن كلوريد الفضة)

(٣) املاح فضائية او زرنيجينية تولد معها راسباً اصفر يذوب في الشادر وفي

الحوامض

- (٤) املاح زرنختانية تولد معها راسباً احمر قرميدي اللون
 (٥) الهيدروجين المكثرت بولد معها راسباً اسود لا يذوب في هيدروكبريتات
 النشادر و يذوب في حامض نيتريك
 (٦) الفلويات الثابتة تولد معها راسب سمر هي أكسيد الفضة اذا عُرِضت
 على نشادر تسود وتفرقع
 (٧) يوديد اليوتاسيوم يرسب معها راسباً اصفر لا يذوب في ماء النشادر الا قليلاً
 و يذوب في هيدروكبريتات الصوديوم وفي سيانيد اليوتاسيوم

الفصل العاشر

في المعادن من الرتبة الثانية اي ذوات الجوهريين

كلسيوم كلس

سبينة كلس وزن جوهره ٤٠ وزن جوهره المادي ٤٠
 يُستحضر بصعوبة بحمل كلوريد الكلسيوم بواسطة صوديوم وزنك على حرارة
 عالية فيُستخلص مزيج من الكلسيوم والزنك ثم يُجفف في بوظقة فحم الى درجة عالية
 صفائه - هو معدن فضي اللون سريع التأكسد ثقلة النوعي ١٠٥٧٧٨ اذا
 عُرِض على الهواء يتحول الى كلس هيدراتي - هو ذو جوهريين اي يتربك
 مع جوهريين من مواد الرتبة الاولى كما تقدم فلنا كلس كل - كلس ب - كلس ي -
 كلس فل - ومع هيدروكلس يتولد هيدرات الكلسيوم او كلس هيدراتي اي
 { كلس ومع اكسجين يتولد اصل يتربك مع غيره سي كلسيل - كلس ا -
 بواسطة أكسيد الهيدروجين التالي يتولد أكسيد الكلسيل كلس ا ا ومع الكلور
 يتولد كلوريد الكلسيل كلس كل - المعروف بكلوريد الكلس
 كلوريد الكلسيوم كلس كل - يُستحضر باضافة حامض هيدروكلوريك
 الى رخام ثم يجفف السبال ويصهر الباقي في بوظقة ويصب على بلاطة من الرخام

ومنى برد يُكسّر ويوضع في قنينات ضابطة. يستعمل في الاعمال الكيماوية لاجل تجريد الغازات من الرطوبة ولازالة الماء من سائلات لا يذوب فيها واذا مزج مع جليد او ثلج يتولد مزيج مجلد (انظر صحيفة ١٧ و ١٨)

كربونات الكلسيوم { كرا
كلس } ا م هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة

اصداف بعض المحيوان وانواع الرخام والطباشير والحجارة الكلسية التي قد تألف منها جبال وقد يتبلور على هيئة معين موروب كما في المعروف بحجر اسلانده نحو 750 هيئة معروفة عند علماء الحجارة والمعادن كلها اشكال المعين الموروب والحجر المسمى اراكونيت هو كربونات الكلسيوم يتبلور على هيئة منشورات مسدسة الاضلاع لا يذوب في ماء الا قليلاً جداً وان كان في الماء حامض كربونيك يذوب فيه كربونات الكلسيوم واذا اغلي الماء يرسب

اكسيد الكلسيوم او كلس . كلس ا - يُسخر باحمااء الكربونات الى درجة الحمرة فيطرد الحامض الكربونيك ويبقى الاكسيد . اذا كان في الكربونات سليكا يتولد سليكات الكلس واذا كان كثيراً بنفسه لانه لا يروى بالماء

صفاته - الكلس الصرف ابيض لا يُصهر بضيء في الظلام قليلاً . اذا اصابه ماء يزيد جرمًا ويتركب مع الماء ويحول الى مسحوق ابيض ناعم هو الكلس الهيدراتي وتظهر من هذا التركيب حرارة شديدة . يذوب في الماء البارد اكثر من الماء الحن فان ليبر ماء على 60 ف يذوب منه 11 قحمة وعلى 212 ف يذوب 7 قحمت - يُسخر ماء الكلس باضافة ماء الى كلس هيدراتي وتركه حتى يصفى . اذا عرّض على الهواء يكتسي قشرة رقيقة هو كربونات الكلس الذي يتولد من تركيب الحامض الكربونيك في الهواء مع الكلس اللائب في الماء - اذا ذوّب في الماء سكر يذوب جانباً كبيراً من الكلس ثم اذا اضيف اليه الكحول يرسب راسب مركب من الكلس والسكر . اذا مزج الكلس مع الحامض السليسيك اي رمل او كوارتز يتولد طين البنيان والكلس الذي فيو دلفان اي سليكات الالومينوم يتصلب تحت الماء . جميع الاتربة المخصبة لا تخلو من الكلس وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة باضافة كلس اليها

فصفات الكلسيوم المتعادل (ف ا) Ca كلس Ca - هو قاعدة عظام الحيوان ذي الفقار ممزوجاً مع الكربونات ومواد آليّة - يُستحضر بإضافة فصفات ما قلوي ونشادر الى كلوريد الكلسيوم فيجمع الراسب ويجفّف

فصفات الكلسيوم الحمض (ف ا) Ca كلس Ca + H_2O ماء - يُستحضر بنذوب فصفات الصوديوم في ماء ثم يُضاف الى المذوّب مذوّب كلوريد الكلسيوم فصفات الكلسيوم المضاعف الحامض (ف ا) Ca كلس Ca - يُستحضر بإضافة حامض كبريتيك الى النصف المتعادل ثم يُضاف اليها ماء فهو بذوّب انصفات الحمض وينتج كبريتات الكلسيوم الذي قد تولد بين الحامض الكبريتيك والكلسيوم

كبريت الكلسيوم - يُستحضر باحمااء الكبريتات مع فحم فصفيد الكلسيوم - يُستحضر بامرار بخار الفسفور على كلس محوّى الى المحويرة في انبوبة من الخزف الصيني

كبريتات الكلسيوم الهيدراتي او الجص او السليبيت (كا) كلس Ca + H_2O - هو موجود بكثرة في الطبيعة وبعض الاحيان على هيئة بلورات . اذا اُحمي بخسر ماء التبليور ثم اذا اصابه ماء يتربك معه ايضاً ويتصلب فيصلح لاصطناع قوالب وهو كثير الاستعمال لذلك في الصنائع . اذا ترشح عنه ماء ينابيع بذوّب منه قليلاً فيصير الماء قاسياً ولا يصلح للغسل لانه يفسد الصابون واذا اُضيف الى مكلسه مذوّب غراء ثقيل يتكوّن طين السنكو واذا مزج مع الشب الابيض وغراء السمك ومواد ملونة يتكوّن مقلد الرخام ذي الالوان المختلفة، وكثيراً ما يُستعمل الجص المسحق مخصباً للاعشاب ولاصلاح الانربة

فلوريد الكلسيوم - كلس فل - هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة بلورات مختلفة الالوان في معادن الرصاص . يُستعمل لاجل استحضار الحامض الهيدروفلوريك (انظر صحيفة ١٠٢)

كلوريد الكلس او المسحق المبيض - يُستحضر بعرض كلس هيدراتي مبلول قليلاً على غاز الكلور فيمنص الكلور ويتولد مسحق ابيض بمص رطوبة من الهواء وينبع رائحة الكلور . يذوب في نحو ١٠ اجزاء ماء وما يبقى غير ذائب فهو

الكلس الهيدراتي الذي لم يتركب مع الكلور فالامر ظاهر ان مسحوق النيبض التجاري مختلف جودة بالنسبة الى الكلور الذي فيه ولاجل النيبض به تُنقَع الافئدة في مذوّبه ثم تُلقى في حامض كبريتيك مخفّف فينولد كبريتات الكلس ويفلت الكلور وهو يُستعمل ايضاً لاجل اصلاح الروائح الرديئة والابخرة المرضية المعدة

لاجل استعمال كمية الكلور في هذا المسحوق يُقنن بواسطة ملح من املاح اكسيد الحديد الاول لان الكلور يحل بعض الماء فيتتركب اكسجينه مع الحديد ويجوّه الى الاكسيد الثاني وهذه كيفية العمل

خذ من كبريتات الحديد 71×16 قحمة وذوّبه في 16 درهم ماء وهذا المقدار يلزم لاجل تاكسده 10 قحعات كلور - خذ من كلوريد الكلس الذي تحت الفحص 50 قحمة واضف اليه قليل ماء فاتر ثم اجعله في وعاء قياس الفلويات كما تقدم (صحيفة 224) واملي الوعاء ماء وامزج الكل مزجاً جيداً ثم اضف هذا السيل شيئاً فشيئاً الى مذوّب كبريتات الحديد حتى يتحول الى الاكسيد الاعلى وذلك يُعرف من عدم تولده راسباً ازرق مع فرّوسيانيد اليوتاسيوم فلا بد من وجود 10 قحعات كلور في مقدار السيل الذي نفذ فلنفرض انه نفذ منه 72 حسب المقياس فاذا $10 : 72 :: 100 : 12489$ في الخمسين اي في المسحوق تحت الفحص 27478 من الكلور في المائة

كواشف مركبات الكلسيوم - (1) تُرسب بواسطة الفلويات الكربونية اذ يتولد كربونات الكلسيوم يذوب اذا اُنقذ في السيل حامض كربونيك ثم يرسب ايضاً بعد الغليان

(2) كبريتات قابل الذوبان او حامض كبريتيك برسيها ولكن لكون كبريتات الكلسيوم قابل الذوبان في 500 جزء ماء لا يظهر الراسب اذا كان قليلاً ويظهر باضافة الكحول الى السيل ويميز عن الراسب المولد بهذه الوساطة مع املاح البارتا والسترونيا بان هذه الاخيرة لا تذوب في حامض نيتريك

(3) المحامض الاكساليك يولد معها راسباً ابيض لا يذوب في الماء ولا في حامض خليك ولا في مذوّب هيدروكلورات النشادر و يذوب في حامض نيتريك

او حامض هيدروكلوريك

- (٤) حامض هيدروفلوساسيك لا ياتر في مذوب املاح كلسيوم
 (٥) كلوريد الكلسيوم يذوب في الكحول ويتراثة كذلك
 (٦) بالسبكتروسكوب يرى خط اخضر بين D و E وخط برطغالي اقرب
 الى موقع احمر الطيف الشمسي من خط الصوديوم الاصفر المذكور سابقاً وخط
 بنفسجي بقرب G بين G و H
 (٧) كلوريد السنروتيوم او كلوريد الكلسيوم اذا ذُوب في الكحول يكسب
 لهبة لونا احمر او بنفسجياً اما املاح الباريتا فلونا اخضر ضعيفاً

باريوم با

سبئة با وزنة الجوهري ١٣٧ وزن جوهري المادي ١٣٧
 الباريوم موجود في الطبيعة على هيئة كبريتات الباريتا المعروف بالحجر الثقيل
 ويستخضر بالبطارية الكنتانية على طريقة استحضار الكلسيوم وايضاً باحمااء باريتا
 في انبوبة حديد واناذا بخار اليوتاسيوم عليه ثم يضاف اليه زيتي فيتولد ملغم ثم
 يطير الزيتي بالاحمااء
 صفاته — هو معدن فضي اللون ايض قابل النطرق بصهر دون درجة
 المحمرة يحل الماء ويناكسد بالتدرج في الهواء ثقلة النوعي ٤ او ٥
 كلوريد الباريوم با كل م — يستخضر بتذويب الكبريتات الطبيعي في
 حامض هيدروكلوريك ثم يرشح السبال ويجفف حتى تتكون قشرة على سطحه ثم
 يترك حتى يبرد فيتبلور الكلوريد على هيئة صفائح شفافة فيها جوهراً ماء
 كبريت الباريوم با ك — يستخضر مزج الكبريتات الطبيعي المسحوق وثلك
 وزنه فحمًا مسحوقاً فيضغط في بوتقة خزفية ويحمى الى درجة المحمرة ساعة فاكثر ثم
 يغلى في ماء فيذوب الكبريت وعند التخييف يتبلور على هيئة صفائح رقيقة
 اكسيد الباريوم الاول با ا — يستخضر باحمااء نترات الباريتا في وعاء صيني
 كبير حتى يكف صعود البخار الاحمر فيبقى الباريتا على هيئة كتلة اسفنجية قابلة
 الاصهار بجمارة عالية — اذا اصابه ماء يتحد به بشراهة وتظهر حرارة كثيرة
 فتتحول الباريتا الى باريتا هيدراتي

باريتا هيدراتي با ١٥ ا او با ١٥ } — يُستحضر مجل مذوّب الكلوريد

الثقيل الساخن بواسطة صودا كاي فمئي برد السبال بنبلور الباريئا الهيدراتي ثم يتحول الى مسحوق ابيض له شراة زائدة للحامض الكربونيك. يذوب في ٢٠ جزءا من الماء البارد وجزئين من الماء الساخن ومذوّبه كثير الاستعمال كاشفاً . هو قلوي نظراً الى فعله في ورق اللتوس واقل شيء من الحامض الكربونيك يعكسه
اكسيد الباريوم الثاني با ١٥ — يُستحضر بانقاذ مجري من الاكسجين على باريئا محمي الى الحمرة في انبوبة صينية — هو رمادي اللون يكون هيدراتياً مع الماء

نيترات الباريئا ن ا م با ١٥ } — يُستحضر باضافة حامض نيتريك الى الكربونات

الطبيعي

كبريتات الباريئا — الحجر الثقيل كبا ١٥ — هو موجود في الطبيعة وبعض الاحيان على هيئة بلورات جميلة جداً ثقلة النوعي بين ٤٤ و ٤٨ — هو كثير الاستعمال في صنعة الدهان لاصطناع ادهان بيضاء

كربونات الباريئا — هو موجود في الطبيعة على هيئة الحجر المسمي وتربت ويُستحضر صنعياً بارسايه من الكلوريد او النيترات بواسطة كربونات قلوي او بواسطة امونيا — هو مسحوق ابيض ثقيل قلما يذوب في الماء

تنبيه — جميع املاح الباريئا القابلة الذوبان سامة

كواشفه — (١) املاح الباريوم برسبها كربونات الامونيا فتمتاز بذلك عن الاملاح القلوية والمغنسية غير املاح الكلسيوم

(٢) حامض كبريتيك مخفف كثيراً او كبريتات ما قابل الذوبان برسبها

فتمتاز بذلك عن املاح الكلسيوم

(٣) املاح السترونتيوم تشاركها في الخصائص المذكورة وتمتاز عنها بان الحامض الهيدروفلوسلسيك ومذوّب كرومات اليوتاسيوم خفيفاً برسبان املاح الباريوم لا املاح السترونتيوم وكلوريد السترونتيوم يذوب في الكحول صرف وكلوريد الباريوم لا يذوب فيه

(٤) بالسيكتروسكوب يمتاز مركبات الباريوم بخطوط خضريين D و F
آخرها موافق F

سترونتيوم ست

سمنه ست وزنه الجوهري ١٧٢٥ وزن جوهره المادي ١٧٢٥
هو موجود في الطبيعة على هيئة أكسيد في بعض الحجارة ويُستحضر على طريقة
استحضار الباريوم

صفاته - هو معدن ابيض ثقل بتأكسد في الهواء ويحل الماء على الحرارة
الاعتيادية ثقله النوعي ٢٢٥٤

كلوريد السترونتيوم - ست كل م - ينبلور على هيئة ابر او مسدسات
قابلة للتذويب في جزئين من الماء البارد وفي الكحول واذا أشعلت تكسب اللهب
لوناً قرمزياً

أكسيد السترونتيوم الاول ست ا - يُستحضر بحل النترات بواسطة الاحماء -
يشبه الباريتا في أكثر خصائصه

أكسيد السترونتيوم الثاني ست ا م - يُستحضر باضافة أكسيد الهيدروجين
الثاني الى الأكسيد الاول او على طريقة استحضار أكسيد الباريوم الثاني

نترات السترونتيوم $\left\{ \begin{array}{l} \text{نا} \\ \text{ست} \end{array} \right.$ - ينبلور على هيئة ذوات ثنائي زوايا غير

هيدراتية قابلة للتذويب في ١٥ جزء ماء بارد - أكثر استعماله عند صناعات الشهب
لاكساب النيران لوناً احمر

تركيب نار احمر - نترات السترونتيوم ٨٠٠ قعجة جافاً - كبريت ٢٢٥
قعجة كلورات البوتاسا ٢٠٠ قعجة. هباب ٥٠ قعجة

تركيب نار اخضر. نترات الباريتا الجاف ٤٥٠ قعجة كبريت ١٥٠ قعجة
كلورات البوتاسا ١٠٠ قعجة هباب ٢٥ قعجة -

يُحقق ملح الباريتا او السترونتيا والكبريت والهباب ويُمزج مزجاً تاماً ثم يُسحق

كلورات البوتاسا حتماً خشناً ويضاف الى سائر الاجزاء بدون عرك كثير
 تنبيه. مركب النار الاحمر قد يشتعل من تلقاء نفسه
 كواشفه - قد تقدم ما يكفي من جهة التمييز بين مركباته ومركبات الباريوم
 - اما بالسبكتروسكوب فبرى خط برطقالي بقرب D الى جهة الاحمر
 وخطان احمران بقرب C وخط ازرق بين F و G

مغنيسيوم م

سمنه م وزن جوهره ٢٤ وزن جوهره المادي ٢٤
 هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة سليكات المغنيسيا في الحجر المعروف بحجر
 الصابون والطلق وفي ماء البحر مركباً مع الكلور واليود والبروم
 استحضاره - امزج كلوريد المغنيسيوم ٦ اجزاء وصوديوم على هيئة قطع
 صفار جزءاً واحداً وفلوريد الكلسيوم جزءاً واحداً وكلوريد البوتاسيوم جزءاً
 واحداً - ألق المزيج في بوظفة محماة الى درجة الحمرة وغطها حالاً. متى اصهر
 المزيج حره ثم متى برد اكسر البوظفة فترى المغنيسيوم على هيئة كرات
 صفائه - هو معدن ابيض فضي ثقله النوعي ١٧٤٢ بصهر عند درجة الحمرة
 ويتصعد مثل الزنك. لا يتأكسد في هواء جاف ويتأكسد في هواء رطب. لا يفعل
 فيه الماء البارد ويتأكسد في الماء الساخن - يشعل في الهواء بنور شديد وايضاً في
 الكلور وبخار اليود والبروم والكبريت. يذوب في المحامض وينت هيدروجيناً
 كلوريد المغنيسيوم. م كل م - اذا ذوّب مغنيسيا او كربوناته في حامض
 هيدروكلوريك يتولد كلوريد المغنيسيوم وماء واذا جف هذا السائل فلا يمكن
 طرد كل الماء بالحرارة بل اذا زبدت يخل الماء فيتولد حامض هيدروكلوريك
 واكسيد المغنيسيوم فيطرد الاول ويبقى الثاني واذا حضر ملح النشادر او كلوريد
 البوتاسيوم يتولد ملح مزدوج يمكن جعله غير هيدراتي. فاقسم مقداراً من الحامض
 الهيدروكلوريك قسمين وشبع القسم الواحد مغنيسيا والاخر امونيا او كربونات
 الامونيا ثم امزجها وجف المحاصل واحم الباقي الى الحمرة في بوظفة صيدية غير
 ضابطة الغطاء فينصمد كلوريد الامونيوم ويبقى كلوريد المغنيسيوم مصهوراً
 فليصب على بلاطة نظيفة ومتى برد فليوضع في قنينة وانسد سدّاً محكمًا

صفاته - هو ايضاً بلوري بيول في الهواء ويزوب في الماء ولا يُسترجع عن مذويه للأسباب المذكورة انفاً ويزوب في الكحول ايضاً. هو موجود في أكثر المياه ولهذا السبب يظهر في الماء المستنقظ فعل حامض ضعيف ان لم يوضع في الانبيق عند الاستنطار كلس

أكسيد المغنيسيوم - مغنيسيا - م ا - مكلس المغنيسيا - يُستحضر بنكليس الكربونات او الهيدراتي او النترات وغالباً يُستحضر من الكربونات. صفاته - هو مسحوق ايضاً لم يتمكن من اصابه يذوب في نحو ٥٠٠٠ جزء ماء على ٦٠°ف - ١٥٢٥°س يذوب في الحوامض ويولد معها املاحاً

هيدرات المغنيسيا م ا م - يُستحضر بارسابه من مذوب ملح من املاح بواسطه پوتاسا او صودا. هو موجود ايضاً في الطبيعة منبلوراً ولم يتمكن من تبلوره صنعاً

كبرينات المغنيسيا - ملح انكليزي (ك ا م) م ا + ٧ ماء يُستحضر غالباً من الحجر المسمي دولوميت وهو كربونات المغنيسيوم والكالسيوم باضافة حامض كبرينيك اليه فينولد كبرينات المغنيسيا وكبرينات الكلس فالاول يذوب والثاني برسب فيرشح السبال ثم يجفف فينبور الملح. وهو موجود ايضاً في بعض المياه المعدنية وفي ماء البحر

صفاته - هو مر الملاق يذوب في وزنه ماء على ٦٠°ف - ١٥٢٥°س. يتركب مع املاح اخر فينولد املاحاً مزدوجة القاعدة مثل كبرينات المغنيسيا والپوتاسا وكبرينات المغنيسيا والامونيوم

كربونات المغنيسيا (ك ا م) م ا + ٧ ماء - يُستحضر بارسابه من الكبرينات بواسطه كربونات ما قلوي وهو موجود في الطبيعة منبلوراً بين الطلق. يذوب في الماء قليلاً ويزوب في الحوامض مولداً معها املاحاً وحامضه الكربونيك بفلت

نصفات المغنيسيا ٣ (م ا) ه ا ف ا + ١٤ ماء - يُستحضر بزوج مذوب نصفات الصودا وكبرينات المغنيسيا فينبور على هيئة بلورات منشورية صهورة صافية وهو موجود طبيعياً في الحبوب

فصفات الامونيوم والمغنيسيوم - اذا اُضيف امونيوم او كربوناته الى ملح من املاح المغنيسيا ثم اُضيف اليها فصفات ما قابل التذويب وجُفِّف السيل ينبلور هذا الملح وهو جزء من بعض حصا المائة

كواشف المغنيسيا (١) مع الفلويات الكاوية بولد راسباً ايض جلاتيني لا يذوب في زيادة الكاشف ويذوب في مذوَّب ملح النشادر
(٢) كربونات اليوتاسا او كربونات الصودا يرسب املاحه وكربونات النشادر في البرد لا يرسبها


(٣) الاملاح الفصفائية القابلة التذويب اذا اُضيف اليها امونيا قليل تولد مع املاح المغنيسيا راسباً ايض بلوري هو فصفات المغنيسيا والامونيوم

زنك وهو التوتيا زن

سيمته زن وزنه الجوهري ٢٢٢٧٥ وزن جوهره المادي ٢٢٢٧٥
الزنك موجود في الطبيعة على هيئة الكبريتت والكربونات والسليكات ويُستخلص بالاكثري من الكربونات. يُجوى اولاً لاجل طرد الماء والحماض الكربونيك ثم يضاف اليه قلع فحم او كوك وُجوى الى درجة الحمرة في انايق فخار فيطهر الحماض الكربونيك ويتصعد الزنك فيجمع في قوابل ممنوع دخول الهواء اليها وغالباً يصعد معه قليل من الزرنيخ

صفاته - هو معدن لامع ازرق يتأكسد في الهواء بلوري اذا تحاول كسره بنصف على الحرارة الاعتيادية وعند ٣٠٠°ف او ٢٠٠°ف يلين فيطرق صفائح ولا يخسر هذه الخاصية اذا برد بعد احماؤه وعلى ٤٠٠°ف - ٢٠٤٤°س يُسحق بسهولة وعلى ٧٣٣°ف - ٤١١٦°س يصهر وعلى درجة الحمرة يتصعدواذا كان ذلك في الهواء يشعل بنور لامع ازرق فيتولد الاكسيد . يذوب بسهولة في المحوامض فيُستعمل لاجل جمع الهيدروجين . ثقله النوعي بين ٦٢٨ و٧٢٢ يجل موضع الفضة والبولاتين والزرنيخ والانتيمون والقصدير والكدميوم والزيق والرصاص اذا اُضيف الى مذوَّب هذه المعادن . يذوب في مذوَّب هيدرات اليوتاسيوم او الصوديوم او النشادر سخن و يفلت هيدروجين

كلوريد الزنك زن كل ٢ - يُستحضر بإحماؤ زنك في كلور فيجئرق وبنحول الى الكلوريد . وايضاً باستنطار برادة زنك مع بي كلوريد الزئبق او بنذوب زنك في حامض هيدروكلوريك ثم يرشح ويجفف ويصهر الباقى ويصب على بلاطة رخام ومتى برد يكسر ويوضع في قنينات نسد سداً محكماً لان الكلوريد ذو سراهة للماء فيصه من الهواء ويذوب فيه وقد سمي قديماً زبدة النوتيا . اذا اضيف اليه مالا تصعد الحرارة فوق ٢١٢°ف - ١٠٠°س . يفسد الانسجة الحيوانية فيستعمل في الجراحة للكي به . يذوب في الكحول واذا احي هذا المذوب يزال الماء من الكحول فينولد اثيلين ك٢٥٢ او اثير ك٤١٠ هكذا



يولد ملحاً مزدوجاً مع كلوريد الامونيوم او كلوريد اليوتاسيوم . اما الاول فيستحضر بتذويب جوهر زنك في ما يكي من الحامض الهيدروكلوريك ثم يضاف اليه جوهر من كلوريد الامونيوم اي ملح النشادر وهو كثير الاستعمال للاعانة على تبيض المعادن بالتصديرا والحامض النحاس والمديد بروميد الزنك - زن ب ٢ - يُستحضر على طريقة استحضار كلوريد و بشبهه في صفاته

يوديد الزنك زن ي ٢ - يستحضر بسحق برادة الزنك ويود تحت ماء - هو جامد ابيض قابل الذوب ويتبلور على هيئة ابر . هو ذو طعم قابض كربه - قال بعضهم هو للاستعمال الطبي خير من يوديد الرصاص كبريت الزنك زن ك - هو موجود في الطبيعة ويسمى بلندا . يذوب في المحامض فيولد هيدروجيناً مكبرتاً

اكسيد الزنك الاول زن ا - يُستحضر بإحماؤ الزنك حتى يصعد عنه بخار ثم يشعل البخار ويجمع غازه في غرفات حيث يجمع الاكسيد وقد سمي سابقاً زهر النوتيا وصوف الفلاسفة

صفاته - هو مسحوق ابيض لا طعم له اذا اُحى بصفر ثم يبيض ابضاً اذا برد.
الماء يذوب منه $\frac{1}{10000}$ جزء والمذوب يغير لون اللتوس . يستعمل في صناعة
الدهان عوضاً عن كربونات الرصاص

هيدرات الزنك زن ٢٥٠ - اذا ذُوب ملح من املاح الزنك وأضيف
الى المذوب مذوب آخر قلوي برسب راسب فيجمع على مرشحة ويُغسل ويُجفف
فهو الزنك الهيدراتي. اذا اُحى يخسر جوهراً ماء مادياً ويتحول الى الاكسيد غير
الهيدراتي. هو قاعدة قوية واذا اصاب قاعدة اخرى قوية يحملها محل هيدروجين
فيتولد زنكات كانه حامض. مثال ذلك

زن ٢٥٠ + ٢(٥٠) - ٢(١٥٥) + زن ٢٠٠
هيدرات الزنك هيدرات اليوتاسيوم ماء زنكات اليوتاسيوم
كبريتات الزنك (ك١٠ زن) - يُستحضر بتذويب الزنك في حامض
كبريتيك مخفف وهو الباقي بعد استحضار الهيدروجين . او باحماة الكبريت
الطبيعي فيمض اكسجيناً ويتحول الى كبريتات الاكسيد الاول ثم يُغسل بماء فيذوب
الكبريتات فيرشح ويُجفف فينبلور على هيئة بلورات تشبه كبريتات المغنيسيوم في
الظاهر

صفاته - هو ذو طعم قابض يذوب في $\frac{1}{100}$ جزء ماء يتركب مع كبريتات
اليوتاسيوم او كبريتات الامونيوم فيولد ملحاً مزدوجاً. اذا اُحى كثيراً ينحل ويبقى
الاكسيد . يستعمل في الطب مقيماً وقابضاً

كربونات الزنك زن ١٠٠ - هو موجود في الطبيعة ويسمى كلامينا
كواشف املاح الزنك - (١) لا ترسب بواسطة الهيدروجين المكثرت
الا اذا كان حامضاً من المحامض الخفاف مثل الحامض الخليك وحينئذ يرسب
راسب ابيض هو كبريتات الزنك

(٢) كبريتات الامونيوم يولد راسباً ابيض هو كبريتات الزنك قابل التذويب
في حامض هيدروكلوريك مخفف

(٣) يوتاسا كاو او سودا كاو يولد راسباً ابيض هو هيدرات الزنك يذوب
في زيادة الكاشف والامونيا كذلك

(٤) كربونات البوتاسا او كربونات الصودا يولد راسباً ابيض هو كربونات الزنك لا يذوب في زيادة الكاثف

(٥) كربونات الامونيوم يولد راسباً ابيض هو كربونات الزنك - يذوب في زيادة الكاثف

(٦) فروسايد البرتاسيوم يولد راسباً ابيض

ككسيوم كد

سبنة كد وزن جوهره ١١٢ وزن جوهره المادي ١١٢

هو موجود في الطبيعة مزوجاً مع معدن الزنك لا يوافي زنك علياً وعند احماء الزنك لاجل استخلاصه من اتره يصعد الكسيوم اولاً لانه يتصعد بحرارة دون اللازمة لتصعيد الزنك

صفاته - هو معدن ابيض شبيه بالقصدير قابل للحب والنظرق ثقلة النوعي ٨٢٧ . يصهر دون ٥٠٠°ف - ٣٧٠°ف نلماً يتأكسد في الهواء واذا اُحى كثيراً يشعل . يتأثر قليلاً بالحمض الهيدروكلوريك الخفيف او الكبريتيك الخفيف في البرد و يذوب في الحمض النتريك

كلوريد الكسيوم كد كل م - هو سهل الذوبان جداً في الماء يتبلور على هيئة منشورات ذوات اربعة اضلاع

بروميدي الكسيوم كد ب م - يودي الكسيوم كد ي م

كبريت الكسيوم كد ك - يستحصل بانفاد هيدروجين مكثرت في المنوب الكبرينات او النترات او الكلوريد - لونه اصفر بلوراته صغرة لا تيزالاً بالمكروسكوب . يستعمل للتلوين وقد يوجد في الطبيعة

اكسيد الكسيوم كد ا - يستحصل باحماء الكربونات او النترات . لونه اسمر بعض حامضاً كربونيكاً من الهواء فيبيض . مع حامض كبريتيك سخن يولد كبرينات الكسيوم ومع حامض نتريك يولد نترات الكسيوم ومكثراً مع حوامض اُخر ومبنة املاحه هيئة املاح الزنك والمغنيسيوم

كوالفة - اذا ذوبت املاح الكسيوم واضيف الي المنوب هيدروجين مكثرت او كبريت الامونيوم يتولد راسب اصفر هو كبريت الكسيوم يذوب

في المحامض الهيدروكلوريك

(١) الفلويات الكاوية الذائبة تولد معها راسباً ايضاً هو الاكسيد الهيدراتي ولا يذوب في زيادة الكاشف

(٢) الامونيا بولد معها راسباً ايضاً كما تقدم غير انه يذوب في زيادة الكاشف

النحاس نح

سمنته نح ووزنه الجوهري ٦٣ وزن جوهري المادي ٦٣

النحاس موجود في الطبيعة صرفاً وعلى هيئة كبريتات النحاس والمحدد وعلى هيئة الكربونات في الحجر الاخضر المسمى ملاخيت وعلى هيئة الاكسيد الاحمر يُستخلص من معدنه باحماضه فيتحول كبريتات المحديد الى اكسيده ويبقى كبريتات النحاس ثم يجمع الكل مع حامض سلسيك اي رمل نقي فيتركب مع المحديد ويصهر ويجري عن كبريتات النحاس المشار اليه ثم يمزج مع مواد كربونية ويجمع الى الاصهار فتطرد عنه المواد التي تخالطه. النحاس الصرف لاجل الاعمال الكيميائية يُستحضر بحل أكسيده بواسطة امرار مجرى من الهيدروجين عليه وهو محمق في انبوبة

صفاته — هو معدن احمر قابل النطق والسحب ثقله النوعي ٨٤١٥ موصل جيد للحرارة وللكهربائية لا يتغير في الهواء الجاف وفي الهواء الرطب يكسي كسوة خضراء هي كربونات النحاس . اذا اُحمى الى الحمرة في الهواء يكسي كسوة سوداء هي اكسيد النحاس . فلما يتاثر بالمحامض الهيدروكلوريك الخفيف او الكبريتيك الخفيف . المحامض النتريك يذوبه ويصعد عنه أكسيد النتروجين الثاني ويتولد نترات النحاس . مع المحامض الكبريتيك سخن بتولد كبريتات النحاس

كلوريد النحاس الاول نح ٢ كل ٢ — يُستحضر بتذويب نحاس في حامض نيترو هيدروكلوريك فيه حامض نيتريك قليل جداً ثم يضاف ماء الى المذوب فيرسب الكلوريد الاول على هيئة مسحوق ايضاً بلوري وايضاً بتذويب اكسيد النحاس في حامض هيدروكلوريك سخن فتمت برد تبلور الكلوريد على هيئة ذوات اربعة اضلاع وايضاً باحماض الكلوريد الثاني فيفسر جوهراً من كلوره ويتحول الى الكلوريد الاول

صفاته — هو مسحوق ايضاً يذوب في الماء قليلاً ويذوب بسهولة في المحامض

الهيدروكلوريك وفي ماء النشادر . يتخضر في الهواء بامتصاص أكسجين فتتحول الى
أكسيد كلوريد النحاس Cu_2O كل Cu ا

كلوريد النحاس الثاني Cu_2O كل Cu - يتخضر بفعل الكلور بالنحاس وايضا
بذوب أكسيد الاول في حامض هيدروكلوريك

صفاته - يذوب في الماء وفي الكحول - اذا ذُوب في الماء ثم تحفّف بالحرارة
وتترك حتى يبرد يتبلور على هيئة ابر مخضرة مزرقّة اللون عيارها $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ ماء
ومذوبة الاكثولي يشعل بلهب اخضر

نحت كبريت النحاس Cu_2S ك - هو موجود في الطبيعة على هيئة بلورات
حسنة من الرتبة الاولى مسودة لينة تذوب في هيبثيمية ثقلها النوعي ٥.٥٠ ويتخضر
صنعياً باحراق نحاس مع كبريت

اول كبريت النحاس Cu_2S ك - يتخضر بانفاذ هيدروجين مكثرت في مذوب
ملح نحاسي فيرسب على هيئة مادة سوداء تمص أكسجيناً من الهواء فتتحول الى
كبريتات النحاس واذا اُحييت تخسر جوهراً من كبريتها فتتحول الى نحت كبريت
نحت أكسيد النحاس او الاكسيد الاحمر Cu_2O ا - هو موجود في الطبيعة
بعض الاحيان على هيئة قطع غير منتظمة وبعض الاحيان على هيئة بلورات حمر
قياسية ذوات ثمانية اضلاع ويتخضر باحراق كبريتات النحاس ١٠٠ جزء وكربونات
الصدوبوم الجاف ٢٨ جزءاً وبرادة النحاس ٢٥ جزءاً وبظها ايضاً باضافة سكر
العنب الى مذوب كبريتات النحاس اذا اُضيف الى المزيج سيال اليوتاسيوم ثم اُحي
الى الغليان

صفاته - اذا اُحي منقطعاً عن الهواء لا يتغير واذا اُحي في الهواء يتحول الى
الأكسيد الاول وبالحامض الهيدروكلوريك يتحول الى الكلوريد الاول وبالحامض
النيتريك يتحول الى النترات الاعلى . الامونيا بذوبته بدون تغير لونه واذا عُرِض
على الهواء يزرق بامتصاصه اكسجيناً . يستعمل في الصنائع لاجل تلوين الزجاج اوتاً احمر
أكسيد النحاس الاول Cu_2O ن خ ا او اكسيده الاسود - يتخضر باحراق نحاس في
الهواء او باحما نتراتو الى المحمورة

صفاته - هو مسحوق اسود يجتمل الاحما الى درجة عالية بدون صهر ولا

تغير . يذوب في المحوامض ويولد معها املاحاً شكلها شبيه بشكل املاح المغنيسيا
 أكسيد النحاس الهيدراتي (نح ٢١٢ م) يستحضر بارسايه من مذوب كلوريد
 او كبريتات بواسطة فاعدة قلووية فيغسل الراسب ويجفف في الهواء . لونه ازرق .
 يذوب في الامونيا ولون المذوب ازرق

اعلى كبريتات النحاس (ك١٢ م نح) ام - هو الشب الازرق . يستحضر بتذويب
 الاكسيد في المحامض الكبريتيك او بتاكسد تحت كبريتو كما تقدم فيغسل فيجفف
 السيل فينبور الكبريتات على هيئة بلورات كبيرة زرق عيارتها (ك١٢ م نح) ١٢
 + ٥ ماء

صفاته - لا يذوب في الكحول ويذوب في الماء واذا اُحيى الى ٢١٢ ف -
 ١٠٠ م يخسر اربعة جواهر من ماء تبلورو ولا يطرد الخامس حتى يجمى الى نحو
 ٥٠٠ ف فيصير غير هيدراتي واذا زيدت الحرارة يتحول الى الاكسيد - اما غير
 الهيدراتي فمحمق ايض مثل الدقيق واقل ما يمكن من الماء بعيد اللون الازرق
 فهو كاشف عن حضور الماء . اذا اضيف الى مذويه امونيا يرسب راسب يذوب
 في زيادة الامونيا فيحدث سيل ازرق واذا اضيف اليه الكحول يرسب راسب
 جميل ازرق سي كبريتات النحاس الشادري عبارته (ك١٢ م نح) ١٢ (ن ٢٠ م)
 + ٢٠ ماء

نترات النحاس نح } ان ٢١ - يستحضر بتذويب النحاس في حامض
 ان ٢١
 نيتريك ثم يجفف السيل ويترك لكي يرد . بلوراته زرق بائنة سهلة الذوبان كاوية
 سريعة الانحلال فاذا ابتلت بلوراته والتفت في رن الصدر تغل ويحترق الصدر
 من سرعة تركيبه مع الحامض النيتريك

كربونات النحاس - اذا اضيف مذوب كربونات الصوديوم الى مذوب
 كبريتات النحاس يتولد كربونات النحاس عبارته نح ٢ كرا ١٢٥ م وهو على تركيب
 الكربونات الطبيعي الاخضر المشار اليه سابقاً المسمى ملاخيت وهو موجود بكثرة
 في سيبيريا حيث يستخرج منه نحاس بنادير جزيلة ويوجد في الطبيعة ايضاً
 كربونات النحاس الازرق ويسمى فسليت وانشرة الخضراء التي تتكون على سطح

نحاس في الهواء هو كربوناته الهيدراتي
 زرنجيت النحاس اي اخضر شيل - يُستخضر باضافة منوَب كبريتات النحاس
 الى زرنجيت البوتاسا فيرسب راسب اخضر لا يذوب في الماء
 امزجة من نحاس ومعادن اخر - نحاس اصفر مركب من نحاس 77 جزءا
 وزنك ٢٤ جزءا وبواسطة تغيير كمية النحاس بالنسبة الى الزنك تتولد امزجة
 مختلفة تستعمل في بعض الصناعات. اما معدن المدافع النحاسية فيركب من نحاس ٩٠
 جزءا وقصدير ١٠ اجزاء ومعدن الاجراس تزداد فيه كمية القصدير. اما البرونز
 فنحاس ٩١ جزءا ووزنك ٦ اجزاء وقصدير جزءان ونحاس القدماء الاصفر مزيج
 من النحاس الاحمر والقصدير

كواشف املاح النحاس (١) اذا اغمس في مذوبها قطعة حديد مصفولة
 تكسي كسوة حمراء في نحاس
 (٢) الهيدروجين المكثرت بولد معها راسبا اسود لا يذوب في كبريتات فلوي ولا
 يظهر اذا حضر سيانيد البوتاسيوم

املاح الاكسيد النحفي تميز عن املاح الاكسيد
 (١) الاملاح النحفية تولد مع بوتاسا راسبا اصفر لا يذوب في زيادة الكاشف
 واملاح الاكسيد تولد مع البوتاسا راسبا ازرق بسودا اذا اغلي على شرط اضافة
 بوتاسا كاف لاجل حل كل الملح النحاسي
 (٢) الامونيا بولد مع النوعين راسبا يذوب في زيادة الكاشف اما مع النحفية
 فللون له في الاول وبزرق اذا عرّض على الهواء اما مع املاح الاكسيد فلونه
 ازرق جميل

تنبيه. جميع املاح النحاس سامة وترباها الزلال

الزئبق زي

سبعة زري ووزنه الجوهري ٢٠٠ وزن جوهره المادي ٢٠٠
 الزئبق موجود في الطبيعة صرفا على كميات قليلة بين كبريتته واكثر وجوده
 على هيئة الكبريتت المعروف بالزئبق في اسبانيا واوستريا وكليفرنيا وبيرو

والمكسيك وجاپان والصين. يجمع الكبريت في انبيق حديد مع قطع حديد او
كلس فينصعد الزبيق ويجمع في قابله او غرفه بارده ثم يصفى بواسطة جلد ثم
يوضع في قنينات حديد او كاوتشوك وكثيرا ما يخاطه قصيرا او رصاص ويسندل
على ذلك بعدم نظافة سطحه اذا انهز في قنينه غير ملانه منه واذا طرح على سطح
ملس تكون كرياتة مستطيلة ذوات اذنان ولاجل الحصول عليه صرفا بذوب
في حامض نيتريك وتترك ٢٤ ساعة فيتولد نترات الزبيق ثم تضاف اليه معادن
اخر فتحدها معها الحامض وما انفرد من الزبيق فهو خالص

صفاته - هو معدن لامع سيال على حرارة الهواء الاعتيادية ويجمد عند -
٤٠°ف ويغلي عند ٦٦٢°ف - ٣٥٠°س ويغول الى بخار على الحرارة الاعتيادية
ثقله النوعي سيالا عند ٦٠°ف - ١٣٥٩ وجامدا ١٤٢٤ وبخارا ٦٩٧٦

الزبيق الصرف لا يانصق بزجاج ولا بالخرز الصفي وبلنصق بها اذا خالطه
رصاص او معدن آخر. يتاكسد في الهواء بالتدرج وبسرع التاكسد اذا احمي
فتحول الى مسحوق احمر بلوري هو اكسيده الاعلى واذا زادت الحرارة يغل
هذا الاكسيد الى اكسجين وبخار الزبيق ويتاكسد بسرعة في الاوزون ولو كان
باردا. اذا ذوب في حامض نيتريك بارد يتولد نحت نترات الزبيق واذا كان
الحامض سخنا وزايد المقدار يتولد النترات الاعلى واذا اضيف اليه حامض
كبريتيك سخن قليل المقدار يتولد نحت كبريتات الزبيق او زائد المقدار فالكبرينات
الاعلى. بخاره ومركباته تدخل الاجسام بالامنصاص فالنقلة فيها كثيرا ما يصيبهم
ارتخاف وارتعاش العضلات يعرف بالفالج الزبقي

كلوريد الزبيق الاعلى او الثاني يزي كل ٢ - هو المعروف بالسليمانه
ويستحضر بفعل الكلور بالزبيق كما ينصح من احاطه في ملعفه وادخاله في غاز
الكلور فيشعل ويتولد الكلوريد الاعلى او بنذوب اكسيده الاحمر في حامض
هيدروكلوريك سخن فينبور هذا المركب عند ما يبرد السيل او باستقطار مزيج
من ملح الطعام وكبرينات اكسيد الزبيق الاحمر في قنينه كبيره كرويه الشكل على
حمام رملي فينصعد الكلوريد الاعلى ويجمع على جوانب اعلى القنينه
صفاته - هو ابيض بلوري بصهر عند ٥٠٩°ف - ٢٦٥°س ويغلي وينصعد

إذا زادت الحرارة. يذوب في ١٦ جزءا ماء بارداً و ٢ أجزاء ماء سخن على ٢١٢°ف
 و يذوب بسهولة في الكحول وإثير. إذا أُضيف مذوّبه إلى ماء النشادر يتولد
 راسب أبيض هو أميد وكوريد الزبيق. عبارة زي ٢ • ٤ ن ٢ كل ٢ ويعرف
 بالراسب الأبيض وإذا أُضيف ماء النشادر إلى مذوّبه يتولد راسب أبيض عبارة
 ٢ (زي كل ٢) زي ٥ • ٤ ن ٢ بعد مركباً من بي كلوريد وأميد الزبيق. الزلال
 يولد معه راسباً غير قابل الذوبان فهو إذا تربيافته وأسبب توليده مادة غير قابلة
 الذوبان مع مواد آليّة يصلح لتخفظ تلك المواد من الفساد
 كلوريد الزبيق الأول زي ٢ كل أي كلومل - يستحضر بإضافة مذوب
 نترات تحت أكسيد الزبيق إلى مذوب كلوريد الصوديوم مقداره زائد عما يلزم
 لحل النترات فيرسب الكلومل على هيئة مسحوق أبيض لا يذوب في الماء ويستحضر
 أيضاً سحق الكلوريد الثاني مع زبيق وإيضاً باستفطار تحت كربونات الزبيق
 وكلوريد الصوديوم

صفاته - هو مسحوق أبيض ثقيل لا يذوب في الماء ولا في الكحول ولا في
 إثير يتصعد بجملة دون درجة الحمرة. الحامض النيتريك يحوله إلى مزيج من
 البي كلوريد والنترات الأعلى والحامض الهيدروكلوريك يحوله إلى البي كلوريد
 إذا أُحمي مع كلوريد فلوي يتحول إلى البي كلوريد وذلك يحدث أيضاً على الحرارة
 الاعتيادية إذا حضرت مواد آليّة وحوامض فلا يجب أن يُعطى مع كلوريد فلوي
 إلا يتحول في المدة إلى البي كلوريد. مع ماء الكلس يتحول إلى مادة سوداء كانت
 تُسعمل كثيراً في الجراحة لاجل علاج بعض القروح وكذلك مع ماء الأمونيا .
 كلومل الصيادلة أحياناً بخاطرة البي كلوريد فيكون استعماله خطراً ويكشف
 ذلك باغلاؤه في ماء ثم برشح ويضاف إليه مذوّب بوتاسا كاوفاذا حضر البي كلوريد
 يتولد راسب أصفر هو الأكسيد

أول بروميد الزبيق زي ٢ ب ٢ - يستحضر كالكلوريد الأول ويشبهه في
 بعض صفاته

ثاني بروميد الزبيق زي ٢ ب ٢ - يستحضر كما أي كلوريد ويشبهه في بعض
 صفاته

اول يوديد الزئبق زي Zn - يُستحضر باضافة يوديد اليوتاسيوم الى نيترات تحت اكسيد الزئبق او بسحق ٢٠٠ جزء زئبق مع ١٢٧ جزءاً من اليود تحت الكحول

صفاته - هو اضفر مخضراً لا يذوب في الماء ولا في الكحول ولا في اثير
في يوديد الزئبق زي Zn - يُستحضر باضافة مذوب يوديد اليوتاسيوم الى الكلوريد
الاول فيرسب راسب اصفر في الاول ثم يجره وايضاً بسحق ٢٠٠ جزء من الزئبق
مع ٢٥٤ جزءاً من اليود تحت الكحول ويدلوم السحق حتى لا يرى شيء من الزئبق
بواسطة عدسة

صفاته - هو مسحوق احمر فرمزي اذا اُحي بغتة الى درجة عالية يصفره واذا
لمسه جسم صلب يجره في الحال

تحت كبريت الزئبق زي Zn - هو مركب اسود اللون غير ثابت يتولد
بارسابه بواسطة هيدروجين مكبرت ومذوب ملح زئبق
كبريت الزئبق زي Zn - يُستحضر باحمااء الزئبق والكبريت معاً وهو
موجود في الطبيعة ويعرف بالزئجفر . ثقل الطبيعي النوعي ٨٢١ وثلث الصناعي
النوعي ٧٦٥ وقد يصنع منه نوع اشده حرة واجمل لوناً من الزئجفر يعرف
بالفرليون يصنع بسحق ٢٠٠ جزء من الزئبق و١١٤ من الكبريت و ٤٠٠ من
الماء و٧٥ من اليوتاسا فهو اولاً اسود ثم يجره

تحت اكسيد الزئبق زي Zn - هو مسحوق مسود يُستحضر بارسابه من تحت
نيترات الزئبق بواسطة بوتاسا . هو غير ثابت ويحل الى زئبق والاكسيد الاول
ويستحضر ايضاً بنفع كلومل في مذوب بوتاسا

اكسيد الزئبق زي Zn - لهذا الاكسيد هيتان الاكسيد الاصفر والاكسيد
الاحمر . اما الاصفر فيستحضر بارساب ملح زئبق بواسطة قاعدة قابلة للذوب
مثال ذلك اضافة مذوب بوتاسا بزيادة الى مذوب الي كلوريد فالراسب
الحاصل غير هيدراتي فيجمع على مرشحة ويجفف . اما الاحمر فيستحضر بوضع الزئبق
في قنبلة ذات عنق طويل واحماؤه عدة اسابيع الى درجة ٦٠٠°ف - ٢١٥°ف من
فينواد الاكسيد الاحمر وهو المعروف بالراسب الاحمر ويستحضر ايضاً باحمااء

التحت نيترات او النيترات. جزء واحد منه يذوب في ٢٠٠٠٠ او ٢٠٠٠٠٠ جزء ماء وفعل هذا الماء بالشمس فعل قلوي
 املاح امونيو زبيقية - اذا ترك الأكسيد الاصفر في قينة مع امونيا يتركبان بدون تغيير ظاهر في الأكسيد وبصبر المركب قاعدة قوية يتركب مع الحوامض
 فينولد املاح سميت املاح امونيو زبيقية وعبارة القاعدة (زي ا) $M_2Z_2 + 2H_2O$ لا تذوب في الماء ولا في اثير ولا في امونيا وتمص حامضاً كربونيكاً من الهواء بشراهة

تحت نيترات الزبيق (ن ا) M_2Z_2 - هو نيترات تحت أكسيد وتولد بترك زبيق في مقدار زائد من الحامض النيتريك البارد الخفيف فيترسب بلورات جميلة على هيئة منشورات من رتبة المعين الموروب

اعلى نيترات الزبيق او نيترات أكسيد الزبيق (ان ا) M_2Z_2 - يُستحضر بتذويب زبيق في مقدار زائد من الحامض النيتريك الساخن ثم يجفف السبال في الخلاء تحت فابلة على مفرغة الهواء فوق كلس او حامض كبريتيك
 كبريتات تحت أكسيد الزبيق (كا ا) M_2Z_2 - يُستحضر بسحق الكبريتات الاعلى ابي كبريتات الأكسيد مع زبيق وايضاً باضافة حامض كبريتيك الى مذوب تحت نيترات فيرسب على هيئة مسحوق ابيض بلوري

اعلى كبريتات الزبيق او كبريتات الأكسيد الاحمر (كا ا) M_2Z_2 - يُستحضر باضافة مقدار زائد من الحامض الكبريتيك الساخن الى زبيق فيرسب الملح على هيئة مسحوق او على هيئة ابر صغار. الماء يجله فيبقى مركب اصفر غير قابل للتذويب يعرف بالتريل المعدني هو M_2Z_2 (زي ا) M_2Z_2

كواشف مركبات الزبيق - (١) الهيدروجين المكثرت برسبها على هيئة راسب اسود لا يذوب في كبريت الامونيوم ولا في حامض نيتريك ساخن

(٢) اذا اغمس في مذوبها قطعة نحاس مصفولة تكتسي كسوة بيضاء هي ملغم زبيق ونحاس واذا اجمت تعود الى اصلها واذا جمع البخار الصاعد عنها بظهر الزبيق نفسه وبظهر الزبيق ايضاً باجماء المركب في انبوبة كشف مع قليل كربونات الصودا الجاف

تمتاز املاح الأكسيد من املاح التحت أكسيد هكذا

(١) املاح التحت أكسيد تولد مع القلويات الكاوية ومع الامونيا راسباً اسود هو تحت أكسيد الزئبق الذي يغفل سريعاً الى زئبق والأكسيد الاول. اما املاح الأكسيد تولد مع القلويات راسباً اصفر ثابت على الحرارة الاعتيادية

(٢) كل كلوريد قابل الذوب والمحامض الهيدروكلوريك يولد مع املاح التحت أكسيد راسباً ابيض هو اول كلوريد الزئبق ولا يؤثر في املاح الأكسيد (٣) كل يوديد قابل الذوب يولد مع املاح التحت أكسيد راسباً اصفر مخضراً هو اليوديد الاول ومع املاح الأكسيد راسباً احمر يطفأ تماماً يذوب في زيادة الملح الزئبقي وفي زيادة الكاشف

مزيج الزئبق ومعدن آخر يسمي ملغماً وملغم الزئبق والقصدير هو المستعمل في اصطناع المرايا على نسبة ٤ اجزاء قصدير وجزء من الزئبق . الزئبق يذوب الذهب والقصدير والرصاص والفضة بدون ان يتخسر سيالته والفئة للحديد قليلة ولذلك يمتزج في اوعية حديد

سيريوم سي

سيميته سي وزن جوهريه ٩٢

هو موجود في الطبيعة في الحجر المعروف بالسيريت اكثر وجوده في اسوج يعرف له سسكوي أكسيد وأكسيد اصفر وقد استخلص المعدن من كلوريد بواسطة صوديوم

لثانوم لن

سيميته لن وزن جوهريه ٩٢.٨

هو ايضاً موجود في السيريت طبعاً . يستخلص مثل السيريوم . أكسيده مسحوق مصفر اللون . املاحه لا لون لها منبلورة برسبها كبريتات اليوتاسا

ديديوم د

سيميته د وزن جوهريه ٩٦

هو موجود في الطبيعة في السبريت ايضاً. أكسيدُه مسحوق اسمر يذوب في
الحموض ويولد املاحاً بلورية حمراء برصها يوتاسا كاو على هيئة أكسيد هيدراتي
ازرق بنفسجي

تريوم بيت

سمنته بت وزن جوهري ٦٤٢٠
يُستخلص من تربة نادرة الوجود سميت بتريا نسبة الى بلدة في اسوج وهي
مزيج من أكسيد التريوم والاريوم والتريوم

اريوم ار

سمنته ار وزن جوهري مجهول

تريوم ت

سمنته ت وزن جوهري مجهول

الفصل الحادي عشر

في المعادن من الرتبة الثالثة اي ذوات ثلاثة جواهر

هذه الرتبة فيها ثلاثة معادن الذهب والثناديوم والثاليوم

الذهب ذ

سمنته ذ وزنه الجوهري ١٩٦٥ وزن جوهري المادي ربما ٢٩٢
الذهب موجود في الطبيعة صرفاً على هيئة كعوب وقطع ذوات ثمانية اضلاع
وعلى هيئة قطع غير منتظمة مختلفة الوزن مختلطة مع كوارتز او أكسيد الحديد
او مركباً مع فضة او پلاتين او روديوم او نحاس او انثيمون وهو موجود على هيئة
تبر في رمال بعض الانهر ولاجل استخلاصه يُسحق معدنه ويضاف اليه زبيق
فينولد ملمع من الزبيق والفضة والذهب ثم يحق فيطراد الزبيق ويبقى مزيج من

الذهب والفضة ثم يجمع مع كلوريد الصوديوم ومحمق الخنزف فتحول الفضة الى كلوريد وتُسفرد كما تقدم في ذكر الفضة . ولاجل تقيّة الذهب بذوب في حامض نيتروهيديروكلوريك ويضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل حامض هيدروكلوريك فيرسب الذهب الصرف على هيئة محمق اسمر صفائه - هو معدن اصفر او محمرّ واذا ترقق حتى ينفذ فيه النور يكون مخضراً . يقبل النطرق أكثر من سائر المعادن فقد ترقق حتى انتهى سمكه الى ٣.٠٠٠ من قيراط ويقبل السحب ايضاً فيصنع شربطاً دقيقاً جداً . ثقله النوعي ١٩٤٥ . يَصهر عند ٢٠١٦°ف يذوب في حامض نيتروهيديروكلوريك والحامض السلينيك بأثر فيه ولا يتأثر من سائر الحوامض ولا بالماء ولا الهواء مها كانت الحرارة . اذا كان صرفاً يشبه الرصاص في الليونة لذلك يُزج بالفضة او النحاس لكي تزيد صلابته وذهب المعاملة في الغالب ذهب ٢٢ قيراطاً اي مزوج معه قيراطاً نحاس اما قيمة الذهب فهو ١٥ مرة قيمة الفضة . ويرسب على سطوح معدنية بتذويب سيانيد او اكسيد في مذوب سيانيد اليوتاسيوم ثم حل المركب بواسطة بطارية كلفائية كما تقدم (صحيفة ٢٢٦)

كلوريد الذهب الاول ذكل - يُستخضر باحمااء الكلوريد الثالث الآتي ذكره الى ٢٢٠°ف فيخسر جوهرين من كلوره ويحول الى الكلوريد الاول - هو اصفر اللون لا يذوب في الماء واذا زادت الحرارة عما ذكر يغفل الكلوريد ويبقى الذهب

كلوريد الذهب الثالث ذكل م - يُستخضر بتذويب الذهب في حامض نيتروهيديروكلوريك وتخفيف السيل بواسطة حمام مائي فيوقف العمل حالما تظهر باورات في السيل البارد فيرسب الكلوريد على هيئة ابر مركبة من الكلوريد والحامض الهيدروكلوريك فتحمى قليلاً لاجل طرد الهيدروجين فيبقى الكلوريد الثالث على هيئة جامد اصفر يص الماء سريعاً و يذوب فيه

وهو يذوب ايضاً في الكحول واثير واذا اُضيف اثير الى مذوبه في الماء يعود الماء الى لونه الاصلي ويتلون الاثير ابي هو اسهل ذوباناً في الاثير مما هو في الماء . النور بجلة فيرسب الذهب على جوانب الوعاء الذي هو فيه ويغفل ايضاً

بإصلاح أكسيد الحديد الأول والحمض الأكساليك فيرسب الذهب وإذا انحل
بواسطة الفصدير يرسب بنفسجي كاسيوس وهو مركب من ذهب وفصدير وكسجين
وإذا أصاب الجلد يغسل ويلون الجلد لونا بنفسجيا

إذا أضيف امونيا الى مذويه في ماء يتولد راسب متفرقع فيه كلور
وهيدروجين ونيتروجين وكسجين وذهب وإذا تُرك قليلا مع امونيا يخسر كلوره
وتزيد قابلية للتفرقع

إذا مزج كلوريد الذهب الثالث ولي كربونات اليوتاسا او الصودا بزيادة
وأغلي فيو نحاس بعد تنظيفه بحامض نيتريك مخفف يكتسي كسوة ذهبية تامة
برويد الذهب الثالث ذ ب م - يُستحضر بتذويب ذهب صرف في حامض

نيتر و هيدروبروميك

بويد الذهب الاول ذي - يُستحضر بمخل ملح ذهبي بواسطة ملح بودي .
لا يعرف له بويد غير الاول

سكوي أكسيد الذهب ذ م ا م - يُستحضر بإضافة قلوي هيدراتي الى
مذوب الكلوريد فلا يرسب راسب حتى يغلي المزيج ثم يشبع حامضا خليا كما فيرسب
راسب هو سكوي أكسيد الذهب. اذا ذُوب في حامض هيدروكلوريك يتولد
كلوريد الذهب واذا ذُوب في حامض هيدروبروميك يتولد بروميد الذهب
وهو يتركب مع فلويدات هيدراتية فيحق له ان يحسب حامضا كما برى في ذهبات
اليوتاسا (ذ ب م ا م) اذا نُفج في امونيا يتولد ذهب متفرقع

أكسيد الذهب الاول ذ م ا - يتولد بإضافة قلوي مثل يوتاسا الى الكلوريد
الاول . هو مسحوق بنفسجي اللون مخضر لا يذوب في الماء وله مركب مع الحامض
الهيوكبريتوس والصوديوم يستعمل في صنعة الداكوبريت لاجل اثبات الصور
سكوي كبريت الذهب ذ م ك م وارل كبريت الذهب ذ م ك - اذا أُنفذ
هيدروجين مكثرت في مذوب الكلوريد الاعلى بارداً يتولد راسب اسمر مصفر
هو سكوي كبريت الذهب واذا كان مخففا الى درجة الغليان يتولد الكبريت
كواشفة (ا) الكلوريد الاعلى بمص ماء من الهواء يذوب فيه ومذوية

اصفر اللون واذا اضيف اليه ايثر يبلون الايثر ويعود الماء الى اصله

(٢) املاح الذهب لا ترسب بقلويات كربونية. اما كربونات الامونيا فيرسبه على هيئة الذهب المنفرع

(٣) املاح اليوتاسيوم والصد يوم لا ترسبها

(٤) كبرينات اكسيد الحديد الاول يرسبه من الكلوريد لاسيا اذا اضيف الى المتدوب حامض هيدروكلوريك قليل فيرسب الذهب على هيئة مسحوق اسمر

(٥) املاح البود القابلة الذوبان ترسب املاح الذهب

(٦) كلوريد القصدير الاول يرسب راسباً واذا كان مع الكلوريد الاول قليل من الثاني يتولد راسب بنفسجي جميل كما تقدم

قناديوم ف

سمنه ف وزن جوهره U^{20} وزن جوهره المادي U^{20}

هو موجود في الطبيعة بين بعض المعادن الحديدية على هيئة قنادات الرصاص - هوا بيض ذو لمعة معدنية اصهاره عسر جداً لا يتاكسد في الهواء ولا في الماء ولا يفعل فيه حامض كبريتيك ولا هيدروكلوريك ولا هيدروفلوريك . يذوب في حامض نيترو هيدروكلوريك والمتدوب ازرقي اللون اذا اُغلي في حامض كبريتيك او في سكر او الكحول يتولد سائل ازرقي وبذلك نمتاز من املاح الكروم التي بالواسطة المذكورة تولد سائلاً اخضر . قنادات الامونيا مع صبغة العنص يولد سائلاً شديد السواد ولا يعنى سواداً بالحوامض ولا بالقلويات ولا بالكلور فلور ووجد القناديوم بالكفاية لاصطنع منه حبر اجود من جميع الاحبار السود المعروفة اكسيد القناديوم الاول ف ا - يستخضر باحماء حامض قناديك مع فحم -

هو اسود اللون موصل الكهربائية وعسر الاصهار .

اكسيد القناديوم الثاني ف ا - يستخضر باحماء ١٠ اجزاء الاكسيد الاول مع ١٢ جزءاً من الحامض القناديك في وعاء ملآن حامض كربونيك . هو مسحوق اسود ينحول بالحرارة الى حامض قناديك

حامض قناديك ف ا - يستخلص من قنادات الرصاص الطبيعي

كلوريد الثناديوم الثاني - يُستحضر بنقع ثناديوم في حامض هيدروكلوريك
وانفاذ مجرى هيدروجين مكثرت فيه فيرسب مسحوق اسمر
كلوريد الثناديوم الثالث - هو سيال اصفر يُستحضر بامرار كلور على مزيج
الثناديوم والفحم
يُعرف له ايضا كبريت ثنائي وثالث

ثاليوم ثا

سبته ثا وزن جوهرة ٢٠٤ وزن جوهرة المادي ٢٠٤
كشِف في سنة ١٨٦١ في البواقي بعد توليد الحامض الكبريتيك من
كبريت الحديد الطبيعي في جبال الهارتز من جرمانيا وكان اكتشافه بسبب خط
اخضر ظهر في السبكتروسكوب يقرب λ من خطوط فراونهوفر ولذلك سمي
ثاليوم من $\Thetaαλλός$ اي اخضر

صفاته - هو معدن ثقيل يشبه الرصاص في الظاهر يُصهر تحت درجة الحمرة
ثقله النوعي ١١٤٩ يذوب في حامض كبريتيك وهيدروكلوريك ونيتريك واملاحه
سامة متراكمة

اكسيد الثاليوم - هو قاعدة قوية تولد املاحا مع الحوامض
حامض ثاليك - هو جامد يذوب في الماء ويجمع من مذوبه على هيئة بلورات
كبريت الثاليوم - يتولد بارسابو من مذوب ملح من املاحه بواسطة
هيدروكبريت الامونيوم على هيئة مسحوق اسمر

الفصل الثاني عشر

في المعادن من الرتبة الرابعة اي ذوات اربعة جواهر
ان في هذه الرتبة عشرة معادن وهي الومينوم كلسيوم منغنيس حديد كروم
كوبلت نكل رصاص بلانين يلاديوم

الومينوم ال

سبته ال وزن جوهرة ٢٧٥ وزن جوهرة المادي مجهول

هو كبير الوجود في الطبيعة على هيئة أكسيد و سليكات أكسيد و يُستحضر بوضع كلوريد الألومينوم في انبوبة ومرار هيدروجين عليه ثم يدخل الى الانبوبة صود يوم و يحمى الكل حتى يصهر الألومينوم فيعمل لاجل تنقيته من كلوريد الصوديوم

صفاته - هو معدن ابيض فضي ثقله النوعي ٢٢٦ قابل النطرق والسحب لا يتأكسد بالهواء ولا بالماء ولو أحي فيقوم مقام الفضة في اشياء كثيرة غير ان صعوبة استخلاصه تجعل قيمته مضعف قيمة الفضة - يذوب في حامض هيدروكلوريك بارد وفي حامض كبريتيك سخن وحامض نيتريك سخن. لا يتلغم مع الزئبق والمزج منه والحامض يلحم عند درجة الحرارة مثل الحديد

كلوريد الألومينوم Al_2Cl_6 كل ٦ - يُستحضر بمزج الومينا جاف وهباب وتكليس المزج في برطقة مغطاة ثم يوضع في انبوبة صينية و يحمى في كور الى الحرارة وينفذ فيه مجرى من غاز الكلور فيتولد أكسيد الكربون وكلوريد الألومينوم الذي يتصعد ويجمع في طرف الانبوبة البارد

صفاته - هو بلوري اصفر ذو شراعة زايدة الماء سهل الذوبان واذا ذاب لا يُستخلص ايضاً من مذويه ولا فائدة له الا في استحضار الومينوم

فلوريد الألومينوم Al_2F_6 فل ٦ - يُبل أكسيد الألومينوم بحامض هيدروفلوريك ويحفظ في انبوبة بلومباجين داخل انبوبة خزف وينفذ عليه مجرى هيدروجين لاجل حمل بخار فلوريد الألومينوم الذي يصعد عند درجة اليياض فتجمع بلورات جميلة في طرف الانبوبة البارد

صفاته - لا يذوب في الماء واغوى الحوامض لا تفعل به

أكسيد الألومينوم Al_2O_3 - هو موجود في الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمة فالسبناج الومينا صرف او ملون باكسيد ما والصفير الومينا ملون ازرق والياقوت الاحمر والاصفر والجادى الومينا ملون احمر وهو من جهة كثرة الوجود يضاهي السليكا . يُستحضر بتكليس الومينا هيدراتي اي احماؤه الى درجة اليياض . هو مسحوق ابيض لا يذوب في اكثر الحوامض الا قليلاً ولا يصهر الا بالبورى الاكسيدروجيني

الومينا هيدراتي $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (٥١) - يُستحضر بإرسائه من مذوب الشب
الايض بواسطة امونيا فيجمع الراسب على مرشحة ويغسل ويجفف
صفاته - يتركب مع الحوامض فيولد املاح الومينوم ويتركب مع الفلويات
فيولد معها املاحاً فهو قاعدة مع الحوامض الثقلية وحامض مع القواعد الثوية
وهو موجود في الطبيعة في بعض الحجارة
كبريت الالومينوم Al_2S_3 - يُستحضر بامرار بخار كبريت الكربون على
الومينا محمي الى درجة المحرة فينولد مادة زجاجية تغل حالاً بالماء الى الومينا
وهيدروجين مكبرت

كبريتات الالومينا $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (٥٢) + $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$ (٥٣) - يُستحضر باشباع
هيدرات الالومينا حامضاً كبريتيكاً ثم يجفف او باحماء دلغان مع حامض
كبريتيك

كبريتات الالومينوم والپوتاسا او الشب الايض $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$ +
پ K_2SO_4 + ١٥٢٤ - ان في ايطاليا وهنكاريا حجر سمي حجر الشب فيه جوهران
مادبان من كبريتات الپوتاسيوم وكذا من كبريتات الالومينوم وخمسة جواهر
مادبة من هيدرات الالومينوم واذا اُحي هذا الحجر يتغير وضع جواهره واذا وُضع
عليه ماء بعد تكليسه يذوب منه الشب الصرف ويتبلور على هيئة كهوب وهو
المعروف في التجارة بالشب الروماني الايض

ويُستحضر الشب ايضاً بفعل حامض كبريتيك بالدلغان الذي هو مزيج من
سليكات الالومينوم وسليكات الحديد فيرسل السليكا وينولد كبريتات الالومينوم
وكبريتات الحديد في حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات الپوتاسيوم
فعند التبلور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتبلور قبله والشب المستحضر
على هذه الكيفية فيه قليل حديد يتلون به وبلوراته ذوات ثمانية اضلاع ولذلك
فضل عليه الشب المكعب اي الروماني

صفاته - كبريتات الالومينوم والپوتاسيوم ذو طعم قابض يحمر اللثوس
يذوب في ١٨ جزءاً من الماء على 60°F - 1050°C وفي وزنه من الماء على 212°F
ف - ١٠٠ اس واذا نكس بمحرماء تبلوره وبصبر مسحوقاً ايضاً ويعرف بالشب

المحروق . يستعمل في الجراحة كأدوية

في بعض انواع الشب يكون الصودا عوضاً عن البوتاسا وهو شب سوداوي او امونيا فهو شب نشادري اما الشب الحديدى ففيه حديد عوضاً عن الالومينوم وفي الشب الكرومي الكروم عوضاً عن الالومينوم فهذه الاملاح جميعها متشابهة من جهة كميات جواهرها كما يرى من هذا الجدول

شب بوتاسي	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥
شب سوداوي	:	:	:	:	:
شب نشادري	:	:	:	:	:
شب حديدي	:	:	:	:	:
شب كرومي	:	:	:	:	:

شب البوتاسا ايض وشب الصودا وشب النشادر كذلك اما شب الحديد فينفسجي او احمر وشب الكروم بنفسجي غامق

الشب كثير الاستعمال في صنعة الصبغ وصنعة الدباغة فاذا اغمست اقمشة في مذوق ثم في صباغ ما بصبر الشب واسطة لانحد اللون والفاش فيثبت عليه اللون - اذا اضيف شب الى مادة حيوانية او نباتية ملونة ثم ارسب بواسطة فلوي برسب معه المادة الملونة فنصنع بذلك انواع من الادهان المختلفة الالوان تُعرف باللاك فاللون الجميل المسمى كرمين هولاك مصنوع حسبما تقدم من الدودي

ان جانباً كبيراً من صخور الرتبة الاولى اي الصخور غير المنصدة مثل الكرانيت والفرغريون هو الومينا واذا انحل بتمادي الاجيال تتكون منه مادة لينة ترابية هي الدلغان الذي هو سليكات الالومينوم الهيدراتي فاذا كان صرقاتاً فهو الكاولين المستعمل في اصطناع الخزف الصيني واذا مزج معه سليكات الحديد فهو طين الخزف الفخاري واذا كان خالياً من الحديد ومن كربونات الكلس فهو الطين الناري اي الذي يصنع منه قرميد وبواطق فخمل درجة عالية من الحرارة واذا خالطه كربونات الكلس يُعرف بالمارل فنصلح به بعض الاتربة غير المنصبة واذا كان ذا مسام فهو تراب القصار وبعض انواع الاتربة الملونة المستعملة

- للهان حمراً وصفرًا هي داغان ملون بأكسيد الحديد.
- كواشفه (١) املاح اللاومينوم اذا وُضع عليها نترات الكوبلت وأُحمت بالبورى تلون اللهب لونها أزرق
- (٢) الامونيا والفلويات الثابتة ترسبها والراسب يذوب في مذوّب پوتاسا كاو او صودا كاو والمحرارة تعين على تذويبها
- (٣) الهيدروجين المكثرت لا يرسبها
- (٤) كربونات الامونيا وكل كربونات قلوي تُرسب راسبًا لا يذوب في زيادة الكاشف

فصل في عمل الزجاج والخزف

الزجاج مركب بصنع بصهر مزيج من سليكات الپوتاسا والصودا والكلس والمغنيسيا والالومينا والرصاص على حرارة عالية مستدامة مدّة والاجزاء الممزوجة تختلف حسب شكل الزجاج او الخزف المطلوب. اذا أُصهر سليكا مع پوتاسا او صودا ينتج زجاج سهل الاصهار ولكنه لا يجتمل فعل الماء ولا المحوامض واذا أُصهر سليكا مع كلس او مغنيسيا او باريتا او الومينا ينتج شيء اشبه بالخزف الصيني لا يذوب ولا يَصهر الا بمحرارة عالية فلا يصلح سليكات من نوع واحد لاصطناع الزجاج بل انما يمزج انواعه على منادير مناسبة يحصل على المطلوب

ان كل زجاج جيد قابل للتذويب قليلاً فاذا سُمِّق ووُضع على قرطاس الكركم مبلولاً يظهر فعلاً قلوباً ونرى الزجاج القديم في شبايك البيوت بجمل شعاع النور نوعاً من قبل عدم استواء سطحه وذلك من ذوبان بعضه على مرور السنين وفعل الماء فيه

اشهر انواع الزجاج هي (١) الزجاج الابيض الاعتيادي المصنوعة منه اقداح وزجاج الشبايك والمرابا الاعتيادية فهو سليكات الپوتاسا او صودا مع سليكات الكلس. اما المصنوع من سليكات الپوتاسا والكلس فشفاف صلب عسر الاصهار وكثير الاستعمال في المعاملات الكيميائية ومنه زجاج بوهيميا الشهير مع

اضافة قليل من سليكات الالومينا واذا وُضِع الصودا عوضاً عن البوتاسا يكون الزجاج اقل شفاقة واسهل اصهاراً ومنه المعروف بالزجاج الاكيلي والآلي والشبكي ومن قبل الصودا اللون المزرق المخضر وذلك لا يبرى اذا استعمل البوتاسا

(٢) اما الزجاج الاخضر الذي تُصنع منه قنينات لا يعتبر لونها فهو مركب من قلوي وسليكا وكلس والومينا ولاجل اصطناعه يُصهر معارماد ورمل وملح وتقل الكلس بعد اروائه وما بقي منه في المصابن بعد عمل الصابون ولونه يتوقف بالاكتر على حضور اكسيد الحديد والمنغنيس

(٣) زجاج صوّاني - سمي صوانياً لان السليكا لاجله استخضر سابقاً بسحق الصوان وهو مركب من سليكات البوتاسا وسليكات اكسيد الرصاص وفائدة اكسيد الرصاص تسهيل صهره ولكنه يفسده لاجل بعض المعاملات الكيميائية . تُصنع منه عدسات آلات معونة النظر ومنشورات وادوات زينة وتُرَبّات وجواهر كاذبة ملونة باكسيد المعادن

تلوين الزجاج هو باضافة قليل من بعض الاكاسيد اليه في حالة الصهر فتذوب فيه ولا تغير شفافته فاللون الازرق من قبل اكسيد الكوبلت والبنفسجي من قبل اكسيد المنغنيس والاخضر من قبل اكسيد النحاس والاسمر والاحمر من قبل اكسيد الحديد والياقوتي والوردي من قبل اكسيد الذهب

انامل - اذا اضيف الى الزجاج اكسيد القصدير يصير مظلماً ايض شبيهاً بالمخزف الصيني فهو المعروف بالانامل كما يبرى في مِين الساعات

اذا برد الزجاج سريعاً يكسر بسهولة كما يبرى بصهره وفطوره الى ماء بارد فتحدث قطع تعرف بقطرات روبرت تخمل ضرباً خفيفاً واذا انكسر اقل شيء من ذنبها تنشق كلها في اليد ولاجل دفع ذلك عن الآلات الزجاجية تُبرّد بالتدرج في افران حامية اما المخزف فمصنوع من طين هو سليكات الالومينا ينقلص عند جفافه اذا كان صرفاً فلا يصلح لعمل المخزف بدون اضافة سليكا اليه اما المخزف الصيني فمصنوع من سليكات الالومينا الايض النقي المعروف

بالكاولين وسليكا معدن بنكليس الصوان وقليل من الكلس

جلوسينوم او كلوسينوم ج

سبته ج وزن جوهره ١٤

يسمى ايضاً برلوم ويُستحضر على طريق استحضار الومينوم وبشبهه في صفاته

الظاهرة . ثقله النوعي ٣.١

أكسيد الكلوسينوم او برلاً ج ٢ ا ٢ - هو موجود في الطبيعة في الزمرد

البرجالي والسلفي وبقية انواعه . املاحه حلوة المذاق ومن ذلك نسبة المعدن

اي من γλυσκός حلو

منغنيس من

سبته من وزن جوهره ٥٧ وزن جوهره المادي مجهول

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة الاكسيد ومنة اثار في رماد النبات اما

المعدن فيستحضر بنكليس الكربونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر

فيتمزج معه فحم ويضاف اليه نحو $\frac{1}{10}$ وزنه بورق غير هيدراتي ثم تملأه بوظة فحم مسحوقاً

وتختر في الفم بؤرة بوضع فيها المزيج المشار اليه ويغلى بقم ويغطاء البوظة

فيجئ الكل في كور الى درجة الحمرة ثم الى اعلى درجة ممكنة نحو ساعة وعند

ذلك تُخرج وهي بردت البوظة تُكسر فيكون فيها زر من المنغنيس المعدني

صفاته - هو معدن محمر مثل اليزموث قصف قابل الانسحاق ثقله النوعي

١٣.١٢ مسحوقه يجبل الماء على ١٠٠°س ويتأكسد بسهولة في هواء رطب فيجب

حفظه تحت نطف

كلوريد المنغنيس التالي من كل ٢ - بعد استحضار الكور بواسطة اكسيد

المنغنيس وحامض هيدروكلوريك يبقى سيال مسود هو مزيج من كلوريد المنغنيس

وكلوريد الحديد فيرشح ويغطف ويحجى الى الحمرة في وعاء من الخزف ويحرك دائماً

فيطير كلوريد الحديد او يتحول بالماء الباقي الى مسكوي اكسيد لا يتبل الذوبان

وكلوريد المنغنيس لا يتغير فيذوب اذا اضيف الى مزيج ماء ثم يرشح ويجفف
فينبولور الكلوريد على هيئة صفايح وردية اللون - يذوب في الماء وفي الكحول
ويحل بالاحماء في الهواء الى الحمرة

مسكوي كلوريد المنغنيس من م كل م - يُستحضر بتذويب مسكوي اكسيد
المنغنيس في حامض هيدروكلوريك مخفف بارد فينولد سيال احمر هو مذوب
مسكوي كلوريد المنغنيس - بالحرارة بصعد عنه كلور فينبولور الى الكلوريد
كلوريد المنغنيس الرابع من ك م - اذا اضيف حامض هيدروكلوريك
الى اكسيد المنغنيس الثاني يتولد الكلوريد الرابع ولكنه لا يثبت بل يتحول الى
كلوروكلوريد المنغنيس الثاني

اكسيد المنغنيس من ا - يُستحضر بامرار هيدروجين جاف على الاكسيد
الثاني محمي قليلاً في انبوبة - هو قاعدة وبولد مع المحامض املاحاً وردية
اللون احياناً فاذا اضيف الى مذوبها قلوي يرسب الاكسيد الهيدراتي الابيض ثم
يتأكسد درجة اخرى فيسمر

مسكوي اكسيد المنغنيس من م ا م - هو موجود في الطبيعة وبعض الاحيان
على هيئة بلورات جميلة ويُستحضر باحساء النترات قليلاً - هو قاعدة ضعيفة املاحه
غير ثابتة غير ان كبريتاته يتركب مع كبريتات قلوي فيتولد ملح شبيه بالنسب
ممي شبيهاً منغنيسياً

اكسيد المنغنيس الثاني من ا م - هو موجود في الطبيعة بكثرة لونه اسود
لا يذوب في الماء. هو كثير الاستعمال في الصنائع والكيمياء لاجل استحضار كبريت
وكلور واذا بُزج كثيراً بالسكوبه اكسيد ومواد آخر بفتضي امتحان اشكاله
التجارية وطريقة ذلك ان تحق ٥٠ قعحة من الاكسيد تحب القمص وتوضع في
آلة امتحان كربونات (صحيفة ٢٢٥) ويضاف اليه نحو ٤ دراهم ماء بارد و ١٠٠ قعحة
حامض هيدروكلوريك ثقيل ثم يضاف اليه ٥٠ قعحة حامض ا كسابيك متبلور
ويركب على القنينة بسرعة الانبوبة التي فيها كلوريد الكلسيوم ووزن المجموع او
يعبر بسرعة ثم يحق قليلاً فينبولور المحامض والكلور يحول المحامض الاكسابيك
الى حامض كربونيك بمساعدة الماء وكل جوهر ي حامض كربونيك بقابلان جوهر

كلور وبالنتيجة بقابلان جوهر أكسيد المنغنيس الثاني أي 426 أو مضعف جوهر حامض كربونيك (22) الأ قليلاً والفرق لا يعتمد به فحسارة الكل وزناً بعد اتمام العمل واحاء الغنية لاجل طرد الغاز الباقي تعدل مقدار الأكسيد الثاني الصرف في 0.5 قحمة من الذي تحت الفحص

أكسيد المنغنيس الاحمر من 3 ا 4 — هو موجود في الطبيعة ويُستخضر باحمااء الأكسيد الثاني او السسكوي أكسيد الى اليباض في وعاء مكشوف. البورق او الزجاج المصهور بذوئه ويكسب منه لون الجهمشت

فرقسيت من 4 ا 7 او من 2 ا 2 + 2 من 3 ا — هو موجود في الطبيعة بين بعض الحجارة المنغنيسية . بالحرارة يتحول الى الأكسيد الاحمر ويفلت بخار الماء وأكسجين

كبريتات أكسيد المنغنيس الاول من 3 ا 7 + 157 — هو ملح ذولون وردي جميل سهل الذوبان كثير الاستعمال في صنعة الصبغ ويُستخضر باحمااء الأكسيد الثاني مع فحم فينبلور الأكسيد الاول فيضاف اليه حامض كبريتيك وعند نهاية العمل يُضاف اليه حامض هيدروكلويك قليل ثم يجفف ويحجن الى الحمرة لاجل حل كبريتات سسكوي أكسيد الحديد الذي يخالطه ثم بذوَّب الكبريتات باضافة ماء الى المزيج . بصبغ الافشة لوناً بنياً . يتكوَّن بيته وبين كبريتات الپوتاسا ملح مزدوج

كربونات المنغنيس — يُستخضر بارسائه من مذوَّب الكلوريد الاول بكربونات قلوي — هو مسحوق ابيض وبعض الاحيان مصفر اللون اذا أُحي بخسر الحامض الكربونيك ويص اخبيناً

الحامض المنغنيك من 3 ا — اذا أُصهر أكسيد المنغنيس مع قلوي ما يص جوهر اخبين من الهواء وتولد مادة خضراء هي منغنات القلوي . واذا أُضيف اليها كلورات الپوتاسا او نترات الپوتاسا يسرع العمل ثم بذوَّب المنغنات بماء ويجفف فينبلور على هيئة بلورات خضر مثلها منغنات الپوتاسيوم

الحامض المنغنيك الاعلى من 4 ا 5 — اذا أُلقي منغنات الپوتاسا في مقدار جزيل من الماء يتحل فيتولد أكسيد المنغنيس الثاني الهيدراتي الذي يرسب ويبقى

سيال بنفجي اللون فيه اعلى منغنيات اليوتاسيا ذائبا وهذا المحل والتركيب يعجل بالحرارة وسبب اختلاف الالوان الحادث في السبال في مدة حدوث المحل والتركيب سمي الحارباء المعدني

يُستخضر اعلى منغنيات اليوتاسيا بتكليس مزيج من اعلى اكسيد المنغنيس ويوتاسيا هيدراتي وكلورات اليوتاسيوم ثم بذوب في ماء وبرشح عن اسبستوس ويخفف فينبور على هيئة بلورات عبارتها من P_2O_5 بنفجية اللون تذوب في الماء البارد قليلاً

املاح الحامض المنغنيك الاعلى تتحول بواسطة يوتاسيا الى املاح الحامض المنغنيك وكلا النوعين ينحل بحضور المواد الآلية والسبال المعروف بسبال كوندى لاصلاح الروائح المعدية هو مذوب منغنيات او منغنيات اعلى اعلى منغنيات اليوتاسيوم والصدويم والباريوم والسنترونيوم والفضة تشبه املاح هذه المعادن مع الحامض الكوريك الاعلى هيئة

كواشف املاح المنغنيس (١) هي وردية او بنفجية اللون تبيض بالتخفيف (٢) اذا اُحيت بالبورى مع قلوي في المهيب المؤكسد على ثلاثين يتولد منغنيات اخضر قلوي

(٣) اذا اُغليت مع اكسيد الرصاص الثاني وحامض نيتريك يتولد سيال بنفجي اللون من قبل الحامض المنغنيك الاعلى الذي يتولد وهذا الكاشف حاد جداً (٤) القلوبات الثابتة مثل يوتاسيا وصدوا تولد مع مذوبات املاح المنغنيس روانسب بيضا تسمر اذا عرّضت على الهواء

(٥) الهيدروجين المكبر لا يولد معها راسبا اما كبريت الامونيوم فيرسب راسبا على اون اللحم هو كبريت المنغنيس الهيدراتي بذوب في حامض هيدروكلوريك بارد

(٦) فروسيانيد اليوتاسيوم يولد معها راسبا ايض

الحديد ح

سبته ح وزن جوهره ٥٦ وزن جوهره المادي مجهول

الحديد كثير الوجود في الطبيعة على هيئة الأكسيد وهو داخل في تركيب
الحبوان ذي الفغار وفي بعض النبات وقد وُجد منه قليل صرفاً أما الحديد
النيزكي أي الساقط إلى سطح الأرض من الجو فهو ممزوج بالنكل والكوبلت
وقد وقع إلى الأرض قطع منه عظمة الحجر يبلغ وزن بعضها ٤٠٠ رطل أما
الحديد المعدني فممزوج بالكبريت والسليكا ولاجل استعماله في الصناعات يُستخلص
من معدنه بكسر المعدن ثم يخلط معه فحم ومجروق ثم يوضع في كور ويصهر فيجري
الحديد المصهور إلى اسفل الكور ومن ثم إلى انلام معدة له في رمل. أما الحديد
الصرف فيُستخرج بأمرار مجرى هيدروجين على أول أكسيد محمق إلى درجة
الحمرة

صفاته - هو معدن لامع ابيض لين من ثقله النوعي ٧.٤ قابل السحب
والنطرق اشد مناته من كل المعادن فان الشريط منه قطره $\frac{1}{7}$ من قيراط
يحمل نحو ١٤ رطلاً يصهر عند درجة عالية لا يتأكسد في هواء جاف ويتأكسد في
هواء رطب يشعل في أكسجين والحديد الاسفنجي المستخرج من الأكسيد الاحمر
بواسطة هيدروجين يشعل في الهواء من تلقاء نفسه. اذا أُحمق إلى الحمرة بحمل الماء
فينتركب مع أكسجينه وبيوكسيد الأكسيد الاسود والهيدروجين بفك. الحامض
الكبريتيك المخفف او الهيدروكلوريك المخفف بدوثة فيفك هيدروجين. عند
درجة الحمرة له قوة مغناطيسية شديدة ويخسرهما اذا برد. عند ما يتأكسد في الهواء
الرطب يتركب الهيدروجين في حالة الولادة مع نيتروجين الهواء فيتكون امونيا
كلوريد الحديد الأول ح كل ٢ - يُستخرج بانفاذ غاز الحامض الهيدروكلوريك
الجاف على حديد محمق إلى الحمرة في انبوبة صينية كما في شكل ٧٣ بدون القابلة
فجميع الكلوريد على هيئة قشور لامعة على اجزاء الانبوبة الباردة. وهذا تعليل
الحل والتركيب

ح + ٢ (هكل) - ٥٥ + ح كل ٢
حديد حامض هيدروكلوريك هيدروجين كلوريد الحديد الأول
ويُستخرج أيضاً بنذوب حديد في حامض هيدروكلوريك وتخفيف السيل
فينياور الكلوريد على هيئة بلورات خضر هيدراتية فيها اربعة جوامر ماء وهي

سريعة الذوبان باثثة وتناكسد في الهواء فينواد أكسيكلوريد هكذا ٤ (ح كل ٢)
 + ١١ - ٢ (ح كل ٤)

كلوريد الحديد الاعلى ح ٢ كل ٦ - هو المسمى سابقا سسكوي كلوريد الحديد
 ويُخضر بنذوب السسكوي أكسيد في حامض هيدروكلوريك فاذا جُفّف
 السبال حتى بصير مثل شراب ينبلور الكلوريد الاعلى على هيئة بلورات حمراء
 هيدراتية او بنذوب اعلى هيدرات الحديد الآتي ذكره في حامض هيدروكلوريك.
 هو سهل الذوب في الماء وفي الكحول وفي اثير - هو كثير الاستعمال في الطب
 لقطع الانزفة لانه يجثرا النزلال بسرعة

بروميد الحديد الاول ح ب ٢ - يُستخضر مثل الكلوريد الاول ويشبهه
 بروميد الحديد الاعلى ح ٢ ب ٦ - يُستخضر باضافة بروم بزيادة الى حديد
 يوديد الحديد الاول ح ي ٢ - يُستخضر هيدراتيا بسحق ٥٦ جزءا من
 الحديد مع ٢٥٤ جزءا من اليود في الماء ومنى ذهب كل رائحة اليود من السبال
 برشح ويجفف فيتباور اليوديد على هيئة بلورات خضر تناكسد سرعبا اذا عرضت
 على الهواء

يوديد الحديد الاعلى ح ٢ ي ٦ - يُستخضر بسحق حديد ويود بشرط ان يكون
 الود زائدا

كبريت الحديد الاول ح ك - يُستخضر باحمااء كبريت وحديد معا - هو
 اسود اللون يجذب المغنيط ويُستخضر ايضا بنذوب الكبريتات الاول وارسايو
 بواسطة كبريت الامونيوم. الحوامض الخفيفة تفعل به وتولد املاح الاكسيد
 الاول ويفلت هيدروجين مكثرت اذا مزج زهر الكبريت وبرادة الحديد وابل
 المزيج ودُفن تحت التراب قليلا وكان المقدار جزيلاً يرمى التراب عنه بواسطة
 بخار الماء الذي يتولد والحرارة المظهرة واحيانا يظهر منه نور وقد زعم بعضهم انه
 يعلل بذلك عن حدوث بعض البراكين. ويُستخضر ايضا بلامسة كبريت وقطعة
 حديد محماة الى درجة البياض

كبريت الحديد الثاني - ييريت حديد - ح ك ٢ - هو موجود في
 الطبيعة على هيئة كعوب . هو صلب جدا لا يفعل به المغنيط ولا الحوامض

الخفيفة وكثيراً ما تظن العامة ذهباً

كبريت الحديد المغنطيسي . بيريت مغنطيسي . ح ٧ ك ١ - هو موجود في الطبيعة على هيئة منشورات ذوات ستة اضلاع . له قوة مغنطيسية ويصنع باحساء قطعة حديد الى البياض ثم غمسها في كبريت مصهور فيسقط الكبريت الى اسفل الوعاء

سكوي كبريت الحديد ح ٢ ك ٢

اول فلوريد الحديد ح فل ٢

اعلى فلوريد الحديد ح ٢ فل ٦

اكسيد الحديد الاول ح ١ - لا يوجد في الطبيعة غير مركب . اذا ذوب ملح حديدي في ماء واضيف اليه قلوي يرسب الاكسيد الهيدراتي على هيئة راسب ابيض بسوداً اذا اُغلي في ماء . اذا عُرض على الهواء يخبث ثم يحمراً . املاحه مخضرة اللون ذات طعم معدني

سكوي اكسيد الحديد ح ٣ ا ٣ - هو موجود في الطبيعة على هيئة بلورات جميلة ويُسخر بارساب كبريتات السكوي اكسيد او السكوي كلوريد بواسطة امونيا ثم يغسل الراسب ويجفف - هو احمر اللون لا يفعل به المغنيط ويستعمل في الصناعات لاصطناع بعض الادهان ويُسخر لذلك بتكليس الكبريتات وهو المعروف بالفلنطار

سكوي اكسيد الحديد الهيدراتي يستخر باضافة كربونات الصودا او امونيا الى كلوريد الحديد الاول - هو ترياق مستحضرات الزرنج . لا يثبت فيجب استخضاره حديثاً عند الحاجة اليه ويُسخر ايضاً باضافة امونيا بزيادة الى مذوب كبريتات السكوي اكسيد . وحيث انه لا يثبت يحفظ مذوب كبريتات السكوي اكسيد لكي يُسخر منه الاكسيد الهيدراتي عند الحاجة اليه

اكسيد الحديد الاسود حجر المغنطيس ح ٣ ا ٤ - هو موجود في الطبيعة ويُسخر منه الحديد ويصنع بامرار بخار الماء على حديد محمى الى الحمرة وايضاً يمزج الكلوريد الاول والاعلى على نسبة جواهرها ويضاف المزيج الى مقدار جزيل من الامونيا قطرة قطرة

حامض حديدك غير هيدراتي ح ا م وهيدراتي ح ٢ ١ ٥ ٢ - ان غير
الهيدراتي لم يُستفرد ويُعرف مركباً على هيئة حديدات اليوناتسيوم ح پ ٢ ا ٤
يُصنع باحماؤه من سسكوي أكسيد الحديد و٤ اجزاء نترات اليوناتسا جافا الى
الحميرة ساعة في بوظفة مغطاة ثم يغسل المحاصل بماء وتلج فيدوب حديدات اليوناتسيوم
على لون احمر مزرق - لا يولد راسباً مع املاح الكلس او السترونيتيا او المغنيسيا
ومع الباريتا يولد راسباً قرمزياً لا يذوب هو حديدات الباريتا

حديد نيتاتي - هو مركب طبيعي من حديد وتيتانوم واكسجين
كبريتات أكسيد الحديد الاول - الزاج الاخضر - ح كا ٤ + ١٥٧ -
يُستحضر كيميائياً باندوب حديد في حامض كبريتيك مخفف ثم يغلى السبال حتى
ينطير بعض مائه ثم يُترك فينبلور منه هذا الملح اما التجاري فيُستحضر باحماؤه الكبريتات
الطبيعي فيُغسل فيدوب الكبريتات ثم يحنف السبال حتى ينبلور عنه الكبريتات.
يلوراته خضر تزهر في الهواء وتكتسي أكسيداً او كبريتات تحت أكسيد

كبريتات سسكوي أكسيد الحديد ح ٢ ا م ٢ (كا م) - يُستحضر
بندوب كبريتات الاكسيد الاول ويضاف اليه مقدار نصف الحامض الكبريتيك
الذي فيه ثم يغلى السبال ويقطر فيه حامض نيتريك الى ان لا يسود السبال
بذلك ثم يحنف فيرسب راسب مصفر يذوب في الماء

نترات أكسيد الحديد الاول ح ا ن ا - يُستحضر بفعل الحامض النيتريك
بالاكسيد الاول او بالكبريت الاول

نترات سسكوي أكسيد الحديد - يُستحضر باضافة حامض نيتريك مخففاً
قليلاً الى الحديد نفسه - هو سبال احمر يستعمل في صناعة الصبغ واذا ترك
رسب منه راسب غير قابل التذويب

كربونات أكسيد الحديد الاول ح ا كرا م - يُستحضر باضافة كربونات
قلوي الى مذوب ملح من الاملاح أكسيد الحديد الاول اذا اغسل وحنف بخسر
جانباً من الحامض الكبريتيك وبص أكسجيناً وهو موجود في الطبيعة في بعض
معادن الحديد لا سيما في الدلغان الحديدي ويوجد ايضاً في بعض المياه المعدنية
الحديدية

فصفات الحديد - يُستحضر بمزج مذوّب جزئين من الأكسيد الأول وجزء
من مذوّب فصفات الصودا فيرسب راسب مبيض في الأول ثم يترق
فصفات مسكوي أكسيد الحديد - يُستحضر بارسابيه من مذوّب ملح من
املاح المسكوي أكسيد بواسطة فصفات الصودا
الفولاذ - هو نوع من كربورت الحديد ويصنع باحمااء الحديد مع فحم الخشب
الى درجة المحمرة فيص الحديد ١٢٢ او ١٢٧ في المائة من الكربون فينصلب وتزيد
سهولة اصهاره ويحسر جانباً من قابلية التطرق واذا خالطه تينايوم يزيد الفولاذ
جودة

كواشف املاح الحديد (١) املاح الاكسيد الاول في الغالب خضر
واملاح الاكسيد الاعلى صفر
(٢) فروسيانيد اليوتاسيوم بولد مع املاح الاكسيد الاعلى رواسب زرقا ومع
املاح الاكسيد الاول رواسب بيضا ربما تترق اذا عرّضت على الهواء
(٣) فريسايانيد اليوتاسيوم بولد مع املاح الاكسيد الاول رواسب زرقا ولا
رسب املاح الاكسيد الاعلى
(٤) الفلويات الكاوية والامونيا تولد مع املاح الاكسيد الاول رواسب بيضا
ثم خضرا تصفرا او نسرا في الهواء ومع املاح الاكسيد الاعلى رواسب محمرة لا
تتغير والاملاح الكربونية مثلها
(٥) الهيدروجين المكبرت لا يرسب املاح الاكسيد الاول ويرسب مع املاح
الاكسيد الاعلى كبريتا ويجول المسكوي اكسيد الى الاكسيد الاول
(٦) كبريت الامونيوم يرسب رواسب سودا مع النوعين تذوب في حواء
مختلفة

(٧) صبغة العفص تولد رواسب زرقا وسودا مع املاح الاكسيد الاعلى
تنبه. يراد بالاكسيد الاعلى هنا المسكوي اكسيد ايضا

الكروم كرو

هيئة كرو وزن جومره ٥٢٤٥ وزن جومره المادي مجهول

الكروم موجود في الطبيعة على هيئة الأكسيد مركباً مع أكسيد الحديد ومع الرصاص على هيئة كرومات الرصاص ويُستخلص بمزج الأكسيد مع $\frac{1}{5}$ وزنه فحمًا محروقًا ووضعوه في بوظفة مبطنة بفحم ثم يحق في كور الى الدرجة العليا الممكنة صفاته - هو ذو لعة معدنية صلب سهل الانصاف ثقله النوعي ٦.٥ اذا أُحج الى درجة الحمرة بمص أكجينا ويحول الى السكوي أكسيد. الحوامض تفعل به قليلاً اذا كان متبلوراً

كلوريد الكروم الاول كرو كل م - يستحضر باحماء اعلى كلوريد الكروم الى الحمرة في انبوبة زجاج او خزف صيني وامرار هيدروجين جاف عليه فيفلت حامض هيدروكلوريك وتبقى مادة بيضاء هي الكلوريد. يدوب في الماء باظهار حرارة زائدة والمذوب في الاول ازرق اللون فيمص أكجينا من الهواء ويحضر اي يتكون أكسي كلوريد الكروم

ويتكون مذوب أكسي كلوريد الكروم بهذه الوساطة ايضاً. اصهر ١٠ اجزاء كلوريد الصوديوم و ١٦.٩ جزءاً من كرومات البوتاسا المتعادل في بوظفة واسكب المصهور ومتى برد اكسره وضعه في انبيق فكه داخل في قابله مبردة واضف ٢٠ جزءاً من الحامض الكبريتيك الثقيل فيسقطر الاكسبكلوريد وفي آخر العمل يحق الانبيق قليلاً

صفاته - هو سبال احمر من لون الدم ثقله النوعي ١.٧١ طيار مدخن على ٢٥٠ ف يحول الى غاز برطفالي اللون. اذا اضيف الى ماء يتولد حامض هيدروكلوريك وحامض كروميك. اذا أسقط فيه فصفور يتفرع بشدة مع اشتعال واذا ابتل به زهر الكبريت يشعل. اذا أمر عليه غاز الامونيا الجاف يشعل. اذا اضيف اليه زيت التريپتينا او الكحول صرف يشعل

كلوريد الكروم الاعلى كرو كل م ١ - وهو مسكوي كلوريد الكروم الهيدراتي - يستحضر بتدويب اعلى هيدرات الكروم الاتي ذكره في حامض هيدروكلوريك. اما غير الهيدراتي فيستحضر باحماء مسكوي أكسيد الكروم وفحم في انبوبة صينية الى الحمرة وامرار كلور جاف عليه فيصعد السكوي كلوريد ويجمع في اجزاء الانبوبة الباردة على هيئة صفائح من لون البنفسجي الفاتح. لا يدوب في ماء

ولو على درجة الغليان الأ إذا اضيف اليه قليل من الكلوريد الاول فيحتد بدوب
وبصير هيدراتيا باظهار حرارة كثيرة

فلوريد الكروم الثالث كرفل م - يُستحضر باستنطار ٤ اجزاء كرومات
الرصاص و ٢ اجزاء فلوريد الكلسيوم و ١ اجزاء حامض كبريتيك في انبيق
بلائين فيصعد بخار احمر فان يتحول الى سيال احمر - الماء بجملة في المحال الى
حامض كروميك وحامض هيدروفلوريك

أكسيد الكروم الاول كروا - لا يثبت ولا يستفرد صرفاً - اذا اضيف
پوتاسا الى مذوب الكلوريد الاول يرسب راسب اسمر يتحول سربعا الى اللون
الاحمر مع انفلات هيدروجين اي يتحول الاكسيد الاول الى اكسيد اعلى
و يُستحضر ايضا باحما ١٠٠ قعنة في كرومات الامونيا في صحن صيني بواسطة
قنديل الكحولي فيحترق بشدة ويبقى اكسيد الكروم الاخضر

خذ ٤٨ جزءا من البارود الجيد و ٢٤ جزءا من بي كرومات الپوتاسا و
اجزاء ملح النشادر واتحق الكل سخنا ناعما و امزجه مزجا تاما و املئ به قدحا
عميقا مخروطيا ثم اقلب القدح على اوج قصدير حتى يفرغ منه ما فيه على شكل
مخروط و اطح راسه بلهب شمعة فيشعل مثل اشتعال بركان الى ان يمتدق جبهة
اجمع الباقي و اغسله و جففه فجمع بلورات اكسيد الكروم الاخضر غير الهيدراتي
هو قاعدة قوية املاحه زرق نمص اكسجينا بشراهة

اول سسكوي اكسيد الكروم - هو الممتدق الاحمر المشار اليه انفا المتكون
حالا من الاكسيد الاول

سسكوي اكسيد الكروم كرم ا - يُستحضر باحما كرومات الزئبق الى درجة
الحمرة فينحل ويبقى سسكوي اكسيد الكروم - هو اخضر اللون غير قابل التذويب
يُستعمل في الصنائع للتصوير على المخزف الصيني باللون الاخضر و الملون الزجاج
لونا اخضر

أكسيد الكروم الهيدراتي كروا ه - يُستحضر بتذويب كرومات الپوتاسا ثم
يضاف الى المذوب حامض هيدروكلوريك قليل و الكحول قليل و يغلى فيتحول
لون المزيج من اصفر الى اخضر ثم اصف امونيا كاويا فيرسب اكسيد الكروم

الهيدراتي الاخضر فيُرشح ويُغسل ويُجفف

حامض كروميك غير هيدراتي كرا_١ - يُستحضر بتذويب لي كرومات البوتاسا في ماء سخن الى الشبع ومتى برد يضاف ١٠٠ جزء منه الى ١٥٠ جزء حامض كبريتيك ثنيل وبتترك حتى يبرد فينبلور الحامض بعد مدة ثم يفرغ السبال وتوضع البلورات على قريميد وتغطى ببلورة حولها رمل لاجل منع دخول الهواء فتجف بعد نحو يومين

صفاته - يحص ماء من الهواء ويزوب فيه . بالحرارة ينحل الى اكسجين وسكوي اكسيد الكروم - بسبب عدم ثبوته ينزع اكسجيناً من مواد كثيرة مثال ذلك اذا وُضع الحامض الجاف في سخن وصب عليه الكحول قليل يشعل . اذا مزج الكحول صرف وكبريت الكربون ثم اضيف اليها حامض كروميك جاف مها كان قليلاً يشعل المزيج

حامض كروميك اعلى عبارته رها كرا_٢ - هو غير ثابت

حامض كلوروكروميك كرا_٣ كل - يُستحضر بمزج ثلاثة اجزاء لي كرومات البوتاسيوم و $\frac{١}{٢}$ جزء من كلوريد الصوديوم مزجاً تاماً ثم يوضع المزيج في انبيق زجاج صغير ويضاف اليه ٩ اجزاء حامض كبريتيك ويحمى الكل حتى يكف صعود البخار الاحمر فيبني سبال احمر يشبه البروم هو الحامض الكلوروكروميك . الماء يجله فينولد حامض كروميك وحامض هيدروكلوريك وقد مضى ذكره

كرومات البوتاسيوم { كرا_١ - هو اصل جميع مستحضرات الكروم
پ_٢

وُستحضر من الكروم المعدني الحديدي الذي هو مركب من مسكوي اكسيد الكروم واكسيد الحديد الاول بتكليس مع نترات البوتاسيوم ثم يُغسل بماء لاجل تذويب الكرومات ويضاف اليه حامض نيتريك لاجل ارساب السليكا الذي يخالطه فيتحول الكرومات المتعادل الى لي كرومات الذي يجمع بالتجفيف والتبلور ثم يذوب ايضاً ويضاف الى كل ٢٩٧ جزءاً من المذوب ١٢٨ جزءاً من كربونات البوتاسيوم فينولد الكرومات المتعادل فيجمع بالتجفيف والتبلور على هيئة بلورات صفر - يذوب في جزءين من الماء على ٦٠°ف - ١٥٥°س . القليل

منه يكسب الماء لونا اصفر

لي كرومات الپوتاسيوم پ ٢١ كروا م . قد تقدم ذكر استحضار . بلوراته
صفر برطالية اللون ، بذوب في ١٠ اجزاء ماء وهو كثير الاستعمال في الصناعات
ثالث كرومات الپوتاسيوم پ ٢٢ (كروا م) - يُستحضر بتذويب لي كرومات
الپوتاسيوم في حامض نيتريك سخن الى الشبع ثم يُترك حتى يبرد فينبور
الكرومات الثالث على هيئة بلورات سود محمرة وفي الهواء تسود

كرومات الرصاص رص ١ كروا م - اذا مزج مذوب كرومات اوي
كرومات الپوتاسيوم ومذوب نترات او خلات الرصاص برسب راسب اصفر
هو كرومات الرصاص - اذا أُغلي في ماء الكلس يخسر جوهراً من حامض
فيتحول الى النعت كرومات . لونه برطالي . اكثر استعمالها في طبع الاقمشة القطنية
وصبغها

كرومات الفضة فض ١ كروا م - يُستحضر باضافة مذوب كرومات
الپوتاسا الى مذوب نترات الفضة فيرسب على هيئة مسحوق اسمر محمر بذوب
في حامض نيتريك مخفف سخن واذا برد السيل يبلور على هيئة صفائح صفار

كرومات الباريئا - اصفر - لا يذوب

كرومات الزنك - اصفر - لا يذوب

كرومات الزينق - احمر - لا يذوب

كرومات النحاس احمر لونه مثل كرومات الفضة

كرومات البزموت اصفر مثل كرومات الرصاص

كبريتات الكروم الاعلى كروم ١ ٢ (كروا م) يُستحضر اكسيد الكروم باحماه
الحامض الكروميك ثم ينفع بعض الايام في حامض كبريتيك فيتولد الكبريتات
على لون بنسجي . اذا أُغلي يخضر واذا أُحي مدة يجمر

الشب الكرومي - انفذ غاز الحامض الكبريتوس في مذوب لي كرومات
الپوتاسا بالآلة المرسومة صحيفة ١٥٨ حتى يخضر ثم اضف اليه حامضاً كبريتيكاً
حتى يحصل فوران واتركه مدة فينبور منه الشب الكرومي على هيئة بلورات

ذوات ثنائي زوايا. يذوب في ماء ولا يذوب في الكحول
كواشف املاح الكروم - (١) املاح أكسيد الكروم الاول القابلة للذوب
تولد مع الفلويات الثابتة رواسب سمراً وهذه الفلويات مع املاح غير الأكسيد
الاول تولد رواسب بنفسجية اللون تذوب في زيادة الكاشف ثم ترسب ايضاً اذا
أغلي السبال

(٢) الهيدروجين المكثرت لا يرسب شيئاً منها

(٣) جميع مركبات الكروم اذا تكلست مع مزيج من كربونات البوتاسيوم
ونترات البوتاسيوم تولد كرومات البوتاسيوم القابل للذوب
(٤) البازيتا يولد مع املاح الكروم راسباً اصفر وكذا الرصاص والقصدير
والبرموت. اما النحاس فراسباً احمر غامقاً واما الزئبق فراسباً احمر قرميدياً

الكوبلت كو

سبته كو وزنه الجوهري ٥٩ وزن جوهري المادي مجهول
الكوبلت موجود في الطبيعة مع الزرنيخ والنكل ومع الحديد في الحديد
البيزكي ويستخلص باصهار أكسيده مع فحم على درجة عالية من الحرارة او بتكليس
أكسلاتوه او بجل أكسيده بواسطة هيدروجين

صفاته - هو ذو لعة معدنية ابيض سريع الانصاف مغنطيسي يقبل التطرق
قليلاً ثقلة النوعي ٨٢٥ يصهر على درجة اصهار الحديد لا يتأكسد في الهواء ولا في
الماء على الحرارة الاعتيادية ويتأكسد بسهولة على حرارة عالية. يذوب في حامض
نيتريك اما الحامض الكبريتيك والهيدروكلوريك فيفعلان به قليلاً

كلوريد الكوبلت كو كل ٢ - يُستخلص بذبوب الاكسيد في حامض
هيدروكلوريك فيتولد سيال وردي اللون. اذا تجفف يتبلور بلورات وردية
هيدراتية واذا أُحيى فبلورات زرق غير هيدراتية واذا اصابتها ماء جمر المدوب
والمدوب الخفيف منه هو المحبر السبمياثوي اي اذا كُتب به على قرطاس لا تظهر
الكتابة الى ان يحمى القرطاس فنظهر على اللون الازرق ثم اذا تركت تزول ايضاً.
اما المحبر السبمياثوي الاخضر فهزيج من الكوبلت والنكل

بوديد الكوبلت كوي ٢ كبريت الكوبلت الاول كو ٤
 بروميد الكوبلت كوب م مسكوي : كو ٢ م
 فلوريد الكوبلت كوفل م : الثالث كو ٢ م
 اكسيد الكوبلت الاول كوا - هو مسحوق ازرق يذوب في المحامض ويولد
 معها املاحا - يُستحضر بارساب الكبريتات او الكلوريد بواسطة كربونات الصودا
 ثم يُغسل الراسب ويُجفف ويكلس. اذا اضيف الى مذوب بوتاسا كاو يرسب راسب
 ازرق جميل اذا اُحي بغول الى لون بنسجي
 مسكوي اكسيد الكوبلت كو ٢ م ١ - يُستحضر بمزج مذوب الكوبلت
 وكلوريد الكلس - هو مسحوق اسود متعادل غير قابل الذوب
 حامض كوبلتيك - ذكره بعضهم على هيئة كوبلتات الپوتاسيوم عبارته
 پ ٢١ (كو م ١ + ١٥٢)

كبريتات الكوبلت كوا ١ م + ١٥ - بلوراته حمرة تذوب في ٢٤ جزءا
 من الماء البارد . يتركب مع الپوتاسا والامونيا فيكون املاحا مزدوجة فيها ستة
 جواهر ماء. اذا اضيف اليه مذوب حامض اكساليك بغول الى اكسالات الكوبلت
 كربونات الكوبلت - يستحضر باضافة كربونات قلوي الى مذوب كوبلت
 فيرسب راسب على لون زهر الدراقن هو مزيج من كربونات الكوبلت وهيدراته
 قد ذُكرت للكوبلت مركبات مع الفسفور والزرنيخ

اكسيد الكوبلت مستعمل في الصنائع لاجل تلوين الزجاج لونا ازرق كما
 يظهر من اصهار قابل منه مع بورق في طب البوري فاذا سحق زجاج ملون
 به فهو المعروف بالسملت وقد يصنع لازورد كوبلتي بمزج الومينا مستحضر حديثا
 ١٦ جزءا وفضفات الكوبلت او زرنجات الكوبلت جزئين ثم يجرى الى الحمرة .
 ويلون الزجاج لونا اسود جميلا بواسطة مزيج من الكوبلت والمنغنيس والحديد
 كواشف الكوبلت (١) مذوب الپوتاسا يولد مع مركبات الكوبلت
 راسبا ازرق بغول بالحرارة الى بنسجي واحمر

(٢) الامونيا يولد راسبا ازرق يذوب بصعوبة في زيادة الكاشف وبنغول الى

(٣) كربونات الصودا يولد معها راسباً قرنفلي اللون وكذا كربونات النشادر وهذا الأخير يذوب في زيادة الكاشف

(٤) فروسيانيد البوتاسيوم يولد راسباً أزرق مخضراً

(٥) سيانيد البوتاسيوم يولد راسباً أصفراً يذوب في زيادة الكاشف

(٦) هيدروجين مكبرت لا يفعل إذا كان الكوبلت مركباً مع حامض ثقيل

(٧) كبريت الامونيوم يولد راسباً أسوداً لا يذوب في حامض هيدروكلوريك

مخفف

نكل نك

سبته نك وزن جوهره ٥٩ وزن جوهره المادي مجهول
النكل موجود في الطبيعة مع الزرنيخ وفي الحديد النيزكي ويستخضر كما يستخضر

الكوبلت

صفاته - هو ذو لمعة معدنية أيضاً قابل التطرق ثقله النوعي ٨.٨ لا يتأكسد في الهواء يذوب في الحامض النيريك والحامض الكبريتيك والهيدروكلوريك يدوبان في هيدروكسجين أكثر استعماله في الصناعات لاجل تكوين امزجة معدنية فانه جزء من معاملة البليجيك والسويس والمزيج المعروف بفضة جرمانية مركب من ٥٠ جزءاً من النحاس و ٢٥ جزءاً من النكل و ٢٥ جزءاً من الزنك

كلوريد النكل نك كل - يستخضر بنذوب أكسيد النكل او كربوناته في حامض هيدروكلوريك فيتولد سيال اخضر اذا جففت تبلور منه بلورات هيدراتية خضرة واذا اُحميت حتى تصير غير هيدراتية تصفر ان لم يجالطها كوبلت فتبقى خضراً

أكسيد النكل الاول نك ١ - يستخضر باحماة النترات الى الحمرة

شسكوي أكسيد النكل نك ٢ ١ - يستخضر بامرار كلور في الاكسيد الهيدراتي

مع ماء

كبريتات النكل نك ١ كا ٢ + ١٥٧ - بلوراته منشورات خضرة تذوب في ٢ اجزاء ماء باردي. يولد املاحاً مزدوجة مع كبريتات البوتاسا والامونيا. اذا


اضيف الى مذوبه مذوب حامض افسا ليك يرسب راسب ازرق مخضر هو
الأكسالات

كربونات النكل - يُستخضر مزج مذوب الكبريتات او الكلوريد وكربونات
الصودا فيرسب راسب اخضر فاتح هو مزيج من كربونات النكل وهيدراته
كواشفه - (١) املاحه خضر اللون

- (٢) الفلويات الكاوية تولد معهار راسب خضرًا لا تذوب في زيادة الكاشف
- (٣) الامونيا يولد راسبًا اخضر يذوب في زيادة الكاشف فيزرق
- (٤) كربونات البوتاسا او الصودا يولد راسبًا اخضر فاتحًا
- (٥) هيدروجين مكبرت لا يرسبها ان كان حامضها ثقبلاً
- (٦) كبريتت الامونيوم يولد راسبًا اسود لا يذوب في حامض هيدروكلوريك
مخفف و يذوب في حامض نيتريك سخن وفي حامض نيترو هيدروكلوريك
- (٧) سبائيد البوتاسيوم يولد راسبًا اخضر يذوب في زيادة الكاشف فيصفر
ثم يرسب ايضًا بالحامض الهيدروكلوريك

الرصاص رص

سبته رص وزنه الجوهري ٢٠٧ وزن جوهره المادي مجهول
الرصاص موجود في الطبيعة على هيئة الكبريتت وبعض الاحيان يكون
هذا الكبريتت على هيئة كعوب بعضها رصاص صرف وبعضها تحاطة فضة وكيفية
استخلاص الرصاص هي ان يحمي الكبريتت اولاً فيتحول بعض الكبريتت الى
كبريتات الرصاص هكذا رص ك + ٢ (١١) - ك رص اء والبعض يتحول الى
اكسيد الرصاص وحامض كبريتوس والبعض يبنى بلا تغير ثم يقطع عنه الهواء
ويحوي الكحل الى درجة عالية فيفلت غاز الحامض الكبريتوس ويبقى الرصاص وهذه
صورة المحل والتركيب



ر ص ك + ٢ (ر ص ا) - ٢ (ك ا م) + ٢ ر ص
كبريت الرصاص أكسيد الرصاص حامض كبريتوس

صفاته - هو معدن أزرق ذو لعة معدنية اذا قطع حديثاً ويكدر في الهواء
لين ثقلة النوعي ١١٤٥ وكثافته تقل بالطرق خلاف سائر المعادن يصهر عند
٦٠٠°ف - ١٥٢٥°س واذا أحيى الى درجة الياس يغلي ويتصعد واذا برّد بالدرج
ينبلور على هيئة كموب وفي الهواء الرطب يكسي مادة زرقاء هي تحت أكسيده .
اذا أحيى في الهواء بناكسد . الحوامض الخفيفة ما عدا النتريك تفعل بالرصاص
شيئاً فشيئاً . اذا بقي في الماء الصرف معرضاً للهواء بمص أكسجيناً وحامضاً كربونيكاً
فينولد الكربونات الهيدراتي واذا كان في الماء ملح ما مذوباً يمنع هذا الفعل
فيحفظ الرصاص . الحامض الكبريتيك الثقل بولد معه كبريتات الرصاص . يتركب
مع الزئبق فيتكون ملغم وهذا الملغم جامد اذا كثرت الرصاص وسبال اذا كثرت الزئبق
كلوريد الرصاص - ر ص كل م - يستخضر بمزج مذوب خلاص الرصاص
ثقبلاً ومذوب كلوريد الصوديوم ثقبلاً وايضاً بمذوب أكسيد الرصاص في
حامض هيدروكلوريك سخن مخفف ثم برشح السبال ويترك لكي يبرد فينبلور منه
الكلوريد على هيئة ابر لا لون لها تذوب في ١٢٥ جزءاً ماء بارداً . هو غير هيدراتي
يصهر اذا أحيى ثم اذا برد يجهد على هيئة مادة تشبه القرن مع الأكسيد بتولد أكسي
كلوريد يستعمل في صنعة الدهان

يوديد الرصاص ر ص ي م - يستخضر باضافة مذوب ملح رصاص الى مذوب
يوديد اليوتاسيوم - هو اصفر اللون لا يذوب في الكحول يذوب قليلاً في ماء
بارد واكثر في ماء سخن والمذوب اذا ترك ينبلور منه بلورات جميلة صفر . اذا
أحيى في الهواء يتحول الى أكسي يوديد

بروميد الرصاص ر ص ب م - يستخضر كالبيوديد ويشبهه في أكثر خصائصه
فلوريد الرصاص ر ص فل م

كبريت الرصاص ر ص ك - هو الرصاص المعدني اي الهيئة التي عليها
يوجد الرصاص في الطبيعة بالاكثرو يستخضر صنعباً بفعل الحامض الهيدروكبريتيك
اي الهيدروجين المكثرت بملح رصاصي قابل الذوبان فيرسيب على هيئة مسحوق

اسود. اما الطبيعي فمتبلور على هيئة كعوب ثقلة النوعي بين ٢٥٠٢٥ و ٢٧٠٧ ويصهر اذا أُحمي الى درجة الحمرة . الحامض النيتريك المخفف يحوله الى نيترات الرصاص والكبريت يرسب واذا كان الحامض النيتريك ثقيلًا يتأكسد بعض الكبريت فيتولد حامض كبريتيك فيرسب كبريتات الرصاص غير قابل الذوب . اما الحامض الهيدروكلوريك والحامض الكبريتيك المخفف فلا يفعلان بكبريت الرصاص

الكبريت الطبيعي كثيرًا ما نخالطه فضة

أكسيد الرصاص الاول رص ا - هو المرذارسنك او المرذارسوخ او المرذاسنك - يُستحضر باحمااء الرصاص في الهواء او باحمااء الكربونات الى الحمرة - يذوب في الماء قليلاً و يذوب في مذوب يوتاسا سخن ومتى برد السبال يتبلور على هيئة منشورات معينة . اذا أُصهر يذوب السليكا بسهولة فيفسد بوظقة بسرعة

أكسيد الرصاص الثاني غير الهيدراتي رص ا م - اذا أُضيف حامض الى

السلفون يتولد أكسيد الرصاص ويرسب راسب هو رص ا

أكسيد الرصاص المالح - السلفون - رص م ا ع - يُستحضر بذبوب الاكسيد الثاني والاكسيد الاول في يوتاسا فيرسب السلفون هيدراتياً وللنجارة تُستحضر باحمااء الاكسيد الاول في الهواء بدون صهره فيكون الناتج مزيجاً من رص م ا ع و ٢ (رص ا) + رص ا م - لونه احمر واكثر استعماله للدهان

كبريتات الرصاص - يُصنع في معامل الاقمشة القطنية المطبوعة . بعدون خلاات الالومينوم باضافة كبريتات الالومينوم الى خلاات الرصاص فيتولد كبريتات الرصاص . هو مسحوق ابيض لا يذوب في الماء و يذوب في ماء محمض

نيترات الرصاص رص ا ن ا ه - يُستحضر بذبوب رصاص او اكسيده او كربوناته في حامض نيتريك فيرسب ويتبلور لانه يذوب في الحامض قليلاً . يذوب في الماء سخن ولا يذوب في الكحول

كرومات الرصاص رص ا كرو ا ن م - يُستحضر باضافة مذوب خلاات الرصاص الى مذوب في كرومات الپوتاسا - هو موجود في الطبيعة على هيئة

بلورات جمر. اما المصنوع فاصفر اللون يُعرف عند الدهانين بالاصفر الكروي
 كربونات الرصاص المتعادل - الاسفيداج. رصاص اكرام - هو موجود
 في الطبيعة على هيئة ابر طويلة مخالطاً معادن اخرى وبتنحصر صناعياً
 برصاص مذوّب النيترات او المخلات بواسطة فلوي كربوني. اما التجاري فيستحضر
 بلف قطع رصاص رقيقة لفاً لولياً اي حلزونياً وغمرها في خل في اوعية فخار
 ثم يطهر الكل تحت زبل ويترك مدة فيتولد اولاً المخلات ثم الكربونات بواسطة
 الحامض الكربونيك المتكون باختار الزبل . وبتنحصر ايضاً بتذويب اكسيد
 الرصاص في حامض خليك ثم يُنقذ في المذوّب حامض كربونيك . والفعلة في
 معامل هذا الصنف كثيراً ما يعترضهم الفولنج الرصاصي المعروف بفولنج الدهانين
 اذا وُضع رصاص نظيف في ماء صرف وعرض على الهواء بكنسي كربوناتاً
 واذا خالط الماء بعض الاملاح كما يحدث غالباً في مياه الانهر فيكسي قشرة
 كبريتات الرصاص غير قابل الذوبان توقية من النائر بالماء والهواء بعد ذلك
 ومن هذا القبيل بدفع الضرر الحاصل من جريان ماء الشرب في انابيب رصاص .
 واذا كان الماء حاوياً مقداراً من الحامض الكربونيك يذوّب كربونات الرصاص
 فيجعل الماء ساماً

كربونات الرصاص يستعمل في صنعة التدهين اما دهانه فاذا عرض على
 هيدروجين مكبرت يسود

اما خللات الرصاص فسياتي ذكره في محله

كواشف املاح الرصاص - (١) اليوتاسا الكاوي او الصودا الكاوي برسب
 راسباً ايضاً يذوب في زيادة الكاشف

(٢) الامونيا برسب راسباً ايضاً لا يذوب في زيادة الكاشف. اما مع المخلات

فلا يظهر راسب بالمحال

(٣) الحامض الهيدروكلوريك برسب راسباً ايضاً لا يذوب في امونيا ولا

يتغير لونه بامونيا. يذوب في ماء غالي واذا برد يتبلور على هيئة قشور

(٤) الهيدروجين المكبرت برسب راسباً اسود لا يذوب في كبريت الامونيا

واذا اضيف اليه حامض نيتريك بتولد النيترات القابل للتذويب والكبريتات

غير القابل الذائب

(٥) المحامض الكبريتيك برسب راسباً ايضاً لا يذوب في حامض نيتريك و يذوب في طرطرات الامونيا
(٦) املاح الكروم القابلة الذائب تولد مع املاح الرصاص رواسب صفراء
تذوب في پوتاسا

اذا مزج رصاص وقصدير على نسبة ١:٢ يتولد معدن اللحام القصديري واذا عكست النسبة يتولد لحام بصهر بجمارة اقل من الاول. ولاصطناع المخردق يضاف الى الرصاص قليل من الزرنيخ

الپلاتين پلا

سيميئة پلا وزنه الجوهري ١٩٧ وزن جوهره المادي مجهول

الپلاتين موجود في الطبيعة ممزوجاً مع پلاديوم وروديوم و ايرديوم و قليل من الحديد على هيئة قطع صغار وكبار في جبال اورال وجزيرة كيلان و برازيل . يُستخلص باضافة حامض نيتروهيديروكلوريك الى المعدن فيذوب الپلاتين و قليلاً من الارديوم الذي يخالطه ثم ينصفى السيل وينظف اكثره بالحمارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلوريد الامونيوم الذليل اليه فيحصل مزيج من كلوريد الامونيوم وكلوريد الپلاتين فيغسل في الكحول ويكس ويحمق ويحبل بماء ويضغط في اسطوانة حديد ويحمى الى الحمرة ويطرق حتى يصير قطعة واحدة

صفاته — هو معدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب عسر الاصهار جداً اثقل المواد المعروفة ثقله النوعي بين ٢١٥ و ٢١٧ لا يتأكسد بالحمارة ولا تفعل به المحامض غير الحامض النيتروهيديروكلوريك. يتأكسد بواسطة الپوتاسا والليثيا اذا احيا معاً

اذا نُقع فرطاس غير منشى او اسبستوس في مذوب لي كلوريد الپلاتين ثم اُحيى يتكون اسفنج الپلاتين وقد مضى ذكره في الكلام بالهيدروجين اما الپلاتين الاسود فيتكون باحمااء مذوب لي كلوريد الپلاتين واضافة كربونات الصودا اليه بزيادة مع قليل من السكر حتى يسود الراسب ويكون السيل صافياً لالون له ثم يجمع الراسب ويغسل ويجفف بجمارة لطيفة وله خاصية ضغط الغازات بزيادة

عن اسفنج البلاتين فيحول الحامض النمليك الى حامض كربونيك واذا قُطر عليه الكحول يتأكسد فيحول الى حامض خليك وقد يشعل بالحجارة المُظهرة من العمل في كلوريد البلاتين يلاكل ٢ - يُستحضر باحمااء الكلوريد الاعلى الى ٤٠٠°

ف - ٢٠٤٤٥° س فيطرد نصف الكلور - هو مسحوق اسمر مخضر لا يذوب في الماء و يذوب في حامض هيدروكلوريك

كلوريد البلاتين الرابع يلاكل ٤ - هو الكلوريد الاعلى . يُستحضر بنذوب البلاتين في حامض نيترو هيدروكلوريك ثم يجفف فينبور . هو اسمر مصفر سريع الذوبان في الماء وفي الكحول بمص ماء من الهواء و يذوب فيه

كلوريد البلاتين النشادري . يُستحضر باضافة مذوب كلوريد الامونيا الى مذوب كلوريد البلاتين فيرسب على هيئة بلورات صغار صفر

بروميد البلاتين الرابع يلاب ٤

يوديد البلاتين الاول او الثاني يلاي ٢ يوديد البلاتين الرابع يلاي ٤ اكسيد البلاتين الاول بلا ١ - يُستحضر بنقع الكلوريد الاول في مذوب پوتاسا كلو فيرسب راسب اسود يذوب في زيادة الفلوي . اذا أُحيى الاكسيد الثاني في مذوب حامض اكساليك يتحول الى الاكسيد الاول فيذوب في السيلال الذي يكسب اونا ازرق غامقا ويرسب منه ابر نحاسية اللون هي اكسالات الاكسيد الاول اكسيد البلاتين الثاني بلا ٢ - يُستحضر بنقع الكلوريد الرابع في مذوب پوتاسا فيبني ذائبا في السيلال كما تقدم في الاكسيد

كواشفة - (١) مركبته لا تُرسب بواسطة حامض هيدروكلوريك

(٢) الهيدروجين المكبريت يرسيها والراسب يذوب في كبريتت قلوي ولا يذوب في حامض هيدروكلوريك وحده ولا في حامض نيتريك وحده و يذوب في مزيجها

(٣) كلوريد الامونيوم او كلوريد پوتاسيوم يولد معها راسبا اصفر لا سيما اذا اضيف الى السيلال الكحول

پلاديوم پل

سبته پل وزنه الجوهري ١٠٦٢٥ وزن جوهره المادي مجهول
هو موجود في الطبيعة مع البلاتين وبشبهه. ثقله النوعي ١١٢٨
الحامض النيتريك يفعل به قليلا. اما الحامض النيتروهيديروكلوريك فيذوبه
كلوريد الپلاديوم الاول پل كل - يُستخضر بنذوب پلاديوم في حامض
نيتروهيديروكلوريك
كلوريد الپلاديوم الثاني . يُستخضر بتق الكلوريد الاول في حامض
نيتروهيديروكلوريك صرف
كبريت الپلاديوم - يُستخضر باصهار پلاديوم وكبريت معا
اكسيد الپلاديوم الاول پلا - يُستخضر بنذوب پلاديوم في حامض نيتريك
ثم يجفف ويحمى بلطافه
اكسيد الپلاديوم الثاني بلا ٢
قد يمزج الپلاديوم مع النحاس ومع الفضة . اما ملغمة مع الزئبق فمستعمل
لاجل حشواضراس مسوَّسة وهو موجود في برازيل ممزجا مع الذهب
كواشفه - مذوب سيانيد الزئبق برسبه على هيئة راسب اصفر فاتح

الفصل الثالث عشر

معادن من الرتبة الخامسة

الى الآن لم يُعرف معدن من هذه الرتبة

الفصل الرابع عشر

في المعادن من الرتبة السادسة اي ذوات ستة جواهر
ان في هذه الرتبة خمسة معادن وهي ملبديوم وتونجستن وارديوم وروديوم
وروثينيوم جميعها قليلة الوجود فنذكرها بالاختصار

مليدنوم مل

سمته مل وزنه الجوهري ٦٦ وزن جوهره المادي مجهول
هو موجود في الطبيعة على هيئة ثالي كبريتت الملبدنوم ومليدات الرصاص
ويُستخضر باحماض المحامض الملبديك الى اعلى درجة ممكنة في بوظقة مبطنة فحماً
صفائه - هو معدن لامع ابيض عسرا الاصهار ثقله النوعي ٨٢٦ . اذا أُحمي
في الهواء يتأكسد فيتولد حامض ملبديك . اذا أُصهر مع نترات اليوتاسا يتولد
مليدات اليوتاسا

كلوريد الملبدنوم مل كل - اكسي كلوريد الملبدنوم مل كل ا - كبريتت
الملبدنوم الرابع مل ك
كبريتت الملبدنوم الثاني مل ك م هو موجود في الطبيعة وفي الظاهر يشبه
الپلومياجين غير انه افخ منه لونا

اكسيد الملبدنوم الاول مل ا اكسيد الملبدنوم الثاني مل ا م
حامض ملبديك مل ا م - يُستخضر باحماض الكبريتت الثاني في الهواء فيطرد
الكبريت ويتأكسد المعدن ثم يضاف اليو ماء النشادر فيذوب اكسيد الملبدنوم
ويحدث مذوب مليدات الامونيا فيجفف وينكلس فيبقى الحامض غير الهيدراتي
على هيئة مسحوق ابيض . يذوب في الماء قليلاً ويذوب بسهولة في الفلويات ومن
املاحه

مليدات الصودا ومليدات الامونيا ومليدات الرصاص . اما مليدات الامونيا
مع حامض نيتريك بزيادة فهو الكاشف عن الحامض النصفوريك اذ يولد مع
املاحه راسباً اصفر

توننجستن تون

سمته تون وزنه الجوهري ١٨٤
هو موجود في الطبيعة على هيئة توننجستنات الحديد والمنغنيس وتوننجستنات
الكلس يستخضر باحماض التوننجستيك في مجرى هيدروجين الى درجة عالية
صفائه - هو معدن ابيض صلب سربع الانصاف ثقله النوعي ١٧٢٤

إذا أُحْمِيَ إلى الحمرة في الهواء بشعل ويتولد حامض تونجسنيك
له مركبان مع الكلور ومركبان مع الكبريت
أكسيد التونجستن الثاني تون ا م

حامض تونجسنيك تون ا م - يُستحضر من تونجسنتات الكلس بنفوع في حامض
نيتريك سخن - هو مسحوق أصفر لا يذوب في الماء ويذوب في الفلويات الكاوية .
من أملاح تونجسنتات الصودا قد استعمل لاجل نزع امكانية الاشتعال من
الاقمشة الذاعمة بنفعا فيه او اضافته إلى النشاء الذي تنشى به
أكسيد التونجستن الاوسط او الأزرق تون م ا ه - يُستحضر بأحما تونجسنتات
الامونيا - لونة أزرق جميل

إرديوم إرد

سبئة إرد وزنة الجوهري ١٩٧
هو موجود في الطبيعة مع الپلاتين ويُعرف له من المركبات الكلوريد الاول
إرد كل والسكوي كلوريد ارد م كل م والكلوريد الثاني ارد كل م والكلوريد
الثالث ارد كل م والأكسيد اردا والاسكوي أكسيد ارد م ا م والأكسيد الثاني
إرد ا م والأكسيد الثالث ارد ا م

روديوم رود

سبئة رود وزنة الجوهري ١٠٤
هو موجود في الطبيعة مع الپلاتين. ثقله النوعي ١٠.٤٦ او ١١ من مركباته السكوي
كلوريد رود م كل م والأكسيد الاول والاسكوي أكسيد وكبريتات الروديوم
إذا خالط الفولاذ مقدار قليل من الروديوم يحسن جدا

روثينيوم رو

سبئة رو وزنة الجوهري ١٠٤
هو موجود مع الپلاتين في الطبيعة. ثقله النوعي ٨.٤٦ ومن مركباته السكوي
كلوريد رو م كل م والأكسيد الاول والاسكوي أكسيد والأكسيد الثاني

أزميوم از

سبته أز وزن جوهره ١٩٧

هو معدن مزرق اللون ثقله النوعي ١٠ ومن مركباته الكلوريد الاول
والسكوي كلوريد والكلوريد الثاني والاكسيد الاول والسكوي اكسيد والاكسيد
الثاني والحامض الأزمويس از ١ م والحامض الأزمويس از ١ ع

الجزء الرابع

في الكيمياء الآلية

ملاحظات عمومية

ان العناصر التي منها تتركب المواد المولفة منها اجسام آلية هي قليلة العدد
والمجانب الاكبر من هذه الاجسام مركب من كربون وهيدروجين واكسجين ونيروجين
مع شيء جزئي من الفسفور والكبريت والمحدد وكثرة هذه الاجسام مع قلة عدد
عناصرها متوقف على اختلاف نسبة جواهر تلك العناصر بعضها الى بعض عدداً
او وضعاً مثال اختلاف الجواهر عدداً الكحول (ك ر ٤ ١ ٦ ٧) وحامض خليك
(ك ر ٤ ٤ ١) ومثال الاختلاف وضعاً الخشب والنشا والصمغ فكل واحدة
من هذه المواد الثلاث المختلفة الصفات الظاهرة مركبة من (ك ر ١٣ ١٠ ١٠)
واختلافها وصفاً هو من اختلاف وضع هذه الجواهر كما انه من احرف مفروضة
تتالف كلمات مختلفة باختلاف رتبة تلك الاحرف فمن ب ح ر مثلاً يتالف بحر
وحرورج و حرب ورحب والاجسام التي هي على هذه الكيفية سببت متجانسة
وهي كثيرة بين المواد الآلية نادرة بين غير الآلية

ان الاجسام الآلية هي خاضعة لقوانين الكيمياء غير الآلية الا انها سريعة
الانحلال ويحصل من انحلالها مركبات جديدة اثبت من التي انحلت وجميعها بغل
بحرارة درجة الحمرة ولا يمكن تكوينها صنعياً الا نادراً وربما كان ذلك من قلة