

الباب الثالث

طريقة تابع المسار Path Following Method

- مقدمة • تقدير قيمة ملائمة لوسيط دالة الجزء • حساب اتجاهات الخطوة • طريقة نيوتن • اختيار طول خطوة الوسيط • تحليل التقارب

Introduction 1.3 مقدمة

في هذا الباب، سوف تُعرف طريقة النقطة الداخلية للبرمجة الخطية التي تسمى طريقة تابع المسار. ولا تنس أنه لحل البرنامج الخطي بطريقة السمبلاكس هناك مرحلتين لخطوات الحل، بينما تحتاج طريقة تابع المسار إلى مرحلة واحدة فقط. هذا يعني بأن هذه الطريقة يمكن أن تبدأ من نقطة خارج منطقة الحلول المسموح بها للمسألة الأساسية أو الشائبة وستصل مباشرة إلى الحل الأمثل. لذلك نبدأ باختيار عشوائي لقيم موجبة لكل المتغيرات

الأساسية والثانية، أي أن $0 < (z, w, y, x)$ ، وبعد ذلك تحدث هذه القيم بشكل متكرر كالتالي:

- 1 - نقترح قيمة ملائمة لـ μ (أصغر من القيمة "الحالية" لكن ليست صغيرة جداً).

- 2 - نحسب اتجاهات الخطوة $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$ بحيث تشير تقريرياً إلى النقطة $(x_\mu, y_\mu, z_\mu, w_\mu)$ على المسار الأوسط.

- 3 - نحسب طول الخطوة للوسيط θ ، حيث تكون النقاط الجديدة:

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= x + \theta \Delta x & \tilde{y} &= y + \theta \Delta y \\ \tilde{w} &= w + \theta \Delta w & \tilde{z} &= z + \theta \Delta z\end{aligned}$$

نستمر حتى نحصل على مركبات موجبة.

- 4 - نستبدل (x, w, y, z) بالحلول الجديدة $(\tilde{x}, \tilde{w}, \tilde{y}, \tilde{z})$.

لتعریف طریقة تابع المسار بالکامل، يکفي عمل کل من هذه الخطوات الأربع بشكل دقيق.

في الفصول التالية سنبدأ بشرح تلك الخطوات بشكل دقيق حسب الترتيب أعلاه. وفي الفصل الأخير سنشرح تحليل التقارب.

2.3 تقدير قيمة ملائمة لوسیط دالة العاجز

Estimating an Appropriate Value for the Barrier Parameter

سوف نشرح الآن كيفية اختيار μ ، هناك خيارات إما أن تكون μ كبيرة جداً أو صغيرة جداً، وإذا اخترنا μ لتصبح ذات قيمة كبيرة جداً فإنه من الممكن أن المتالية تتقارب إلى المركز التحليلي analytic center لمنطقة الحلول المسموح بها ، وهذا ما لا نريد الوصول إليه. ومن ناحية أخرى إذا اخترنا

μ لتصبح ذات قيمة صغيرة جداً، فإنه من الممكن أن المتسلسلة تبقى بعيدة جداً عن المسار الأوسط، وبالتالي قد تتعثر الخوارزمية عند حدود منطقة الحلول المسموح بها في مكان أمثل فرعياً. الفكرة المثالية أن نجد تسوية معقوله بين هذين الطرفين. ولعمل هذا علينا أن نعرف أولاً القيم التي سوف تمثل القيمة الحالية μ بشكل ما، ومن ثم نختار قيمة أصغر من ذلك ولتكن كسر ثابت منه.

معطى لدينا النقطة (x, w, y, z) وهي بالتأكيد ليست على المسار الأوسط، إذ لو كانت على المسار الأوسط فإن هناك عدة صيغ يمكننا من خلالها استعادة قيمة μ . على سبيل المثال يمكننا فقط حساب x, z لأي دليل ثابت i . أو يمكننا أن نحسب y, w لأي دليل ثابت i . كما يمكننا أن نأخذ القيمة المتوسطة لكل تلك القيم:

$$\mu = \frac{z^T x + y^T w}{n + m}$$

هذه الصيغة تعطينا بالضبط قيمة μ حينما نعلم أن (x, w, y, z) تقع على المسار الأوسط. إن النقطة الرئيسية هنا هي أننا سوف نستخدم هذه الصيغة لإيجاد تقرير لقيمة μ حتى لو كان الحل الحالي (x, w, y, z) لا يقع على المسار الأوسط. بالطبع الخوارزمية تحتاج لقيمة μ التي تمثل نقطة أقرب إلى الحل الأمثلة من الحل الحالي. وبالتالي فإن الخوارزمية تأخذ القيمة أعلى ونخفضها من خلال وسيط كسري.

$$\mu = \delta \frac{z^T x + y^T w}{n + m}$$

حيث أن δ عدد بين الصفر والواحد ، وفي التطبيق وجد أن وضع δ تساوي تقريرياً $1/10$ يعطي أفضل النتائج. ولكن لاختلاف الأداء في ذلك سنتركه ك وسيط .

3.3 حساب اتجاهات الخطوة Calculating Step Directions

هدفنا أن نجد $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$ بحيث أن النقطة الجديدة $(x + \Delta x, w + \Delta w, y + \Delta y, z + \Delta z)$ تقع تقريرياً على المسار الأوسط الأساسي الثنائي في النقطة $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$. نذكر أن المعادلات المعرفة لهذه النقطة على المسار الأوسط هي:

$$Ax + w = b$$

$$A^T y - z = c$$

$$XZe = \mu e$$

$$YWe = \mu e$$

نرى أن النقطة الجديدة $(x + \Delta x, w + \Delta w, y + \Delta y, z + \Delta z)$ ، إذا كانت ستقع بشكل تام على المسار الأوسط عند μ ، فإنها تُعرف على الشكل التالي:

$$A(x + \Delta x) + (w + \Delta w) = b$$

$$A^T(x + \Delta y) - (z + \Delta z) = c$$

$$(X + \Delta X)(Z + \Delta Z)e = \mu e$$

$$(Y + \Delta Y)(W + \Delta W)e = \mu e$$

بالتفكير في (x, w, y, z) على أنها بيانات معلومة و $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$ على أنها مجاهيل ، نعيد كتابة هذه المعادلات ونضع المجاهيل على اليسار وقيم البيانات على اليمين:

$$A\Delta x + \Delta w = b - Ax - w = \rho$$

$$A^T \Delta y - \Delta z = c - A^T y + z = \sigma$$

$$Z\Delta x + X\Delta z + \Delta X \Delta Ze = \mu e - XZe$$

$$W\Delta y + Y\Delta w + \Delta Y \Delta We = \mu e - YWe$$

لاحظ أنتا قدمنا رمزيين للاختصار هما: ρ و σ . إن هذين المتجهين يمثلان الحلول الغير مسموح بها الأساسية و الحلول الغير مسموح بها الثانية على التوالي.

وهذه المعادلات تشكل نظام معادلات غير خطية حيث المتغيرات هي $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$ ونريد أن يصبح لدينا نظام خطى، لهذا يجب أن نتخلص من الحدود غير خطية، فيصبح لدينا النظام الخطى التالي:

$$A\Delta x + \Delta w = \rho \quad (1.3)$$

$$A^T \Delta y - \Delta z = \sigma \quad (2.3)$$

$$Z\Delta x + X\Delta z = \mu e - XZe \quad (3.3)$$

$$W\Delta y + Y\Delta w = \mu e - YWe \quad (4.3)$$

هذا النظام من المعادلات هو نظام خطى مكون من $2n+2m$ معادلة في $2n+m$ مجهول. سوف نوضح لاحقاً أن هذا النظام غير شاذ (حيث أن A لها رتبة كاملة) ولهذا يكون لها حل وحيد، هذا الحل سوف يُعرف اتجاهات الخطوة التالية لطريقة تابع المسار.

إن حذف الحدود غير الخطية في هذا النظام هو أمر شائع لحل نظام معادلات غير خطية، وتسمى هذه الطريقة بطريقة نيوتن، كما سوف يتم شرحها في الفصل التالي.

Newton's Method 4.3 طريقة نيوتن

ليكن لدينا الدالة:

$$F(\xi) = \begin{bmatrix} F_1(\xi) \\ F_2(\xi) \\ \vdots \\ F_n(\xi) \end{bmatrix}, \quad \xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}$$

من \mathbb{R}^n إلى \mathbb{R}^m ، والمطلوب لحل المسألة هو أن نجد نقطة $\xi^* \in \mathbb{R}^n$ بحيث $F(\xi^*) = 0$. مثل هذه النقطة تسمى جذر أو صفر لـ F . طريقة نيوتن هي طريقة تكرارية لحل هذه المسائل.

فيما يلي نوضح أحد خطوات هذه الطريقة. معطى نقطة اختيارية ξ ، الهدف منها هو إيجاد اتجاه الخطوة $\Delta\xi$ بحيث $F(\xi + \Delta\xi) = 0$. وإذا كانت F غير خطية لا يمكن إيجاد أي اتجاه للخطوة. لذلك يكون اتجاه الخطوة مقارب باستخدام أول حدين من سلسلة تايلور الموسعة:

$$F(\xi + \Delta\xi) \approx F(\xi) + F'(\xi)\Delta\xi$$

حيث

$$F'(\xi) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \xi_1} & \frac{\partial F_1}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial \xi_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial \xi_1} & \frac{\partial F_2}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial \xi_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial \xi_1} & \frac{\partial F_n}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial \xi_n} \end{bmatrix}.$$

إن التقرير خطأ في $\Delta\xi$. لذلك عند مساواته بالصفر يعطينا نظاماً خطياً. حيث ينتج من الحل اتجاه الخطوة:

$$F'(\xi)\Delta\xi = -F(\xi)$$

لدينا $\dot{\xi} = \Delta$ ، طريقة نيوتن تُحدّث الحل الحالي ξ باستبداله بـ $\xi + \Delta$. وتستمر هذه العملية إلى أن يصبح الحل الحالي جذر $F(0) \approx 0$. إن طريقة نيوتن تعمل بشكل جيد في الحالات العامة، وقد تفشل إذا كانت F غير مستقرة أو كانت نقطة البداية بعيدة عن الحل.

لإيجاد نقطة على المسار الأوسط نضع:

$$F(\xi) = \begin{bmatrix} Ax + w - b \\ A^T y - z - c \\ XZe - \mu e \\ YWe - \mu e \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad \xi = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \\ z \end{bmatrix}$$

نرى أن مجموعة المعادلات التي تُعرف $(x_\mu, y_\mu, w_\mu, z_\mu)$ هي جذر لـ F . إن مصفوفة اشتقات F هي:

$$F'(\xi) = \begin{bmatrix} A & 0 & I & 0 \\ 0 & A^T & 0 & -I \\ Z & 0 & 0 & X \\ 0 & W & Y & 0 \end{bmatrix}.$$

لاحظ أن

$$\Delta\xi = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta w \\ \Delta z \end{bmatrix}$$

من السهل ملاحظة أن اتجاه نيوتن يتوافق مع الاتجاه الحاصل من حل المعادلات (1.3)-(4.3).

5.3 اختيار طول خطوة الوسيط Choosing the Step Length

إن اتجاهات الخطوة التي حددت باستعمال طريقة نيوتن، حددت تحت فرضية أن وسيط اتجاه الخطوة θ يساوي واحد (أي أن $\tilde{x} = x + \Delta x$). لكن أخذ مثل هذه الخطوة قد يجعل المتغيرات الأساسية والثانوية في الحل الجديد غير موجبة. لذا قد تحتاج لاستعمال قيمة أصغر لـ θ . والتي تضمن أن:

$$x_j + \theta \Delta x_j > 0, \quad j=1,2,\dots,n$$

بنقل Δx إلى الجانب الآخر أولاً ثم بالقسمة على θ و x_j (كليهما موجباً) نرى أن θ يجب أن تتحقق

$$\frac{1}{\theta} > -\frac{\Delta x_j}{x_j}, \quad j=1,2,\dots,n.$$

بالطبع هذه المتباعدة يجب أن تتحقق للمتغيرات y و w و z أيضاً. وعند وضعها مع بعضها البعض فإن القيمة الأكبر لـ θ ستتحقق من خلال:

$$\frac{1}{\theta} = \max_{ij} \left\{ -\frac{\Delta x_j}{x_j}, -\frac{\Delta w_i}{w_i}, -\frac{\Delta y_i}{y_i}, -\frac{\Delta z_j}{z_j} \right\}$$

حيث أنها أسأنا استعمال الترميز قليلاً باستعمال \max_{ij} للدلالة على الحد الأعلى لكل النسب للمجموعة المحددة. وعلى أية حال فإن اختيار θ لن يضمن تباعناً فعلياً، لذا فإننا نقدم الوسيط r ، الذي يعتبر أقل فعلياً من الواحد وفي نفس الوقت قريب من الواحد، ونضع:

$$\theta = r \left(\max_{ij} \left\{ -\frac{\Delta x_j}{x_j}, -\frac{\Delta w_i}{w_i}, -\frac{\Delta y_i}{y_i}, -\frac{\Delta z_j}{z_j} \right\} \right)^{-1} \wedge 1$$

حيث $a \wedge b$ تعني أقل العددين a و b . هذه الصيغة قد تبدو غير واضحة، ولا يتعين على أحد حسابها يدوياً، ولكن تصبح بدلاً ها عند برمجتها بواسطة الحاسب الآلي. مثل هذا الروتين سيكون سريعاً جداً (يتطلب $2n + 2m$ عملية حسابية فقط). إن خلاصة الخوارزمية المبينة في هذا الفصل موضحة كالتالي:

خوارزمية 1.3 (خوارزمية طريقة تابع المسار)

مدخلات نقطتين البداية $(x, w, y, z) > 0$ حيث x, w, y, z بينما

$$\rho = b - Ax - w$$

$$\sigma = c - A^T y + z$$

$$\gamma = z^T x + y^T w$$

$$\mu = \delta \frac{\gamma}{n+m}$$

ليست مثالية

حل

$$A \Delta x + \Delta w = \rho$$

$$A^T \Delta y - \Delta z = \sigma$$

$$Z \Delta x + X \Delta z = \mu e - X Z e$$

$$W \Delta y + Y \Delta w = \mu e - Y W e$$

$$\theta = r \left(\max_i \left\{ -\frac{\Delta x_i}{x_i}, -\frac{\Delta w_i}{w_i}, -\frac{\Delta y_i}{y_i}, -\frac{\Delta z_i}{z_i} \right\} \right)^{-1} \wedge 1$$

$$x = x + \theta \Delta x \quad w = w + \theta \Delta w$$

$$y = y + \theta \Delta y \quad z = z + \theta \Delta z$$

في الفصل القادم، سوف نقوم بتحليل التقارب وسوف نستنتج ما إذا كانت هذه الخوارزمية تقارب إلى الحل الأمثل.

6.3 تحليل التقارب Convergence Analysis

في هذا الفصل، سوف نستقصي خصائص التقارب في خوارزميةتابع المسار. في البداية نود أن نذكر بأن طريقة السمبلكس Simplex method هي خوارزمية فيها عدد الدورات منتهي (بافتراض أن الخطوات مأخوذة بحيث لا يكون هناك دوران). بينما في طريقة النقطة الداخلية فإن الحالة مختلفة لأن كل حل ناتج تكون جميع متغيراته موجبة. ولكي نصل للحل الأمثل يتطلب ذلك تلاشي العديد من المتغيرات. وهذا التلاشي يمكن أن يحدث فقط عند النهاية. وهذا يثير بعض التساؤلات، أهمها: هل متالية الحلول الناتجة عن طريقة تابع المسار تقارب؟ وإذا كانت كذلك هل الحل هو الأمثل؟ وكم مقدار سرعة هذا التقارب؟ وبشكل خاص إذا حدثنا مقدار تحمل الأمثلة فكم عدد الدورات لإنجاز هذا المقدار من التحمل؟ سوف نوضح هذه المسائل في هذا الفصل.

في البداية نحتاج لقياس حجم متجهات مختلفة، و هناك عدة خيارات على سبيل المثال لكل $\infty \leq p \leq 1$ يمكننا أن نعرف معيار p -norm للمتجه x على أنه:

$$\|x\|_p = \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

ويكون لدينا ما يسمى المعيار الجزيئي sup-norm عندما p تقترب من مالا نهاية، وهو معرف كالتالي:

$$\|x\|_\infty = \max_j |x_j|$$

سوف نتطرق الآن لدراسة قياس التحسن، بالذكر بالنظرية الثانية.
حيث أن هناك ثلاثة موازين يجب أن تطبق لكي يكون الحل الأساسي
الثاني أمثل وهي:

1- وجود حلول مسموح بها للمسألة الأساسية.

2- وجود حلول مسموح بها للمسألة الثانية.

3- تحقق نظرية المتممة complementarity.

لكل واحد من هذه الموازين، نقدم مقياس مدى إخفاق تحقيقها.
بالنسبة للميزان الأول، وهو وجود منطقة غير خالية للحلول المسموح بها
للمسألة الأساسية، سوف نستخدم معيار 1-norm لتجهأساسي ليس داخل
منطقة الحلول المسموح بها.

$$\rho = b - Ax - w$$

وأما بالنسبة للميزان الثاني وهو وجود منطقة غير خالية للحلول المسموح بها
للمسألة الثانية، سوف نستخدم معيار 1-norm لتجهثاني ليس داخل منطقة
الحلول المسموح بها.

$$\sigma = c - A^T y + z$$

للتممة سوف نستخدم

$$\gamma = z^T x + y^T w$$

سوف ندرس الآن مقدار التحسن في الدورة الواحدة. ولأجل التحليل في
هذا الفصل يفضل أن نقوم بإجراء بعض التعديلات في الخوارزمية بجعلها ذات
خطوات أقصر من المحددة سابقاً، فنضع

$$\theta = r \left(\max_{ij} \left\{ \left| \frac{\Delta x_j}{x_j} \right|, \left| \frac{\Delta w_i}{w_i} \right|, \left| \frac{\Delta y_i}{y_i} \right|, \left| \frac{\Delta z_j}{z_j} \right| \right\} \right)^{-1} \wedge 1$$

$$= \frac{r}{\max(\|X^{-1}\Delta x\|_{\infty}, \dots, \|Z^{-1}\Delta z\|_{\infty})}^1 \quad (5.3)$$

لاحظ أن التغيير الوحيد الذي أحدثه هو استبدال النسب السالبة بالقيمة المطلقة لنفس النسبة. وبما أن القيمة العظمى للقيم المطلقة يمكن أن تكون أكبر من القيم العظمى للنسب نفسها، فإن هذه الصيغة تعطى قيمة أصغر لـ θ . لتكن x, y, w, z ، تدل على الكميات من دورة واحدة للخوارزمية، ونضع شرطة على نفس الأحرف للدلالة على نفس الكمية في الدورة القادمة للخوارزمية. لذلك

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= x + \theta \Delta x & \tilde{y} &= y + \theta \Delta y \\ \tilde{w} &= w + \theta \Delta w & \tilde{z} &= z + \theta \Delta z \end{aligned}$$

والآن دعنا نقوم بحساب بعض الكميات الأخرى، نبدأ بمنطقة الحلول الغير مسموح بها الأساسية:

$$\begin{aligned} \tilde{\rho} &= b - A\tilde{x} - \tilde{w} \\ &= b - Ax - w - \theta(A\Delta x + \Delta w) \end{aligned}$$

ولكن $b - Ax - w$ تساوي منطقة الحلول الغير مسموح بها الأساسية ρ و $A\Delta x + \Delta w$ أيضاً تساوي ρ ، حيث أن هذه المعادلة هي بالضبط نفس المعادلة (1.3). وبالتالي:

$$\tilde{\rho} = (1 - \theta)\rho$$

بنفس الطريقة

$$\begin{aligned} \tilde{\sigma} &= c - A^T \tilde{y} + \tilde{z} \\ &= c - A^T y + z - \theta(A\Delta y - \Delta z) \\ &= (1 - \theta)\sigma \end{aligned}$$

وحيث أن θ هو عدد بين الصفر والواحد، يترتب على ذلك أن كل دورة ينتج عنها تناقص في الحلول غير المسموح بها لـ كل من المسألة الأساسية والشائكة وهذا التناقص بدوره يقرب θ من الواحد.

إن تحليل المتممة أكثر تعقيداً، حيث أنها نقوم هنا بالتخلاص من الحدود غير الخطية، وجعل النظام خطياً.

$$\begin{aligned}\tilde{\gamma} &= \tilde{z}^T \tilde{x} + \tilde{y}^T \tilde{w} \\ &= (z + \theta \Delta z)^T (x + \theta \Delta x) + (y + \theta \Delta y)^T (w + \theta \Delta w) \\ &= z^T x + y^T w + \theta(z^T \Delta x + \Delta z^T x + y^T \Delta w + \Delta y^T w) \\ &\quad + \theta^2(\Delta z^T \Delta x + \Delta y^T \Delta w)\end{aligned}$$

نحتاج لتحليل كل حد من حدود θ بشكل منفصل. من (3.3) نلاحظ:

$$\begin{aligned}z^T \Delta x + \Delta z^T x &= e^T (Z \Delta x + X \Delta z) \\ &= e^T (\mu e - ZXe) \\ &= \mu n - z^T x\end{aligned}$$

بنفس الطريقة، من (3.3)، لدينا

$$\begin{aligned}y^T \Delta w + \Delta y^T w &= e^T (Y \Delta w + W \Delta y) \\ &= e^T (\mu e - YWe) \\ &= \mu m - y^T w\end{aligned}$$

أخيراً، من (1.3) و(2.3) ينتج لدينا:

$$\begin{aligned}\Delta z^T \Delta x + \Delta y^T \Delta w &= (A^T \Delta y - \sigma)^T \Delta x + \Delta y^T (\rho - A \Delta x) \\ &= \Delta y^T \rho - \sigma^T \Delta x\end{aligned}$$

بتعويض هذه المعادلات في المعادلة الأخيرة لـ $\tilde{\gamma}$ ، نحصل على

$$\begin{aligned}\tilde{\gamma} &= z^T x + y^T w + \theta \left(\mu(n+m) - (z^T x + y^T w) \right) \\ &\quad + \theta^2 (\Delta y^T \rho - \sigma^T \Delta x)\end{aligned}$$

حتى الآن، قمنا بترتيب $z^T x + y^T w = \gamma$ وكذلك $\mu(n+m) = \delta \gamma$. لذلك

$$\tilde{\gamma} = (1 - (1-\delta)\theta) \gamma + \theta^2 (\Delta y^T \rho - \sigma^T \Delta x)$$

يجب علينا الآن أن نبتعد عن المساواة ونعمل على التقدير، والأداة المفضلة للتقدير هي المتباينة التالية:

$$\begin{aligned} |v^T w| &= \left| \sum_j v_j w_j \right| \leq \sum_j |v_j| |w_j| \\ &\leq (\max_j |v_j|) (\sum_j |w_j|) = \|v\|_\infty \|w\|_1 \end{aligned}$$

هذه المتباينة هي حالة بسيطة من متباينة هولدر Holder's inequality، ومنها نلاحظ أن

$$|\Delta y^T \rho| \leq \|\rho\|_1 \|\Delta y\|_\infty \quad \text{و} \quad |\sigma^T \Delta x| \leq \|\sigma\|_1 \|\Delta x\|_\infty$$

لذلك

$$\tilde{\gamma} \leq (1 - (1 - \delta)\theta) \gamma + \theta (\|\rho\|_1 \|\theta \Delta y\|_\infty + \|\sigma\|_1 \|\theta \Delta x\|_\infty)$$

وبعد ذلك نستخدم الاختيار المحدد لطول الخطوة θ لنحصل على حد لكل من $\|\theta \Delta x\|_\infty$ و $\|\theta \Delta y\|_\infty$. من (5.3) نستنتج

$$\theta \leq \frac{r}{\|X^{-1} \Delta x\|_\infty} \leq \frac{x_j}{|\Delta x_j|} \quad \text{for all } j$$

لذلك

$$\|\theta \Delta x\|_\infty \leq \|x\|_\infty$$

و بنفس الطريقة

$$\|\theta \Delta y\|_\infty \leq \|y\|_\infty$$

إذا افترضنا أن الحدود $\|x\|_\infty$ و $\|y\|_\infty$ محدودة بـ عدد حقيقي كبير M ، حيث x و y هما متاليتا المتجهات المستخرجة من خوارزمية تابع المسار، وبالتالي نستطيع تقدير المتممة الجديدة على أنها :

$$\tilde{\gamma} \leq (1 - (1 - \delta)\theta) \gamma + M \|\rho\|_1 + M \|\sigma\|_1$$

والآن سوف ندرس قاعدة التوقف stopping criteria . نضع $\epsilon > 0$ عدداً تحملياً موجباً صغيراً، ونضع $\infty < M$ عدداً تحملياً منتهياً كبيراً. إذا أصبحت $\|x\|_\infty$ أكبر من M نتوقف ونوضح أن المسألة الأساسية غير محدودة. وإذا أصبح $\|y\|_\infty$ أكبر من M نتوقف ونوضح أن المسألة الثانية غير محدودة. وفي النهاية إذا كان $\epsilon < \|\rho\|_1 + \|\sigma\|_1$ ، نتوقف ونوضح أن الحل الحالي هو الأمثل (ضمن نطاق التحمل الصغير).

بما أن مقياس المتممة هو γ ، والمتممة تتعلق بالفجوة الثانية duality gap . فإنه من المتوقع أن قيمة صغيرة لـ γ يجب أن تترجم إلى فجوة ثانية صغيرة. وهذا حاصل فعلاً. فمن تعريف σ , ρ و γ نستطيع أن نكتب

$$\begin{aligned}\gamma &= z^T x + y^T w \\ &= (\sigma + A^T y - c)^T x + y^T (b - Ax - \rho) \\ &= b^T y - c^T x + \sigma^T x - \rho^T y\end{aligned}$$

سوف نستخدم متباعدة هولدر Holder inequality لحد بعض هذه الحدود، نستطيع تقدير الفجوة الثانية :

$$\begin{aligned}|b^T y - c^T x| &\leq \gamma + |\sigma^T x| + |y^T \rho| \\ &\leq \gamma + \|\sigma\|_1 \|x\|_\infty + \|\rho\|_1 \|y\|_\infty\end{aligned}$$

والآن إذا كانت كل من γ ، $\|\rho\|$ صغيرة وكانت $\|x\|_\infty$ و $\|y\|_\infty$ ليست كبيرة جداً تصبح الفجوة الشائبة صغيرة. هذا التقدير يوضح لنا أن لا نتوقع أن الفجوة الشائبة تصبح صغيرة إلى أن تصبح المسألة الأساسية والشائبة قريبة جداً من منطقة الحلول المسموح بها. وتؤكد التطبيقات الفعلية هذا التوقع.

سوف نتطرق الآن إلى مقدار التحسن في خوارزميةتابع المسار من خلال عدة دورات.

الآن نضع $\rho^{(k)}, \sigma^{(k)}, \gamma^{(k)}, \theta^{(k)}$ ، لترمز لقيمة هذه الكميات عند الدورة k^{th} . النظرية التالية توضح الأداء العام للخوارزمية:

نظريّة 2.3

نفترض أن هناك عدداً حقيقياً $t > 0$ ، عدداً حقيقياً $M < \infty$ ، والعدد الصحيح K حيث أنه لكل

$$\theta^{(k)} \geq t, \quad \|x^{(k)}\|_\infty \leq M, \quad \|y^{(k)}\|_\infty \leq M.$$

فإنه يوجد عدد ثابت $\bar{M} < \infty$ بحيث

$$\|\rho^{(k)}\|_1 \leq (1-t)^k \|\rho^{(0)}\|_1, \quad \|\sigma^{(k)}\|_1 \leq (1-t)^k \|\sigma^{(0)}\|_1, \quad \gamma^{(k)} \leq (1-\tilde{t})^k \bar{M},$$

لكل $k \leq K$ حيث

$$\tilde{t} = t(1-\delta)$$

البرهان: إنظر [Wr].

النظرية أعلاه هي إثبات جزئي للتقارب، لأنها تعتمد على افتراض أن أطوال الخطوط تبقى محدودة وبعيدة عن الصفر. ولكي تكون أطوال الخطوط بعيدة عن الصفر يتطلب ذلك تعديل الخوارزمية، بحيث تكون نقطة البداية مختارة بدقة. إن هذه التفاصيل تقنية ولذلك حذفت. (انظر المراجع).

تمارين الباب الثالث

1.3 بالبدء من $(x, w, y, z) = (e, e, e, e)$ ، وباستخدام $\delta = 1/10$

و $r = 9/10$ ، حيث $e = [1, 1, \dots, 1]^T$ بعد خطوة

واحدة من خوارزمية تابع المسار لمسائل التالية:

$$\text{maximize} \quad 3x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

subject to

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$x_i \geq 0 \quad i = 1, 2, 3$$

2.3 أعد السؤال السابق لمسائل التالية:

$$\text{maximize} \quad z = -4x_1 - 3x_2 + 12x_3$$

subject to

$$-2x_1 - 3x_2 + 12x_3 \leq -5$$

$$-x_1 + x_2 + 3x_3 \leq -3$$

$$x \geq 0$$

3.3 أعد السؤال السابق لمسائل التالية:

$$\text{maximize} \quad 5x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 8x_4$$

subject to

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

4.3 بالبدء من $(x, w, y, z) = (e, e, e, e)$ ، وباستخدام $\delta = 1/10$

و $r = 9/10$ ، حيث $e = [1, 1, \dots, 1]^T$ بعد خطوة

واحدة من خوارزمية تابع المسار لمسائل التالية:

$$\text{maximize} \quad 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4$$

subject to

$$8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 7$$

$$2x_1 + 6x_2 + x_3 + 5x_4 \leq 3$$

$$x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 8$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

5.3 ضع $\{x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu\}$: $\mu \geq 0$ تدل على المسار الأوسط. أثبت أن:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} b^T y_\mu - c^T x_\mu = \infty$$

6.3 باعتبار مسألة البرمجة الخطية التي منطقة الحلول المسموح بها

محدودة وغير خالية من الداخل. استعمل نتيجة التمرن 5.3 لإثبات أن

المسائل الثانية لمجموعة الحلول المسموح بها غير محدودة.