

## الباب السادس

### الثنائية وشروط الأمثلة

### Duality and Optimality

- مقدمة • المسائل بشكل
- القياسى • الثنائية القوى
- والضعيف • مجموعة الحلول
- المسموح بها • شروط الأمثلة

#### 1.6 مقدمة Introduction

بشكل عام من الممكن إعادة صياغة جميع مسائل الأمثلة المحدبة على شكل ما يسمى البرمجة الخطية المخروطية conic linear programs . هذه المسائل هي دالة هدف خطية ومجموعة حلول مسموح بها هي عبارة عن تقاطع فراغ تألفي affine space مع مخروط محدب convex cone. إن جميع المعادلات الغير خطية في البرمجة الخطية المخروطية هي متضمنة في تعريف المخروط المحدب. إن للبرمجة الخطية المخروطية خاصية الثنائية القوية تحت قيود مؤهلة. وإذا كان الفراغ التألفي يتقاطع مع الداخل النسبي relative interior للمخروط، فإن المسألة الثنائية تكون قابلة للحل، حيث قيمة الحل

الأمثل لدالة الهدف هي نفسها بالنسبة لمسألة الأساسية. وذلك إذا كانت مجموعة الحلول المسموح بها لمسألة الثانية غير خالية.

من الممكن صياغة تصنيف جزئي subclass من البرمجة الخطية المخروطية إذا اعتربنا المخاريط التي لها نفس الثانية، أي أن المخروط الأساسي والثانية لمسألة متطابقان. وهناك ثلاث مخاريط تطبق عليها هذه الخاصية في الأعداد الحقيقية وهي: الشمن الموجب في  $\mathbb{R}$  ومخروط لوزنتر Lorentz Cone أو مخروط الرتبة الثانية، ومخروط المصفوفات الموجبة شبه المعرفة. هذه المخاريط بترتيبها تُعرف كل من مخروط مسائل البرمجة الخطية ومخروط مسائل الرتبة الثانية ومسائل البرمجة الموجبة شبه المعرفة. إن كون هذه المخاريط لها نفس الثانية يضمن لنا تماثلاً مثالياً بين مسألة الأساسية ومسألة الثانية، أي أنه من الممكن بشكل دقيق تمثيل مسألة الأساسية ومسألة الثانية بنفس الصيغة. وكما شرحنا في الباب الخامس إن مسائل البرمجة الخطية وبرمجة الرتبة الثانية يمكن أن ينظر لها على أنها حالة خاصة من مسائل البرمجة الموجبة شبه المعرفة.

في هذا الباب سوف ندرس بعض خواص النظرية الأساسية للبرمجة الموجبة شبه المعرفة. كما سوف نعرف الشكل القياسي للبرمجة الموجبة شبه المعرفة ونشتق مسألة الثانية المرافق. أيضاً سنتثبت أن النظريات الكلاسيكية للثانية القوية والضعيفة تكون هي الشرط اللازم والكافي لشروط الأمثلة للبرمجة الموجبة شبه المعرفة عندما تكون على الشكل القياس.

## 2.6 المسائل بالشكل القياسي Problems in Standard Form

فيما يلي سوف نعطي الشكل القياسي للمسألة الأساسية:

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & \text{tr}(CX) \\ \text{subject to} & \text{tr}(A_i X) = b_i, \quad i=1, \dots, m \\ & X \in \mathcal{S}_n^+ \end{array} \quad (1.6)$$

حيث  $\mathcal{S}_n^+$  ترمز لمجموعة المصفوفات الموجبة شبه المعرفة. وكذلك يكون الشكل القياسي للمسألة الثنائية على الشكل التالي:

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & b^T y \\ \text{subject to} & \sum_{i=1}^m y_i A_i + S = C \\ & S \in \mathcal{S}_n^+, \quad y \in \mathbb{R}^m. \end{array} \quad (2.6)$$

إن  $X$  و  $(y, S)$  هي عبارة عن حلول مسموح بها، لأنهما يحققان قيود المسألة الأساسية والثنائية على التوالي. سوف نرمز لمجموعة الحلول المسموح بها للمسألة الأساسية بالرمز التالي:

$$\mathcal{P} = \{X \mid \text{tr}(A_i X) = b_i, \quad X \succeq 0, \quad i=1, \dots, m\}$$

وبالمثل سوف نرمز لمجموعة الحلول المسموح بها بالنسبة لمسألة الثنائية بالرمز التالي:

$$\mathcal{D} = \{(y, S) \mid \sum_{i=1}^m y_i A_i + S = C, \quad S \succeq 0, \quad y \in \mathbb{R}^m\}$$

بالمثل نرمز لمجموعة الحلول المثلث لمسألة الأساسية بالرمز:

$$\mathcal{P}^* = \{X \in \mathcal{P} \mid \text{tr}(CX) = p^*\}$$

ونرمز لمجموعة الحلول المثلث لمسألة الثنائية بالرمز:

$$\mathcal{D}^* = \{(S, y) \in \mathcal{D} \mid b^T y = d^*\}$$

حيث القيمتين  $p^*$  و  $d^*$  هما قيمة الحل الأمثل لكل من (1.6) و (2.6) بالترتيب. سوف تكون  $p^* = -\infty$  إذا كانت المسألة الأساسية غير محدودة. و  $p^* = \infty$  إذا كانت المسألة الأساسية ليس لها حلول مسموح بها، أي أن  $\mathcal{P} = \emptyset$ . وبالمثل بالنسبة لمسألة الثانية.

تكون (1.6) وبالمثل (2.6) قابلة للحل إذا كانت  $\mathcal{P}$  غير خالية و  $\mathcal{D}$  غير خالية. ومن الواضح أن (2.6) هي شائبة لجرانج لـ (1.6). لاحظ أن

$$\begin{aligned} p^* &= \min_{X \succeq 0} \max_{y \in \mathbb{R}^m} \left\{ \text{tr}(CX) - \sum_{i=1}^m y_i (\text{tr}(A_i X) - b_i) \right\} \\ &= \min_{X \succeq 0} \max_{y \in \mathbb{R}^m} b^T y + \text{tr} \left( (C - \sum_{i=1}^m y_i A_i) X \right) \end{aligned}$$

من الممكن استنتاج شائبة لجرانج لـ (1.6) بتبديل التعظيم بالتصغير فينتج لدينا:

$$\max_{y \in \mathbb{R}^m} \left\{ b^T y + \min_{X \succeq 0} \text{tr} \left( (C - \sum_{i=1}^m y_i A_i) X \right) \right\} \quad (3.6)$$

إن مسألة التصغير الموجودة داخل (3.6) محدودة من الأسفل، إذا وإذا فقط

$$\text{tr} \left( (C - \sum_{i=1}^m y_i A_i) X \right) \geq 0 \quad \forall X \succeq 0$$

أي أنه إذا وإذا فقط

$$C - \sum_{i=1}^m y_i A_i \succeq 0 .$$

في هذه الحالة يتضح أن مسألة التصغير الموجودة داخل (3.6) لها قيمة مثل تساوي الصفر. وبالتالي فالمقالة (3.6) يمكن إعادة كتابتها على الشكل

التالي:

$$\max_{y \in \mathbb{R}^m} \left\{ b^T y \middle| C - \sum_{i=1}^m y_i A_i \succeq 0 \right\}.$$

وبتعريف  $S = C - \sum_{i=1}^m y_i A_i$  نحصل على (2.6).

في هذا الجزء من الكتاب سوف نفترض فرضيتين، الأولى: أن المصفوفات  $A_i$  مستقلة خطياً، وبالتالي فإن  $y$  محددة بشكل وحيد لصفوفة معطاة  $S$  من مجموعة الحلول المسموح بها للمسألة الثانية، أي أن  $S \in \mathcal{D}$ . وهذا يسمح لنا أن نكتب  $y \in \mathcal{D}$  أو  $S \in \mathcal{D}$  بدلاً من  $(S, y) \in \mathcal{D}$ . إن هذه الفرضية هي نفس الفرضية الموجودة في البرمجة الخطية التي تفترض أن مصفوفة القيود لها الرتبة الكاملة. ولكن ترى ذلك لاحظ أن الاستقلال الخطى للمصفوفات  $A_i (i=1, \dots, m)$  يكفى الاستقلال الخطى للمتجهات  $B$  حيث  $b = \text{vec}(B)$ ، حيث  $b = \text{vec}(A_i) (i=1, \dots, m)$  هو المتجه المكون من أعمدة  $B$  بعضها فوق بعض. وبالتالي من الممكن اعتماد هذه الفرضية من دون أن نفقد العمومية.

والفرضية الثانية هي ما تسمى بوجود الحلول المسموح بها فعلياً strict feasibility. أي أنه يوجد  $X \in \mathcal{P}$  و  $S \in \mathcal{D}$  بحيث أن  $0 \succ X \succ 0$  و  $0 \succ S \succ 0$ . إن مثل هذه الحلول تسمى أيضاً بالحلول المسموح بها القوية أو قيد سلتر المؤهل أو شرط سلتر المنظم. وفي بعض الأحيان يُرجع إليها على أنها فرضية النقطة الداخلية.

لاحظ أن الفرضية متوافقة مع شرط سلتر المنظم للأمثلة المحدبة، وذلك إذا استخدمنا حقيقة أن الداخل النسبي relative interior  $\text{ri}_n^+$  هو عبارة عن جميع المصفوفات الموجبة المعرفة. لاحظ أنه إذا تحققت الفرضية الثانية فإن الداخل النسبي لمجموعة الحلول المسموح بها الأساسية الثانية معطى بـ

$$\text{ri}(\mathcal{P} \times \mathcal{D}) = \{(X, S) \in \mathcal{P} \times \mathcal{D} \mid X \succ 0, S \succ 0\}$$

حيث  $\text{ri}(\mathcal{P})$  يمثل الداخل النسبي لـ  $\mathcal{P}$ . سوف نلاحظ في الفصل القادم أن الفرضية الثانية تضمن لنا أن  $\emptyset \neq \mathcal{P}^*$  وأن  $\mathcal{D}^* \neq \emptyset$  وأن  $p^* = d^*$  وسوف نبين

ذلك لاحقاً. من السهل إثبات خاصية التعامد التالية للمسألتين (1.6) و (2.6) والتي سوف نستخدمها بشكل مكثف.

### نظريّة 1.6

لتكن  $(X^{\circ}, (y^{\circ}, S^{\circ})) \in \mathcal{P} \times \mathcal{D}$  وأن  $(X, (y, S)) \in \mathcal{P} \times \mathcal{D}$  زوجان من الحلول المسموح بها. ولنرمز لهما:

$$\text{tr}(\Delta X \Delta S) = 0 \quad \Delta S = S - S^{\circ} \quad \Delta X = X - X^{\circ}$$

البرهان:

من تعريف  $\Delta S$  و  $\mathcal{D}$

$$\Delta S = \sum_{i=1}^m (y_i^{\circ} - y_i) A_i$$

أي أن  $\Delta S \in \text{span}\{A_1, \dots, A_m\}$ . وبالمثل بتعريف  $\Delta X$  و  $\mathcal{P}$  نحصل على

$$\text{tr}(A_i \Delta X) = \text{tr}(A_i X) - \text{tr}(A_i X^{\circ}) = b_i - b_i^{\circ}, \quad i=1, \dots, m$$

والذي يقتضي أن

$$\Delta X \in \text{span}\{A_1, \dots, A_m\}^{\perp}$$

وهذا يبين أن  $\Delta S$  تقع في الفراغ الجزئي  $S$  المولد بالمصفوفات  $\{A_1, \dots, A_m\}$ ، وأن  $\Delta X$  تقع في المتممة العمودية لهذا الفراغ الجزئي.

لنرمز للفراغ الجزئي المولد بالمصفوفات  $\{A_1, \dots, A_m\}$  بالرمز

$$\mathcal{L} = \text{span}\{A_1, \dots, A_m\}$$

وليكن لدينا  $X \in ri(\mathcal{P})$  ، أي أن  $X$  من مجموعة الحلول المسموح بها الفعلية. سوف نسمي  $\Delta X$  باتجاه مسموح به عند  $X$  إذا كانت  $\Delta X \in \mathcal{L}^{\perp}$  ، وبالمثل سوف نسمي  $\Delta S$  باتجاه مسموح به عند  $S \in ri(\mathcal{D})$  إذا كانت  $\Delta S \in \mathcal{L}$  . والفكرة هنا أنه يوجد طول خطوة  $\alpha > 0$  بحيث أن  $X + \alpha \Delta X \in \mathcal{P}$  وأن  $S + \alpha \Delta S \in \mathcal{D}$  . ولهذا السبب سوف نشير إلى  $X + \alpha \Delta X$  و  $S + \alpha \Delta S$  بالخطوات المسموح بها.

إنه من المفيد في بعض الأحيان أن نعيد صياغة المسألتين الأساسية والثنائية بحيث تكونا متماثلتين، أي أن المسألتين تكون لهما بالضبط نفس الصيغة. لـ $\text{tr } A_i M = b_i$ ,  $i=1,\dots,m$  بحيث أن  $M \in \mathcal{S}$  وأن  $\text{tr } CM = 0$  وبالتالي فإن (1.6) لها الصيغة البديلة التالية:

$$p^* = \min_X \{\text{tr}(CX) \mid X \in \mathcal{L}^\perp + M, X \succeq 0\} \quad (4.6)$$

وتشاءية لاجرانج لهذه المسألة هي:

$$d^* = \max_S \{\text{tr}(-MS) \mid S \in \mathcal{L} + C, S \succeq 0\} \quad (5.6)$$

لاحظ أن  $X \in \mathcal{P}$  إذا وإذا فقط كانت  $X$  حلًا مسموح به للمسألة (4.6). وبالمثل  $S \in \mathcal{D}$  إذا وإذا فقط كانت  $S$  حلًا مسموح به للمسألة (5.6). وأن

$$\text{. } S = C - \sum_{i=1}^m y_i A_i \text{ إذا كانت } b^T y = \text{tr}(-MS)$$

### 3.6 الثنائية القوي والضعيف

كما في البرمجة الخطية إن الفرق بين قيمة دالة الهدف للمسألة الأساسية والثنائية يسمى الفجوة الثنائية.

**تعريف 2.6 (الفجوة الثنائية)**

لتكن  $X \in \mathcal{P}$  وأن  $(y, S) \in \mathcal{D}$ . إن المقدار

$$\text{tr}(CX) - b^T y \quad (6.6)$$

يسمى الفجوة الثنائية للمسألة الأساسية والثنائية عند  $(X, y, S)$ . من تعريف المسألة الأساسية والثنائية وذلك لحل مسموح به  $(S, y, X)$  نجد أن

$$\begin{aligned} \text{tr}(CX) - b^T y &= \text{tr} \left( \left( \sum_{i=1}^m y_i A_i + S \right) X \right) \\ &\quad - \sum_{i=1}^m y_i \text{tr}(A_i X) \\ &= \text{tr}(SX) \geq 0 \end{aligned}$$

حيث المتباعدة متحققة لأن  $0 \leq X \leq I$ . إن قيمة الفجوة الثانية دائمًا غير سالبة للحلول المسموح بها، وهذا ما يسمى بخاصية الثانية الضعيف، وسوف نطرحها في النظرية التالية.

### نظريّة 3.6 (الثانية الضعيف)

لتكن  $X \in \mathcal{P}$  و  $y, S \in \mathcal{D}$  فإن

$$\text{tr}(CX) - b^T y = \text{tr}(SX) \geq 0 \quad (7.6)$$

أي أن الفجوة الثانية دائمًا غير سالبة في حالة الحلول المسموح بها.

**البرهان:** تمرير.

### تعريف 4.6

يقال عن المسألتين الأساسية والثانية أنهما في حالة ثنائية مثالية إذا كانت  $p^* = d^*$ .

لاحظ أن هذا التعريف لا يقتضي أن تكون  $\mathcal{P}^*$  و  $\mathcal{D}^*$  غير خاليتين. إذا كانت  $\mathcal{D}^*$  غير خالية فإننا نقول أن الثنائيّة القوية تتحقق للمسألتين الأساسية والثانية.

### مثال 5.6

إن هذا المثال يرجع إلى [VB] ويوضح زوجاً من مسائل الثنائيّة والتي فيها الثنائيّة المثالية تتحقق ولكن  $\mathcal{P}^* = \emptyset$ . لنتبر المسألة التالية في الصيغة القياسيّة الثنائيّة:

$$\begin{aligned} & \text{maximize } y_2, \quad y \in \mathbb{R}^2 \\ & \text{subject to } y_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \preceq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

إن هذه المسألة غير قابلة للحل ولكن  $y_2 = \max$ . كما أن المسألة الثنائية لهذه المسألة (والتي هي المسألة الأساسية بالصيغة القياسية) تأخذ الشكل التالي:

$$\begin{aligned} & \text{minimize } \text{tr} \left( \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} X \right) \\ & \text{subject to } X = \begin{bmatrix} 0 & x_{12} \\ x_{12} & 1 \end{bmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

لاحظ أن  $X \succeq 0$  يقتضي أن  $x_{12} = 0$  أي أن

$$X^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0$$

وهو الحل الأمثل الوحيد وقيمة دالة الهدف تساوي واحد، ولكن  $\emptyset = \mathcal{P}^*$ .

إذا كانت المسألة الأساسية (1.6) لها حل مسموح به فعلياً والمسألة الثنائية (2.6) لها حل مسموح به أو العكس. فإن الثنائية المثلية تتحقق، وتكون  $\emptyset \neq \mathcal{D}^*$  أو في الحالة المعاكسة تكون  $\emptyset \neq \mathcal{P}^*$ . إن إثبات هذه النظرية يحتاج إلى الرجوع إلى نتائج أساسية في التحليل المحدب، وسوف نذكر النظرية، ومن الممكن الرجوع إلى إثبات النظرية في [Dk].

#### نظرية 6.6 (الثنائية القوي)

إذا كانت  $d^* < \infty$  وأن (2.6) لها حل مسموح به فعلياً فإن  $\emptyset \neq \mathcal{P}^*$  وأن  $p^* = d^*$ . بالمثل إذا كانت  $-\infty < p^*$  وأن (1.6) لها حل مسموح به فعلياً فإن  $\emptyset \neq \mathcal{D}^*$  وأن  $p^* = d^*$ . البرهان: إنظر [Dk].

لدينا كنتيجة لهذه النظرية والتي سوف تعطينا الشرط الكافي لثنائية القوي.

**نتيجة 7.6**

إذا كانت المسألتان الأساسية والثانية لها حلول مسموحة بها فعلياً فإن  $d^* = p^*$  ، وتكون مجموعتا الحلول المثلث غير خالية.

**البرهان:**

مباشر من النظرية 3.6 تكون  $d^*$  و  $p^*$  متساويتين. ومن نظرية 6.6 يتحقق

□

المطلوب.

**4.6 مجموعة الحلول المسموحة بها Feasible Solutions**

لتتبين احتمال عدم وجود حلول مسموحة بها للمسألتين الأساسية والثانية وكذلك كون المسألتان غير محدودتين نحتاج إلى التعريف التالي:

**تعريف 8.6**

نقول إن المسألة الأساسية لها سهم محسن  $\text{improving ray}$  إذا وجدت مصفوفة متماثلة  $0 \leq \bar{X}$  بحيث أن  $\text{tr}(A_i \bar{X}) = 0$  ،  $i=1, \dots, m$  ، وكان  $C\bar{X} < 0$ . بالمقابل نقول إن المسألة الثانية لها سهم محسن إذا وجد متوجه  $\bar{y}$  بحيث أن  $0 \geq A_i^T \bar{y}$  ،  $i=1, \dots, m$  و كان  $b^T \bar{y} > 0$ .

إن الأسهم المحسنة للمسألة الأساسية تسبب عدم وجود حلول مسموحة بها للمسألة الثانية والعكس صحيح.

**نتيجة 9.6**

إذا وجد سهم محسن شائي  $\bar{y}$  ، فإن المسألة الأساسية ليس لها حل مسموح به. وبالمثل إذا وجد سهم محسن أساسياً  $\bar{X}$  ، فإن المسألة الثانية ليس لها حل مسموح به.

البرهان:

ليكن لدينا  $\bar{y}$  سهم محسن ثانٍ. ولنفرض وجود حل مسموح به  $X$  للمسألة الأساسية وبالتالي:

$$0 < b^T \bar{y} = \sum_{i=1}^m \text{tr}(A_i X) \bar{y}_i = -\text{tr}(X \bar{S}) \leq 0$$

وهذا يعتبر تناقض، وبالمثل للمسألة الأساسية.

#### تعريف 10.6

إن المسألة الأساسية ليس لها حل مسموح به بقوة strongly infeasible إذا كانت المسألة الثانية لها سهم محسن. ويقال إن المسألة الثانية ليس لها حل مسموح به بقوة إذا كانت المسألة الأساسية لها سهم محسن.

من هذا التعريف نجد أن كل مسألة برمجة خطية ليس لها حل مسموح به هي مسألة ليس لها حل مسموح به بقوة. بينما مسألة البرمجة الموجبة شبه المعرفة قد تكون المسألة ليس لها حل مسموح به ضعيف weak infeasibility، كما هو بالتعريف التالي:

#### تعريف 11.6

المسألة الأساسية ليس لها حل مسموح به ضعيف إذا كانت  $\mathcal{P} = \emptyset$  وكان لـ  $\forall \epsilon > 0$  يوجد  $0 \preceq X \preceq C$  بحيث أن

$$|\text{tr}(A_i X) - b_i| \leq \epsilon, \quad \forall i$$

وبالمثل المسألة الثانية ليس لها حل مسموح به ضعيف إذا كانت  $\mathcal{D} = \emptyset$  وكانت لـ  $\forall \epsilon > 0$  يوجد  $y \in \mathbb{R}^m$  و  $0 \preceq S \preceq C$  بحيث

$$\left\| \sum_{i=1}^m y_i A_i + S - C \right\| \leq \epsilon$$

## مثال 12.6

سوف نعطي الآن مثال على عدم وجود حلول مسموح بها ضعيف. إذا كانت المسألة الثانية معرفة حيث  $m=1$  ،  $n=2$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = [1]^T$$

بحيث أن المسألة الثانية تكون على الشكل التالي:

$$\begin{aligned} &\text{maximize } y_1 \\ &\text{subject to } y_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

نستطيع أن نبني  $\varepsilon$  في التعريف السابق بوضع

$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{\varepsilon} & 1 \\ 1 & \varepsilon \end{bmatrix}, \quad y_1 = \frac{1}{\varepsilon}$$

بحيث أن

$$\|y_1 A_1 + S - C\| = \left\| -\frac{1}{\varepsilon} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\varepsilon} & 1 \\ 1 & \varepsilon \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\| = \varepsilon$$

## نظريّة 13.6

إذا كانت المسألة الثانية ليس لها سهم محسن فإن المسألة الأساسية إما أن يكون لها حلول مسموح بها أو ليس لها حلول مسموح بها ضعيف. وبالمثل إذا كانت المسألة الأساسية ليس لها سهم محسن فإن المسألة الثانية إما أن يكون لها حلول مسموح بها أو ليس لها حلول مسموح بها ضعيف.

البرهان: انظر [Dk].

هناك وصف بديل لعدم وجود الحلول المسموح بها الضعيف وذلك بتقدم مفهوم السهم المحسن الضعيف. حيث أن السهم المحسن للمسألة الأساسية يؤدي إلى عدم وجود حلول مسموح بها فعلياً للمسألة الثنائية، والعكس صحيح فإن السهم المحسن الضعيف يؤدي إلى عدم وجود حلول مسموح بها ضعيف.

#### تعريف 14.6

نقول أن المسألة الأساسية لها سهم محسن ضعيف إذا وجد متتالية

$$\bar{X}^{(k)}, \quad k=1,2,\dots$$

بحيث أن

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \min \left| \text{tr} (A_i \bar{X}^{(k)}) \right| = 0 \quad i = 1, \dots, m$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \max \text{tr} (C \bar{X}^{(k)}) = -1$$

وبالمثل نقول أن المسألة الثنائية لها سهم محسن ضعيف إذا وجد متتاليات

$$\bar{S}^{(k)} \geq 0 \text{ و } \bar{y}^{(k)} \in \mathbb{R}^m \text{ و } \bar{S}^{(k)} \succeq 0, \quad k=1,2,\dots$$

بحيث أن

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \min \left\| \bar{S}^{(k)} + \sum_{i=1}^m \bar{y}^{(k)} A_i \right\| = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \min b^T \bar{y}^{(k)} = 1$$

الآن لدينا النظرية التالية:

#### نظريّة 15.6

المسألة الأساسية ليس لها حلول مسموح بها ضعيف إذا وإذا فقط كانت المسألة الثنائية لها سهم محسن ضعيف، وبالمثل المسألة الثنائية ليس لها حلول

ممسموح بها ضعيف إذا وإذا فقط كانت المسألة الأساسية لها سهم محسن ضعيف.

البرهان: انظر [Dk].

### 5.6 شروط الأمثلة Optimality Conditions

من نظرية الثانية الضعيف نظرية 3.6 نرى أن  $X^* \in \mathcal{P}$  وأن  $S^* \in \mathcal{D}$  هي عبارة عن حلول مثلثى إذا كانت الفجوة الثانية عند  $(X^*, S^*)$  صفرًا. أي أن  $\text{tr}(X^* S^*) = 0$ . وهذا الشرط يكافىء أن تكون  $XS = 0$  ، لأن  $XS \geq 0$  وأن  $XS \leq 0$ . ينتج عن ذلك أن الشروط الكافية للأمثلة للمسألة الأساسية والثانية هي :

$$\begin{aligned} \text{tr}(A_i X) &= b_i, \quad X \geq 0, \quad i=1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m y_i A_i + S &= C, \quad S \geq 0 \\ XS &= 0 \end{aligned} \tag{8.6}$$

يسمى الشرط  $XS = 0$  بشرط المتممة complementarity condition، والحلول المثلثى التي تحقق هذا الشرط تسمى متممة أو حلول متممة complementary.

ونتيجة 7.6 التي أشترت من نظرية الثانية القوية تقضي أن شرط الأمثلة هي أيضًا لازمة إذا كانت كلًّ من المسألة الأساسية والثانية لها حلول مسموح بها فعلية.

#### نظريه 16.6

إذا كانت المسألتان الأساسية والثانية لها حلول مسموح بها فعلياً فإن النظام (8.6) هو الشرط اللازم والكافى لشروط الأمثلة للمسألتين.

البرهان: انظر نتيجة 7.6.

في حالة البرمجة الخطية دائماً تتحقق لدينا المتممة الفعلية، أي أنه يوجد دائماً حلول مثل  $X^*$  و  $S^*$  بحيث أن  $S^* + X^* > 0$ . ولكن في حالة البرمجة الموجبة شبه المعرفة فإن هذا الوضع ليس دائماً صحيحاً، وهذا المثال التالي يبين ذلك:

### مثال 17.6

إن هذا المثال يرجع إلى [Ali2]. لتكن  $b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ،  $n = m = 3$  وأن

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

إن الحلول المثلى للمسألتين الأساسية والثنائية هي :

$$X^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, y_i^* = 0 \quad (i=1,2,3), \quad S^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

إنه من الواضح أن  $X^*$  هو الحل الأمثل، لأن  $C \geq 0$  وبالتالي

$$\text{tr}(CX) \geq 0 \quad \forall X \in P$$

أيضاً من السهل أن نرى أن الزوج  $(X^*, S^*)$  هو زوج وحيد، فيتبين أن المتممة الفعلية لا تتحقق في هذا المثال.

## تمارين الباب السادس

٦.١٧ اذكر شروط الأمثلة للمثال

٦.٢٦ لتكن  $b = [1 \ 0 \ 0]$ ,  $n = m = 3$ , وأن:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

اكتب مسألة البرمجة الموجبة شبه المعرفة على الشكل القياسي؟ وأيضاً

اكتب الشكل القياسي لمسألة الشائكة؟

٦.٣٥٦ أوجد  $L$  و  $L^\perp$  للتمرين السابق؟

٦.٤٥٦ أوجد البرنامج الشائي لمسألة التالية:

$m = 3$  ،  $n = 2$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b = [1 \ 2]^T$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

ثم أوجد الفجوة الشائكة؟

٦.٥٦٥٦ أثبت نظرية الشائكة الضعيف

6.6 لدينا البرنامج التالي

$$\text{maximize } y_1 + y_2 , \quad y \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{subject to } y_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

أوجد البرنامج الثنائي والفجوة الثنائية؟