


أولاً: الأحماض الأمينية

تعتبر الأحماض الأمينية ضمن المكونات الأساسية لجميع الأغذية ومع ذلك فإنه يوجد اختلافاً كبيراً في محتواها من الأحماض الأمينية. وهي توجد كمكون أساسي في تكوين البروتينات، وعند هضم البروتين فإنه يعطى أحماضاً أمينية حرة وبتنيدات قصيرة السلسلة تمتص بواسطة الجسم. وتستخدم الأحماض الأمينية في الغذاء لإنتاج البروتينات اللازمة لإعطاء التركيب البنائي والوظائف الفسيولوجية للأنسجة المختلفة وكذلك الهرمونات وأعضاء الجهاز العصبي. ومن المعروف أن احتياجات الحيوانات للأحماض الأمينية تختلف عن بعضها البعض تبعاً للنوع. وكذلك تختلف احتياجات الكائنات الحية من الأحماض الأمينية طبقاً للعمر. لذلك لابد من وجود كميات مناسبة من كل حمض أميني في الغذاء. والجدول في صفحة ٢ يبين احتياجات الإنسان من الأحماض الأمينية الأساسية طبقاً لمراحل النمو.

وتعتبر الأحماض الأمينية مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية منخفضة تتراوح ما بين ١٠٠ - ٢٠٠ وتحتوي على الأقل على مجموعة كربوكسيل واحدة (-COOH) ومجموعة أمين واحدة (-NH₂). وترجع الاختلافات بين الأحماض الأمينية المختلفة إلى طبيعة مجموعات السلاسل الجانبية (-R) والتي لها أهمية أساسية وتميز كل حمض أميني عن الآخر.



الرمز العام للحمض الأميني

احتياجات الإنسان من الأحماض الأمينية الأساسية

العمر			
البالغ	١٠ - ١٢ سنة	٣ - ٦ أشهر	الحمض الأميني (مجم / كجم)
١٠	٣٠	٧٠	أيزوليوسين
١٤	٤٥	١٦١	ليوسين
١٢	٦٠	١٠٣	ليسين
١٣	٢٧	٥٨	ميثيونين + سستين
١٤	٢٧	١٢٥	فينايل آلانين + تيروسين
٧	٣٥	٧٨	ثريونين
٤	٤	١٧	تريتوفان
١٠	٣٣	٩٣	فالين
٨٤	٢٦١	٧١٤	كمية الأحماض الأمينية الأساسية الكلية
٠,١٥	٠,٣٣	٠,٣٩	كمية الأحماض الأمينية الأساسية الكلية: كمية البروتين المطلوبة



من المعروف أن الهستيدين هو حمض أميني أساسي بالنسبة للأطفال ويحتاج البالغ الى مستويات منخفضة منه. هذه الأرقام مأخوذة من FAO/WHO (1973).

ومن معرفة التركيب الكيميائي للمجموعة R فإنه يمكن استنتاج خواص الأحماض الأمينية وبالتبعية عند معرفة خواص الحمض الأميني فإنه يمكن التعرف على ماهية المجموعة R ثم الحمض الأميني. والجدير بالذكر أنه يوجد تقريبا ١٨ حمض أميني مختلف في البروتينات الطبيعية.


وفي الطبيعة توجد الأحماض الأمينية في الصورة اليسارية (L-form) وتوجد أيضا في الطبيعة بعض الأحماض الأمينية في الصورة اليمينية (D-Form) ولكنها متخصصة جداً فهي عادة ما توجد مرتبطة مع مركبات أخرى غالبا ما تكون سامة.

١-١ التركيب والخصائص العامة للأحماض الأمينية:

يوجد تقريبا ٢٠ حمض أميني في البروتينات وكلها ألفا أمينو ماعدا حمضين ألفا ايمينو وهما البرولين والهيدروكسي برولين. ويطلق على الأحماض الأمينية ألفا نظرا لإرتباط مجموعة الأمين على ذرة الكربون ألفا للسلسلة وهي ذرة الكربون المجاورة لمجموعة الكربوكسيل. والجدير بالذكر أن كلا المجموعتين الكربوكسيل والأمين تكونا متصلتين بذرة كربون واحدة.



Proline




Hydroxyproline

α -Imino acids.


كما يوجد عديد من المركبات لها تركيب كيميائي يشابه تركيب الأحماض الأمينية منتشرة في الطبيعة ولا توجد في البروتين ولها أهمية خاصة في التمثيل الغذائي أو كمكونات للنباتات أو كمضادات حيوية Antibiotics.

والرموز التالية تبين التركيب الكيميائي لبعض منها:


α - Alanine




β - Alanine



α - Aminobutyric acid



γ - Aminobutyric acid



Structure of alternative forms of amino acids

والجدول التالي يبين بعض خواص المركبات القريبة في تركيبها الكيميائي للأحماض الأمينية التي توجد في نوعية خاصة جدا من البروتينات أو في الصورة الحرة.







الرمز	أهمية التمثيل الغذائي أو مصدر النسيج	الحمض الأميني
$\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CHNH}_2\text{-COOH}$	أنسجة النبات والحيوان	ألفا أمينو حمض البيوتريك
$\text{CH}_2\text{-NH}_2\text{-CHNH}_2\text{-COOH}$	مضادات حيوية	ألفا جاما ثنائي أمين حمض البيوتريك
$\text{CH}_2\text{-NH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$	معاون إنزيمي أ COA	بيتا الأنين
$\text{CH}_2\text{-NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$	أنسجة المخ	جاما امينو حمض البيوتريك
$\text{HOOC-CHNH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_3$ $\text{H}_2\text{N-CH-COOH}$	جدر الخلايا البكتيرية	الفا ابيسلون ثنائي امينو حمض بيميليك Pimelic

التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية ألفا اليسارية الموجودة في البروتينات

المجموعة	الاسم الشائع	الاسم الكيماوي	التركيب الكيميائي
الأولى	أحماض أمينية لها سلاسل أليفاتية Glycine*	Aminoacetic acid	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
	Alanine	α -Aminopropionic acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
	Valine	α -Aminoisovaleric acid	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
	Leucine	α -Aminoisocaproic acid	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{H}_3\text{C} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
	Isoleucine	α -Amino- β -methylvaleric acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---} \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$
الثانية	Serine	α -Amino- β -hydroxypropionic acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
	Threonine	α -Amino- β -hydroxy-n-butyric acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
الثالثة	Cysteine†	α -Amino- β -mercaptopropionic acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{SH} \quad \text{NH}_2 \end{array}$
	Methionine	α -Amino- γ -methylthio-n-butyric acid	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{S} - \text{CH}_3 \quad \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
الرابعة	Aspartic acid	α -Aminosuccinic acid	$\begin{array}{c} \text{HOOC} - \text{CH}_2 \\ \\ \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
	Asparagine	γ -Amide of α -aminosuccinic acid	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{---} \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$

*تدل العلامة على أن الجليسين لا يوجد في الصورة اليمينية أو اليسارية نظرا لعدم احتوائه على ذرة كربون غير متناسقة

التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية ألفا اليسارية الموجودة في البروتينات

المجموعة	الإسم الشائع	الإسم الكيماوى	التركيب الكيميائى
الرابعة	Glutamic acid	α -Aminoglutaric acid	$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
	Glutamine	δ -Amide of α -aminoglutaric acid	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{O}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
أحماض أمينية بها سلاسل جانبية قاعدية			
الخامسة	Arginine	α -Amino- δ -guanidino-n-valeric acid	$\text{H}-\underset{\text{NH}_2}{\text{N}}(\text{C}=\text{NH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
	Lysine	α,ϵ -Diaminocaproic acid	$\text{CH}_2(\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
	Hydroxylysine*	α,ϵ -Diamino- δ -hydroxy-n-caproic acid	$\text{CH}_2(\text{NH}_2)-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
	Histidine	α -Amino- β -imidazolepropionic acid	
أحماض أمينية بها حلقات عطرية			
السادسة	Phenylalanine	α -Amino- β -phenylpropionic acid	
	Tyrosine	α -Amino- β -(<i>p</i> -hydroxyphenyl)propionic acid	
	Tryptophan	α -Amino- β -3-indolepropionic acid	
أحماض أمينية إيمينية			
السابعة	Proline	Pyrrolidine-2-carboxylic acid	
	4-Hydroxyproline	4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid	

تدل العلامة على أن الهيدروكسى ليسين يوجد فقط فى الكولاجين والجيلاتين.

الخواص العامة للأحماض الأمينية الشائعة

المحضر الأميني	الصيغة الجزيئية	الوزن الجزيئي	الوزن الجزيئي (°C)	التكوين في الماء		قيم ثوابت الانقسام	نقطة التبادل الكاتيوني	التحويل الضوئي	ذائبة
				درجة حرارة التكمين	(جم/%)				
L-Alanine	C ₃ H ₇ O ₂ N	89.09	297	166.5 (25°C)	2.34, 9.69	6.01	+2.8 (w, c = 6, 25°C)		
L-Arginine	C ₆ H ₁₄ O ₂ N ₄	174.20	244	148.7 (20°C)	2.01, 9.04, 12.48	10.76	+12.5 (w, c = 3.5, 20°C)		
L-Asparagine	C ₄ H ₈ O ₃ N ₂	132.12	234-235	35.3 (28°C)	2.02, 8.80	5.41	-5.42 (w, c = 1.3, 20°C)		
L-Aspartic acid	C ₄ H ₇ O ₄ N	133.10	270-271	4.5 (20°C)	2.10, 3.86, 9.82	2.98	+4.36 (w, c = 1, 20°C)		
L-Cysteine	C ₃ H ₇ O ₂ NS	121.16	240	160 (20°C)	1.71, 8.27, 10.78	5.02	+9.8 (w, c = 1.3, 30°C)		
L-Cystine	C ₆ H ₁₂ O ₄ N ₂ S ₂	240.30	260-261	0.112 (25°C)	1.04, 2.05, 8.0, 10.25	5.02	-22.3 (1 N HCl, c = 1, 20°C)		
L-Glutamic acid	C ₅ H ₉ O ₄ N	147.13	247-249	8.64 (25°C)	2.10, 4.07, 9.47	3.08	+31.4 (6 N HCl, c = 1, 22°C)		
L-Glutamine	C ₅ H ₁₀ O ₃ N ₂	146.15	185-186	26.0 (18°C)	2.17, 9.13	5.65	+6.5 (w, c = 2, 25°C)		
Glycine	C ₂ H ₃ O ₂ N	75.07	233-290	250 (25°C)	2.35, 9.78	6.06	Not Active		
L-Histidine	C ₆ H ₉ O ₂ N ₃	155.16	287	41.9 (25°C)	1.77, 6.10, 9.18	7.64	-39.7 (w, c = 1.13, 20°C)		
L-Isoleucine	C ₆ H ₁₃ O ₂ N	131.17	284	41.2 (25°C)	2.36, 9.68	6.02	+11.29 (w, c = 3, 20°C)		
L-Leucine	C ₆ H ₁₃ O ₂ N	131.17	293-295	24.3 (25°C)	2.36, 9.60	5.98	-10.8 (w, c = 2.2, 25°C)		
L-Lysine	C ₆ H ₁₁ O ₂ N ₂	146.19	224.5	>1000 (25°C)	2.18, 8.95, 10.53	9.47	+14.6 (w, c = 6.5, 20°C)		
L-Methionine	C ₅ H ₁₁ O ₂ NS	149.21	280-282	53.7 (20°C)	2.28, 9.21	5.74	-8.2 (w, c = 1, 25°C)		
L-Phenylalanine	C ₉ H ₉ O ₂ N	165.19	283	29.6 (25°C)	1.83, 9.13	5.48	-35.1 (w, c = 2, 20°C)		
L-Proline	C ₅ H ₉ O ₂ N	115.13	220-2	1620 (25°C)	2.00, 10.60	6.30	-80.9 (w, c = 1, 20°C)		
L-Serine	C ₃ H ₇ O ₃ N	105.09	228	359.7 (20°C)	2.21, 9.15	5.68	-6.8 (w, c = 10, 20°C)		
L-Threonine	C ₄ H ₉ O ₃ N	119.12	255-257	90.3 (20°C)	2.71, 9.62	6.16	-28.3 (w, c = 1.1, 26°C)		
L-Tryptophan	C ₁₁ H ₁₂ O ₂ N ₂	204.22	290-292	11.4 (25°C)	2.38, 9.39	5.88	-31.5 (w, c = 0.5, 20°C)		
L-Tyrosine	C ₉ H ₉ O ₃ N	181.19	342-344	0.453 (25°C)	2.20, 9.11, 10.07	5.63	-10.6 (1 N HCl, c = 4, 22°C)		
L-Valine	C ₆ H ₁₁ O ₂ N	117.15	315	88.5 (25°C)	2.32, 9.62	5.96	+22.9 (20% HCl, c = 0.8, 23°C)		

تدل الحروف W و C على الماء كمذيب والنسبة المئوية للتركيز (وزن/حجم) على التوالي.

٢-١- الحروف المختصرة للأحماض الأمينية Amino acid symbols

الحمض الأميني Amino acid	الرمز بثلاث حروف Three-letter symbol	الرمز بحرف واحد One-letter symbol
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Asparagine	Asn	N
Aspartic acid	Asp	D
Asn+Asp	Asx	B
Cysteine	Cys	C
Glutamine	Gln	Q
Glutamic acid	Flu	E
Glu+Gln	Glx	Z
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I
Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Methionine	Met	M
Phenylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Serine	Ser	S
Threonine	Thr	T
Tryptophan	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V


الأحماض الأمينية بصفة عامة مواد غير متطايرة، بللورات بيضاء اللون في الصورة النقية وليس لها درجات انصهار محددة ولكنها تتكسر عند درجات الحرارة التي تتراوح ما بين ١٨٥ و ٣٤٠°م، وعادة لها نشاط ضوئي ما عدا الجليسين، وتذوب إلى حد ما في الماء وتنخفض درجة ذوبانها في الماء إلى حد كبير عند نقطة التعادل الكهربى للجزيء.

والأحماض الأمينية لا تذوب في المذيبات العضوية ما عدا البرولين والهيدروكسى برولين اللذان لهما درجة ذوبان معقولة في كحول الايثايل. وجميع الأحماض الأمينية تكون أملاح ثابتة.



والجداول السابقة تبين التركيب الكيميائى، الرموز المختصرة (حرف واحد- ثلاثة حروف) وخواص الأحماض الأمينية الشائعة.

٣-١- الخواص الأيونية Ionic properties


تحتوى الأحماض الأمينية على مجموعات حمضية (COOH-) وقاعدية (NH₂-)، ونتيجة لذلك فإنها يمكن أن تتفاعل كحمض ضعيف وكقاعدة ضعيفة ولذلك تسمى Ampholytes ويطلق على هذا السلوك باسم Amphiprotic حيث أنها يمكن أن تكتسب أو تعطى بروتون، والذي يمثله التفاعل التالى:-



وتتأين المجاميع القابلة للتأين فى الجزيء فى المحلول كما يلى:-




وعلى ذلك يوجد للحمض الأميني في المحلول صورة تسمى ثنائي القطبية Dipolar أو زويتر آيون Zwitter ion، أى أنه في المحلول المائي توجد الأحماض الأمينية في الصورة المشحونة حيث تتأين كلا المجموعتين الكربوكسيلية والأمينية. وتحتوى بعض الأحماض الأمينية على مجاميع أخرى إضافية قابلة للتأين في السلسلة الجانبية، وأن تأين المجموعة يعتمد على درجة حموضة الوسط (pH)، وكل حمض أميني له درجة حموضة عندها يكون مجموع الشحنات متساويا وبالتالي لا يحمل الجزيء أى شحنة وتسمى في هذه الحالة باسم نقطة التعادل الأيونى (Iso-ionic point (PI).





تعتمد الشحنات الكلية لأى حمض أميني على درجة حموضة الوسط (pH) وكذلك قيم ثوابت الانقسام (pka) للمجموعات القابلة للتأين الموجودة. فإذا كانت درجة حموضة الوسط أكبر من ثابت الانقسام للمجموعة فان الجزيء يفقد بروتون. ويحمل الجزيء شحنة سالبة وكذلك عند درجات حموضة (pH) منخفضة (توجد تركيزات مرتفعة من البروتونات) تكتسب مجموعة الكربوكسيل بروتون وبالتالي تصبح غير مشحونة والشحنة الكلية على الجزيء تكون موجبة.

وعند درجات حموضة (pH) مرتفعة (توجد تركيزات منخفضة من البروتونات) تفقد مجموعة الأمين بروتونها وبالتالي تصبح غير مشحونة، والشحنة الكلية على الجزيء تكون سالبة. وكذلك إذا كانت درجة حموضة



الرمز التركيبي لحمض أميني ألفا



تأثير حموضة الوسط على شحنات الحمض الأميني

المحلول أقل من ثابت الانقسام فإن الجزيء يحمل شحنة موجبة. وفي الحقيقة عند درجات حموضة وسط متغيرة نلاحظ أن الأحماض الأمينية توجد في صور أيونية مختلفة وتحمل شحنات مختلفة يمكن استخدامها في عديد من الطرق التحليلية مثل الفصل عن طريق الهجرة في المجال الكهربى electrophoresis والتبادل الأيونى الكروماتوجرافى فى فصل كل حمض أمينى عن الآخر.

والمثال التالى يبين سلوك الحمض الأمينى أسبارتيك فى محاليل مختلفة على درجات حموضة (pH) متباينة

حمض اسبارتيك	درجة حموضة الوسط	محصلة الشحنات
$\begin{array}{c} \text{H}_3^+\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2-\text{COOH} \end{array}$	→ pH=1	1
$\begin{array}{c} \text{H}_3^+\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2-\text{COOH} \end{array}$	→ pH=2.8 Isoionic point	0
$\begin{array}{c} \text{H}_3^+\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2-\text{COO}^- \end{array}$	→ pH=6.6	-1
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2-\text{COO}^- \end{array}$	→ pH=11	-2