



تقسيم الطيور

إن مملكة الطيور تحوى أنواعا وأشكالا وأحجاما عديدة ، ولتأمل الفرق في الوزن والحجم بين الطيور الطنانة التي لا يتعدى وزنها عدة جرامات ، والنعامة التي يتعدى وزنها مائة كيلو جرام ويبلغ طولها ٢٤٠ - ١٩٠ سم (من الأرض لأعلى الرأس) وما بين هذين النقيضين أنواع وأشكال ، مثل : البط ، والبوم ، والتوارس ، والببغاء ، والعصافير وهكذا ، والاختلاف في نويعيات الطيور ناتج من طبيعة حياة كل منها وما هيأ الله لكل طائر من وسائل تعينه على ممارسة وظائف حياته ؛ لذا فقد عكف العلماء على تصنيف الطيور إلى أقسام تجمع الأشياء المشتركة ما بين عدة أنواع ، ثم إلى تقسيم أشمل يجمع الصفات الأشمل ما بين هذه الأقسام ، وأول أنواع التقسيم في الطيور هو النوع الذي يجمع مجموعة مشابهة يمكنها التزاوج فيما بينها في الظروف الطبيعية وتجمع بينها صفة تشابه الجينات الوراثية .

ويتصاعد التقسيم من النوع إلى الأجناس ، وهو تقسيم أعم من النوع ، ويحوي الجنس الواحد من الطيور عدة أنواع ، كما تنضم عدة أجناس من الطيور التي تجمع بين صفاتها وطبيعتها أشياء مشتركة فيما يسمى بالعائلة . أما قمة التقسيم وهو الرتبة فهو الذي يضم عدة عائلات بينها صفات وخصائص مشتركة . إذن فالترتيب في تقسيم الطيور تصاعديا يكون بدءا من النوع إلى الجنس إلى العائلة ثم الرتبة .

إذا نحن أردنا تعريف طائر في تقسيم علمي كما نرى في اللافتات المكتوبة في حدائق الحيوان والمتاحف الكبرى ، نقول إن الطائر من رتبة - عائلة - جنس - نوع - حيث يكون النوع عادة هو الاسم المعروف به الطائر لدينا .

والرسم التالي يوضح بعض الرتب من الطيور التي يندرج تحتها عائلات

الطيور . وفي الصفحات التالية سنورد أمثلة لبعض أنواع العائلات الشهيرة في عالم الطيور والتي تحتوى كل منها عدداً من الأنواع



مثال على رتب الطيور التي تتفرع منها العائلات


◆ عائلة النعام :

هي طيور ضخمة لا تطير وساقها مكونة من وصلة واحدة بلا ركبة ولها في القدم إصبعان فقط .



وتتحرك هذه الطيور بالجري على الأرض ، ويصل ارتفاعها من الأرض للرأس حوالي ١٩٠ - ٢٤٠ سم ، والنعام هي أكبر الطيور الموجودة على الأرض وريش النعام عادةً أسود اللون على الجسم ، أما رقبة وساق الطائر فهي عارية من الريش ويميل لونها إلى الأحمر أحياناً وإلى اللون الرمادي في بعض الأحيان ، والأثني عادةً أصغر حجماً من الذكر ، ويعيش النعام في أزواج أو في مجموعات صغيرة العدد في الأماكن المفتوحة في إفريقيا في السودان وأثيوبيا وتanzania .


◆ عائلة الريا :



وتشبه هذه الطيور النعام وتعتبر أكبر الطيور في أمريكا الجنوبية ، وهي أيضاً لا تطير وساقاً كالتぬام من وصلة واحدة ولا يغطي الريش ساقها أيضاً ، ولها ثلاثة أصابع في كل قدم ، وطول الطائر منها حال وقوفه حوالي ٩٠ سم ، وزن الواحد حوالي ١٠ كيلو جرامات ، وهي لا تطير ولكنها سريعة الجري حيث تصل سرعتها إلى ٥٠ كيلو متراً في الساعة ، ولها عنق

طويل وساقها كذلك ويغطي جسمها ريش يصل إلى الفخذ ، ولها جناحان قصيران للغاية ، ويميل لونها إلى الأصفر المائل للرمادي ، والأثني أيضاً أصغر حجماً من الذكر ، وعادة ما تعيش في السهول الجافة وتعتبر من الطيور غير المهاجرة ، وعادة ما يحتضن الذكر البيض لمدة ٤٠-٣٥ يوماً ، ويتوالى أيضاً حماية الصغار وتتغذى هذه الطيور على الخضروات وبعض الحيوانات الصغيرة أحياناً .


♦ عائلة الشُّبَّنِم أو الكسواري :



وتضم هذه العائلة ثلاثة أنواع ، وهي طيور ضخمة لا تطير طولها وهي واقفة ٨٠ إلى ١١٠ سم ، ويصل وزنها إلى ٥٤ كيلو جراماً ، ويحمل الرأس عرفاً متصلباً أشبه بالعظم حيث يرز من عظام جمجمة الطائر (انظر الشكل) والرأس خالٍ من الريش وكذلك الرقبة ، ولهم ألوان زاهية عليها نتوءات كثلك التي نراها في الديك الرومي ، ولها ريش أسود كثيف وليس لها ذيل ، والأرجل قوية بها ٣ أصابع وللأصبع الداخلي ظفر حاد ، وأثني هذه العائلة أكبر من الذكر .

تعيش طيور هذه العائلة في الغابات الاستوائية الكثيفة ، وهي طيور غير مهاجرة وتضع الأنثى بيضها في أرض الغابة ولون بيضها مائل إلى الأخضرار ، ويقوم الذكر بحضانة البيض لمدة ٣٠-٥٠ يوماً ، ويرعى الذكر والأثني الصغار بعد فقس البيض لمدة ٤ شهور ، وتتغذى على طلع الباتات وعلى الفواكه والحشرات والفقاريات الصغيرة التي تجدها في أرض الغابات .

♦ عائلة الإيمو :



هي طيور ضخمة لا تطير لها عنق طويل وساقان طويلان بكل قدم ٣ أصابع ، أما الرقبة فليست عارية تماماً من الريش كالنعم ، وإنما الجزء الأمامي فقط هو الحالى من الريش وله لون زاهٍ وهي أقرب في الشكل إلى الشُّبَّنِم من حيث الشكل

العام ، ويغطى الجسم ريش ناعم طويل هو أقرب ما يكون إلى الشعر ويميل لونه إلى الرمادي الضارب إلى البني مع لون أسود للرأس والرقبة ، أما الجزء العاري من مقدمة الرقبة فيميل إلى الأزرق ، وتعيش طيور هذه العائلة في أستراليا في الصحراء والغابات القريبة من الماء ، وقد ترحل مجموعات منها في رحلات هجرة موسمية .

◆ عائلة الكيوي :



تضم هذه العائلة ثلاثة أنواع وطيورها متوسطة الحجم أقرب شبهها بالحيوان منها للطائر ، وطيور الكيوي لا تطير ويبلغ طول جسم الطائر منها ٤٥-٨٤ سم وارتفاع الطائر من الأرض عند وقوفه حوالي ٣٠ سم وزنه ١,٣-٤ كيلو جرامات ، ويغطى جسم طائر الكيوي ريش أشبه بالشعر ولا ذيل له ، وأرجل الكيوي قصيرة وبكل قدم ٣ أصابع وله منقار طويل به انحناء بسيط ، ويميل لون طائر الكيوي إلى اللون البني أو الرمادي ، وأنثاه أكبر حجماً من الذكر ، يعيش الطائر في أستراليا ولا يهاجر ويصنع الكيوي عشه عن طريق الحفر في الأرض ، ويقوم الذكر بتجهيز العش حيث تضع الأنثى فيه ما بين ٢-١ بيضة وهي ضخمة الحجم بالمقارنة بحجم الطائر نفسه حيث تزن البيضة حوالي ٢١ كيلو جرام وهو ما يمثل ١٨٪ - ٢٥٪ من وزن جسم الأنثى ، ويرقد الذكر على البيض لمدة ٧٤-٨٤ يوماً ، ويتجذب الكيوي على بذور النباتات والفواكه وعلى اللافقاريات العديدة الموجودة في التربة معتمداً على حاسة الشم .

◆ عائلة التينامو :



هي طيور أرضية بدائية تضم ٤٦ نوعاً ، وحجمها يتراوح بين الصغير والمتوسط حيث يبلغ طول الجسم ١٥-٤٩ سم ، والوزن ما بين ٤٥٠-٢٣٠٠ جرام ، والأرجل قصيرة بها ٣ أو ٤ أصابع حسب النوع ، ولا تمثل طيور هذه العائلة إلى الطيران والجسم مغطى بريش يشبه في مظهره قشر الأسماك وللون مائل للبني وأنثاه

أكبر من الذكر ، ويعيش هذا الطائر في الغابات والأماكن التي تحتوي أعشاباً وهو غير مهاجر ، ويقوم الذكر بحضانة البيض ١٩-٢٠ يوماً ، ويقوم أيضاً بحماية الصغار ، ويتجدد هذا الطائر على الفواكه والبذور والحشرات والفقاريات الصغيرة .

◆ عائلة البطريق :




وتضم هذه العائلة ١٨ نوعاً من هذه الطيور التي تعيش في الماء ولا تطير وتعتبر من الطيور البحرية .

ويتراوح حجم طيور عائلة البطريق ما بين المتوسط والكبير ، ولها أجنحة تستخدمنها كالمجداف تحت الماء ، أما الأقدام فيها أغشية سميكه ما بين الأصابع ، ونظراً لوجود قدمي الطائر في مؤخرة الجسم تقريباً فإنه يمشي مستقيماً القامة ويبلغ طول الطائر ٤٠-١١٥ سم ، ويزن الواحد ما بين ١-٣٠ كيلو جراماً ، وهو من الطيور ذات القدرة العالية على السباحة وتبلغ سرعته في الماء ٢٠ عقدة ، ومنقار البطريق متوسط الحجم

ويتكاثر البطريق على الساحل الصخري أو الثلجي أو الرملي حيث يضع البيض على الأرض مباشرة ، وبيض البطريق ١-٢ بيضة يرقد الذكر أو الأنثى عليه ، ويتجدد البطريق على الأسماك والجبار والقشريات .

◆ عائلة الطيور الغواصة : Divers



تضُم هذه العائلة ٥ أنواع ، وهي طيور كبيرة الحجم قادرة على السباحة والغوص في الماء ولها ثلاثة أصابع في القدم بينها غشاء ، ولأنَّ أرجل هذه الطيور تقع في

نهاية الجسم فإنَّ مشيتها غير متزنة ، ويبلغ طول الطائر ٥٣-٦٩ سم وزنه ١-٢ كيلو جرام ، وهي طيور ذات قدرة عالية في السباحة ولها منقار متوسط الحجم حاد المقدمة ، والجسم بصفة عامة طويل ، وكذلك الرقبة والأجنحة قصيرة نسبياً ومدببة والذيل قصير وريش الطائر كثيف وهو محملٍ

على الرقبة والرأس ولكنه أكثر صلابة على الجسم ، وتتكاثر طيور هذه العائلة على اليابسة وهي من الطيور المهاجرة ، وتصنع عشها بقليل من المواد أو بدون أي مواد بجوار الماء ، وعادة ما يختار الذكر مكان العش ويرقد الزوجان كلاهما على البيض لمدة ٢٧-٩ يوما ، وتتغذى الطيور الغواصة على الأسماك والصفادع واللافقاريات البحرية .

◆ عائلة القادوس "الباتروس" :



تضم هذه العائلة ١٤ نوعا ، وهى طيور كبيرة الحجم حيث يبلغ طول الطائر ٦٨-١٣٥ سم ، وزنه من ١٢-٣ كيلو جرام ، والمنقار متوسط الطول وطرفه مقوس لأسفل وفتحة الأنف عبارة عن أسطوانة أنبوبية تقع طوليا على أعلى منقار الطائر ، والأجنحة طويلة جدا وعرضها قليل مقارنة بالطول ، وأطرافها مدببة وبها العديد من الريش الشانوى الذى يساعد على الطيران والأرجل قصيرة أو متوسطة الطول حسب النوع .

ويبلغ طول الجناحين ١٧٨-٣٥٠ سم ، وللطائر ٣ أصابع في القدم وبينها غشاء كامل حتى أطراف الأصابع ، والذيل قصير يأخذ شكل القوس أحيانا وفي بعض الأنواع طويل ومدبب ، واللون بنى أو رمادي وفي بعض الأنواع أبيض الجسم أسود الرأس والأجزاء العليا ، يتتكاثر الطائر في الجزر المحيطية ، وطيور هذه العائلة كثيرة الهجرة وعادة ما تصنع أعشاشها على هيئة مستعمرات في نتوءات التربة أو في حمى الشجيرات والنباتات الموجودة على الجزر ، وقد تضع البيض في العراء إذا لم تجد هذا أو ذاك ، يتناوب الذكر والأنثى الرقاد على البيض مدة ٦٥-٧٩ يوما



وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك والقشريات .

♦ عائلة خطاف البحر "بتيل" :



تضم هذه العائلة ٧٢ نوعا ، وهي طيور تتراوح ما بين الحجم الصغير والكبير . وطيور هذه العائلة ذات أجنحة طويلة تصل إلى مترين وطول الطائر يصل إلى ٩٠-٢٨ سم ، والوزن ما بين ١٣٠ جراما و٤ كيلو جرامات والذيل قصير ، والمنقار يتراوح ما بين القصير والمتوسط وشكله كالخطاف من الطرف ، وفتحات الشم على شكل أنبوبي ، والأرجل قصيرة وبالقدم ٣ أصابع بينها غشاء بكمال طول الأصابع ، واللون إما أسود أو أبيض أو بني أو رمادي أو خليط من هذه الألوان ، والذكر عادة أكبر حجما من الأنثى ، وتحب هذه الطيور الحيطان وتتكاثر على الجزر الموجودة في الحيطان ، وهي من الطيور المهاجرة وعادة ما يكون تكاثرها في مستعمرات على الجزر حيث تضع بيضها على حافة الصخور أو في حفر تحت السطح ، ويتولى الذكر والأنثى معا الرقاد على البيض ٤٣-٦٠ يوما، وتتغذى طيور هذه العائلة على السمك والحبار والقشريات .

♦ عائلة طيور النوء :



تضم هذه العائلة ٢٠ نوعا هي أصغر الطيور البحريّة ، ولها أجنحة طويلة نسبيا طولها ٥٦-٣٢ سم ، ويبلغ طول الطائر ٢٦-١٤ سم ، وزنه ٦٨-٢٥ جراما ، وأقدام الطائر متوسطة الحجم وبها ٣ أصابع بينها غشاء بطول الأصابع بالكامل ، ومنقار الطائر قصير أو متوسط الطول حسب النوع ، عليه أنبوبة لحسنة الشم في الجزء العلوي النوع من المنقار ، وذيل طيور هذه العائلة يتراوح ما بين القصير والمتوسط ويأخذ شكلا مقوسا أو مربعا أو على شكل ريشات متباينة بما يشبه شكل الشوكة ، وتتواجد طيور هذه العائلة في الحيطان وتتكاثر في أعشاش متجاورة على هيئة مستعمرات في الجزر وعلى سواحل الحيطان ، وعائلة طيور النوع غير


مهاجرة ، وعادة ما يضع بيضها في حفرة بالأرض حيث يرقد عليها الذكر والأثنى لمدة ٤٥-٥٣ يوما ، وتتغذى طيور هذه العائلة على الكائنات البحرية حيث تطاردها وتصطادها تحت سطح الماء .

◆ عائلة البحص :



تضم عائلة البحص ٨ أنواع ، وهي طيور مائة كبيرة الحجم ذات عنق طويل ومنقار طويل ذو طرف خطافى وبه كيس مرن في فكه الأسفل ويبلغ طول الطائر ١٢٧-٧٠ سم ، وزنه من ١٥-٢ كيلو جرام ، وأرجل النعام قصيرة ولكن القدم كبيرة وقوية ، وذيل البحص قصير ، وغالبية البحص لونه أبيض مع بعض السواد في الجناحين مع مسحة من اللون الوردي أحيانا والبرتقالي أحيانا أخرى على الجسم ، وهناك نوع من البحص لونه بني ، والبحص طائر له قدرة عالية على الطيران لذا فأجنحته طويلة وذات عرض كبير للمساعدة على تحليق الجسم الكبير والثقيل المعروف عن طيور هذه العائلة ، ويبلغ طول الجناحين ٢,٨-٢ متر ، وذكور البحص أكبر حجما من الإناث ، وتعيش طيور هذه العائلة في كل مناطق العالم على شواطئ البحيرات وعلى شواطئ البحار والمحيطات . والبحص من الطيور المهاجرة جزئيا في بعض الأنواع تهاجر والبعض الآخر لا يقوم بالهجرة ، أما التكاثر فيتم في مستعمرات ويتعاون الذكر والأثنى في بناء العش ، فالذكر يقوم بجمع الخامات والأثنى تتولى بناء العش كما يتعاون الذكر والأثنى أيضا في الرقاد على البيض لمدة ٧٠-٥٠ يوما . ويستغذى البحص على الأسماك التي يضعها البحص في الكيس المرن الموجود أسفل الفك السفلي للمنقار ، ويتعاون البحص في صيد الأسماك حيث تتقدم مجموعات منه لتحاصر الأسماك بجاه الشاطئ ، ثم تأكل هي الأسماك في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ في شكل جماعي .


♦ عائلة الأطيش «الجانيت» :



تضم هذه العائلة ٩ أنواع ، وهى طيور بحرية كبيرة الحجم قوية الجسم لها منقار قوى وطويل ، ويبلغ طول الطائر من هذه العائلة ٦٦-١٠٠ سم ، وزن في المتوسط من ٩٠٠ جرام إلى ٣,٦ كيلو جرامات ، وجناحا الطائر طويلاً وطرفه مدبب ويبلغ طول الجناحين ١٤٠-١٧٠ سم ، أما الأرجل فهى قصيرة والقدم كبيرة

ومهيأة لأعمال الغوص والسباحة وعادة ما يكون عنق الطائر ملوناً وتكون رجلاه ملونتين ، واللون الغالب للجسم هو الأبيض ، وأنثى طيور هذه العائلة أكبر حجماً من الذكور ، وتعيش طيور هذه العائلة في المحيطات والجزر الحيطية ، ومن حيث الهجرة فقد لوحظ أن المجموعات التي تعيش في الأماكن الاستوائية الحارة لا تهاجر ، أما المجموعات التي تعيش في أماكن باردة نسبياً فإنها تهاجر . وتتكاثر طيور هذه العائلة في مستعمرات جماعية حيث تضع البيض إما على الأعشاب أو على أنواع الأشجار أو حتى على الأرض مباشرة . ويتولى الذكر والأثني الرقاد على البيض لمدة ٤٢-٥٥ يوماً . ويمكن للصفار الطيران بعد ثلاثة أشهر من وقت الخروج من البيضة . وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك والجبار عن طريق الغوص في أعماق المحيطات .

♦ عائلة الغاق «الكورمورانت» :



تضم هذه العائلة ٣٣ نوعاً وطيور هذه العائلة طيور قوية كبيرة الحجم لها منقار طويل أسطواني الشكل طرفه مقوس والذيل طويلاً ، ويبلغ طول الطائر من نصف إلى واحد متر ، وزن ما بين ٩٠٠ جرام و ٤,٩ كيلو جرام ، والأرجل قصيرة بصفة عامة وموقعها

بالقرب من مؤخرة الجسم ، أما الأقدام فكبيرة مما أعطى الطائر قدرة عالية على السباحة ، كما أن لها قدرة عالية في الطيران أيضا .



طائر الغاق ذو العنق القصير

بالرغم من أن بعض الأنواع منها لا تطير على الإطلاق ويبلغ طول الجناحين ٨٠-١٦٠ سم ، ولون الطائر إما الأسود أو الأبيض أو الرمادي أو البنى ، ويسهل لون الأنواع التي تعيش في الشمال عموما إلى الألوان الداكنة .

وتعيش طيور هذه العائلة على السواحل وداخل المياه وفى الأماكن المائية والرطبة ، ويعيش بعض أنواعها على المرتفعات ، وتعتبر الأنواع التي تعيش في الشمال البارد طيوراً مهاجرة .

وتتكاثر طيور هذه العائلة في

مستعمرات جماعية حيث يجمع الذكر بعض الأعشاب لتبني بها الأنثى عشا فوق الصخور أو فوق الأشجار ، ويحتضن كل من الذكر والأثني البيض لمدة ٢٢-٦ يوما . وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك والحيوانات البرمائية وعلى اللافقاريات البحرية حيث إن لديها القدرة على الغوص في الماء للحصول على الغذاء .

♦ عائلة الغاق طويل العنق :

تضم هذه العائلة ٤ أنواع ، وتشبه الغاق ولكنها ذات عنق طويل ، والجسم أكثر طولا ، والمنقار طويل ومستقيم ومدبب بحدة من طرفه الأمامي مما جعل البعض يطلقون على بعض أنواع طيور تلك العائلة اسم **Darter** أو لعبه التنفسين التي يرشق لاعبوها سهما صغيراً مدبباً الطرف

في قرص فلين معلق على الحائط ؛ وذلك من فرط شدة حدة منقاره الذى يشبه سن سهم هذه اللعبة .



طائر الفاق طويل العنق طول الجناحين ١٢٠-٧٠ سم ، والذيل طويل جداً بالمقارنة بالطيور الأخرى . وتقوم طيور هذه العائلة بنشر جناحيها

بعد السباحة في الماء لتجفيفهما لأنها لا تملك غدة زيتية تمكنها من دهان الريش بالزيت . ويختلف شكل الذكر عن الأنثى حيث يتلون ريش الرقبة والأجنحة عند الذكور باللون الأبيض والأسود أما الإناث فلون ريش رقبتها وأجنحتها يميل إلى اللون البني الفاتح . وطيور هذه العائلة مهاجرة وتکاثرها في مستعمرات جماعية حيث تبني أعشاشها من أفرع الشجر بالقرب من الشاطئ ويقوم الذكر مع الأنثى بحضانة البيض لمدة ٣٠-٢٦ يوماً ، ويبدأ الصغار الطيران بعد ٤٩-٣٥ يوماً ، وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك حيث ترشق منقارها في الأسماك بعد مطاردتها في عمق البحر ، وتتغذى أيضاً على الحيوانات البرمائية واللافقاريات المائية .

◆ عائلة طيور الفرقاطة :



تضم هذه العائلة ٥ أنواع ، وهي طيور كبيرة الحجم خفيفة الوزن بدرجة ملحوظة ، وذات قدرة عالية على المناورة ، ولها أجنحة طويلة ١٧٦-٢٣٠ سم ، أما طول الطائر فيبلغ ٧٩-١٠٤ سم ، أما الوزن فيتراوح ما بين ٧٥ جراماً - ١,٦ كجم ، وطيور هذه العائلة ذات قدرة ضعيفة على السباحة ، والمنقار متوسط الطول وحاد الطرف ،

والجسم مستطيل والأرجل قصيرة والأقدام صغيرة ، والذيل مشقوق ، ويقل وزن الذكر بمقدار ٣٠ % عن الأنثى ، ولون هذه الطيور أسود أو بني مع وجود بقعة حمراء عند منطقة الزور . وتعيش طيور الفرقاطة في الحيطان بالقرب من الأماكن الاستوائية وفي الجزر الحيطية ، وهي طيور متوجلة حول مكان معيشتها ولكنها غير مهاجرة . وتتكاثر في مستعمرات جماعية حيث تبني أعشاشها على الأشجار أو على الأرض ويتولى الذكر والأنثى حضانة البيض لمدة ٥٥ يوما ، ويظل الصغار في حضانة الأبوين لمدة ١١-٦ شهرا . وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك والجبار .

◆ عائلة طيور مالك الحزين :



تضم هذه العائلة ٦ أنواع ، وهي طيور يتراوح حجمها ما بين الصغير والكبير ، وهي طيور مائية لها منقار طويل حاد يشبه سن الرمح ولها رقبة طويلة وأرجلها طويلة أيضا ، ويبلغ طول الطائر ١٤٠-٣٠ سم ، والوزن من ١٠٠ جرام إلى ٣ كجم . ولذلك الحزين أربعة أصابع طويلة في قدميه بدون أى أغشية فيما بينها ، وللهذه

الطيور قدرة عالية على الطيران والمناورة وذلك بمعاونة أجنبحتها الطويلة مستديرة الحواف ، وتطير هذه الطيور ورقبتها منثنية على شكل حرف «S» ، وأما الذيل فقصير نسبيا وذكر هذه الطيور أكبر من الأنثى ، وتعيش في كل أماكن العالم في الأراضي ذات البحيرات العذبة أو المالحة ، وقد تتكاثر هذه الطيور في أعشاش منفردة أو في مستعمرات جماعية حيث تبني أعشاشها من أعواد الأفرع الرفيعة فوق الأشجار أو على الأرض ، وتقوم الأنثى عادة ببناء العش ويعمل الذكر والأنثى في حضانة البيض لمدة ٣٠-١٨ يوما ، وتتغذى هذه الطيور على الأسماك والفقاريات الصغيرة والحشرات التي تصطادها من الماء .

◆ عائلة طيور اللقلق :



تضم هذه العائلة ١٩ نوعاً ، وهي طيور كبيرة أو ضخمة الحجم ذات منقار طويل حاد الطرف ، ويصل طول الطائر ١٥٠-٧٠ سم ، ويزن ٩-٢ كجم ، والرقبة طويلة بصفة عامة وكذلك الأرجل ، والأصابع الأمامية بها أغشية غير كاملة ، والذيل قصير ومستدير العافة ، ولون الطائر إما أبيض أو أسود نوع من طيور عائلة اللقلق



اللقلق الأسود أحد أنواع عائلة اللقلق


ولطيور هذه العائلة قدرة عالية على الطيران وذلك لضخامة أججحتها حيث يبلغ طول الجناحين ١٤٥-٣٢٠ سم ، وتطير هذه الطيور ورقبتها مستوية مع الجسم والرجلان بارزان من الخلف ، والذكر والأنثى لا يختلفان في الشكل . وتعيش طيور هذه العائلة في الأماكن المفتوحة وغالباً بالقرب من المياه ، وتعتبر الأنواع التي تسكن الأماكن الباردة في الشمال طيوراً مهاجرة . وتتكاثر هذه الطيور في مستعمرات جماعية أو بشكل منفرد ، وتبني أعشاشها من عيدان الأغصان على الأشجار وعلى الأرض ، وتبيض الأنثى ٣-٥ بيضات حيث يتولى الذكر مع الأنثى حضانة البيض لمدة ٣٠-٥٠ يوماً ، وتصبح الصغار قادرة على الطيران بعد ١٢٦-٥٠ يوماً من الخروج ، وتتغذى هذه الطيور على الأسماك والفصارييات الصغيرة والحشرات .

♦ عائلة طائر أبي ملعقة :



تضم هذه العائلة ٣١ نوعا ، وهي طيور بين المتوسطة والكبيرة من حيث الحجم ، ذات أرجل طويلة ولها منقار طويل على شكل ملعقة الطعام ، ويتراوح طول الطائر من ٤٨-١١٠ سم ، والرقبة طويلة نسبيا ، ويقوم الطائر بمدّها للأمام أثناء

طيرانه ، أما الأجنحة فهي عريضة ومستديرة الحواف والذيل قصير ، ويتخلل أصابع هذه الطيور غشاء قصير يربط فقط بين قاعدة الأصابع وقد يكون عاري الجلد عند منطقة الوجه أو الرأس في بعض الأنواع كما أن بعض أنواع هذه العائلة له عرف في أعلى الرأس



ولون هذه الطيور غالبا هو الأبيض والأسود والبني كما يميل بعضها إلى اللون الأحمر ، والذكر مثل الأنثى في الشكل العام ولكن الذكر غالبا أكبر حجما من الأنثى . وتعيش طيور هذه العائلة في أنحاء العالم المختلفة في السهول ومناطق حشائش الساقانا وفي المستنقعات ومناطق البحيرات ، وتعتبر بعض أنواع هذه العائلة طيورا مهاجرة والبعض الآخر غير مهاجرة . وتتكاثر

طيور أبو ملعقة في مستعمرات جماعية ، وتبيض الأنثى ٥-٢ بيضات حيث يتولى الذكر مع الأنثى حضانة البيض ، ولكن حضانة الأنثى أكثر احتمالا ، وتمتد فترة حضانة البيض إلى واحد وعشرين يوما . ويمكن للصغار الطيران بعد ٢٠-٣٠ يوما من الخروج من البيض وتتغذى طيور هذه العائلة على الحيوانات المائية أو على البذور


◆ عائلة طيور البشاروش / النحام (الفلامنجو) :



طائر البشاروش أثناء الطيران

تضم هذه العائلة خمسة أنواع ، وهى طيور كبيرة الحجم مشهورة بطول أرجلها وطول عنقها ومنقارها المنحنى وألوانها

الراهية ، وهى من الطيور التى تتجول فى الأماكن المائية الضحلة ، ويبلغ طول الطائر من هذه العائلة ١٤٥-٨٠ سم ، وزنه من ٢-٣ كجم ، وقدم الطائر صغيرة والأصبع الخلفى قصير جداً أما الأصابع الأمامية فبينها غشاء بطول الأصابع كاملاً ، وهى من الطيور الرشيقية انسابية الجسم التى تطير بسرعة ورقبتها أثناء الطيران تكون ممدودة للأمام والأرجل ممدودة للخلف؛ لتبرز من خلف الذيل طويلة ومنبسطة خلف الطائر (انظر الشكل) .



وأجنحة البشاروش قصيرة نسبياً إذا ما قورنت بطول الطائر ، ولهذه الطيور قدرة معقولة على السباحة إذا ما لزم الأمر ، ويغلب اللون الأبيض مع الأحمر على أنواع هذه العائلة ، وتتراوح نسبة البياض والاحمرار حسب النوع والغذاء الذى يتناوله الطائر . والذكر لا يختلف عن الأنثى في الشكل العام . وتعيش طيور البشاروش في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا وشرق آسيا واليابان


وإفريقيا والجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية في المياه المالحة أو العذبة وذلك في البحيرات والمستنقعات . وبعض هذه العائلة مهاجر وبعضها لا يهاجر .

وتتكاثر هذه الطيور في مستعمرات جماعية في طين البرك والمستنقعات

حيث تضع الأنثى بيضة أو بيتين ، يتولى الذكر مع الأنثى حضانة البيض لمدة ٢٨ يوما ، كما يقوم الذكر والأنثى معا برعاية صغارهما لمدة تمتد إلى ٧٥ يوما أخرى حيث يتغذى الصغار على لبن يطعمانهم به الأبوان .

وتتغذى طيور البشاروش أو النحام على الحيوانات الدقيقة والنباتات الدقيقة العالقة في الماء حيث يسحب الطائر تياراً من الماء إلى داخل الفم حاملا معه كل العوالق الغذائية ، ثم يقوم بتصفية الماء خلال مرشح طبقي موجود داخل التجويف منقار الطائر بحيث يحفظ بالغذاء ويترلعه .

♦ عائلة البط والأوز والبجع :



تضم هذه العائلة ١٤٧ نوعاً ولكبر عدد أنواع هذه العائلة فإنها تقسم إلى ١١ عائلة فرعية ، وهي طيور تتراوح أنواعها بين الصغير والمتوسط والكبير ، وتعتبر من الطيور المائية أو شبه المائية ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ٣٠-١٥٠ سم ، والوزن ما بين

٢٥ جراما و ١٥ كجم ، والمنقار في هذه العائلة قصير ومفلطح وعربيض ولا يعتبر حادا وإنما يوجد به بعض الشرشة على حوافه الجانبية ، وطول الرقبة في هذه العائلة يتراوح ما بين المتوسط والطويل والأرجل قصيرة وقوية وبها ٤ أصابع بينها غشاء كامل بطول الأصابع الأمامية أما الإصبع الخلفي فقصير.

وتمتاز هذه الطيور بالقدرة الفائقة على السباحة والطيران ، والأجنحة لا تعد من النوع العربيض وحوافها في العادة مدبة ، والذيل قصير بصفة عامة وأثناء فترة تغيير ريش الجناحين . وتعيش طيور هذه المجموعة في جميع مناطق العالم عدا أمريكا الشمالية ، وعادة ما تعيش بالقرب من الماء . وكثير من أنواع هذه العائلة يعد من الطيور المهاجرة . وتبني الطيور أعشاشها باستخدام بعض النباتات الشاطئية أو التجويفات الصخرية أو الفجوات في الأشجار . وتبني الأنثى ما بين ٤-١٤ بيضة حيث تتولى الأنثى حضانة

هذا البيض لمدة ١٨-٣٩ يوما . وتتغذى طيور هذه العائلة على مجموعة كبيرة نباتية وحيوانية عادة من اللافقاريات ، والنباتات المائية وبعض الحشرات .

◆ عائلة نسور العالم الجديد :



تضم هذه العائلة ٧ أنواع ، وهي طيور ضخمة الجسم تأكل بقايا الحيوانات الميتة والجيفة ويتراوح طول الطائر ما بين ٦٠-١٣٠ سم ، ويزن ما بين ٩٠٠ جرام و ١٤ كجم ، ومنقار هذا الطائر ثقيل ومستدير الشكل له طرف خطافى حاد ، وتملك الأنواع التى تسكن الغابات من هذه العائلة حاسة شم جيدة

تستخدمها فى الوصول إلى الغذاء من حيوانات ميتة إلى غير ذلك من الأشياء ذات الرائحة النفاذة ، ورأس طيور هذه العائلة غالبا عارية من الريش ، ولها ألوان زاهية كالأحمر والأصفر ويحيط بالرقبة طوق من الريش المنفوش ، أما أجنحة هذه الطيور فطويلة وذات عرض كبير حتى تساعد الطائر على أن يحوم بخفة فى الهواء لمدة طويلة مستخدما التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة كما هو الحال فى الطائرات الشراعية ، ويصل طول الجناحين إلى ٥٢-٣٢ متر ، والأرجل والأصابع قوية بدرجة معقولة أما المخالب فضعيفة ؛ لأنها لا يقتضى الفرائس وإنما يصل إلى مكان الجيف ويستخدم منقاره فى نهش لحمها ، ولون هذه الطيور إما الأسود أو البني وهناك نوع منها لونه أبيض ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى من حيث الشكل غير أن الذكر أكبر حجما من الأنثى . وطيور هذه العائلة تتوارد في جماعات في حالتين فقط عند المبيت وعند التهام الطعام من الجيف ، ولكنها تتکاثر في أعشاش منفردة ، وتعيش طيور هذه العائلة في أمريكا الجنوبية والشمالية

وتعيش في مختلف الأراضي المفتوحة وفي الغابات . ولا تبني هذه الطيور أعشاشها بل تبحث عن مكان آمن في كهف أو حافة صخرية . وتضع الأنثى ٣-١ بيضات ويتولى الذكر والأنثى حضانة البيض لمدة ٥٨-٣٢ يوما، ويمكن للصغار الطيران بعد ٧٥-٧٠ يوما .



◆ عائلة العقاب :

هي عائلة وحيدة النوع وهو طائر قوى يأكل الأسماك حيث يصطادها بمخالبه القوية بالقرب من سطح الماء . ويعيش هذا الطائر في شمال ووسط أوروبا . وهو من الطيور المهاجرة حيث يترك مكان عشه في شهر أغسطس أو سبتمبر ، ويرحل إلى الأماكن الحارة في وسط إفريقيا وجنوبها ، وتفضل هذه الطيور اقتناص الأسماك من البحيرات العذبة ، وهناك أيضا البعض منها بالقرب من شواطئ البحار ، ويعود العقاب إلى أماكن الأعشاش في شهر إبريل أو مايو حيث يشرع في بناء عشه أعلى إحدى الأشجار الجافة والسميكية لهذا الغرض ، وتبني الأنثى ٤-٤ بيضات حيث ترقد عليها الأنثى وحدها لمدة ٣٦-٣٥ يوما، ويقوم الذكر بإحضار الطعام للأنثى أو يتولى الرقاد على البيض حتى تأكل أنثاه . كما أن الذكر عليه إطعام الصغار في الأسبوع الأولى من عمرهم ، ثم تساعده الأنثى بعد ذلك ، ويترك الصغار

العش بعد ٥١-٧٠ يوما ، ولكن يظل الصغار معتمدين على الآبوبين في الطعام لمدة شهر آخر بعد الطيران . ويتغذى العقاب على السمك الذي يلقطه بمهارة من الماء بمخالبه القوية .

◆ عائلة أبو حبيب (النساف) :



وهي عائلة وحيدة النوع ، وهو طائر كبير الحجم يصلح طوله ٥٠-١٢٠ سم ، وهو من الجوارح ولونه أسود ورمادي فاتح والرأس عاري من الريش ، ويميل لون وجه الطائر إلى الأحمر ، وللطائر زوائد ريشية خلف الرأس سوداء طويلة ، والأرجل طويلة لونها وردي ، وله عنق طويل وذيل طويل أيضا . وهذا الطائر صامت في أغلب الأحيان ولكنه يصدر بعض الصيحات في العش . وهذا الطائر هو الوحيد القادر على قتل الشعابين بضربيات أقدامه السريعة التي يوجهها بخفة إلى رأس الشعبان . ويتوارد هذا الطائر في أزواج ونادرا ما يرى في مجموعات صغيرة وموطنه إفريقيا .

◆ عائلة الصقور :

تضم هذه العائلة ٦١ نوعا ، وهي طيور جارحة يتراوح حجمها بين الصغير والكبير ، ويبلغ طول الطائر من ١٥-٦٣ سنتيمتر ، والوزن ما بين ١٠ جرامات و ٢ كجم ، والمنقار حاد ومقوس الطرف ، وله قدرة عالية على تقطيع لحم الفرائس وفتح الأنف موجودة على قاعدة المنقار على جزء لحمي . والحلقة المحيطة بالعين خالية من الريش . ولهذه الطيور قدرة إبصار

عالية ورقبة الطائر قصيرة والأرجل تتراوح ما بين المتوسط والطويل ، ويغطي الرئيس الفخذ أو الجزء العلوي فقط من الرجل ، والقدم قوية جدا وبها مخالب حادة . ولهذه الطيور قدرة فائقة على الطيران السريع والمناورة والانقضاض المفاجئ على الفرائس تساعدها في ذلك الأجنحة متوسطة الطول ومدببة الأطراف ، والذيل متوسط الطول ، ويختلف لون الطائر حسب النوع ولكن في الأعم يكون اللون الداكن في الجزء العلوي من الجسم ، أما الجزء الأسفل من الجسم فاللون يميل إلى الفاتح المنقط أحياناً أو المخطط ، والذكر أصغر حجماً من الأنثى .


وتعيش طيور هذه العائلة في معظم مناطق العالم في بيئات مختلفة ومتعددة ومن حيث الهجرة فإن بعض الأنواع تعتبر مهاجرة والبعض الآخر غير مهاجر ، وتتكاثر طيور هذه العائلة إما في مستعمرات جماعية أو في أعشاش منفردة ، ويتكون العش من بعض الأعواد والأفرع على الشجر أو على الصخور ، وفي بعض الأحيان تختل هذه الطيور أعشاش الغراب القديمة والمهجورة .



وتبيض الأنثى ٦-٢ بيضات ، ويرقد الذكر والأنثى على البيض ، ولكن يغلب دور الأنثى في حضانة البيض لمدة ما بين ٤٩-٢٥ يوماً يتولى بعدها الذكر إحضار الطعام للصغار حيث ترعى الأنثى الصغار في العش لمدة ما بين ٧-٣ أسابيع ، ثم يبدأ الصغار في الطيران بعد ١٤-٦٠ يوماً تالية . وتتغذى طيور هذه العائلة على الحيوانات المتنوعة التي تقتضيها بالانقضاض المفاجئ بمهارة فائقة .

طيور الطنانة

كثيرة الهجرة بين مناطق
العالم وتغذى على الحشرات
ورحيق الأزهار.





الحمام واليمام

تعيش في جميع بقاع
العالم، ماعدا الأماكن
شديدة البرودة وتعتبر مهاجرة
جزئياً.

طيور المرعّة


تعيش في معظم أنحاء العالم
- ماعدا أمريكا الشمالية -
في السهول الساحلية ،
والأراضي المفتوحة .




طائر الحبار

يعيش في أوروبا الغربية
وشمال إفريقيا والشرق
الأوسط وشرق أوروبا وشرق
آسيا واليابان وغينيا الجديدة ،
وأستراليا ونيوزيلندا ،
والأمريكتين ، وبعضها يهاجر

النوارس وخطاف البحر
تعيش على السواحل في
معظم أنحاء العالم .



طيور النكات
تعيش في مختلف مناطق
العالم بالقرب من البرك
والمستنقعات .



- ١- القنبرانى : يعيش فى الغابات والأراضى المزروعة بالحشائش ولايهاجر .
- ٢- خباف الزنق : يعيش فى جميع الأنهاء بجوار الأنهار والبحيرات والمستنقعات .
- ٣- أبو ملعقة : تعيش في جميع أنحاء العالم في مناطق السهول وحشائش السافانا والبحيرات .
- ٤- الكاچو : يعيش في نيوزيلنديا بالقرب من المياه الساكنة .
- ٥- ببغاء لوري : تعيش في جنوب وجنوب شرق آسيا وغيانا الجديدة وأستراليا ، ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادى .
- ٦- صائد الحشرات : يعيش في أمريكا الشمالية والجنوبية ، والمنطقة المدارية بصفة عامة .
- ٧- الطيور الصافرة : تعيش في غابات ومستنقعات أستراليا والمناطق المدارية .
- ٨- الكوتينجا : يعيش في غابات أمريكا الجنوبية وغابات المنطقة المدارية بصفة عامة .
- ٩- الإيمو : موطنها أستراليا وهى من الطيور المهاجرة موسمياً .

طيور السمنة

تعيش في معظم أنحاء العالم
وتهاجر أنواع التي تعيش
في المناطق الشمالية الباردة
إلى المناطق الدافئة في
الشتاء.



الطيور صائدة الهوام

تعيش في أوروبا - ماعدا
إيطاليا وأيرلندا - وهي تهاجر
أحياناً .

الغراب

يعيش في غرب وجنوب أوروبا وجزء من أوروبا وجزء من أوروبا الوسطى وهناك أيضاً من الأنواع ما يعيش في اسكتلندا وأيرلندا وتهاجر إلى إفريقيا .



أبو رزق

يعيش في أوروبا وآسيا وشمال غرب إفريقيا وأمريكا الشمالية .

طيور القبرة

تعيش في أوروبا ومنطقة
كبيرة من آسيا وشمال غرب
إفريقيا .



طيور الشقراق

يعيش في المناطق المفتوحة
ويخاصة في جنوب وشرق
أوروبا وتهاجر إلى إفريقيا في
الشتاء .

بومة المخازن

تعيش في معظم أنحاء العالم
وهي غير مهاجرة .



نقار الخشب

تعيش في معظم أنحاء العالم
وি�خاصة في أوروبا الوسطى
والشمالية والشرقية ويمكن
أن توجد في المناطق الجبلية
والمناطق الريفية .



- ١- الطيور ذات المنقار الحاد : تعيش في الغابات المطيرة بأمريكا الجنوبية وهي في الغالب غير مهاجرة .
- ٢- الطيور قاطعة النباتات : غرب وجنوب أمريكا الجنوبية .
- ٣- طيور الوروار : تعيش في المناطق المفتوحة في أوروبا الشرقية وإفريقيا وأستراليا .
- ٤- طيور السمامة : تعيش في معسكرات جماعية وتهاجر بين مختلف بلدان العالم .
- ٥- هدهد الغابات الأخضر : تعيش في الغابات الإفريقية ومناطق السافانا .
- ٦- طيور الجرذ : تعيش في غابات إفريقيا وكذلك الحدائق والزراعات وهي غير مهاجرة .
- ٧- الهدهد : تعيش في أوروبا وإفريقيا في الأماكن المفتوحة .
- ٨- أبوالخناء الأسترالي : يعيش في البرك والمستنقعات والغابات .
- ٩- الواق : يعيش في أمريكا الجنوبية في الأماكن المائية ما بين المكسيك والأرجنتين .

العقاب

يعيش في شمال ووسط
أوروبا .



الصقر

يعيش في معظم بقاع
العالم، بعضها مهاجر
وبعضها غير مهاجر .

الكركي

تعيش في معظم أنحاء العالم
وبحاصة في الأراضي الرطبة
والمياه الضحلة .



السمان

تعيش في إفريقيا والجزرية
العربية والجزء الشرقي من
آسيا وجنوب شرقى آسيا وفي
غينيا الجديدة وأستراليا
ونيوزيلندا ، وأوروبا الشرقية .

نسور العالم الجديد



تعيش في أمريكا الجنوبيّة
والشمالية ، خصوصاً في
الأراضي المفتوحة والغابات .




البشاروش

تعيش في أوروبا الغربيّة
و شمال إفريقيا والشرق
الأوسط ، و شرق أوروبا
و شرقي آسيا ، واليابان
و جنوب إفريقيا والجزيرة
العربية ، وأمريكا الجنوبيّة .

طيور جناح الشمع
تعيش في المناطق الشمالية
من آسيا وأوروبا وأمريكا
الشمالية .




طيور السنونو
تعيش في معظم أنحاء
العالم، وهي من الطيور
المهاجرة .



- ١- طيور اسكيمرو : تعيش في إفريقيا والجزيرة العربية وجنوب شرق آسيا ، وفي أمريكا الجنوبية على الشواطئ الرملية الخصبة وعند مصبات الأنهار ، وتعتبر مهاجرة جزئيا .
- ٢- الفرقاطة : تعيش في الأماكن الاستوائية وفي الجزر المحيطة وهي متوجلة ولكنها لا تهاجر.
- ٣- البطريرق : تعيش في المنطقة الجنوبية وهو من الطيور البحرية ويقتني على الأسماك والجبار والقشريات .
- ٤- الغاق : تعيش في الأماكن المائمة الرطبة وعلى السواحل .
- ٥- طيور البلابل : تعيش في غابات إفريقيا وجنوب آسيا وبعضها يعيش في الزرارات .
- ٦- الريا : موطنها أمريكا الجنوبية .
- ٧- النعام : تعيش في السودان وأثيوبيا وتزانيا .
- ٨- طائر السحرون : يعيش في الأماكن المخضضة من الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية .

الغاق

تعيش في الأماكن المائية
الرطبة وعلى السواحل .



الخباري

تعيش جماعات في الأماكن
المفتوحة والأراضي العشبية .

اللقلق

تعيش في الأماكن المفتوحة
بالقرب من المياه .




مالك الحزير

تعيش في جميع أنحاء العالم
في المناطق ذات البحيرات
العذبة أو المالحة .

♦ عائلة السُّمَائِيَّ :


تضم هذه العائلة ١٥ نوعاً ، وهي طيور صغيرة تعيش على الأرض ، ويمكن تمييزها عن غيرها بعدم وجود أصبع خلفي في القدم ، ويصل طول الطائر من ١١-١٨ سم ، والوزن بين ٤٠-٨٠ جراماً ، ومتقارن الطائر قصير ورفعي والجناحان قصيران ، أما الذيل فقصير جداً ويميل لونه إلى البني والرمادي والأسود ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ولكن الأنثى أكبر حجماً من الذكر ولونها أكثر بريقاً .



وتعيش طيور هذه العائلة في إفريقيا والجزيرة العربية والجزء الشرقي من آسيا وجنوب وجنوب شرق آسيا وفي غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلاندة وأوروبا الشرقية وجنوب القارة الأوروبية حيث تعيش في الغابات والأراضي المغطاة بالحشائش .

وتضع أنثى السُّمَائِيَّ ٤ بيضات ، ويقوم الذكر بحضانة البيض لمدة ١٢-١٣ يوماً ، وتتغذى هذه الطيور على البذور والحشرات .

♦ عائلة طيور الكركي :





تضم هذه العائلة ١٥ نوعاً ، وهي طيور كبيرة الحجم ، ويبلغ طول الطائر ١٥٢-٧٦ سم وارتفاع هامته من الأرض ٩٠-١٨٠ سم ، والوزن ٢,٧-١٠,٥ كجم ، ورقبة الطائر طويلة يفردها أثناء الطيران أمام الجسم وباستقامته ، والسيقان طويلة أيضاً ويقذفها الطائر خلف الذيل باستقامة الجسم عند الطيران ،

وتعيش طيور هذه العائلة على الأرض ولا تعتلي الأشجار مطلقاً ، والمقار متوسط أو طويل وهو مستقيم بصفة عامة ، ولبعض الأنواع أجزاء ملونة على الرأس أو الرقبة ، ولهذه الطيور قدرة عالية على الطيران يساعدها على ذلك وجود جناحين طويلين وعريضين حيث يصل طول الجناحين إلى ٢٧-١١ متراً .

للطائر ٤ أصابع في القدم ويرتفع الإصبع الخلفي منها لأعلى الساق ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ، ولكن الذكر أكبر حجماً من الأنثى ويغلب اللون الأبيض والرمادي والأسود والبني على جسم الطائر .

وتعيش هذه العائلة في معظم أنحاء العالم في الأراضي الرطبة ذات المياه الضحلة وفي الأراضي ذات العشب القصير ، وتهاجر أنواع التي تعيش في الشمال إلى الأماكن الدافئة شتاء ، ويضع الطائر عشه من أوراق النباتات المائية بالقرب من المستنقعات ، وتوضع الأنثى بيضتين يرقد عليهما الذكر وأنثى لمدة ٤٠-٣٠ يوماً ، وتستمر رعاية الأبوين للصغار لمدة ٥٥-١٠٥ يوماً . وتتغذى طيور الكركى على أنواع عديدة من الحيوانات الصغيرة وعلى البذور وعلى الفواكه ، وجزور النباتات .



◆ عائلة طيور المخزعل :

هي عائلة وحيدة النوع ، وهي طيور متوسطة الحجم تتوجه في الأماكن المائية الضحلة والمستنقعات في أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا الشمالية ،

ويتراوح طول الطائر ما بين ١٨-٦٣ سم ، ويميل لونه لللون البني مع وجود نقاط وألوان في ريشه ، والجسم رفيع انساني والرقبة طويلة وكذلك الأرجل ولون الأرجل داكن . وعادة ما يتتجول بخفة خلال المستنقعات والمجاري المائية وأجناب الأنهر . ولهذا الطائر صيغات تشبه صرائح الطفل يطلقها عالية في الليل .

◆ عائلة طيور السُّخُنُون (نافح البوق) :


تضم هذه العائلة ٣ أنواع ، وهى طيور متوسطة أو كبيرة الحجم تعيش في جماعات تصدر أصواتاً مزعجة ، ورأس الطائر صغيرة والمنقار صغير مقوس ، والرقبة متوسطة الطول ، أما الأرجل فطويلة ، ويصل طول الطائر ٤٣-٥٣ سم ، والوزن ١,٥-١ كجم ، والإصبع الخلفي لهذه الطيور قصير ومرتفع أعلى وتعد طيور السخنون سريعة الجري .

وتتغذى هذه الطيور فوق الأرض ، وتضع أعشاشها فوق الأشجار ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى حيث يميل اللون إلى الأسود ، أما الرأس

والرقبة فعليها ريش محمل يميل إلى القرمزى أو الأخضر أو البرونزى ، وتنسدل بعض الريشات الموجودة على ظهر الطائر تجاه الذيل بما يشبه خصلات الشعر . وتعيش هذه الطيور في الأماكن المنخفضة من الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية ولا تهاجر من مكانها . وتبيض الأنثى ٦-١٠ بيضات في مكان مرتفع على الأشجار . وتتغذى طيور السخنون على الفواكه المتساقطة وعلى الحشرات الموجودة على الأرض .




♦ عائلة المرعنة ودجاج الماء :



تضم هذه العائلة ١٢٣ نوعا ، وهى طيور يتراوح حجمها بين الصغير والكبير، وهى طيور مائية أو شبه مائية يتراوح طول الطائر ما بين ١٠ إلى ٦٠ سم ، وزنه ما بين ٣٠ جراما و ٣٣ كجم ، وفي

الغالب لديها قدرة على الطيران رغم أن بعض أنواع هذه العائلة لا تطير على الإطلاق والجسم عادة رفيع ، والأرجل طويلة وبها أربعة أصابع قد يتخللها أغشية، وقد يغطي مقدمة وجه الطائر غطاء جلدی من الأمام لهألوان زاهية ومنقار هذه الطيور قصير بعض الشئ ولكنها قوى والأجنحة مستديرة الحواف ، والذيل قصير لدرجة أنه غير ملحوظ في بعض الأنواع وكعادة الطيور المائية فإن هذه الطيور تصبح عاجزة عن الطيران أثناء فترة تغيير ريش الجناحين ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى في طيور هذه العائلة ، ولكن الذكر في بعض الأحيان يكون أكبر من الأنثى ، ويغلب اللون الأسود والأزرق الغامق والقرمزى والبني والأحمر والرمادى على طيور هذه العائلة بصفة عامة كما تتلون بعض الأنواع منها بالنقاط والخطوط . وتعيش هذه الطيور في مختلف قارات العالم عدا أمريكا الشمالية في الأراضي الرطبة وقرب مصادر المياه وكذلك في الغابات الرطبة .



طيور عائلة المرعنة ودجاج الماء


وبعض أنواع هذه العائلة مهاجر .

وتبني الطيور أعشاشها من أعواد الأشجار أو أوراق النباتات المائية ، وقد تبني أعشاشا عائمة على سطح الماء مع إخفائها جيدا عن العيون ، ويتراوح عدد البيض في هذه العائلة ما بين بيضة واحدة إلى ١٤ بيضة

حسب النوع ، وقد يشتراك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض ، وقد ترقد الأنثى وحدها عليه لمدة تتراوح بين ٣٠ - ٢٠ يوما ، وبعد فقس البيض يتولى

الروجان معا رعاية الصغار لمدة شهرين تقريبا . وتتغذى طيور هذه العائلة على الحيوانات الصغيرة والبذور والفواكه والنباتات المائية .

◆ عائلة الكاجو :




هذه العائلة تقتصر على نوع واحد نادر هو الكاجو الذى لم يبق منه سوى عدة مئات وهو مهدد بالانقراض ، وهو طائر يشبه فى مظهره الخارجى طائر مالك الحزين من حيث الريش الموجود خلف الرقبة ، ولون المنقار والرجل ، ولكنه صغير الحجم حيث يصل طول الطائر إلى ٥٥ سم وطول المنقار ٦,٣ سم ، والأرجل طويلة نسبيا ولونها هي والمنقار أحمر ، وينبت فى أعلى الرأس وخلف الرقبة ريش عرفى ناعم ، ويميل

لون صدر الطائر إلى اللون الرمادى الفاتح مع اللون البنى فى ريش الجناحين ، وهذا الطائر له غناء وصوت جميل يرددہ قبيل الفجر ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ، ولكن الذكر أكبر قليلا من الأنثى ، وجناحا الطائر عريضان وطرفهما مستدير ولكنهما قصيران ، ولذلك فإنه لا يطير لكنه من الطيور سريعة الجرى . وتوجد البقية القليلة منه الآن فى نيو كاليدونيا بالقرب من المياه الساكنة .

والكاجو طائر غير مهاجر . ويصنع عشه من أوراق الشجر الجافة على الأرض وتبين الأنثى بيضة يحتضنها الذكر والأنثى لمدة ٤٠-٣٥ يوما ، ويظل الصغار معتمدين على الأبوين لمدة ١٠٠ يوم ويتنبزى الكاجو على الديدان واللافقاريات الدقيقة التى يتقطها بمنقاره من الأرض .

♦ عائلة الواق الشمسي :



تضم نوعا واحدا يسكن أمريكا الجنوبية حيث يتجلو في الأماكن المائية ، وهو طائر طويل الجسم طوله حوالي ٤٨ سم ، وله خطوط بيضاء في رأسه الأسود ، والجسم كله مخطط باللون البنى والرمادى والأسود في خطوط دقيقة متقاربة ، ويميل لون البطن إلى اللون الفاتح أو الأبيض وذيله - كذلك - مخطط باللون بنية زاهية ، وتظهر ألوان برتقالية في جناحيه عند فردهما للطيران أو عند قيامه بالرقص حيث يمشي في خيلاء على الأرض ، وقد يطير لأقرب شجرة إذا أزعجه وجود غرباء في المكان ، وله صوت حاد كالصفارة ، وموطنه مابين المكسيك والأرجنتين في الأراضي المنخفضة الاستوائية وفي الغابات بالقرب من الماء .

♦ عائلة طيور القنبراني :



تضم هذه العائلة نوعين ، وهى طيور كبيرة الحجم تعيش على الأرض ، لها سيقان طويلة وأقدام صغيرة ذات إصبع خلفى صغير مرتفع ، ويساعده ذلك على الجرى السريع خافضا رأسه عندما يحس بالخطر أو باقتراب غرباء ، ويبلغ طول الطائر ٩٠-٨٠ سم ، ومنقاره قصير يميل لونه للحمرة ، ويوجد رايش عرفى على رأس الطائر ، وجناحا الطائر قصيران وحروفهما مقوسة

والذيل طويل ، ولا يميل الطائر للطيران إلا نادرا ويميل لون الطائر إلى البنى ، وبه خطوط أما الرقبة والبطن فلونهما فاتح . ويسكن القنبراني الغابات والأراضي المزروعة بالحشائش . ولا يعتبر من الطيور المهاجرة . تضع الأنثى البيض في مكان مرتفع قليلا حيث يتولى الذكر والأنثى معا حضانة البيض لمدة ٢٥-٦ يوما ، وتتغذى هذه الطيور على الفواكه والحيوانات الصغيرة .

♦ عائلة طيور الحباري :




تضم هذه العائلة ٢٢ نوعا ، وهي طيور كبيرة الحجم تعيش على الأرض ، وطول الطائر يتراوح ما بين ٤٠-١٢٠ سم ، والوزن ما بين ١٨-٥ كجم ، وأرجل الحباري قوية والإصبع الخلفي غير موجود ، وإنما توجد ثلاثة أصابع أمامية عريضة والأظافر غير حادة والمنقار قصير ومفلطح وغير حاد ، ورقبة الحباري طويلة ، والجناحان عريضان ، ولكن الذيل قصير فيبلغ طول الجناحين من ١-١,٢٥ مترا ، ويميل لون الجسم العلوي من جسم الطائر إلى اللون البنى والرمادي والأسود والأبيض ، أما الأجزاء السفلية من الجسم فتميل إلى اللون الأبيض ، وذكر طيور الحباري أكبر حجما من الأنثى ويميل لونها إلى التباين .

وتعيش هذه الطيور في جماعات في الوديان والأراضي المفتوحة والأراضي العشبية . وبعض أنواعها تهاجر والبعض الآخر يظل في مكان معيشته دون هجرة .

وتقوم الأنثى عادة ببناء العش وحضانة البيض لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، كما تقوم الأنثى أيضا برعاية صغارها مدة تصل من ٣٥-٥٥ يوما أخرى .

◆ عائلة خباب الزنبق :




تضم هذه العائلة ٨ أنواع ، وهي طيور تتراوح ما بين الحجم الصغير والمتوسط ولها أرجل طويلة وتمتاز بأصابع طويلة جدا ، ويصل طول الطائر ١٥-٣٠ سم ، ويزن من ٤٠-٢٣٠ جراما ، ويستطيع الطائر لخفة وزنه وطول أصابعه أن يمشي على أوراق النباتات

الطاافية إضافة إلى قدرته العالية على السباحة والغطس والجري ، وأجنحة طيور هذه العائلة قصيرة مستديرة الحواف ، والمنقار قصير وقد يحمل الطائر غطاء جلديا في مقدمة الرأس واللون الغالب لأنواع هذه العائلة هو البني أو الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الأصفر ، وعادة ما يكون الجزء الأسفل من الجسم هو الجزء الداكن اللون ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى غير أن الأنثى أكبر حجما من الذكر . وتعيش طيور هذه العائلة في أماكن العالم المختلفة بالقرب من الأنهر والبحيرات والمستنقعات وهناك نوع واحد من هذه الطيور يهاجر ولكن باقي الأنواع لا تهاجر . ويبنى الذكر العش فوق أوراق النباتات الطافية ويتولى الذكر - أيضا - حضانة البيض لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، ويقوم - أيضا - برعاية وحماية صغاره حيث يحملهم تحت جناحيه لمدة تصل إلى ١٠٠ يوم . وتتغذى هذه الطيور على الحيوانات الصغيرة وعلى بذور النباتات المائية .

◆ عائلة الشنقب الملون :

تضم هذه العائلة نوعين من الشنقب ، وهى طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم يبلغ طول الطائر ٢٠-٢٥ سم ، والوزن ما بين ٧٦ جراما و ١٦٥ جراما ، ومنقار الطائر متوسط الطول ذو طرف حاد ، والجناحان قصيران



وذلك يضعف قدرة هذه الطيور على الطيران ، ويتلون صدر الطائر باللون الأخضر أو البني أو الأحمر أو الأبيض في تمازج لوني جميل ، كما أن الأجنحة ملونة بألوان وزخارف

جميلة من اللون الأصفر وتظهر هذه الألوان عندما يفرد الطائر جناحه . وتعيش طيور هذه العائلة في شرق أوروبا واليابان وشرق آسيا وإفريقيا والجزر العربية وجنوب وجنوب شرق آسيا في غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزلندا وفي أمريكا الجنوبية ، حيث تسكن المستنقعات والبرك ذات الحشائش والحقول ذات التربة المائية ، ولا تعد مهاجرة بدرجة كبيرة ؛ لأن هجرتها تكون محلية ، وتبني هذه الطيور أعشاشها من أوراق النباتات المنسوجة والتي يبنيها الذكر تحت غطاء سميك لضمان الحماية ، كما يقوم الذكر بحضانة البيض ، وقد تساعده الأنثى أيضاً لمدة 19 يوماً ، ثم يقوم الذكر برعاية الصغار حتى تمام استعدادهم للاعتماد على أنفسهم ، وتتغذى هذه الطيور على البذور والحيوانات اللافقارية الموجودة في مياه البرك والمستنقعات .


♦ عائلة طائر المُحَار ♦



تضم هذه العائلة 11 نوعاً ، وهي طيور سوداء تتوجه في البرك والمستنقعات ذات منقار قوي وطول أحمر اللون ، ويبلغ طول الطائر 40-45 سم ، ويزن ما بين 400-700 جرام ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ولكن الأنثى أكبر حجماً ولها منقار أطول من الذكر ، وتعيش هذه الطيور في أوروبا الغربية

وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا وشرق آسيا واليابان وغيرها الجديدة واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية والجنوبية ، وهناك بعض الأنواع منها ما تعيش على السواحل وقد تتواجد في الداخل على الأرض ، وتهاجر بعض الأنواع من هذه العائلة ، وتبيض الأنثى ٤-٢ بيضات يشتراك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة تصل إلى ٣ أسابيع ، وتتغذى هذه الطيور على اللافقاريات وعلى الحمار الموجود في المياه .

♦ عائلة طيور أبي المنجل :



تضم نوعا واحدا ، وهو طائر جوال في الأماكن المائية ذو حجم متوسط وله منقار مقوس أحمر اللون يشبه في تقوسه منجل الحصاد ، وللطائر ساقان طويلة نسبيا ، ولو نهما أحمر كلون المنقار - أيضا - أما الجنحان فلهما حافة مستديرة ، ولا يوجد إصبع خلفي في

القدم ، ويتلاءم هذا المنقار المقوس ؛ ليتلقى حول الجنادل المائية والكتل الحجرية بحثا عن الغذاء كما يتوجول في المياه الضحلة غامسا رأسه ومنقاره في الماء بحثا عن غذائه ، وعند الطيران فإن الطائر يضرب الهواء بجناحيه ضربات بطيئة مصدرها صوت صفير متعدد خلال طيرانه ، ويتوارد هذا الطائر في أزواج أو مجموعات صغيرة ، ويتوارد هذا الطائر بالقرب من الأنهر الصخرية في منطقة التبت والهيمالايا .


♦ عائلة طيور النكات :

تضم هذه العائلة ١٣ نوعا ، وهي طيور متوسطة الحجم ، جوالة في الأماكن المائية لها منقار مميز طويل ورفيع ، والأرجل طويلة ورفيعة ، وبلغ طول الطائر ٣٠-٥٠ سم ، والوزن ٤٣٥-١٤٠ جراما ، والجنحان حادا

الطرف وطويلاً ، أما الذيل فقصير ، وبالقدم ثلاثة أصابع بينها غشاء جلدي غير كامل الطول ، ويغلب اللون الأبيض والأسود والرمادي والبني على ريش طيور هذه العائلة .

وتعيش هذه الطيور في مختلف مناطق العالم بالقرب من البرك والمستنقعات ذات المياه العذبة والمالحة . ومن حيث الهجرة نجد أن الأنواع التي تعيش في الأماكن الشمالية الباردة تهاجر شتاءً . وتتكاثر طيور هذه العائلة في مستعمرات جماعية ، وتبيض الأنثى في المتوسط ٤ بيضات حيث يقوم الذكر والأثني معاً بحضانته لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، ويمكن للصغار الطيران بعد ٢٨ - ٤٢ يوماً . وتتجذر هذه الطيور على اللافقاريات المائية وعلى الفقاريات الصغيرة وذلك بالمرور بالمقار في الماء والتقطاف الغذا .

◆ عائلة طيور المرعنة :




مرعنة مطروقة

تضم هذه العائلة ٦٦ نوعاً ، وهي طيور يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط ، وهي طيور شبه مائية لها عنق غليظ وقصير ولها عيون واسعة ، ويبلغ طول الطائر ما بين ١٤ ، ٤١ سم ، والوزن ما بين ٣٤ جراماً ، ٢٩٦ جراماً ، ومنقار الطائر في هذه العائلة يتراوح بين القصير والمتوسط


وهو منقار مستقيم وقوى ، والأجنحة طويلة ومدببة الأطراف ، ولهذه الطيور قدرة وسرعة عالية في الطيران ، ذيل الطائر قصير بصفة عامة ، أما الأرجل فتتراوح بين المتوسط والطويل ، ولها ثلاثة أصابع أمامية أما الإصبع الخلفي فإما ضامر أو غير موجود في بعض الأنواع ؛ لذلك فهي طيور سريعة العدو ، ويتراوح لون الجسم بين الأبيض والأسود والرمادي والبني والأصفر والأخضر في تمازج حسب النوع ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في الشكل العام ولكن ألوان الذكور زاهية بعض الشئ عن الإناث . وتتواجد هذه الطيور في معظم أنحاء العالم عدا أمريكا الشمالية في السهول الساحلية والأراضي

المفتوحة بالداخل . وتعد أغلب أنواع هذه العائلة من الطيور المهاجرة .
ويصنع الذكر عدة أعشاش عبارة عن حفر صغيرة في الأرض تختار الأنثى منها واحدا ، وعادة ما يكون بالقرب من الماء تحيطه بعض الأحجار أو بقايا الأصداف للحماية . وتضع الأنثى ٤ بيضات ، ويشترك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة تتراوح ما بين ٣٨-١٣ يوما ، وتتغذى طيور هذه العائلة على أنواع مختلفة من اللافقاريات والنباتات .

◆ عائلة الطيطوي والشنقب :



طائر الطيطوي



دريجة من عائلة الطيطوي والشنقب


تضم هذه العائلة ٨٦ نوعا ، وهي طيور جوالة في المياه الساكنة ، يتراوح حجمها بين الصغير والكبير ، ويبلغ طول الطائر ما بين ١٣ سم ، ٦٦ سم ، والوزن ما بين ١٨ جراما ، ١ كجم ، ويختلف شكل وطول المنقار حسب النوع ، ويتراوح ما بين القصير والطويل ، وبين المستقيم والمقوس .

وكذلك الأرجل تتراوح بين المتوسط والطويل . ولا تختلف الإناث عن الذكور في طيور هذه العائلة غير أن الإناث غالبا أكبر حجما ولها منقار أطول من منقار الذكر . وتغلب الألوان التالية على لون الجسم : البني الرمادي ، الأحمر ، وتتوارد هذه الطيور في جميع أنحاء العالم عدا

أمريكا الشمالية ، وهي طيور مهاجرة في غالبيتها ، ومن حيث التكاثر فغالبا ما يتخذ الذكر أنثى واحدة وقد يأخذ الذكر أكثر من أنثى . وتبني الطيور أعشاشها إما حفرة بسيطة في الأرض أو بين الأعشاب وربما بين الأشجار ،

وتضع الأنثى ٤ بيضات ، وتقوم الأنثى وحدها أو بمشاركة الذكر بالحضانة لمدة ١٨ - ٣٠ يوما . وتتغذى طيور هذه العائلة على مجموعة متنوعة من اللافقاريات وأحيانا بعض النباتات .


♦ عائلة طيور شنقب البذور :




تضم هذه العائلة أربعة أنواع ، وهي طيور يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط ، وتعيش هذه الطيور على الأرض في جماعات . ويصل طول الطائر ١٥ سم إلى ٢٧ سم ، والوزن ما بين ٦٠ جراماً و ٤٠٠ جرام ، وأرجل هذه الطيور قصيرة ، والمنقار مخروطي الشكل وتوجد فتحة الأنف عند قاعدة المنقار ، وتعطيها أغطية واقية ، والأجنحة طويلة ذات حافة مدببة ، وهي طيور لها قدرة طيران عالية وقدرة مناورة والذيل متوسط الحجم ، وللطائر ثلاثة أصابع أمامية طويلة وواحد خلفي قصير ، والجسم يميل إلى اللون البنى أو الرمادى ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ، ولكن ألوان الذكور أكثر جذباً وبريقاً . وموطن هذه الطيور أمريكا الجنوبية في المناطق الخضراء والمرتفعات والحقول ، وتهاجر بعض أنواعها . ويبنى الطائر العش في تجويف صغير بالأرض يبطنه بعض الخامات اللينة حيث تضع الأنثى ٤ بيضات ، وتقوم - أيضاً - بحضانتها لمدة ٢٦ يوماً وعند مغادرتها للعش تقوم بتغطية البيض ، ويصبح الصغار قادرين على الطيران بعد ٤٩ يوماً . تتغذى هذه الطيور أساساً على البذور وبعض الخضروات وربما بعض الحشرات أحياناً .

♦ عائلة النوارس وخطاف البحر :

تضم هذه العائلة ٩١ نوعاً ، وهي طيور بيضاء أو رمادية وغالباً ما يكون الرأس وطرف الجناح لونهما داكن أو أسود ، للطائر ٣ أصابع أمامية بينها غشاء ، أما الإصبع الخلفي فقصير ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في



خطاف البحر




نورس البحر

الشكل ولكن الذكر أكبر حجماً من الأنثى ، والأجنحة عند طيور هذه العائلة طويلة ومدببة الأطراف ، وهي من أقوى الطيور قدرة على الطيران . وإذا تكلمنا عن الخصائص فستشخص عائلة النوارس الفرعونية ببعض الخصائص العامة وعائلة خطاف البحر الفرعونية بخصائصها أيضاً ، وعن النوارس : طيور ذات حجم يتراوح بين المتوسط والكبير ، وتمتاز بالضخامة والقدرة على السباحة ، والذيل متوسط بصفة عامة ، المنقار قوي ومحلي الطرف ومتوسط الطول ومربع الشكل . أما عن خطاف البحر : فيتراوح حجمها بين الصغير والكبير ، ولكن أجسامها أكثر رشاقة ولا تسبح إلا نادراً ، والذيل مشقوق وطوله بين المتوسط والطويل ، والمنقار طويل وأكثر رفعاً وطرفه الأمامي مدبب .


وبصفة عامة فإن طيور عائلة النوارس وخطاف البحر تعيش على السواحل في مختلف أنحاء العالم ، ويعتبر العديد من أنواع هذه العائلة طيوراً مهاجرة خصوصاً خطاف البحر ، وتتكاثر طيور هذه العائلة في مستعمرات جماعية حيث يبني العش في تجويف خفيف في الأرض - يبطنه الطائر ببعض الخامات اللينة - ، أو على الصخور في الجزر الصخرية . وتبيّن أنثى الطائر في هذه العائلة ٤-١٨ بيضات ، يشترك الذكر والأنثى معاً في حضانتها لمدة ٢٥ يوماً ، وتأكل هذه الطيور كل شيء حيواني أو نباتي بما فيها جثث الحيوانات (بالنسبة للنوارس) . كما تغوص طيور خطاف البحر لصيد السمك من أعماق المياه .

♦ عائلة طيور إسكيموس : *skimmers*

تضم هذه العائلة ٣ أنواع ، وهي طيور كبيرة الحجم تشبه خطاف البحر غير أن لها منقاراً مختلفاً له شكل خاص ، ويبلغ طول الطائر من هذه العائلة بين ٤٠ سم إلى ٥٠ سم ، وزنه ما بين ٣٠٠ جرام و ٤٠٠ جرام ، والمنقار طويل وعميق وغير حاد ، كما أنه مضغوط من الأجناب والفك السفلي من منقار هذا



الطائر أطول بمقدار ٢٥ % من الفك العلوي ، ولهذا الطائر ميزة عجيبة تميزه عن باقي الطيور وهي أنه عند سقوط الضوء الساطع على عينيه فإن حدقة العين تغلق العين حتى تبدو الفتاحة كخط رأسى رفيع . (انظر الشكل)




عين الطائر في الضوء العادي

تأثير الضوء على عين طائر الإسكيموس

وأجنحة الطائر طويلة وحوافها مدببة وعريضة عند قاعدتها ، وهي طيور لها قدرة عالية على الطيران ، أما الذيل فقصير ومشقوق ، والأرجل قصيرة بها ٣ أصابع أمامية بينها غشاء ، وعادة ما يكون لون ريش الطائر إما رمادياً أو بنيناً في أجزائه العليا ، أما الأجزاء السفلية من الجسم فلونها أبيض ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى ، ولكن الذكر أكبر حجماً من الأنثى ، وتعيش هذه الطيور في قارة إفريقيا والجزيرة العربية والجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من قارة آسيا وفي أمريكا الجنوبية على الشواطئ الرملية المحمية وعند


مصبات الأنهر وعلى ضفاف الأنهر الكبرى . و تعد هذه الطيور من الطيور المهاجرة جزئيا .

وتتكاثر هذه الطيور في مستعمرات جماعية حيث تبني أعشاشها على شكل حفر ضحلة في الأرض تضع فيها الأنثى ٤-٣ بيضات ، ويتعاون الذكر مع الأنثى في الحضانة لمدة ٢١ يوما ، ويصبح الصغار قادرين على الطيران بعد ٣٥ يوما . وتتغذى هذه الطيور على الأسماك عن طريق التحلق فوق سطح الماء مباشرة مع غمس الفك السفلى للمنقار في الماء وجعله يشق الماء وعند مقابلة أى فريسة فإن الطائر يغلق منقاره بسرعة البرق ملتئماً الفريسة . انظر الشكل



طيور الطائر فوق سطح الماء مباشرة واضعا فك المنقار السفلى في الماء أثناء الطيران ليغلق الفكين بسرعة بمجرد الاصطدام بأى فريسة عائمة

◆ عائلة الحمام واليمام :



تضُم هذه العائلة ٣٠١ نوعا ، وهي طيور يتراوح حجمها بين الصغير والكبير وجسمها انسيلابي ولها قدرة عالية على الطيران ، ويتراوح الطول ما بين ١٥ ، ٨٢ سم ، ويتراوح الوزن ما بين ٣٠ جراما ، ٢,٤ كجم ، وتقع فتحة الأنف على قاعدة المنقار على نتوء لحمي تمتاز به مناقير تلك الطيور ، وأرجل وأقدام طيور هذه العائلة قصيرة ولها أربعة أصابع مستوية لا

يوجد بينها أى أغشية ، ويتراوح الذيل بين القصير والطويل ، وشكله العام مربع ، ويختلف اللون اختلافاً بيناً بين طيور هذه العائلة بحيث يصعب تعميم أى لون ، وقد نجد عرفاً عند بعض أنواع هذه العائلة ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى . وتعيش طيور الحمام واليمام في كل بقاع العالم عدا الأماكن الشمالية الباردة جداً ، وبعض أنواعها تعتبر طيوراً مهاجرة ، وتعيش هذه الطيور على الأشجار أو فوق الأماكن الآمنة حيث تجد حفراً . وتبيض الأنثى بيضتين ، ويتعاون الذكر مع الأنثى في الحضانة لمدة ١٤-٢٨ يوماً . وتتغذى هذه الطيور على الحبوب وأوراق النباتات والفواكه .

◆ عائلة ببغاء لوري :




تضم هذه العائلة ٥٥ نوعاً ، وهي طيور تتراوح ما بين الصغير والمتوسط ويصل طول الطائر ١٥ سم - ٣٢ سم ، ولسان الطائر متتطور وطرفه كالفرشاة بما يمكن الببغاء من الوصول داخل الزهور وهي بذلك تقوم بعملية التلقيح للزهور ، كما أن لهذه الطيور قدرة على الطيران السريع يساعدها في ذلك أحجحتها ذات الطرف المدبب وحجمها المتوسط ، والذيل في هذه الطيور قصير بصفة عامة وقد يكون طويلاً ورقيقاً في بعض الأنواع . ويغلب على لون هذه الطيور الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى .

والببغاء من عائلة لوري طيور اجتماعية دائم الصياغ وإصدار الأصوات ، وتسوطن طيور الببغاء من عائلة لوري جنوب وجنوب شرق آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ .

وكثير من الأنواع في هذه العائلة تعتبر طيوراً مهاجرة ، وقد تضع البيض في هيئة مستعمرات جماعية ، أو في أعشاش منفردة ، والعيش عادة ما يكون فجوة في وسط الأشجار ، وتتغذى على رحيق الأزهار وحبوب اللقاح الموجودة في الأزهار وطلع النباتات والفواكه .

♦ عائلة بومة المخازن :



تضم هذه العائلة ١٤ نوعاً من البوم ، وهى طيور متوسطة الحجم لها وجه يشبه رسمة القلب ولها عينان صغيرتان نسبياً ، وهى من الطيور الليلية التى تظهر وتتغذى على فرائسها فى الليل ، ويصل طول الطائر من ٥٣-٢٣ سم ، ويتراوح وزنه ما بين ١٨٠ جم ، ١,٣ كجم ، ورأس الطائر كبير بالمقارنة بباقي الطيور ، أما الجسم فرفيع وخفيف ويعطى لون الطائر

وريشه انطباعاً مخدعاً عن حجم الطائر حيث يبدو أكبر من الواقع ، وأرجل البوم طويلة والساق مغطى بالريش ، أما القدم فعاري من الريش والجناح عريض ومستدير الطرف بذلك يتمكن الطائر من الطيران بخفة ومن التحليق بدون صوت لاقتناص فرائسه ، والذيل متوسط الطول ، ويميل لون بوم المخازن إلى اللون البنى والذهبى من ناحية البطن والصدر وإلى اللون الرمادى فى الجزء العلوي ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى فى الشكل العام ، ولكن الأنثى أكبر حجماً . وتعيش طيور هذه العائلة فى معظم أنحاء العالم ، وتعتبر من الطيور الساكنة التى لا تهاجر ، وتبنى عشها فى فجوات فى الأشجار أو فى المنازل والمبانى ، وتبيض الأنثى ٤-٧ بيضات وهى التى تختضن البيض لمدة ٣٤-٢٧ يوماً ، وتتغذى طيور عائلة بوم المخازن على أنواع كثيرة من الفقاريات التى تقتنصها بمخالبها وكذلك تتغذى على الحشرات الكبيرة .


♦ عائلة طيور السمامة :

تضم هذه العائلة ٩٢ نوعاً ، وهى طيور ذات حجم بين الصغير والمتوسط ، وتشتهر بالقدرة العالية على الطيران والسرعة وأجنحتها طويلة وذيلها مشقوق ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٠ ، ٣٠ سم ، والوزن ما بين ٩ ، ١٥٠ جم ،

والأرجل دقيقة ولها أظافر مقوسة حادة ، وكثير منها له إصبع خلفي يمكن عكسه للأمام ، والمنقار صغير جدا ولكن قاعدته عريضة ، وجسم الطائر رشيق والرقبة قصيرة ، ولون ريش الطائر يميل إلى اللون البني الغامق والأسود ، وأحيانا تكون مقدمة العنق بيضاء ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في الشكل العام ، وتعيش طيور هذه العائلة في صورة جماعات ، وتصدر عنها أصوات وصرخات أثناء الطيران ، وتعيش طيور السمامة في معظم أنحاء العالم عدا أماكن المرتفعة ، وهي

طيور تقضي وقتها كله طائرة في الهواء حيث تتغذى ولا تستريح إلا عند الذهاب للعش ، وتعتبر هذه الطيور من أكثر الطيور هجرة وقطعاً للمسافات الطويلة أثناء الهجرة ، وتتكاثر في مستعمرات جماعية أو في صورة منفردة ، وتقوى العش بلعابها ؛ لذلك يعتبر بعض الناس أن عش بعض أنواع الطيور شيء يؤكل . وترقد الأنثى ويساعدها الذكر في الرقاد على البيض لمدة ٢٨-١٧ يوما ، وتتغذى طيور السمامة على الحشرات الطائرة في الجو .

♦ عائلة الطيور الطنانة :




تضم هذه العائلة ٣٣٢ نوعا ، وهو عدد ضخم من الأنواع لطيور عائلة واحدة ، وهي طيور صغيرة الحجم إلى درجة كبيرة ، ولها الرقم القياسي في أصغر طائر معروف على وجه الأرض ، ويبلغ طول الطائر من هذه

العائلة ٥-٢١ سم ، والوزن ما بين ٢٠-٢ جم ، وتظهر في الطيور الطنانة صفات وقدرات بدنية تعكس مدى تواافق الخلق مع الوظيفة ، فهذه الطيور لديها القدرة على الوصول إلى داخل الزهور لتمتص الرحيق من جوفها


بمنقارها الطويل ، وضربات جناحيها البالغة السرعة التي تصدر طنينا من فرط سرعتها تمكن الطيور من التعلق والوقوف معلقا في الهواء ، وهو الشيء الذي أعطى هذه الطيور اسمها « الطنانة » ، وأثناء قيام الطيور الطنانة بامتصاص الرحيق فهي - أيضا - تفيد النبات بعملية نقل لحبوب اللقاح من الزهور المذكورة إلى المؤنة كما يفعل النحل ، ويصل عدد ضربات جناح هذا الطائر إلى ٧٠ ضربة في الثانية الواحدة مما يمكنها من الوقوف في الهواء والطيران للخلف أيضا ، كما أن لسان الطائر يمكن امتداده خارج الفم الطويل جدا لامتصاص الرحيق ، وعادة ما يختلف الذكر في لونه عن

الأثني حيث يكون لونه أحضر لاما أو أحمر زاهيا ، وقد يكون للذكر عرف أيضا ، وذيل الطيور الطنانة قصير وقد يكون شكله مربع الحافة أو مشقوق الحافة والأرجل دقيقة وضعيفة حتى إن الطائر لا يقدر على السير عليها مشيا .



وتعتبر الهجرة من سمات بعض أنواع هذه العائلة ، وعش الطيور الطنانة يكون على هيئة وعاء عميق مصنوع من ألياف النباتات وخيوط العنكبوت يعلقه الطائر بهذه الخيوط في أوراق أو أغصان النباتات ، وتضع أثني الطائر بيضتين وهى التي ترقد على البيض لمدة ١٤-٢٣ يوما، وتتغذى الطيور الطنانة على الحشرات الصغيرة إلى جانب رحى الأزهار .


♦ عائلة طيور المجردة :



تضم هذه العائلة ٦ أنواع ، وهى طيور صغيرة ذات ذيل طويل رفيع متدرج في شكل ريشاته ومدبب الطرف وربما كان ذلك الشكل بالإضافة إلى اللون الرمادي الذى تتلون به طيور هذه

العائلة هي الأسباب التي دعت إلى تسميتها بذلك الاسم لتشابه تلك الصفات مع شكل الفئران . ويبلغ طول الطائر ٣٥-٣٠ سم بما فيها الذيل الطويل الذي يمثل وحده ٦٥ % من طول الطائر ، أما الوزن فيتراوح بين ٤٥-٥٥ جم ، والأجنحة قصيرة وأطرافها مستديرة وطيور الجرذ تطير بسرعة ولمسافات قصيرة ، وأرجل هذه الطيور قصيرة وأقدامها قوية ولها ٤ أصابع تتجه للأمام ، ولكن الإصبع الخارجي يمكن عكسه ليصبح خلفيا ، ومنقار الطائر صغير ومقوس لأسفل قليلا ، وعادة ما يجثم هذا الطائر في وضع رأسى ، ولكنه يقف أفقيا في بعض الأحيان أيضا ، ويستطيع هذا الطائر القفز والجري السريع على الأرض أيضا ، ويميل لون طائر الجرذ إلى اللون الرمادي والبني الخاطط ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في الشكل العام ، ويميل هذا الطائر إلى العيش في جماعة ، ولا يعتبر من الطيور المهاجرة . ويتکاثر في أعشاش منفردة أو في مستعمرات غير متقاربة وشكل العش يشبه الفنجان ، وتبيض الأنثى ٣ بيضات ، ويشترك الذكر معها في حضانة البيض لمدة ١١-١٤ يوما ، وتتغذى هذه الطيور على النباتات والبذور .

◆ عائلة طيور الجنقلة :



تضم هذه العائلة ٩٢ نوعا ، وهي طيور يتراوح حجمها ما بين الصغير والكبير نسبيا والجسم متنكّل ولها رأس كبير ولها منقار مدبب وطويل وقوى ، ويبلغ طول الطائر ٤٥-٤٠ سم ، ويتراوح وزن الطائر ما بين ٨ جم ، ورقبة هذا الطائر من الصغر بحيث لا تكاد تميز لها وجودا ، وكذلك جناحا الطائر فهما صغيران

ومستديرا الحواف ومع ذلك فهو طائر سريع الطيران ، والذيل قصير إلى متوسط وقد يكون مربع الشكل أو مستدير الشكل ، وأرجل الطائر أيضا قصيرة وضعيفة ، أما أصابع القدم الأربع فيميزها التصاق الإصبع الثالث مع

الرابع في معظم الطول أما الأصبع الثاني مع الثالث فهما في حالة التصاق جزئي ، كما يغيب الإصبع الثاني في بعض أنواع هذه العائلة ، وألوان هذه الطيور عادة زاهية ولا معة مابين الأزرق والأخضر والأحمر والبرتقالي . وتتوارد طيور هذه العائلة في أماكن عديدة من العالم عدا الأماكن الشمالية وأمريكا الشمالية حيث تعيش عادة في مناطق الغابات ومناطق حشائش السافانا وبالقرب من الماء وهي طيور غير مهاجرة بطبيعتها . وتصنع طيور هذه العائلة أعشاشها عن طريق الحفر أحيانا حيث تخرن نفسها طويلا في أجناب الأنهار تعمل عشها في نهايته ، وقد يكون عشها عبارة عن فجوة في أحد جذوع الأشجار أيضا . وتبيض أنثى طائر الجنقلة ٤-٢ بيضات في المناطق الاستوائية ، ويزيد هذا العدد ليصبح ٦-١٠ بيضات في الأماكن المعتدلة ، ويتعاون الذكر مع أنثاه في حضانة البيض لمدة ١٨-٢٢ يوما ، وتتغذى طيور هذه العائلة على الأسماك والفقاريات الصغيرة والحشرات .

◆ عائلة طيور الوروار (أكل النحل) :



تضم هذه العائلة ٢٣ نوعا ، وهي طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم ولها جسم رفيع وطويل نسبيا ، ويبلغ طول الطائر ما بين ١٧ ، ٣٥ سم ، والوزن ما بين ١٥ ، ٨٥ جم ، وهي طيور تعيش في مجموعات ويميزها منقارها الطويل المدبب والمقوس لأسفل وأجنحتها كبيرة وحادية الطرف ولها قدرة عالية في مجال الطيران يساعدها في ذلك

طول جناحيها وطول الذيل أيضا ، والأرجل قصيرة بصفة عامة وكذلك الأقدام فهي صغيرة وضعيفة ، وتحتمل هذه الطيور على أسلاك التلغراف وعلى الأغصان وتنطلق من هناك ؛ لاصطياد غذائها ، ويغلب اللون الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر على طيور هذه العائلة حيث تظهر بقع من هذه الألوان في ريش الطائر إضافة إلى عصابة سوداء من الريش الأسود في المنطقة

المحيطة بالعين بما يشبه القناع ، ولا يختلف لون وشكل الذكر عن الأنثى ولكن ألوان الذكر أكثر بريقاً من ألوان الأنثى .

وتهاجر أنواع من هذه العائلة خصوصاً تلك التي تعيش وتتكاثر في المناطق المعتدلة ، وتتكاثر طيور الرووار في مستعمرات جماعية أو في أعشاش منفردة ، وتبني هذه الطيور أعشاشها في أنفاق طويلة يصل طولها إلى ٣ أمتار تحفرها في أجناب الكثبان الرملية ، وتبني الأنثى الرووار ٧-٢ بيضات ويشارك الذكر إنشاء في حضانة البيض لمدة ١٨-٢٣ يوماً ، وتتغذى على الحشرات الطائرة خصوصاً التحل الشغال .

♦ عائلة طيور الشقراقي :



تضم هذه العائلة ١٢ نوعاً ، وهي طيور متوسطة إلى كبيرة الحجم لها منقار حاد الطرف ، ويترافق طول الطائر من ٢٥ سم إلى ٤٥ سم ، وزنه ١٠٠-٢٠٠ جم ، ورأس الشقراقي كبير نسبياً ، وجناحاه طويلان ومديباً الطرف مما يعطيه قدرة عالية على الطيران والنشاط ، والذيل ما بين قصير الطول ومتوسطه وشكله العام مربع وأحياناً طويلاً الريش الخارجي من

الذيل ، أما الأرجل فقصيرة والقدم صغيرة وضعيفة ، ويغلب اللون الأزرق والأخضر والرمادي على ريش طائر الشقراقي ، ويشبه الذكر الأنثى تقريباً ، وتعيش هذه الطيور في الأراضي العشبية والجرداء على حد سواء في أنحاء متعددة من العالم ، وبعض أنواع هذه العائلة تعتبر مهاجرة ، ويتخذ من الأشجار ومن الجدران أعشاشاً . وتبني الأنثى ٤ بيضات يشتراك معها الذكر في حضانتها لمدة ١٧-١٩ يوماً . وتتغذى هذه الطيور على الحشرات والفقاريات الصغيرة أيضاً .

◆ عائلة الهدهد :



هي عائلة وحيدة النوع تعيش في أوروبا وإفريقيا في الأراضي المفتوحة، وتتغذى على الأرض حيث تلتقط اللافقاريات والفقاريات الصغيرة ، وطائر الهدهد يتميز بمنقاره الطويل المقوس لأسفل ويستخدمه في نبش الأرض بحثا عن الغذاء ، ويضع الهدهد عشه في فجوات عالية فوق الأشجار، كما يبني أحيانا عشه في أماكن صخرية بالقرب من سطح الأرض ، ويتميز الهدهد لونه

الراهن المزركش بالألوان البنية والبيضاء والقرمزية ، ويزين رأسه عرف ريشي بلون يميل إلى البرتقالي وأطرافه منقطة باللون البني الداكن ويشكل هذا العرف مروحة صغيرة فوق رأس الهدهد، وجناح الهدهد ذيله عليهما خطوط واضحة بالأسود والأبيض ، والجناح عريض مستدير الطرف ، وللهدهد صوت شدو له نغمات معروفة يطلقها أثناء طيرانه . وتبين أنثى الهدهد ٦-٧ بيضات ، وهي التي تختضن البيض لمدة ٢٠-١٦ يوما حيث يبدأ الصغار في الخروج تباعاً من البيض ، ويتولى الذكر والأنثى تغذيتهم في العش لمدة ٢٤-٢٧ يوما ، ويتناول الصغار الغذاء من الوالدين بأن يصطفوا داخل العش حتى إذا تناول الصغير الموجود في فوهة العش نصيبه من الغذاء اندفع من يليه في الصف ليأخذ مكانه ويعود الأمل لآخر الصف متظروا دوره من جديد في نهاية الصف .

◆ عائلة هدد الغابات الأخضر :

تضم هذه العائلة ٨ أنواع ، وهي طيور حجمها ما بين المتوسط والكبير، وتعيش طيور هذه العائلة إما منفردة أو في مجموعات صغيرة العدد ، ويتراوح طول الطائر ما بين ٢٣ سم ، ٤٦ سم ، ومنقار الطائر طويل ورقيق وبه تقوس




لأسفل ، ويختلف هذا التقوس ما بين الأنواع المختلفة داخل العائلة حيث يكون خفيفاً في بعض الأنواع وكبيراً في أنواع أخرى ، وأجل هدهد الغابات

قصيرة وتكون مغطاة بالريش في بعض الأنواع ، وأصابع القدم تنتهي بمخالب طويلة مقوسة والإصبعان رقم ٣ ، ٤ مندمجان عند قاعدتهما ويملئون منقاره الطائر بلون واحد إما الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر أو الأسود حسب النوع داخل العائلة ، وذيل هدهد الغابات طويل ومدرج في شكله والجناح مستدير الحافة ، وعادة ما يقفز هدهد الغابة فوق الأرض ولا يميل للطيران بعكس الهدّد العادي الذي يتنقل طائراً ما بين الأشجار .

واللون الغالب على هذه العائلة من طيور هدهد الغابات هو اللون الأسود أو الأخضر الداكن ، ويعيش هدهد الغابات في الغابات الإفريقية وفي مناطق السافانا ، وهو طائر غير مهاجر ويتكاثر في أعشاش منفردة حيث يبني عشه في تجاويف الأشجار ، وتضع الأنثى ٢-٤ بيضات ، وهي التي تقوم بحضانة البيض لمدة ١٧-١٨ يوماً ، وتتغذى هذه الطيور على الحشرات والفواكه الصغيرة .

♦ عائلة طائر أبي منقار :



تضُم هذه العائلة ٤٨ نوعاً ، وهي طيور متوسطة إلى كبيرة الحجم ، ومن هذه الطيور ما يمكن اعتباره طائراً أرضي المعيشة ، ومنها ما يمكن اعتباره هوائي المعيشة بمعنى أنه يقضى معظم وقته طائراً ،


وتتميز طيور عائلة أبي منقار - كما هو واضح من اسمها - بضخامة المنقار الذي عادة ما يغطي ببغاء صلب تشبه خامته قرون الحيوانات وهذا الغطاء

القوى حجمه بحجم المنقار نفسه ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ٣٨ سم ، ١٦٠ سم ويتراوح الوزن ما بين ٨٥ جم - ٤ كجم .

ومنقار الطائر طويل بصفة عامة أما الغطاء الذى يغطى المنقار فيمتد لداخل جسم الطائر ويقوى بعظام الطائر الداخلية ، وعادة ما يتلون المنقار والغطاء باللون الأحمر أو الأصفر ، ولعيون هذه الطيور رموش ملونة ، ووجه الطائر خالٍ من الريش ، ورقبة الطائر متوسطة أو طويلة ، كما تتميز طيور هذه العائلة بالأجنحة الطويلة العريضة ، والذيل الطويل مقوس الشكل ، والأرجل قصيرة أو متوسطة الطول .

ويغلب اللون البنى والرمادى والأسود على طيور هذه العائلة والذكور أكبر حجماً من الإناث بحوالى ١٠ % كما يزيد طول منقار الذكر بمقدار ١٥ - ٢٠ % عن منقار الأنثى ، وتعتبر طيور هذه العائلة غير مهاجرة فتبني أعشاشها في فجوات الأشجار حيث تدخل الأنثى وتختبئ داخله ، ولا يجدوا من العش إلا فتحة ضيقة رأسية يدخل لها الذكر الطعام خلالها أثناء فترة حضانتها للبيض والتي تترواح ما بين ٤٠ - ٢٥ يوماً ، وتتغذى طيور هذه العائلة على الحشرات والفواكه والفقاريات الصغيرة .

◆ عائلة مرشد العسل :



تضم هذه العائلة ١٧ نوعاً ، وهى طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم تعيش بطريقة منفردة غير جماعية ، وبعض الأنواع منها تظهر علاقة فريدة بالإنسان فهى دليله إلى خلايا

النحل البرية ، ويبلغ طول الطائر من هذه العائلة من ١٠ - ٢٠ سم ، والوزن ما بين ١٠ ، ٥٥ جم ، ومنقار مرشد العسل قصير ومدبب والأرجل قصيرة والأقدام قوية ، والجناح طويل مدبب الطرف والذيل طويل ومدرج الشكل ؛ لذلك فلديها قدرة عالية على الطيران والتحليق فى الجو ، ويعتمد لون الطائر إلى اللون الرمادى والبني ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى فى الشكل العام ،

وتعيش هذه الطيور في إفريقيا وفي جنوب وجنوب شرق آسيا في مناطق الغابات وحشائش الساقانا المختلطة بالأشجار ، أما من حيث الهجرة فيتمكن اعتبارها من الطيور موسمية الهجرة لمسافات قصيرة ، ومرشد العسل من الطيور المتuelle على أعشاش غيرها من الطيور خصوصا تلك التي تحفر أعشاشها في الأشجار ، مثل : نقّار الخشب ، وبعض الطيور صائدات الحشرات حيث تضع بيضة واحدة في كل عش من أعشاش الطيور الأخرى ، وتفسس البيضة بعد ١٢-١٣ يوما ، وتخرج صغار مرشد العسل وفي منقارها زوائد تشبه الأسنان تقتل بها صغار الطائر الذي يأويها كضيف متطلل حتى تستأثر وحدها بالغذاء ، وتتغذى هذه الطيور على الحشرات ، وعلى شمع العسل النحل ، لذلك فإن هذه الطيور أثناء بحثها الغريزى عن خلايا النحل ترشد الإنسان والحيوان عن مكان خلايا عسل النحل البرية التي تقصدها بحثا عن الشمع الموجود داخلها وهناك بعض القبائل التي تسترشد بهذا الطائر للحصول على العسل ، وتقوم بعد العثور عليه بإهداه الشمع الموجود بها إلى الطيور مرشدة العسل كمكافأة لها .

◆ عائلة طائر التوكان :



تضم هذه العائلة ٣٥ نوعا ، وهي طيور متوسطة إلى كبيرة الحجم تعيش بشكل انفرادي ، وتميز بمنقارها الضخم الزاهي بالألوان ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ٣٣-٦٦ سم ،

والم Narrar طويلاً ومقوس لأسفل وفتحة الفم عند قاعدة المنقار ، وتحمل الحافة القاطعة من المنقار أسناناً قاطعة تشبه أسنان المنشار .

وبالرغم أن طول منقار الطائر من هذه العائلة قد يقارب طول جسم الطائر نفسه إلا أن وزن المنقار خفيف للغاية وقوى من داخل جسم الطائر بطبقات عظمية رقيقة .

ويميز وجه الطائر وجود منطقة خالية من الريش وملونة بألوان زاهية تحيط بعيني الطائر ، وأرجل طائر التوكان متوسطة إلى طولية والأقدام قوية ، أما جناح الطائر فقصير وحافته مستديرة وليس له قدرة عالية على الطيران، وذيل الطائر طويل ومتدرج ، وقد يكون مستدير الحافة ، ويغلب اللون الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والأحمر على ألوان جسم الطائر ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى في معظم الأنواع ، ولكن منقار الذكر أكبر وبيني طائر التوكان عشه في فجوات الأشجار ، وتضع الأنثى ٤-٢ بيضات ، ويقوم الذكر مع الأنثى بحضانة البيض لمدة ١٥-١٦ يوما . وتتغذى طيور التوكان على الفواكه والحيوانات الصغيرة.

◆ عائلة نقار الخشب :

تضم هذه العائلة ٢٠٠ نوع تشتهر جميعها في صفات تجعلها قادرة على حفر خشب الأشجار ، وهي طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم وعادة ما تعيش في شكل انفرادي ، ويصل طول الطائر من هذه العائلة ما بين ٥٥-٨ سم والوزن ما بين ٨ جم ، ٥٦٠ جم ، ومنقار هذا الطائر مدبب الحافة بما يشبه الإزميل الذي يستخدمه النجار، فهو مستقيم وحاد وقوى ، ولسان نقار الخشب طويل جدا يبرز خارج المنقار وله حافة كالفرشاة يلتقط بها الغذاء من داخل الشقوب التي يحفرها في الأشجار .



وذيل نقار الخشب مقوى بطريقة تتيح للطائر الارتكاز به على جذع

الشجرة أثناء تسلقه لأعلى ، وأجنحة نقار الخشب طويلة وغريبة ومدببة الأطراف ، وتغلب الألوان السوداء والبيضاء والخضراء والبنية والرمادية والصفراء والحمراء على ألوان ريش أنواع طائر نقار الخشب كلها ، وفي معظم الأحيان تكون على هيئة خطوط ، ويعيش نقار الخشب في معظم أنحاء العالم ، ولا تعتبر معظم أنواع الطيور المهاجرة ، وعادة ما يضع الطائر عشه بطريقة منفردة على هيئة فجوة في جذع الشجرة ينحنيها الطائر بمنقاره ، وتبيض أنثى نقار الخشب ۱۱-۳ بيضة ، ويتعاون الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة ۲۰-۹ يوما . وتتغذى طيور هذه العائلة على الحشرات واليرقات التي يستخرجها الطائر من تحت سطح أخشاب الأشجار - عن طريق الحفر في الأخشاب بمنقاره - أو من تحت الأشجار ، وتتغذى أيضا على الفواكه والبذور وتتغذى بعض أنواع على عسل النحل أيضا .


◆ عائلة الطيور صائدة الحشرات :



تضُم هذه العائلة ۳۹۶ نوعاً وتعيش في بيئات متنوعة ، وهي طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم ويتراوح طول الطائر ما بين ۶ سم ، ۵۰ سم وزنه ما بين ۴،۵ جم ، ۸۰ جم ، ومنقار هذه الطيور عريض ومفلطح وطرفها خطافي الشكل ، ورأس طيور هذه العائلة كبير الحجم مقارنة بالجسم وأحياناً يكون عليها عرف . أما الأجنحة فتتراوح ما بين الصغيرة والكبيرة وعادة ما تكون مدببة العافة ، والذيل متوسط الحجم وقد يكون مشقوقاً في بعض أنواع ، والأرجل والأقدام صغيرة وضعيفة ، ويميل لون هذه الطيور إلى البني والأخضر والرمادي ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في معظم أنواع وتهاجر أنواع منها خصوصاً التي تعيش في المناطق المعتدلة ، ويتنوع شكل العش ما بين شكل الفنجان وشكل القبة . وتبيض الأنثى ۳-۴ بيضات وهي التي تقوم بالحضانة لمدة ۲۰-۱۴ يوما ،


وتغذى هذه الطيور على الحشرات الطائرة وعلى بعض الفواكه في المناطق الاستوائية وعلى الفقاريات الصغيرة أيضاً.

◆ عائلة طيور الكوتينجا :



تضم هذه العائلة ٦١ نوعاً، وهي تتراوح ما بين الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم، وغالبيتها من الطيور التي تقضي معظم أوقاتها محلقة في الهواء، ويتراوح طول الطائر ما بين ٩ سم ، ٤٦ سم ، والوزن ما بين ٦ جم ، ٤٠٠ جم ، والأجنحة قصيرة والذيل كذلك قصير ، ومنقار الطائر مفلطح ويتراوح ما بين القصير والطويل حسب النوع داخل العائلة والأرجل قصيرة لكن القدم كبيرة وأصابع القدم الأمامية متلاصقة عند قاعدها ، وببعض الأنواع منها عرف ، ولهذه الطيور ألوان وأشكال متنوعة وعادة ما يكون الذكر زاهي الألوان عن الأنثى ، وطيور هذه العائلة غير مهاجرة ، وتعيش عادة في الغابات على اختلاف أنواعها وتتخذ هذه الطيور أعشاشاً على شكل فنجان وتضع الأنثى من ٣-١ بيضات ، وتقوم الأنثى وحدها بحضانة البيض لمدة ٢٨-١٩ يوماً ، وتغذى هذه الطيور على الحشرات والفواكه .


◆ عائلة الطيور ذات المنقار الحاد :



هي عائلة وحيدة النوع وطيورها صغيرة الحجم وتمتاز بمنقار حاد ومخروطي الشكل، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٦ سم ، ١٨ سم وأصابع القدم الأمامية متلاصقة عند قاعدها ، وفتحة الشم مستطيلة ومغطاة بقطاء علوي ، وللطائر بعض الريشات الرفيعة التي تشبه الشعر فوق الرأس ولا يختلف الذكر عن

الأثني في الشكل ، وتتغذى هذه الطيور على الفواكه الصغيرة واللافقاريات.

◆ عائلة الطيور قاطعة النباتات :



تضم هذه العائلة ٣ أنواع وهي طيور صغيرة ذات منقار صغير وقوى مخروطى الشكل وحافة فكى المنقار مستندة كالمشار ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة بين ١٧ ، ٢٠ سم ، والأرجل قصيرة ولكن الأقدام كبيرة كما أن القدمين الأماميتن ملتصقتان جزئيا ، وجناح هذا الطائر

صغير نسبيا وله حافة حادة ، والذيل طويل ، ويغلب اللون الرمادى والبني على ألوان ريش الطائر من أعلى الجسم ، كما يميل لون الجزء الأسفل من الجسم إلى الأحمراء ، وتتلون عينا الطائر باللون الأصفر ، وتعتبر هذه الطيور من الطيور ذات الهجرة الجزئية ، وتصنع هذه الطيور أعشاشها على شكل جزء مسطح من ألياف الجذور النباتية ، وتضع الأنثى ٤-٥ بيضات ، وتقوم وحدها بحضانة البيض ، وتتغذى هذه الطيور على النباتات وأوراق النبات الخضراء والبذور والفواكه .


◆ عائلة طيور القبّرة :



تضم هذه العائلة ٧٩ نوعا ، وهي طيور صغيرة الحجم تعيش على الأرض ، ولها أرجل طويلة ، وأصابع طويلة بها مخالب طويلة أيضا ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٢ سم ، ٢٤ سم ، وزنه ما بين ١٥ جم ٧٥ جم ، والجناح مدبب الطرف وريشه الداخلى طويل أما الذيل فمتوسط الطول وكذلك منقار الطائر الذى يعتبر

متوسط الطول ومديبا ، ويغلب اللون البنى والرمادى والأبيض على ريش الطائر كما يميل لون الجزء الس资料لى إلى اللون الفاتح ، وتحمل بعض الأنواع عرقا صغيرا فوق الرأس ولا يختلف الذكر عن الأنثى فى الشكل العام بيد أن الذكر أكبر حجما ، ولهذه الطيور غناه لطيف . وتستوطن هذه الطيور معظم بقاع العالم ويعتبر العديد من أنواعها مهاجرا ، وتبنى طيور هذه العائلة أعشاشها على شكل فنجان وتوسسه على الأرض مباشرة ، كما تبني بعض الأنواع العش على هيئة قباب صغيرة وتبيض الأنثى ٦-٢ بيضات ، وترقد وحدتها على البيض لمدة ١٦-١١ يوما ، وينادر الصغار العش قبل اكتساب القدرة على الطيران ، وتتغذى هذه الطيور على البذور واللافقاريات .

◆ عائلة طيور السنونو :




تضم هذه العائلة ٨١ نوعا ، وهى طيور صغيرة رفيعة الجسم تمضى معظم وقتها طائرة فى الجو وتشبه - كثيرا - في مظهرها الخارجي طيور السمامة ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١١ سم ، ٢١ سم ، والوزن ما بين ١٠ جم ، ٥٥ جم ، وجناح طائر السنونو طويل ومدبب الطرف ، والذيل طويل فى بعض الأنواع وقصير فى أنواع أخرى ولكنه مشقوق ، والأرجل والأقدام صغيرة جدا ، ولكن الطائر يستخدمها

عندما يجثم على أفرع الأشجار ، ومنقار الطائر صغير ومدبب وعربيض عند القاعدة وبه بعض الشعيرات ، وعادة ما يكون الجزء العلوي من جسم الطائر داكن اللون والجزء السفلـى فاتح اللون ، ويختلف الذكر عن الأنثى فى طول ريش الذيل حيث يزيد فى الذكر عن الأنثى ، وتطير طيور هذه العائلة بسرعة وقوة وتقضى معظم وقتها طائرة فى الهواء ، وهى من الطيور التى تعيش فى

جماعات ولها شدو ونداءات صوتية لبعضها البعض وتعيش طيور السنونو في معظم أنحاء العالم في الأرض المفتوحة وفي الغابات وبالقرب من الجداول، وتهاجر أنواع كثيرة منها وتتكاثر في مستعمرات جماعية ، وتبني أعشاشها من الطين الملتصق بالصخر أو المعلق في باطن الصخر وله مر للدخول ، وقد تصنع العش من الطين المدعم بالقش على هيئة فنجان ، وقد تصنع بعض أنواع السنونو أعشاشا على الأشجار أو في فجوات الصخور ، وتبيض الأنثى ٨-٣ بيضات ، وقد يشتراك معها الذكر في حضانة البيض لمدة ١٣-١٦ يوما ، وتتغذى طيور السنونو على الحشرات الطائرة التي تقتنصها من جناحها أثناء التحلق .

◆ عائلة طيور التمرة وأم عجلان :



طائر أم عجلان



طائر التمرة

تضم هذه العائلة ٥٨ نوعا ، وهي طيور صغيرة الحجم رفيعة الجسم تعيش على الأرض في معظم الأحيان ، وطيور هذه العائلة لها ذيل طويل وأرجل طويلة ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٢-٢٥ سم ، والوزن ما بين ١٢ جم ، ٥٠ جم ، وأصابع الأقدام متوسطة الطول والإصبع الخلفي طويل ، ويتحرك الطائر مشيا ولا يقفز أبدا ، ومنقار هذه الطيور متوسط الطول ومدبب الطرف ، وهي طيور ذات قدرة عالية في الطيران ولون الطائر متعدد البقع يغلب عليها الأسود والأبيض والأصفر والأزرق والرمادي ، وتعيش هذه الطيور في جماعات في معظم أنحاء العالم

ويعض أنواع هذه الطيور تهاجر ، وتبني أعشاشها على شكل فنجان تضعه على الأرض مباشرة أو على الصخور أو في فجوات الأشجار ، وتبيض الأنثى ٧-٢ بيضات ، وهي التي تتولى حضانته لمدة ١٢-٢٠ يوما ، وتتغذى طيور هذه العائلة على الحشرات وبعض القواقيع والبذور .

◆ عائلة طيور الوقواق والدقنوش :



تضم هذه العائلة ٧٦ نوعا ، وهى طيور ذات حجم ما بين الصغير والمتوسط حيث يبلغ طول الطائر ٣٦-١٤ سم ، والوزن ما بين ٢٠ ، ١١ جم ، وتعيش طيور هذه العائلة منفردة أو في جماعات ، وتقضى معظم وقتها محلقة في الجو والمنقار متوسط الطول ومقوس تقوسا خفيفاً لأسفل وطرفه خطافى ، والأرجل قصيرة والأقدام ضعيفة ، والأجنحة متوسطة الحجم ومدببة الطرف ، وهى طيور ذات قدرة عالية على الطيران ،

وذيل هذه الطيور طويل ومدرج وقد يكون مستدير الحافة في بعض الأنواع ، ويميل لون الذكر إلى الرمادي والأسود والأبيض والأحمر ، أما الأنثى فيميل لونها إلى البني أو درجات فاتحة من ألوان الذكر ، وتعيش طيور الوقواق والدقنوش في الغابات الكثيفة وعلى حواف الغابات ، ومعظم هذه الطيور غير مهاجرة وتصنع أعشاشها على هيئة فنجان غير عميق وتستخدم ألياف النباتات في نسيج العش على ارتفاع عالٍ فوق أفرع الأشجار ، وتبيض الأنثى من ٢ - ٥ بيضات ، وقد يشترك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة ١٤-٢٣ يوما ، ثم تبقى الصغار في العش لمدة ١٢-٢٥ يوما ، وتتغذى هذه الطيور على الحشرات والفواكه والفقاريات الصغيرة .

♦ عائلة البلابل :



بلبل الحدائق

تضم هذه العائلة ١١٩ نوعا ، وهي طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم ، عادة ما تعيش في جماعات وتقضى معظم وقتها طائرة في الجو ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٥ سم ، ٢٨ سم ، والوزن ما بين ٢٠ جم ، ٦٥ جم ، ومنقار البلبل متوسط

الحجم ورفيع ومدبب الطرف وبه تقوس خفيف لأسفل وحوله بعض الشعيرات ، أما الأرجل متوسطة الطول ، والرأس قد يعلوه عرف ، والعين ذات ألوان زاهية .

وأجنحة البلابل قصيرة مقوسة ، والذيل ما بين المتوسط والطويل ، ويغلب اللون البني والرمادي والأصفر والأخضر على ألوان ريش البلبل ، وأحيانا يتلون الريش بيقع بيضاء أو صفراء أو حمراء على الرأس وما تحت ذيل الطائر ، ولا يختلف الشكل العام للذكر عن الأنثى في البلابل سوى أن ألوان الذكر زاهية عن ألوان الأنثى ، وبالنسبة للهجرة فإن الطيور التي تعيش في المناطق الشمالية الباردة نوعا هي التي تهاجر ، وتصنع البلابل أعشاشها على هيئة فنجان قليل العمق ما بين أفرع الأشجار ، وتبيض الأنثى ٥-٢ بيضات ، ثم يشترك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة ١٤-١١ يوما، ثم تبقى الصغار في العش لمدة ١٨-١٤ يوما ، وتتغذى البلابل على الفواكه والبراعم وعلى الحشرات أحيانا .

♦ عائلة الدقنوش :

وتضم هذه العائلة ٨٣ نوعا ، وهي طيور متوسطة إلى صغيرة الحجم تعيش بعض أنواعها بصورة منفردة والبعض الآخر في جماعات ، وتعيش طيور هذه العائلة معظم أوقاتها طائرة في الجو ، ورأس الدقنوش كبير بالنسبة للجسم ، ويصل طول الطائر ١٥ سم - ٣٨ سم والوزن من ١٠ جم إلى ٨٧ جم ، ومنقار الدقنوش حاد وقوى وله طرف خطافى وعليه بعض الشعيرات




الدقنوش الرمادى

عند القاعدة ، وبعض أنواع هذه العائلة ذات منقار ضعيف ، وطيور الدقنوش عدوانية في افتراسها للحشرات والفقاريات الصغيرة ، وهي تماثل في سلوكها هذا الطيور الجارحة فأرجل الدقنوش متوسطة الطول وقوية وله مخالب حادة ، والجناح مستدير الحافة ، أما الذيل فيتراوح بين المتوسط والطويل ، لذلك فإن لهذه الطيور قدرة طيران عالية ، ويغلب اللون الرمادي والبني على ريش الطائر مع وجود بقع بيضاء وسوداء على

أجنحته وعلى رأسه ، وقد تكون هذه البقع حمراء أو خضراء أو صفراء ، ويعيش الدقنوش في أغلب مناطق العالم في الغابات ومناطق السافانا والأراضي التي تنمو بها الحشائش والعشب وحول المناطق الزراعية ، وتعتبر بعض أنواع عائلة الدقنوش طيوراً مهاجرة خصوصاً الأنواع التي تعيش في الأماكن الشمالية ، وتصنع طيور عائلة الدقنوش أعشاشها على شكل فنجان مبطن بمواد لينة ، وتبني الأنثى ٧-٢ بيضات ، وقد يشتراك الذكر مع الأنثى في حضانة البيض لمدة ١٢ - ١٨ يوماً ، ويبقى الصغار في العش لمدة ١٦ - ٢٠ يوماً أخرى ، وتتغذى طيور عائلة الدقنوش على الحشرات واللافقاريات وتتغذى على الفقاريات الصغيرة في بعض الأحيان .

♦ عائلة طيور جناح الشمع :

تضم هذه العائلة ٨ أنواع ، وهي طيور تتراوح مابين الصغير والمتوسط الحجم ، وهي طيور اجتماعية تعيش في مجموعات وتقضى معظم أوقاتها محلقة في الهواء ، ويبلغ طول الطائر ٨ سم إلى ٢٤ سم ، والوزن ما بين ٤٠ جم ، ٧٠ جم ، والمنقار قصير وبه تقوس خفيف ، والأرجل والأقدام



قصيرة ، وعادة ما يعلو رأس الطائر عرف ريشي يميل للخلف ، ويترافق طول الجناح ما بين القصير والطويل حسب النوع داخل العائلة ، وحافة الجناح مدببة في بعض الأنواع ومستديرة في أنواع أخرى ، وذيل طيور جناح الشمع مربع الشكل وطوله قصير في بعض الأنواع وطويل في أنواع أخرى ، وريش الطائر ناعم

مخملى يميل لونه إلى البنى والأصفر والأسود والرمادى والأحمر ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في الشكل العام ، وتعيش طيور هذه العائلة في المناطق الشمالية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، وتتكاثر هذه الطيور في أعشاش منفردة أو جماعات غير مترابطة حيث تبني العش من أغصان الأشجار وفروعها على هيئة شكل الفنجان ، ويبطن الطائر عشه بالريش أو المواد اللينة الناعمة ، ويشترك الذكر مع الأنثى في إنشاء عشهما ، وتبيض الأنثى ٥ بيضات في المتوسط ويساركها الذكر في حضانة البيض لمدة ١٢-١٨ يوما ، وبعد الفقس يبقى الصغار في العش لمدة ٢٥-١٩ يوما حيث يقوم الزوجان بتغذيتهم بالطعام المهضوم الذي يسترجعه الطائر من أمعائه ليطعم به الصغار .

وتتغذى طيور هذه العائلة على الفواكه والبراعم وبعض الحشرات ، ولهذه الطيور شهية ونهم لالتهام الغذاء ، لذلك فهى تقضى معظم أوقات اليوم ببحث عن الطعام وتلتهمه بسرعة ولا تخلد للراحة إلا في أوقات قليلة .

♦ عائلة طيور السمنة :

تضم هذه العائلة ٣٢٨ نوعا ، وهى طيور يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط ومنها ما يعيش طائرا معظم وقته ، ومنها ما يتغذى على الأرض ويترافق طول الطائر من هذه العائلة ما بين ١١ سم ، ٣٣ سم ، والوزن ما



بين ٨ جم ، ٢٢٠ جم ، وتعيش هذه الطيور بصورة منفردة عند التكاثر، ولكنها تعيش في جماعات في الأحوال العادمة وأثناء الهجرة ومنقار طيور السمنة متوسط الطول ومدبب الطرف وعادة ما توجد بعض الشعيرات عند قاعدته ، وأرجل هذه الطيور ما بين المتوسط والطويل والقدم قوية عند بعض الأنواع وضعيفة عند بعض الأنواع ،

والجناح مستدير الحافة أو مدبب الطرف حسب النوع ، والذيل متوسط أو طويل ؛ لذلك فلدى هذه الطيور قدرة عالية على الطيران ، ويغلب اللون البني والرمادي والأبيض والأسود والأحمر والأصفر على ألوان ريش طيور عائلة السمنة ، وعادة ما يفوق الذكر الأنثى من حيث الحجم ، وكثير من هذه الطيور لديها صوت غناء جميل ، وتعيش طيور عائلة السمنة في معظم أنحاء العالم وتهاجر الأنواع التي تقطن المناطق الشمالية الباردة هربا من بروادة الشتاء . وتبني هذه الطيور أعشاشها من الحشائش وأغصان الأشجار وقد تبطن العش من الداخل بالطين وتضع هذا العش في فجوات الأشجار أو بين الصخور ، وغالبا ما تقوم الأنثى ببناء العش ، وتبيض ٦-٢ بيضات وهي التي تختضن البيض لمدة ١٢-١٥ يوما ، ويبقى الصغار في العش لمدة ١١-١٨ يوما ، وتتغذى طيور عائلة السمنة على اللافقاريات وبعض الفواكه في فصل الشتاء .

◆ عائلة الطيور صائدة الهوام :


تضمن هذه العائلة ١٣ نوعا ، وهي طيور دقيقة الجسم دائمة الحركة تقضي معظم أوقاتها طائرة في الهواء ، وتعيش منفردة ويتراوح طول الطائر ما بين ١٠-١٢ سم ، والوزن أقل من ٧ جم ، والذيل طويل ورفيع ومدبب ، والأرجل طويلة ورفيعة ، والجناح مدبب الطرف ، ويميل لون ريش الطائر



إلى الرمادي المائل إلى الزرقة أو البنى في أجزاء الجسم العليا ، أما الأجزاء السفلية من الجسم فيميل لونها إلى اللون الأبيض ، وبعض الأنواع ذات ألوان سوداء في الرأس وكثير منها لها ريشات بيضاء على حافة الذيل الخارجية ، ولا يختلف الذكر عن الأنثى في الشكل العام ، وبالنسبة للهجرة فهناك نوع واحد فقط تهاجر طيوره شتاء أما باقى الأنواع فلا تهاجر ، وتبني هذه الطيور أعشاشها على شكل فنجان وتستخدم ألياف النباتات وترتبطها بما يشبه خيوط العنكبوت من قاعدتها وأجنابها ،

وتبييض الأنثى ما بين ٥-٣٥ بيضات ، ويشارك الذكر الأنثى في حضانة البيض لمدة ١٣-١٥ يوما ، وتتغذى طيور هذه العائلة أساسا على الحشرات الطائرة .

♦ عائلة طيور الصادح :




تضم هذه العائلة ٣٦٢ نوعا ، وهي طيور صغيرة جدا إلى متوسطة الحجم حيث يبلغ طول الطائر ٩ سم - ١٦ سم ، والوزن ما بين ٥ جم ، ٢٠ جم ، ومنقار الطائر متوسط الحجم مدبب الطرف والأرجل متوسطة الطول أما الأقدام فقوية عند بعض الأنواع وضعيفة

عند بعض الأنواع والجناح قصير مستدير الحافة في بعض الأنواع وطويل مدبوب الطرف في أنواع أخرى ، والذيل ما بين المتوسط والطويل .

ويغلب اللون البني والرمادي والأخضر والأصفر على ألوان ريش الصادح ، وعادة ما تكون به بعض الخطوط الداكنة اللون ، وبعض أنواع منه بها سواد في الرأس ، وذكر الصادح أكبر حجما من الأنثى ولكنهما لا يختلفان في الشكل العام ، وواضح من اسمه أنه طائر له صوت غنائي مميز ، وتعد أنواع عديدة منه طيورا مهاجرة خصوصا تلك التي تقطن شمال وغرب أوروبا وهجرتها إلى إفريقيا حيث المناطق الدافئة والحرارة شتاء وكذلك الأنواع التي تقطن شرق أوروبا وشمال شرق آسيا واليابان نجدها تهاجر إلى جنوب وجنوب شرق آسيا ، كما أن بعض أنواع الصادح لا تهاجر على الإطلاق ، وتصنف هذه الطيور أعشاشها على شكل فنجان أو قبة صغيرة ، وعادة ما يوضع هذا العش بالقرب من الأرض في مناطق النباتات الكثيفة ، وتضع الأنثى ٧-٢ بيضات في العش حيث تختضنها لمدة ١٤-١٢ يوما ، وتبقي الصغار في العش لمدة ١١ - ١٥ يوما أخرى بعد الفقس ، ومن المؤسف أن هذه الطيور مطعم لتطفل طائر الوقواق الذي يدس بيضه ضمن عشها لتتولى أنثاه الرقاد على بيضه ورعايته صغره . وتتغذى طيور الصادح على الحشرات وبعض الفواكه في فصل الخريف والشتاء عندما يندر وجود هذه الحشرات .

◆ عائلة الطيور صائدة الذباب :



تضم هذه العائلة ١٠٨ نوعا ، وهي طيور صغيرة الحجم تعيش في صورة منفردة غير جماعية وتقضى معظم وقتها طائرة في الهواء ، ويتراوح طول الطائر ما بين ١٠ سم ، ٢١ سم والوزن ما بين ٦ جم ، ٢٠ جم ورأس هذا الطائر كبير ، وعينيه كبيرة بالنسبة للجسم ، والمنقار مفلاطح وبه تقوس خفيف وقاعدته عريضة ، وعليها بعض الشعيرات .

أما أرجل الطائر فقصيرة والأقدام صغيرة وضعيفة ، والجناح قصير في بعض الأنواع وطويل في الأخرى ، ولكنه في العموم مدبوب الطرف وتمتاز طيور هذه العائلة بقدرتها ونشاطها في الطيران .

ويتلون ريش الطيور صائدة الذباب باللون البني والأزرق والأصفر والأحمر عادة ما يفوق الذكر الأنثى في حجمه مع تشابه الشكل العام للذكر والأنثى في بعض الأنواع واختلافهما في بعض الأنواع من حيث الشكل ، وتهاجر غالبية أنواع هذه العائلة ، وتبني طيور هذه العائلة عشها على هيئة فنجان فوق أغصان الشجر أو في فجوات الأشجار حيث تضع الأنثى ٦-٢ بيضات حيث تتم حضانتها إما بالأنثى وحدها أو باشتراك الذكر معها في بعض الأحيان لمدة ١٥-١٠ يوما وبعد خروج الصغار من البيض تمكث في العش لمدة ١٥-١٠ يوما أخرى معتمدة على الوالدين وتغذى هذه الطيور على الحشرات .

♦ عائلة أبو الحناء الأسترالي :



تضم هذه العائلة ٣٩ نوعا ، وهي طيور صغيرة الحجم ، عادة ما تعيش بصورة منفردة وتقضى معظم وقتها طائرة في الهواء ، وعادة ما يكون صدر وبطن هذا الطائر من هذه العائلة ما بين ١٠ سم ، ١٦ سم ، ومن عادة هذه الطيور أن تقف مستقيمة الجسم ، ثم تهز ذيلها بين الحين والآخر ، ومنقار طائر أبي الحناء متوسط الطول عريض

عند قاعدته ومفلطح بصفة عامة وطرفه خطافى الشكل وتوجد بعض الشعيرات عند قاعدة المنقار ، ولطيور أبي الحناء أرجل متوسطة الحجم ولكنها ضعيفة ، ويتراوح طول الجناح ما بين المتوسط والطويل ولها حافة مدببة ، وهي طيور نشيطة الحركة ، أما الذيل فهو إما متوسط أو طويل وهو

مربع الحافة من حيث الشكل ، ويميل لون طيور هذه العائلة إلى اللون الأسود والبني والأخضر في أجزاء الجسم العليا واللون الأحمر والوردي والأبيض والأصفر والرمادي في أجزاء الجسم السفلية وهناك بعض المساحات البيضاء على الجناحين والذيل ، ولا يختلف شكل الذكر في أغلب الأحيان عن الأنثى ، ومن حيث الهجرة يمكن اعتبار كثير من أنواع هذه العائلة طيورا ذات هجرة جزئية ، وتبني طيور أبو الحناء أعشاشها على شكل فنجان صغير غير عميق وتصنعه من الأغصان وخيوط تشبه خيوط العنكبوت وتحرص على وضع العش عاليا فوق فروع الأشجار بعيدا عن أي خطير محتمل ، وقد يصل ارتفاع العش إلى عشرين مترا ، وتضع الأنثى ٤-٥ بيضات يميل لونها إلى الأزرق وبها نقط حمراء أو بنفسجية ، وتقوم الأنثى بحضانة البيض لمدة ١٢-١٤ يوما . وتتغذى طيور أبو الحناء على الحشرات واليرقات التي تلتقطها من على الأرض .

◆ عائلة الطيور الصافرة :




تضم هذه العائلة ٥٢ نوعا ، وهي طيور يتراوح حجمها بين الصغير والمتوسط وقد تعيش في جماعات أو بصورة منفردة ، وتقضى وقتا طويلا طائرة في الهواء ، ويبلغ طول الطائر من هذه العائلة ما بين ١٢ سم ، ٢٥ سم ، والوزن ما بين ١٥ جم ، ١٠٠ جم ، والرأس مستدير ، والجسم سمين ، أما منقار هذه الطيور

فمتوسط الطول ومستقيم أو مقوس تقوسا خفيفا وبعض الأنواع لمنقارها نهاية خطافية الشكل ولبعض الأنواع شبكات عند قاعدة المنقار أيضا ، والأرجل متوسطة الطول وقوية ، وكذلك الأجنحة متوسطة الحجم ولكنها كبيرة في بعض الأنواع وطرفها مدبب ، وتمتاز بقدرة عالية في الطيران ، ويميل لون هذه الطيور إلى البني والرمادي مع بعض الأخضر أحيانا ،

وبعضاها يميل لون الجزء السفلي منه إلى اللون الأصفر ، وعادة ما تكون ألوان الذكر زاهية عن ألوان الأنثى ولهذه الطيور شدو مفاجئ يشبه الصفير ، وهذا ما يفسر تسميتها بهذا الاسم وتهاجر بعض أنواع طيور هذه العائلة ، وتصنعن أعشاشها بأغصان الأشجار على هيئة فنجان فوق الأشجار ، وتضع الأنثى ٤-٢ بيضات ويشتراك معها الذكر في الحضانة لمدة ١٧ يوما ، وتبقى الصغار في العش لمدة ١٣-١٦ يوما ، وتتغذى هذه الطيور على الحشرات والفاكه.

◆ عائلة القرقف طويل الذيل :



تضم هذه العائلة ٨ أنواع ، وهي طيور ضئيلة الحجم يمثل الذيل ثلثي طول الطائر الكلى ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ٩ سم ، ١٤ سم ، وزنه ما بين ٥ جم ، ٧ جم ، وهذه الطيور اجتماعية تعيش في جماعات متراابطة ولها نظام يجمعها معاً بأعداد كبيرة ، وتحرك بنشاط عبر الأماكن المزروعة ، ومنقار

القرقف قصير ومخروطي الشكل ، والرجل والقدم صغيرة ، وذيل الطائر طويلاً ومدرج ، وريش القرقف عموماً ناعم ويعلب عليه اللون الأسود والرمادي والوردي والأبيض والبني ، وعادة ما تكون الأجزاء العليا من الجسم داكنة عن الأجزاء السفلية ، ولا يختلف الشكل العام للذكر عن الأنثى وإن كان حجم الأنثى أقل قليلاً من حجم الذكر ، وتعيش طيور هذه العائلة في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي شرق أوروبا وأسيا واليابان وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية خصوصاً في مناطق الغابات وعلى حواف الغابات . ولا يعتبر القرقف طويل الذيل طائراً مهاجراً ، وينتقل على شكل كروي يصنعه من ألياف النباتات ويبطنه بالريش الناعم من الداخل و يجعل له مدخلات جانبية ، وعادة ما يضعه داخل الزراعات أو

النباتات ، وتبيض الأنثى ٦-١٠ بيضات لونها أبيض وبها نقط حمراء وهي التي تختزن البيض لمدة ١٣-١٤ يوما ، وتبقى الصغار في العش لمدة ١٦-١٧ يوما أخرى ، وتتغذى هذه الطيور على الحشرات

♦ عائلة الطيور متسلقة الأشجار:



تضم هذه العائلة ٧ أنواع ، وهي طيور صغيرة الحجم رفيعة الجسم تعيش في صورة منفردة ولكنها قد تختلط في العيش مع مجتمعات من أنواع مختلطة ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ١٢ سم ، ١٥ سم ، والوزن ما بين ٧ جم ، ١٦ جم ، منقار الطائر طويل ورفيع ومقوس قليلا وطرفه حاد ، أما الأرجل فقصيرة والأصابع

طويلة وبها مخالب طويلة ومقوسة للمساعدة على التماسك في جذع الشجرة أثناء التسلق ، وكذلك الذيل الطويل الصلب الذي يستند عليه الطائر كنقطة ارتكاز خلفية أثناء التسلق ، أما الجناح فيعتبر قصيرا ، ولكن سرعة طيران هذا الطائر كبيرة ، وعادة ما يكون الجزء العلوي من الجسم لونه بنية مع وجود بعض البقع البيضاء أما الجزء السفلي من الجسم فهو أبيض اللون ، ولا يختلف شكل الذكر عن الأنثى بوجه عام غير أن الذكر أكبر حجما من الأنثى بنسبة بسيطة ، ومن حيث الهجرة يمكن اعتبار طيور هذه العائلة ذات هجرة جزئية ولمسافات قصيرة ، وتصنع أعشاشها من ألياف النبات على هيئة فنجان مع تبطينه من الداخل بالريش حيث تضعه بين أغصان الشجر أو في مكان مخفى من جذع شجرة ، وتوضع الأنثى ٦-٥ بيضات لونها أبيض وفيها بعض النقاط الحمراء ، وهي التي تختزن البيض لمدة ١٤-١٥ يوما ويسقى الصغار في العش لمدة ١٥-١٦ يوما أخرى ، وتتغذى طيور هذه العائلة على اللافقاريات الصغيرة .


♦ عائلة الطيور أكلة العسل :



تضم هذه العائلة ١٧٢ نوعا ، وهى طيور حجمها بين الصغير والمتوسط ، وتقضى معظم أوقاتها طائرة في الهواء ، وتعيش في جماعات في غالب الأحيان ، ويتراوح طول الطائر ما بين ٨ سم ، ٤٥ سم ، والوزن ما بين ٦ جم ، ١٥٠

جم ، ومنقار الطائر من هذه العائلة متوسط إلى طويل ومقوس قليلا واحدا ، الطرف ولسانه يمكنه الامتداد خارج المنقار وله طرف به زوائد كالفرشاة ، ويتميز هذا الطائر وجود جزء من الرأس غير مغطى بالريش ، والأرجل ما بين القصيرة والمتوسطة الطول ، والجناح طويل ومدبب الطرف وقدرة الطيران عند الأنواع صغيرة الحجم معقولة ولكن الأنواع الكبيرة نوعا طيرانها ضعيف ، والذيل ما بين المتوسط والطويل ، ولون الريش يختلف حسب النوع ولكن يغلب عليها اللون الأخضر الفاتح والبني والرمادي والأصفر وكثير من الأنواع به قطعة ملونة في الرأس خلف الأذن ، وتعيش هذه الطيور في إفريقيا وغينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا في مناطق الغابات ، وبعض أنواع هذه العائلة تعتبر طيورا مهاجرة ، ومن حيث التكاثر فبعض الأنواع تتكاثر في مستعمرات جماعية حيث تبني الأعشاش على هيئة فنجان ويصنع من الأجزاء النباتية ويوضع عاليا فوق الأشجار . وتضع الأنثى بيضتين حيث يشترك معها الذكر في الحضانة لمدة ١٣-١٧ يوما ، ويبقى الصغار في العش لمدة ١٠-١٦ يوما أخرى . وتتغذى هذه الطيور على الرحيق والحشرات وبعض الفواكه .

◆ عائلة شحرور العالم الجديد :New World blackbird




تضم هذه العائلة ٩٦ نوعا ، وهي طيور حجمها ما بين الصغير والكبير منها ما يحلق أوقاتا طويلا ومنها ما يسكن على الأرض ، وهي طيور تعيش عادة في جماعات وتتصدر أصواتها مزعجة ، ويتراوح طول الطائر من هذه العائلة ما بين ١٥ سم ، ٥٣ سم ، والوزن ما بين ٢٠ جم ، ٤٥٠ جم ،

ومنقار الشحرور طويل مخروطي الشكل ومدبب الطرف في بعض الأنواع وقصير قوي في أنواع أخرى ، وجناح الشحرور طويل ومدبب الطرف ، والذيل متوسط أو طويل وشكله مدرج أحيانا ولديه قدرة عالية على الطيران ، ولون ريش الشحرور بنفسجي داكن ولا مع أو أسود أو بني ، وقد يكون ملونا بخلط من الأسود مع الأصفر والبرتقالي والأحمر .

وذكر الشحرور أكبر حجما من الأنثى ، وموطن شحرور العالم الجديد هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية حيث يعيش في الغابات ومناطق الشجيرات الكثيفة والأراضي العشبية وأماكن المستنقعات المائية ، وقد يتم تكاثر هذه الطيور في مستعمرات جماعية ، وبعض أنواع الشحرور يتغذى على أعشاش غيره من الطيور ، ويصنع الشحرور عشه من ألياف النبات ويخفيه بين الشجيرات أو بين النباتات أو في الأرض ، وتبيض الأنثى ٦-٢ بيضات وتحتضنها لمدة ١٢-١٥ يوما ، ويستمر الصغار في العش مدة من ٣٥-٩ يوما ، ويغذى الشحرور على أنواع عديدة من الفواكه والأحياء الصغيرة .

◆ عائلة طيور البرقش (الثغرقيون) :

تضم هذه العائلة ١٢٤ نوعا ، وهي طيور صغيرة الحجم منها ما يقضى أوقاته معلقا في الهواء منها ما يأكل على الأرض ، وبعض أنواعها تعيش في جماعات والبعض الآخر يعيش منفردا ، وغالبا ما تتغذى طيور هذه



العائلة على البذور ، ويتراءح طول الطائر ما بين ١١ سم ، ١٩ سم والوزن ما بين ٩ جم ، ١٠٠ جم ، ومنقار هذه الطيور صلب ويتراءح طوله ما بين القصير والمتوسط وهو مخروطي الشكل مدبب الطرف ، وقد يتقطع فكما المنقار في بعض الأنواع حتى يكون ملائماً

ل النوع القذاء ، وأرجل البرقش والأقدام عادة ما تكون قصيرة أو متوسطة الحجم ورفيعة وضعيفة ، أما الجناح فيتراءح طوله بين المتوسط والطويل وطرفه إما مستدير أو مدبب ، وهى طيور لها قدرة طيران عالية ، والذيل متوسط الطول به تقوس للداخل وقد يكون مشقوقاً في بعض الأنواع ، ويتلون ريش البرقش بالبني والأخضر والأصفر والوردى والأحمر ، وعادة ما يكون لون الذكر أزهى من لون الأنثى كما أنه يفوقها في الحجم ، وتعيش طيور هذه العائلة في أماكن العالم المختلفة في الغابات وأماكن الشجيرات الكثيفة والأراضي المزروعة ، وكثير من أنواعها يهاجر ويتکاثر بعض أنواع البرقش في مستعمرات غير مكدسة العدد ، وتبنى أعشاشها على شكل فنجان من ألياف النبات وتضعه على الأشجار أو الشجيرات ، وتتفرد الأنثى ببناء العش وحدها ، ثم تضع ٣-٥ بيضات فيه ، ثم تقوم وحدها أيضاً بحضانة البيض لمدة ١٢-١٤ يوماً ، ثم يبقى الصغار في العش لمدة ١١-١٧ يوماً أخرى ، وتتغذى طيور البرقش على البذور ، أما الصغار فيطعمهم الوالدان بعض الديдан حيث يتناولها الصغير من فم والديه وقد يطعمانهم البذور المهمضومة بعملية الاسترجاع .

♦ عائلة طيور أبي رزيق :

تضُم هذه العائلة ٤ أنواع ، وهى طيور متوسطة الحجم رشيقه الجسم ويبلغ طول الطائر ٢٠-٥٠ سم وزنه ٤٠ جم - ٣٥٠ جم ، والمنقار متوسط الحجم مدبب الطرف مستقيم ، وهذه الطيور عادة تلتقط الأشياء



اللامعة ، ثم تخفيفها في أماكن أخرى ، وتعيش هذه الطيور في أوروبا وأسيا وشمال إفريقيا ودائماً ما تحلق في أماكن معيشتها في جماعات صغيرة ما بين ٢٠-١٠ طائراً ، وجناح الطائر مدرب الحافة ، وتبني الطيور أعشاشها على شكل طبق عميق من ألياف النباتات مع الطين وثبتته أعلى الأشجار . وتضع الأنثى من ٥-٣ بيضات وتحضنها لمدة ١٧-١٨ يوماً ، ثم تتم تغذية الصغار في العش لمدة ٢٤ يوماً أخرى ، وتتغذى هذه الطيور على اللافقاريات والبذور وبعض الحشرات .

♦ عائلة الغربان :



تضم هذه العائلة ١١٣ نوعاً ، وهي طيور متوسطة إلى كبيرة الحجم حيث يتراوح طول الطائر ما بين ١٥ سم ، ٧١ سم ووزن ما بين ٨٠ جم ، ١,٥ كجم ، ومنقار الغراب أسود وقوى ، وأرجل الغربان متوسطة الطول وكذلك أقدامها وتمتاز بقوة الأرجل ، والذيل ما بين القصير ومتوسط الطول أما الجناح فطويل وعربيض ، ولون ريش

الغربان لامع ويغلب عليه اللون الأسود وقد يتداخل معه الأبيض في بعض الأنواع وكذلك الرمادي والبني والأزرق ، وتغطى فتحة الشم شعيرات رفيعة ولا يختلف الشكل العام للذكر عن الأنثى سوى أن الذكر أكبر قليلاً في الحجم . وتعيش الغربان في كل أنحاء العالم عدا الجزء الشمالي من أمريكا الشمالية ، ولا تهاجر الغربان في أغلب الأحيان ، وتتكاثر بعض أنواع الغربان

في مستعمرات جماعية ، وعش الغراب عادة ما يكون على هيئة طبق من أعواد الأشجار يضعه الطائر فوق شجرة ، وقد يكون على هيئة قبة ، وقد يكون في إحدى فجوات الأشجار ، وتوضع أنثى الغراب ٣-١٠ بيضات ، ويشترك معها الذكر في حضانة البيض أحياناً ، وقد تقوم الأنثى وحدها بالحضانة لمدة ٢٠-٢٢ يوماً ، ويبقى الصغار في العش لمدة ٤٥-٥٠ يوماً أخرى ، وتتغذى الغربان على الحيوانات الصغيرة ، مثل : الفشران ، والحشرات ، واليرقات ، والبذور ، وعلى المكسرات ، وبعض الفواكه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ^(١)

. صدق الله العظيم

(١) التحل (٧٩)



أسماء بعض الطيور

Avocet	النكات
Bee eater	وروار (أكل النمل)
Bittern	العجاج / القوق / الواق
Black bird	شحرور
Black cap	طائر القلسوة
Blue bird , Eastern	زرقان
BlueThroat	ذو الزور الأزرق
Bobolink	الوشق
Brambling	البرقش
Bullfinch	دغناش
Bunting cirl	مرعنة الدراسة
Bustard great	الحبارى
Buzzard	البازى المترهل
Capercaillie	طيهوج
Cardinal	الكاردينال
Chaffinch.	الشرشور
Chiffchaf	شقشاق
Chough	غراب الصخر
Condor , califonia	رخمة / نسر / عقاب أمريكي
Coot	زفة
Cormorant	غاق
Corncrake	مرععة البر

Crane	الكركي - الغرنوق
Creeper , Tree	متسلق الأشجار
Cross bill	ذو المنقار المتقطع أو (المتصالب)
Crow	غراب
Cuckoo, Common	وقواق
Curlew	الكروان / القرلى
Diver	طائر غواص
Dotterel	لبارى
Dove , Collard	اليمامة المطوقة
Duck , Wood	بط الغابات
Dunlin	طيطوى
Eagle , Bald	عقاب أصلع
Eagle , Golden	عقاب ذهبي
Egret	أبو قردان / بلشون
Eider	بط الزف
Falcon	صقر
Fieldfare	دج
Flamingo , Greater	نحام / بشاروش
Flycatcher	صائد الذباب
Flycatcher , Spotted	صائد الذباب الأبقع
Gad wall	سمارية / بطة برية
Gannet	أطيش
Goldcrest	ذو العرف الذهبي
Goldfinch	الحسون الذهبي
Goosander	إوز
Goose , Canada	إوز كندي

Goshawk	باز
Grebe , black necked	غطاس أسود الرقبة
Green finch	خضارا / خضير
Green shank	طيطوى أخضر الرجلين
Grouse, Black	قطا / قطة
Gull, Black headed	نورس أسود الرأس
Harrier, Hen	عقيب
Hawfinch	البرقش / الحسون
Heron	مالك الخزين
Hoopoe	الهدهد
Jackdaw	غراب الزرع
Jay	زرياب / أبورزيق
Kestrel	عوسة / صقر الجراد
Kingfisher	جنقلة (صياد السمك)
Kite, Black	حدأة سوداء
Kitti wake.....	نورس شمالي
Lapwing	تورم / زفراقي
Linnet	التفاحى
Magpie	العقبق
Mallard	برُكة (بط خضارى)
Martin	خطاف
Mergenser	بط بحرى
Merlin	باشق
Moorhen	طهيوح
Nightingale	عندليب
Nightjar	السبد

Nutcracker	نقار المكسرات
Nuthatch	نقار أزرق
Oriole	الصافر
Osprey	سنقر / عقاب
Ouzel & Ring	شحرور الدُّج
Owl, Barn	بومة الخارن / هامة
Owl, Great Horned	البومة المقرنة
Owl, short eared	بومة قصيرة الأذن
Oystercatcher	محار
Partridge	الحجالة
Pelican	بُعْد
Petrel	خطاف البحر
Phalarope	مقبب
Pheasant	ديك بري
Pigeon	حمام
Pintail	بلبل
Pipit, Meadow	تمرة المروج
Pipit, Water	تمرة الماء
Plover, Golden	مرععة ذهبية
Pochard, Red-crested	بطة حمراء العرف
Ptarmigan	حجل الثلج
Puffin	طائر البوفين
Quail	سمانى / لبادى
Rail, Water	مرععة الماء
Raven	غراب / غداف

Razorbill	منقار الموسى
Redpol	حسون أحمر
Redshank.....	طيطوى أحمر
Redstart.....	حميراء
Redwing	طاير أم رياح
Robin	طاير أبو الحناء
Roller	شراق
Rook	غراب الغيط
Ruff	طهيوج / مجفجف
Sandpiper	طيطوى
Scaup.....	البط الغواص
Scoter	بط البحر الأسود
Serin	البرقش الصداح
Shelduck	شهرمان
Shoveler	أبومجرفة
Shrike, Grey	دقنوش رمادى
Siskin	حسون الشوك
Skua, Arctic	نورس الأطلنطي
Skylark.....	قبة الحقول
Snipe	شنقب
Sparrow, tree	عصافير الأشجار
Spoonbill	أبوملعقة
Starling	الزرزور
Stilt, Blackwinged	المطوال ذو الجناح الأسود
Stonechat	صوار
Stork, white	لقلق أبيض

Swallow	طائر السنونو
Swan, Mute	بجع أخرس / تم آخرس
Swift	سمامة / زوار
Teal	بط برى / دُج / حَدَف
Tern	خطاف البحر
Thrush, song	سمنة مغيرة
Tit	قرقف / عصفور
Turkey	ديك رومى
Turnstone	طيطوى
Vireo, Solitary	صادح أمريكي
Vulture, Black	نسر أسود
Wagtail, Grey	طائر أم عجلان الرمادى
Warbler, Garden	صادح الحدائق
Wax Wing	جناح الشمع
Wheateater	أبو بليق
Whimbrel	كروان أوربي صغير
Whinchat	زقروق
Whitethroat	زريقة
Wigeon	بط الزاى
Woodcock	دباجحة الغابة
Woodpecker, black	نقار الخشب أسود
Wren	صعوة
Wryneck	اللّوّاء



- 1 - The illustrated encyclopedia of birds
 - 2 - The Hamlyon photographic guide to birds of the world
 - 3 - Which bird - An instant guide to recognizing birds by Mike Lambert & Alanpearson
 - 4 - Field Guide to the birds of Britain & Ireland John Gooders
 - 5 - Extinct and vanishing birds of the world James c. Greenway, Jr.
 - 6 - The wonderful world of birds and their behaviour Donald Broom
 - 7 - The love of Birds John A. Burton - D. H. S. Risdon.
- ٤ - كل شئ عن الطيور - تأليف : شفيق المهدى .