


## الفصل الأول

# الكون والمجموعة الشمسية



- \* الكون .
- \* الفضاء القريب .
- \* الشمس .
- \* الكواكب .
- \* حزام كويبير .

# الفصل الأول : الكون والمجموعة الشمسية

## Cosmos and the solar system

### \* الكون Cosmos


هو الفضاء الشاسع الذى تتحرك فيه أعداد هائلة من النجوم والكواكب ، ومن نجوم هذا الكون الشمس التى تبدو ككرة من الغازات المتوهجة التى تمدنا بالضوء والحرارة . وللشمس عائلة تتكون من الأرض وتسعة من الكواكب التى تدور حولها فى مدارات خاصة مكونة المجموعة الشمسية . والقمر يدور حول الأرض ويعكس ضوء الشمس .

ووحدة الكون العظمى هى المجرات التى لا تحصى عدداً ، وكل مجرة galaxy تتكون من ملايين النجوم التى تتباعد عن بعضها آلاف بلايين الكيلو مترات ، ويصل إلينا جانب من ضوءها خافتاً ضعيفاً . ومجرتنا تسمى درب التبانة Milky way أو الطريق اللبنى حيث تنتشر فيها النجوم انتشار التبن الذى يبعثر على الأرض ، ولذا سميت بالتبانة . والمسافات بين النجوم ضرب من الخيال فالمسافة بيننا وبين بعض النجوم يقطعها الضوء فى ألف سنة أى تبعد عنا ألف سنة ضوئية .

( السنة الضوئية = عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات وهى وحدة قياس المسافة بين النجوم ) .

وتتباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعة فائقة ويزداد بذلك حجم الكون ( يتمدد ) وكلما تباعدت المجرات ازدادت سرعتها ، ولا يعنى استمرار تباعد المجرات أن الكون ستختفى مجراته وراء حدود الكون المرئى ويصبح فارغاً وذلك لأن هناك ملايين المجرات الجديدة التى تتولد عندما تختفى المجرات البعيدة ، والمجرات الجديدة تتولد من الغاز الكونى بنفس الطريقة التى ظهرت بها المجرات القديمة . وعندما نتأمل فى هذا النظام نجد أنه يفوق حدود الوصف

والخيال وقد أخبر القرآن الكريم فى إعجاز رائع عن ذلك فى سورة الواقعة  
( فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) . ( آيات ٧٥ ، ٧٦ )



أحدث التلسكوبات فى مراكز الأرصاد لرصد الكواكب والنجوم

### \* الفضاء القريب :

هو ذلك الفضاء الذى تسبح فيه أفراد المجموعة الشمسية وتتحرك فيه الأقمار الصناعية ، وتقع الشمس فى مركز هذا الفضاء وتسبح فيه مع الكواكب السيارة التسعة وما يتبع كل كوكب منها من أقمار تدور حوله .

وتتشابه الكواكب الأربعة الأولى وتسمى مجموعة الكواكب الأرضية : عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ .

وذلك لتقارب حجومها وكثافة مادتها ، وأصغر أفرادها كوكب عطارد Mercury الذى يبلغ قطره  $\frac{2}{3}$  من قطر الأرض ويتم دورته حول الشمس فى ٨٨ يوماً أما كوكب الزهرة Venus فيبلغ قطره ٩٧,٣ ٪ من قطر الأرض وتغلفها غازات كثيفة وتدور حول الشمس دورة كل ٢٢٥ يوماً .

أما كوكب المريخ Mars فيبلغ قطره نحو نصف قطر الأرض وجوه رقيق شفاف ويكمل دورته حول الشمس فى ٦٨٧ يوماً . وللأرض قمر واحد أما المريخ فله قمران .

وينتشر فراغ شاسع بين كوكب المريخ وكوكب المشترى Jupiter ويملاً هذا الفراغ نحو ١٥٠٠ من الكويكبات ( أجسام سيارة صغيرة ) والمشتري أكبر أفراد المجموعة الشمسية ويبلغ قطره ١١ مرة قدر قطر الأرض إلا أنه سريع الدوران ويكمل دورته حول الشمس فى ١١,٩ سنة . وتشبه أجواء كواكب المجموعة

الخارجية ( زحل Seturn – أورانوس Uranus – نبتون Neptune – بلوتو Pluto ) جو المشتري ، ويدور حول المشتري ١٦ قمرا أما زحل فله ١٧ قمرا وتدور حوله حلقات عظيمة ، ولأورانوس ١٤ قمرا ولنبتون قمران أما بلوتو فلا يعرف له إلا قمر واحد . وتدور جميع الكواكب والكويكبات في اتجاه واحد حول الشمس بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة وكذلك جميع الأقمار تدور عكس عقارب الساعة إلى جانب أن الشمس وجميع الكواكب تدور حول محاورها في نفس الاتجاه .

( جميع وحدات الكون تدور في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة ) .

### \* الشمس The sun :

أقرب نجم إلى الأرض وتبعد عنه بحوالى ١٥٠ مليون كيلو متر ، ورغم أنها كبيرة جدا بالنسبة للأرض إلا أنها صغيرة بالنسبة لنجوم أخرى ، وقطر الشمس أكثر من ١٠٩ أضعاف قطر الأرض ، وتزودنا الشمس بالحرارة والضوء وهما أساس الحياة ، ودرجة الحرارة في مركز الشمس عالية جدا لأن قلب الشمس يتألف من غاز الهيدروجين وتحدث تفاعلات نووية اندماجية ينتج عنها مقادير عظيمة من الحرارة تنبعث باستمرار من سطح الشمس ويسمى السطح النير وهو أبرد كثيرا من داخلها ، وتبلغ درجة حرارة السطح ٦٠٠٠ °م ويبدو هذا السطح منقطا بفقاقيع غير منتظمة بسبب الغازات التي ترتفع إليه من الداخل ويندلع من سطح الشمس سحب من الغازات المتوهجة .

تدور الشمس حول محورها مرة كل ٢٥ يوما ويتم قياس هذه الحركة بمتابعة حركة البقع المظلمة الكبيرة التي على سطح الشمس وتعرف بالكلف الشمسية ، ويرافق هذه البقع المظلمة بقع لامعة تدعى الصياخد بالإضافة إلى التأججات العظيمة في جو الشمس والتي تسمى الاندلاعات وتدوم لفترة قصيرة وتشوش هذه الاندلاعات على البث الإذاعي وتعطل انتقال الإشارات اللاسلكية .

وتنتشر الطاقة الحرارية والضوئية المنبعثة من الشمس عبر الفضاء في جميع الاتجاهات ، والطاقة الحرارية من الشمس تعرف بالإشعاع تحت الأحمر وهو إشعاع غير

مرئى ولكنه يستشعر بالحس فكل جسم يمتص هذا الإشعاع يصبح أسخن من ذى قبل ، هذا إلى جانب الإشعاع فوق البنفسجى والذى لا يصل منه إلى سطح الأرض إلا القليل جدا وهذا القليل يفيد صحيا ( يحول مقدم فيتامين د تحت الجلد إلى فيتامين د بتأثير الأشعة فوق البنفسجية ) والطاقة الحرارية والضوئية من الشمس ضرورية للحياة فهى تحفظ درجة حرارة الأرض والجو لتصبح صالحة للحياة وضرورية للرؤية ونمو النبات وقيامه بعملية البناء الضوئى .



### \* الكواكب :

Mercury	عطارد
Venus	الزهرة
Earth	الأرض
Mars	المريخ
Jupiter	المشترى
Saturn	زحل
Uranus	أورانوس
Neptune	نبتون
Pluto	بلوتو

### عطارد :

- أقرب الكواكب إلى الشمس وسطحه ملىء بالجبال العالية وفوهات البراكين .
- يبعد عنها ٥ مليون كيلو متر .
- يدور حولها مرة كل ٨٨ يوما .
- يدور حول نفسه مرة كل ٥٩ يوما .
- ( يوم عطارد طويل جدا ) .



كوكب عطارد

- كوكب صخري موحش لا يوجد على سطحه حياة أو ماء .
- ليس له غلاف جوى ولذا يفقد حرارته ليلاً .
- ليس له أقمار تدور حوله ويرجع ذلك لضعف قوة جاذبيته .
- درجة الحرارة على سطحه  $400^{\circ}$  س نهارا ( لا يصلح للحياة ) ،  $150^{\circ}$  س ليلاً .



كوكب الزهرة

### الزهرة :

- حجمه يساوى حجم الأرض ، ويظهر فى السماء لامعاً أكثر من أى كوكب آخر ويمر بأطوار مماثلة لأطوار القمر .
- يدور حول نفسه مرة كل ٢٥٠ يوماً وحول الشمس فى ٢٢٥ يوماً .
- ليس له أقمار ، ومحاط بغلاف جوى عبارة عن سحب كثيفة من غازات ضارة .
- درجة الحرارة على سطحه من  $200^{\circ}$  س إلى  $450^{\circ}$  س ولا يوجد ماء على سطحه .
- يحيط به سحب تحبس حرارة الكوكب ( لا يصلح للحياة ) .
- الضغط الجوى على سطحه أكثر من ٩٠ مرة من الضغط الجوى على سطح الأرض .



كوكب الأرض

### الأرض :

- تدور حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة ( تدور من الغرب إلى الشرق ) .
- تدور حول الشمس مرة كل  $365\frac{1}{4}$  يوم .
- يحيط بها غلاف مائى وغلاف هوائى .
- لا ترتفع درجة حرارة السطح عن  $50^{\circ}$  س ( صالح للحياة )
- يدور حولها قمر واحد .

## المريخ :

- يدور حول الشمس مرة كل ٦٨٧ يوما ويبلغ قطره نحو نصف قطر الأرض .
- يدور حول نفسه مرة كل ٢٤ ساعة .
- جو المريخ يشبه جو الصحراء القطبية .
- ( درجة الحرارة ١٢° س في النهار ، -٦٢° س في الليل ) .
- الكوكب لونه أحمر ويتبعه قمران .
- له غلاف جوى رقيق به نسبة ضئيلة من الأكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون .

## المشتري :



- أكبر كواكب المجموعة الشمسية ( قطره يبلغ ١١ مرة قدر قطر الأرض ) .
- يدور حول الشمس مرة كل ١١.٨ سنة ( عامه طويل جدا ) .
- يدور حول نفسه مرة كل ١٠ ساعات ( يومه قصير جدا ) .
- تصل درجة حرارة السطح -١٢٠° س .
- توجد بقع حمراء بيضاوية كبيرة على سطحه .
- يبلغ الضغط الجوي على سطحه خمسة أضعاف الضغط الجوي على سطح الأرض .
- يدور حوله مجموعة من الأقمار .

## زحل :



- ثاني الكواكب من حيث الحجم ( قطره يساوي حوالى ١٠ مرات قطر الأرض ) .
- يدور فوق خط استواءه عدد من الحلقات تمتد فى الفضاء لأكثر من ١٥٠ ألف كيلو متر وتتكون من قطع صغيرة من الصخور والجليد .
- يدور حول الشمس مرة كل ٢٥,٥ سنة ( عامه طويل جدا ) .

- يدور حول نفسه مرة كل ١٠ ساعات ( يومه قصير جدا ) .
- تصل درجة حرارة السطح -١٢٠° س .
- يتبعه ٢٣ قمرا .

### أورانوس :



- يظهر فى الفضاء على هيئة كرة ملساء لونها أخضر مزرق .
- يدور حول الشمس مرة كل ٨٥ سنة .
- يدور حول محوره مرة كل ١١ ساعة .
- يدور حوله عدد من الحلقات مستواها عمودى على مستوى دورانها حول الشمس
- يتبعه ١٥ قمرا .
- درجة حرارة السطح -١٨٠° س .

### نبتون :


- يبدو فى الفضاء كماءة زرقاء تشع بضوء خافت .
- يدور حول الشمس مرة كل ١٦٥ سنة .
- يدور حول نفسه مرة كل ١٦ ساعة .
- يتبعه عدد من الأقمار يشاهد منها بوضوح قمران .
- درجة حرارة السطح -٢٢٠° س .

### بلوتو :

- أصغر كواكب المجموعة الشمسية حجما .
- يدور حول الشمس مرة كل ٢٤٨ سنة ويغلب عليه الظلام .
- يدور حول نفسه مرة كل ٩ أيام .
- ليس له غلاف جوى .
- له قمر واحد .




## \* حزام كويبير Kuiper belt :



أسفرت ثقالة الكواكب خلال المراحل المبكرة للنظام الشمسي عن دفع الأجسام الصغيرة إلى الدوران في مدارات حول نبتون وقد اتجهت بعض هذه الأجسام نحو الشمس . في حين انطلقت أخرى بسرعة مفرطة نحو غيمة أورت الثانية ( غير مبينة في الشكل )

تمكن العالم الأمريكي كويبير من اكتشاف وجود مجموعة نائية من الأجرام السماوية أبعد عن الشمس من أى كوكب آخر ، وقد دافع كويبير عن اكتشافه بقوة منذ عام ١٩٥١ وتأكد ذلك للعلماء عام ١٩٩٢ . وتسمى هذه المجموعة من الأجرام ( حزام كويبير ) Kuiper belt .

وقد تأكد كويبير من هذه الحقيقة نتيجة لمعرفته العميقة بسلوك مذنبات معينة ومن ثم أوضح كويبير وآخرون أن النظام الشمسي لا ينتهى عند نبتون أو بلوتو ( اللذين ينافس كل منهما الآخر على من يكون منهما الأبعد عن الشمس ) بل تصوروا وجود حزام وراء نبتون وبلوتو مؤلف من مواد تخلفت عن عملية تكون الكواكب ،




رصد QB1 من حزام كويبير وتحديد فلكه

وهذه البقايا بعيدة جدا عن الشمس ، ولذلك فمن المحتمل أنها مكون من الجليد وغازات أخرى متجمدة مما يجعلها شبيهة للغاية لنوى المذنبات .

وقد تمكن العلماء من رصد حزام كويبير باستخدام تلسكوب جامعة هاواي ( يبلغ قطره ٢,٢ متر ) ومشيد على جبل ماوناكيا .

وأسفرت عمليات الرصد عن اكتشاف عدد من الأجسام فى حزام كويبير تبلغ ٣٢ جسما مشترك فى عدد من السمات منها أنها تقع رواء نبتون مما يوحى بأن الحافة الداخلية لحزام كويبير تتحدد بهذا الكوكب ، كما أن جميع هذه الأجرام السماوية المكتشفة حديثا تسبح فى أفلاك ذات أقطار صغيرة مما يجعلها أصغر كثيرا من كوكب بلوتو .

ويقدر العلماء أن يكون عدد الأجسام فى حزام كويبير ٣٥,٠٠٠ جسم ومن ثم فإنه يحتمل أن تكون الكتلة الكلية لهذا الحزام أكبر بمئات المرات من حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري ويعتقد الفلكيون بأن هناك ما يكفى من المادة فى حزام كويبير لتشكيل المذنبات وأنه بمثابة مستودع لهذه المذنبات حيث تنطلق الأجسام من حافة الحزام إلى النظام الشمسى الداخلى وفى النهاية يحترق الكثير منها ببطء ويرتطم بعضها بالكواكب . توفر الاكتشافات الحديثة للأجسام فى حزام كويبير رؤية جديد للنظام الشمسى الخارجى ، ولا تنبع خصوصية بلوتو إلا من كونه أكبر من أى جسم آخر فى حزام كويبير .



قد يدور عدد لا يحصى من الأجسام فى حزام كويبير بعيدا عن الشمس ، لكن يتعذر رؤية جميع هذه الأجسام من الأرض . والأجسام ( الدوائر ) التى يمكن رصدها على نحو مرض باستخدام التلسكوب على جبل ماوناكيا فى هاواى يقع معظمها قريبا من الحدود الداخلية للحزام كما نرى فى هذه الصورة لتوزيع المادة البعيدة .