

## الفصل الثالث عشر : الجهاز العصبي والأفعال المنعكسة


### The nervous system and reflex action

– يتركب الجهاز العصبي من جزئين :

- ١ – الجهاز العصبي المركزي Central nervous system .
- ٢ – مجموعة من الأعصاب تصل الجهاز العصبي بالأعضاء المختلفة ويسمى الجهاز العصبي الطرفي .

#### الجهاز العصبي المركزي

يتركب من المخ Brain والحبل الشوكي Spinal cord .



وتحمل الأعصاب النبضات الكهربائية من الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أنحاء الجسم مما يسبب انقباض العضلات أو إفراز الغدد للإنزيمات أو الهرمونات والغدد والعضلات تسمى أعضاء الاستجابة effectors لأنها تستجيب عندما يصل إليها النبضات العصبية أو الهرمونات .


والعضلة ثنائية الرؤوس biceps مثلاً هي عضو الاستجابة الذي يسبب انثناء الذراع – والغدد اللعابية مثال لعضو الاستجابة عندما يفرز اللعاب كنتيجة لإشارات عصبية من المخ .

وكذلك ترسل الأعصاب النبضات العصبية من أعضاء الحس ( العين – الأذن – الجلد – الخ ) إلى المخ والحبل الشوكي وتسمى هذه النبضات بالنبضات العصبية الحسية Sensory impulses وتلك التي ترسل من المخ والحبل الشوكي إلى أعضاء الاستجابة تسمى نبضات عصبية حركية Motor impulses .

والأعصاب التي تربط الجسم بالجهاز العصبي المركزي تسمى بالجهاز العصبي الطرفي  
Peripheral nervous system

### \* الخلايا العصبية ( Nerve cells ( neurones )

يتكون الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي من خلايا عصبية  
والخلايا العصبية ثلاثة أنماط



#### أ - الحركية

#### Motor neurones

تحمل النبضات العصبية  
من الجهاز العصبي المركزي  
إلى العضلات والغدد .

#### ب - الحسية

#### Sensory neurones

تحمل النبضات العصبية  
من أعضاء الحس إلى الجهاز  
العصبي المركزي .

#### ج - القطبية

#### Multipolar neurones


لا تعتبر حسية أو  
حركية ووظيفتها عمل  
التوصيلات بين الخلايا  
العصبية داخل الجهاز  
العصبي المركزي وتسمى  
خلية موصلة .

وكل خلية عصبية تتركب من نواة وسيتوبلازم وألياف متفرعة تسمى تفرعات شجيرية Dendrites تعمل على اتصال الخلية بخلايا أخرى ويتميز سيتوبلازم الخلية بوجود حبيبات نيسل Nissl التي تختفى عند بذل المجهود وتظهر وقت الراحة ويمتد من جسم الخلية خيط من السيتوبلازم محاط بغلاف عازل دهني يسمى غلاف الميالين Myelin sheath يساعد على سرعة مرور النبضات العصبية ويسمى الليف العصبى Nerve fibre أو المحور ويلى غلاف الميالين غمد شوان Schwann .

ويمتد الليف العصبى داخل العصب بينما تستقر أجسام الخلايا العصبية فى الجهاز العصبى المركزى وهو المخ والحبل الشوكى .

### \* العصب Nerve

يُرى بسهولة – أبيض – متين – ليفى ويتركب من مئات من الألياف العصبية المجهرية فى حزم – ومعظم الأعصاب تحتوى خليط من الألياف الحسية والألياف الحركية – ولهذا يحمل العصب عديد من النبضات المختلفة بعضها يتحرك فى اتجاه فى الألياف الحسية والأخرى تتحرك فى الاتجاه المضاد فى الألياف الحركية .




بعض الألياف العصبية طويلة جدا – الألياف العصبية المتجهة إلى القدم تستقر أجسام خلاياها العصبية فى الحبل الشوكى – والألياف تمتد داخل العصب بدون كسر – تحت جلد الأصابع أو عضلات القدم . ولهذا فكل خلية عصبية مفردة لها ليف عصبى يصل طوله إلى متر .

## \* التشابك العصبى Synapse


لأن الألياف العصبية معزولة ولتمر النبضات العصبية من خلية لأخرى يوجد فى مناطق الاتصال بين محور خلية وجسم خلية أخرى ما يسمى بالتشابك العصبى حيث يتصل نهاية فرع من أحد المحاور مع أحد التفرعات الشجيرية لخلية أخرى .

وعندما تصل النبضات العصبية إلى التشابك تتولد كميات قليلة جدا من مركبات كيميائية ( نواقل كيميائية Chemical transmitter ) مثل الاستيل كولين تسبب تولد النبضات فى الخلية الأخرى .



وفى التشابك العصبى يكون الاتصال بين غشاء قبل التشابك ( نهاية محور ) وغشاء بعد التشابك ( بداية زائدة شجيرية ) وتمر النبضات العصبية فى المحور قبل التشابك حتى تصل إلى غشاء قبل التشابك فتؤثر على حركة حويصلات التشابك التى تتجه إلى الغشاء وتممر المادة الكيميائية التى تمر فى المسافة بين الغشائين ( ٢٠ نانومتر ) وتدخل وتؤثر على الغشاء بعد التشابك فتتكون نبضات عصبية بعد التشابك وهكذا يمر التيار العصبى خلال التشابك العصبى .

ويوجد عند غشاء بعد التشابك إنزيم يوقف فعل المركب الكيميائى حتى لا يستمر تأثيره ويستمر مرور النبضات العصبية .






### \* النبضات العصبية Impulses

لا تحمل الألياف العصبية الإحساس مثل الألم أو البرودة — فهذه الإحساسات نشعر بها عندما تصل النبضات إلى المخ .

والنبضات العصبية عبارة عن سلسلة من النبضات الكهربائية تنتقل خلال الليف العصبى وكل نبضة تستغرق ٠,٠١ ثانية وتتحرك بسرعة تزيد عن ١٠٠ متر لكل ثانية .

وجميع النبضات العصبية متشابهة فلا يوجد أى خلاف بين النبضات التى تأتى من العين أو الأذن أو اليد والاختلاف فقط فى ترجمة هذه النبضات فى المخ إلى صور الإحساس .

وتنشأ النبضات العصبية نتيجة اختلاف تركيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلور خارج وداخل الغشاء البلازمى وهذا الاختلاف فى التركيز يرجع إلى خاصية النفاذية الاختيارية للغشاء وينشأ عنه اختلاف فرق الجهد الكهربى خارج وداخل الغشاء .



فيصبح خارج الغشاء جهده الكهربى أعلى منه داخل الغشاء ويعرف ذلك بجهد الغشاء أثناء الراحة .

وعندما يؤثر مؤثر على الغشاء فإن نقطة التأثير تفقد خاصية النفاذية الاختيارية ويتغير تركيز الأيونات داخل وخارج الغشاء فى هذه النقطة فيصبح داخل الغشاء جهده الكهربى أعلى منه خارج الغشاء ويعرف ذلك بجهد الغشاء أثناء العمل أى النبضة العصبية فى هذه النقطة .

ويعتبر انقلاب فرق الجهد فى هذه النقطة مؤثراً للنقطة التالية ويستمر ذلك وهذا ما يسمى بالنبضات العصبية الكهربية ويستمر مرور النبضات العصبية وتستعيد نقاط التأثير وضعها الطبيعى أثناء الراحة .

### \* المٌخ The brain

يتكون المخ من المادة الرمادية ( نحو الخارج ) والمادة البيضاء ( نحو الداخل ) وتتركز المادة الرمادية فى تلافيف القشرة المخية وتنقسم القشرة المخية انقساماً جزئياً إلى النصفين الكرويين بواسطة شق طولى والنصف الكروى الأيسر يتحكم فى الجانب الأيمن من الجسم والنصف الكروى الأيمن يتحكم فى الجانب الأيسر .

– النصفان الكرويان **Cerebrum** : ويقع بهما مراكز التفكير والذاكرة والإدراك ومراكز الحس الشعورى ( السمع والبصر والشم والتذوق واللمس ) ومركز النطق والكتابة .

– المخيخ **Cerebellum** : اسفل الجزء الخلفى من النصفين الكرويين يتكون من ثلاثة فصوص ( فسان جانبيين بينهما فص وسطى ضيق ) ويحمل سطح المخيخ أحاديد متوازية ووظيفته حفظ التوازن الحركى .


– القشرة المخية **Cortex** : فى كل من النصفين الكرويين والمخيخ تتكون من مئات الآلاف من الخلايا العصبية .

## – النخاع المستطيل Medulla :

جسم أسطوانى بين قنطرة فارول والحبل الشوكى يصل النبضات العصبية بين المخ والحبل الشوكى كما يوجد به مراكز عصبية تسيطر على الحركات اللاإرادية مثل ضربات القلب والحركات التنفسية ودرجة حرارة الجسم .




وتتصل الغدة النخامية بالجانب السفلى للمخ وذلك عند منطقة تحت المهاد ( تحت السرير البصرى ) Hypothalamus .



مخطط يوضح مناطق المخ

## \* الحبل الشوكى Spinal cord



قطع عرضى فى الحبل الشوكى يوضح المنطقة الرمادية  
(على شكل حرف H) وسط المنطقة البيضاء

يظهر الحبل الشوكى فى  
القطع العرضى مكونا من مادة  
رمادية Grey matter على  
شكل حرف H ويحيط بها مادة  
بيضاء White matter يمتد  
منها الأعصاب الشوكية Spinal  
nerve وتنقسم الأعصاب الشوكية  
إلى جذرين . . جذر ظهري  
Dorsal root الذى تدخل منه  
الأعصاب الحسية وجذر بطنى  
Ventral root الذى تخرج منه  
الأعصاب الحركية .



وهذان النوعان من الأعصاب يستمران معاً فى عصب واحد هو العصب الشوكى .  
وأجسام الخلايا العصبية للألياف الحسية تقع فى الجذر الظهري . ويحيط بالحبل  
الشوكى أغشية ويحيط به القناة الفقارية .

## \* السحايا (الأغشية) Meninges

يحيط بالمخ والنخاع الشوكى ثلاثة اغشية هى الأم الجافية Dura mater  
والعنكبوتية Arachnoid والأم الحنون Piamater .

وبين العنكبوتية والأم الحنون مسافة يملؤها سائل مخى شوكى والأم الحنون  
غشاء رقيق غنى بالأوعية الدموية يغذى الجهاز العصبى المركزى ويمده  
بالأكسجين والأم الجافية غشاء مثبت تحت العظام ويوفر الحماية للجهاز العصبى  
المركزى وبينهما العنكبوتية والسائل المخى الشوكى ولهما دور فى تغذية الجهاز  
العصبى ومده بالعناصر الضرورية .





## \* الفعل المنعكس Reflex action

كمثال للفعل المنعكس عندما تلامس صفيحة ساخنة تسحب يدك بسرعة ويعرف بأنه استجابة فورية تلقائية من الجسم لأى إثارة . . وكذلك عند الدق على الركبة فى موضع معين نجد أن القدم تحدث ركلة وغالبا يقوم الطبيب بهذا الاختبار ليستدل على الحالة العصبية أو الصحية للإنسان . . . وكذلك الحركة التلقائية لأصابع القدم عند ملامسة باطن القدم .

ولكن ما الذى يحدث عندما نسحب اليد بعيدا عن ملامسة جسم ساخن ؟

النهايات الحسية فى الأصابع تثار بواسطة الحرارة مما يسبب نبضات عصبية تمر فى العصب خلال الذراع إلى الحبل الشوكى والمخ .

والإحساس بالألم يدركه المخ فقط عندما تصل إليه النبضات العصبية والنبضات العصبية التى وصلت إلى الحبل الشوكى هى التى تصل إلى المخ وقبل أن تصل تنعكس هذه النبضات فى الحبل الشوكى وتتحد فى ليف عصبى حركى إلى العضلات حيث تسبب انقباض العضلات وحركة الذراع . . ويحدث ذلك فى جزء من الثانية .

## \* القوس المنعكس The reflex arc

ما حدث من حركة تلقائية للذراع لإبعاد اليد عن الحرارة يسمى الفعل المنعكس ويحدث عن طريق خمسة عناصر أساسية تسمى القوس المنعكس وهى :

### ١ - مستقبل Receptor

يستقبل المؤثر وفى المثال السابق هو النهايات العصبية فى الجلد .

### ٢ - ليف عصبى حسى Sensory nerve fibre

يحمل النبضات العصبية من النهايات العصبية إلى الحبل الشوكى .

### ٣ - ليف عصبى موصل Intermediate nerve fibre


يحمل النبضات العصبية من الجانب العلوى إلى الجانب السفلى للحبل الشوكى .

### ٤ - ليف عصبى حركى Motor nerve fibre

يحمل النبضات العصبية من الحبل الشوكى إلى العضلات .


### ٥ - المستجيب Effector

يحدث الاستجابة عندما تصل إليه النبضات وفى المثال السابق عضلات الذراع .



و داخل المادة الرمادية تتصل الخلايا العصبية الحسية فى الجذر الظهري بخلايا عصبية حركية من الجذر البطني بواسطة خلايا عصبية موصلة ومناطق الاتصال هي التشابكات العصبية وتمر النبضات العصبية دائما فى اتجاه واحد من النهايات الحسية إلى الحبل الشوكى إلى العضلات وتتجه النبضات العصبية فى الحبل الشوكى متفرعة إلى أعلى نحو المخ حتى يتم إدراك الحس .

### الجهاز العصبى الطرفى



\* الاستجابات الإرادية واللاإرادية  
Voluntary and involuntary responses

عندما تحرك يدك لتناول شيء ما أو تمشى فى الطريق وغير ذلك مما تقوم به بإرادتك يسمى الحركات الإرادية وتتم عن طريق العضلات الإرادية ويتحكم فيها المخ .

ولكن هناك كثير من العمليات التى تتم داخل أجسامنا ولا تحكم لإرادتنا فيها مثل نبضات القلب أو حركة الأمعاء وهذه الأنشطة تتم عن طريق الجهاز العصبى الذاتى Autonomic nervous system .

والأعصاب الذاتية هى التى تتحكم فى الوظائف اللاإرادية ولا تتأثر شعوريا ولا يسيطر عليها المخ وتمتد هذه الأعصاب من عقد عصبية ganglia تقع خارج الحبل الشوكى ( خارج فقرات العمود الفقارى ) .

وينقسم الجهاز العصبى الذاتى إلى جهازين


\* الجهاز العصبى السمبثاوى Sympathetic .

\* الجهاز العصبى الباراسمبثاوى Para Sympathetic .

وتغذى الأعصاب من الجهازين معظم أعضاء الجسم ووظيفة الأعصاب السمبثاوية تضاد وظيفة الأعصاب الباراسمبثاوية فمثلا .

● العصب الباراسمبثاوى يقلل من ضربات القلب ويزيد من الحركات الدودية للأمعاء بينما العصب السمبثاوى يزيد من ضربات القلب ويقلل من الحركة الدودية للأمعاء .

ويوضح الشكل فى الصفحة القادمة الأعصاب السمبثاوية والأعصاب الباراسمبثاوية



الأعصاب السمبثاوية على اليمين والأعصاب الباراسمبثاوية على اليسار ولاحظ أن الأعصاب تنطلق من المخ والحبل الشوكي ثم تتجمع في عقد عصبية ثم ينطلق من العقد العصبية أعصاب إلى أعضاء الجسم المختلفة والأعصاب الباراسمبثاوية تتصل بالمخ والمنطقة العجزية بينما الأعصاب السمبثاوية تتصل بالحبل الشوكي .