

# الملاحق

## الملاحق الأول

### مراجعة في بعض المعلومات الرياضية المفيدة

١ - حول خاصية التجانس في عملية الجمع

لكي نستطيع جمع كميتين أو مقدارين لابد أن تكون وحدة القياس نفسها للمقدارين وجمع 10 سم و 5 م غير ممكن . ولو ادعينا جدلاً أن المجموع الناتج 15 فلا يمكن القول إن ال 15 هذه هي 15 سم ولا 15 م . إذا 15 ماذا؟ في الواقع لا معنى للعدد 15 في هذه الحالة . ولكن لو اتخذنا وحدة قياس مشتركة، وقلنا إن 500 سم = 5 م ، أو 10 سم = 0.1 م، فالجمع يصبح ممكناً، والجواب هو 500 سم + 10 سم = 510 سم، أو 5 م + 0.1 م = 5.1 م . ولو سألت شخصاً، ما مجموع 5 كتب و 7 أقلام؟ فأجاب 12، فإنه سيشعر بالعجز والخطأ عندما تطلب منه تحديد 12 ماذا؟ إذ لا يستطيع أن يقول 12 كتاباً ولا 12 قلماً . وسيعود يدرك أن 5 كتب و 7 أقلام هي 5 كتب و 7 أقلام، ولا يمكن التعبير عنهما في رقم واحد .

وهذه الحقيقة البسيطة هي خاصة أساسية في الجمع بصرف النظر عن طبيعة عملية الجمع . ففي الجبر لا نجمع إلا الحدود المتشابهة . و  $7x^2y$  مضافاً إليها  $7x^2y$  يساوي  $12x^2y$  . تماماً كأننا نقول 5 كتب و 7 كتب تصبح 12 كتاباً . ولكن  $5x^2y$  مضافاً إليها  $7xy$  هي  $7x^2y$  و  $7xy$ ، تماماً كأننا نقول 5 كتب و 7 أقلام، ولا يمكن جمعها في حد واحد، لأنها غير متشابهين . وكذلك الأمر، يمكن جمع  $F(0.5)$  و  $3F(0.5)$

لنجد  $4F(0.5)$ ، حيث  $F(0.5)$  تعني قيمة دالة  $F$  عند النقطة 0.5. ويمكن جمع  $3\sqrt{2}$  و  $5\sqrt{2}$  لنجد  $8\sqrt{2}$  أما  $F(0.5) + 3F(1)$ ، أو  $5\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$ ، فستبقى كل منهما كما وردت دون تغيير.

وتبقى الفكرة نفسها في الكسور العادية (الأعداد النسبية). فمقام الكسر يعني أننا قسمنا الواحد الصحيح إلى عدد من الأجزاء المتساوية يساوي المقام. والبسط يعني أننا أخذنا من هذه الأجزاء عدداً يساوي البسط. و  $3/4$  تعني ثلاثة أرباع. أي قسمنا الواحد الصحيح إلى أربعة أجزاء متساوية وأخذنا منها ثلاثة أجزاء. ومقلوب مقام الكسر يُعتبر بمثابة وحدة قياس أو شيء، والبسط يمثل عدد ما لدينا من هذه الوحدة أو هذا الشيء. و  $9/5$  تعني تسع مرات المقدار  $1/5$  أو تسع أخماس وهكذا... ولجمع كسرين عاديين لابد إذا من توحيد المقامات حتى يصبح الجمع ممكناً ولجمع  $3/4$  و  $9/5$  نحول الكسرين بحيث يكون لهما المقام نفسه. ومن خواص الكسر أو العدد النسبي نعرف أن قيمته لا تتغير إذا ضربنا البسط والمقام بالعدد نفسه، وقيمة  $3/4$  هي نفس قيمة  $15/20$ ، وقيمة  $9/5$  هي نفس قيمة  $36/20$ . إذا

$$\frac{3}{4} + \frac{9}{5} = \frac{15}{20} + \frac{36}{20} = \frac{15 + 36}{20} = \frac{51}{20}$$

لأن  $15/20$  هي 15 مرة الـ  $1/20$ ، و  $36/20$  هي 36 مرة الـ  $1/20$ . ومجموعهما هو  $15 + 36 = 51$  مرة الـ  $1/20$ ، أو  $51/20$ .

ولا توجد مشكلة في ضرب كسرين عاديين فالجواب هو كسر بسطه جداء البسطين ومقامه جداء المقامين.

$$\frac{3}{4} \times \frac{9}{5} = \frac{27}{20}$$

وبصورة عامة:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

وينطبق على الطرح ما ينطبق على الجمع. وطرح عدد  $b$  من عدد  $a$ ، أي  $a - b$ ، هو جمع العدد السالب  $(-b)$  إلى العدد  $a$ ، أي  $a + (-b)$ . (تذكر أننا نقرأ في اللغات

الأجنبية من اليسار إلى اليمين). وكذلك ينطبق على التقسيم ما ينطبق على الضرب. وقسمة  $a$  على  $b$  ما هي إلا ضرب  $a$  بمقلوب  $b$ ،  $a \div b = a \times \frac{1}{b}$ ، ولتقسيم كسر عادي على كسر عادي آخر نضرب الأول في مقلوب الثاني. وهكذا يكون:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

وعلى سبيل المثال:

$$\frac{3}{4} + \frac{9}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36}$$

ولحساب كسر من عدد معين نضرب هذا الكسر بالعدد. ولحساب ثلث الستة،

مثلاً، نضرب  $\frac{1}{3}$  بـ 6 فنجد

$$\frac{1}{3} \times 6 = \frac{1}{3} \times \frac{6}{1} = \frac{6}{3} = 2$$

ولو أردت حساب خمسة أسباع الثلاثين تكتب ببساطة:

$$\frac{5}{7} \times 30 = \frac{5}{7} \times \frac{30}{1} = \frac{150}{7}$$

## ٢- النسب المئوية

يتألف العدد العشري من جزئين، أحدهما صحيح يقع على اليسار من الفاصلة، والآخر عشري يقع على اليمين من الفاصلة. وعلى سبيل المثال، 921.534 فيه جزء صحيح هو 921 وجزء عشري هو 0.534. (تذكر في الكتب الانجليزية وما شابهها أن النقطة مكتوبة بين رقمين تعني فاصلة عشرية، وأنها بين رمزين تعني إشارة ضرب، و  $a \cdot b$  تعني  $a \times b$ ). ولا تتغير قيمة العدد إذا أضفنا مزيداً من الأصفار على اليمين من الجزء العشري، أو على اليسار من الجزء الصحيح،  $921.534 = 0921.534000$  وكما أن للجزء الصحيح منازل (أو مراتب) هي منزلة الآحاد ومنزلة العشرات ومنزلة المئات. . . الخ فكذلك للجزء العشري منازل تبدأ بمنزلة الجزء من عشرة، تليها منزلة الجزء من مائة، تليها منزلة الجزء من ألف، وهكذا. ونلاحظ أن الرقم يختلف مدلوله من منزلة إلى أخرى. فالخمس نكتبها في منزلة الآحاد تعني خمس

مرات الواحد الصحيح، وهي في منزلة العشرات تعني خمس عشرات أي 50، وهي في منزلة المئات تعني خمس مئات أي 500. وكذلك في الجزء العشري، نجد أن للرقم نفسه مدلول يختلف باختلاف المنزلة التي يشغلها. فالخمس بعد الفاصلة مباشرة، أي في منزلة الجزء من عشرة، تعني خمسة أجزاء من عشرة أي  $5/10$ ، وهي في منزلة الجزء من مائة تعني خمسة أجزاء من مائة أي  $5/100$ ، وفي منزلة الجزء من ألف تعني خمسة أجزاء من ألف أي  $5/1000$ ، وهكذا. واصطلاح  $921.534$  يعني  $9 \times 10^2 + 2 \times 10 + 1 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-3}$

$$9 \times 100 + 2 \times 10 + 1 \times 1 + 5 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{100} + 4 \times \frac{1}{1000}$$

ولو أردنا التعبير عن هذا المجموع كلاميا قلنا:

واحد وعشرتان وتسع مئات بالإضافة إلى خمسة أعشار وثلاثة أجزاء من مائة وأربعة أجزاء من ألف. وبالطبع سيكون من الأسر بكثير أن نصلح على القول تسعمائة وواحد وعشرون فاصلة خمسمائة وأربع وثلاثون، ونكتب 921.534.

ونلاحظ أيضا أن كل منزلة في العدد العشري هي عشرة أمثال تلك التي تقع إلى اليمين منها مباشرة. فالمائة هي عشر عشرات، والعشرة عشر وحدات، والواحد عشرة أجزاء من عشرة، والجزء من عشرة هو عشرة أجزاء من مائة، وهكذا. ولذلك يطلق على هذا النظام في التقييم اسم «النظام العشري». وهذا يوضح أن ضرب عدد على شكل كسر عشري بمضاعفات العشرة، أو قسمته على مضاعفات العشرة، لا يحتاج إلا إلى إزاحة الفاصلة في اتجاه اليمين عند الضرب، أو في اتجاه اليسار عند القسمة، عددا من المنازل يساوي عدد الأصفار في مضاعف العشرة. وعلى سبيل المثال لضرب 20.604 بعشرة نأخذ الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين فنجد 206.04؛ ولقسمته على عشرة نأخذ الفاصلة منزلة واحدة إلى اليسار فنجد 2.0604. وفي الحالة الأولى أصبح كل جزء من عشرة واحدا ( $1/10 \times 10 = 1$ ) أي أن منزلة الجزء من عشرة أصبحت هي منزلة الآحاد، ولذلك أرحنا الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين. وفي الحالة الثانية أصبح كل واحد صحيح جزءا من عشرة ( $1/10 = 1/10 + 1$ )، أي أن منزلة الآحاد أصبحت منزلة الجزء من عشرة، ولذلك أرحنا الفاصلة منزلة واحدة إلى اليسار. وكقاعدة عامة، عند الضرب بـ

$10^n$  نأخذ الفاصلة إلى اليمين  $n$  منزلة، وعند القسمة على  $10^n$  (أي الضرب بـ  $10^{-n}$ ) نأخذ الفاصلة إلى اليسار  $n$  منزلة.

والآن كيف نعبر عن عدد عشري في شكل نسبة مئوية؟

النسبة المئوية تعني النسبة إلى مائة، أي عدد نسبي مقامه يساوي 100. وخمسون في المائة تعني  $50/100$ ، وخمس وستون بالمائة تعني  $65/100$ ، ونصف المائة تعني  $50/100$ . وللتعبير عن عدد عشري في صيغة نسبة مئوية نضرب العدد العشري بمائة فنحصل على العدد المطلوب، ونضيف إلى قراءته عندئذ كلمتي «في المائة».

مثال (١)

عبر عن الأعداد التالية في شكل نسبة مئوية:

0.3254 ، 21.3 ، 0.003 ، 0.052 ، 0.05 ، 1.21 ، 0.3 ، 0.75

الحل

الأجوبة المطلوبة هي على الترتيب: 75 في المائة؛ 30 بالمائة؛ 121 في المائة؛ 5 في المائة؛ 5.2 في المائة (ونقرؤها خمس واثنتان من عشرة في المائة)؛ 0.03 في المائة (ونقرؤها ثلاثة من مائة في المائة)؛ 2130 في المائة، 32.54 في المائة (ونقرؤها اثنتان وثلاثون وأربع وخمسون من المائة في المائة).

ولجمع الأعداد العشرية نرتب المنازل المتشابهة تحت بعضها تماما. وبالتالي تقع الفواصل تحت بعضها البعض تماما. ثم نجمع جمعا عاديا ونضع الفاصلة عندما نصل إلى موقع الفاصلة.

٣- التناسب

إذا كانت المقادير  $a, b, c, d$  بحيث يكون

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

قلنا إنها متناسبة. وتسمى العلاقة بينها تناسباً طرفاً  $a$  و  $d$  ووسطاً  $c$  و  $b$ . ومن أهم خواص التناسب:

أ-  $a \times d = b \times c$  (جداء الطرفين = جداء الوسطين).

$$\text{ب- } \frac{a}{a \pm b} = \frac{c}{d \pm c}$$

$$\text{ج- } \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$$

$$\text{د- } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

مثال (٢)

الأعداد 2، 3، 4، 6 متناسبة. اكتب التناسب وتحقق من الخواص المذكورة أعلاه.

الحل

الأول والرابع هما الطرفان والثاني والثالث (الواردين في الوسط) هما الوسطان.

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

ومن الواضح أن

$$\text{أ- } 2 \times 6 = 3 \times 4$$

$$\text{ب- } \frac{2}{2+3} = \frac{4}{4+6}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$$

و

$$\frac{2}{3-2} = \frac{4}{6-4}$$

$$\frac{2}{1} = \frac{4}{2}$$

$$\frac{2+3}{3} = \frac{4+6}{6}$$

ج-

$$\frac{5}{3} = \frac{10}{6}$$

$$\frac{2-3}{3} = \frac{4-6}{6} \quad \text{و}$$

$$-\frac{1}{3} = -\frac{2}{6}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2+4}{3+6} = \frac{6}{9} \quad \text{-د}$$

مثال (٣)

صندوق يتضمن 5 كرات سود، و 6 كرات بيض. ما نسبة الكرات السود إلى الكرات البيض؟ وما نسبة الكرات البيض في الصندوق؟

الحل

نسبة الكرات السود إلى الكرات البيض هي  $5/6$ .

نسبة الكرات البيض في الصندوق هي نسبة عدد الكرات البيض إلى مجموع عدد الكرات في الصندوق أي

$$\frac{5}{5+6} = \frac{5}{11}$$

مثال (٤)

في صندوق 15 كرة بعضها أبيض والآخر أسود. إذا كانت الكرات تتوزع بين اللونين الأبيض والأسود بنسبة 2:1 فاحسب عدد الكرات من كل لون.

الحل

مجموع الحصص  $1+2=3$

ويكون  $1/3$  الكرات أبيض و  $2/3$  الكرات أسود.

$$15 \times 1/3 = 5 \quad = \text{عدد الكرات البيض}$$

$$15 \times 2/3 = 10 \quad = \text{عدد الكرات السود}$$

## مثال (٥)

قسمنا ستة آلاف ريال بين ثلاثة أشخاص بنسبة 1:3:2 فما هي حصة كل منهم؟

## الحل

$$\text{مجموع الحصص} = 1+3+2=6$$

$$\text{مقدار الحصة الواحدة} = 6000/6 = 1000$$

$$\text{وتكون حصة الأول} = 2000 \times 2 = 2000 \text{ ريال}$$

$$\text{حصة الثاني} = 1000 \times 3 = 3000 \text{ ريال}$$

$$\text{حصة الثالث} = 1000 \times 1 = 1000 \text{ ريال.}$$

أو نقول إن حصة الأول تشكل  $2/6$  من المبلغ وحصة الثاني  $3/6$  من المبلغ وحصة الثالث  $1/6$  من المبلغ. أي أن:

$$\text{حصة الأول} = 6000 \times 2/6 = 2000 \text{ ريال}$$

$$\text{حصة الثاني} = 6000 \times 3/6 = 3000 \text{ ريال}$$

$$\text{حصة الثالث} = 6000 \times 1/6 = 1000 \text{ ريال}$$

## ٤ - العمليات الأساسية في المجموعات وقانون دي مورغان

## الاحتواء

نقول إن المجموعة  $A$  محتواة في المجموعة  $B$ ، ونكتب  $A \subset B$ ، إذا كان كل عنصر ينتمي إلى  $A$  ينتمي أيضا إلى  $B$ .

وفي حال وجود عنصر واحد على الأقل ينتمي إلى  $B$  ولا ينتمي إلى  $A$  نسمي  $A$  مجموعة جزئية فعلية من  $B$ . ومن الواضح أن كل مجموعة محتواة في نفسها، ونرمز لهذه الحقيقة بكتابة  $A \subseteq A$ .



## المجموعتان المتساويتان

نقول إن المجموعتين  $A$  و  $B$  متساويتان إذا كانت  $A \subset B$  و  $B \subset A$ . الشرط الأول  $A \subset B$  يقتضي أن كل عنصر ينتمي إلى  $A$  ينتمي أيضا إلى  $B$ ، والشرط الثاني  $B \subset A$  يقتضي أن كل عنصر ينتمي إلى  $B$  ينتمي أيضا إلى  $A$ . وهذا يعني بوضوح تطابق عناصر المجموعتين.

## اتحاد مجموعتين

اتحاد مجموعتين  $A$ ،  $B$  هو مجموعة تتضمن كافة العناصر التي تنتمي إلى واحدة منهما على الأقل. ونرمز له بـ  $A \cup B$ .

## تقاطع مجموعتين

تقاطع مجموعتين  $A$ ،  $B$  هو مجموعة تتضمن كافة العناصر التي تنتمي إليهما معا. ونرمز له بـ  $A \cap B$ .

ومن الواضح أنه يمكن التعبير عن انتهاء عنصر إلى  $A \cup B$  بقولنا إنه ينتمي إلى  $A$  أو  $B$ . ويمكن التعبير عن انتهاء عنصر إلى  $A \cap B$  بقولنا إنه ينتمي إلى  $A$  و  $B$  وإذا لم يكن هناك أي عنصر مشترك بين  $A$  و  $B$  كان تقاطعهما خاليا. ونرمز للمجموعة الخالية بـ  $\emptyset$ . ومن الواضح أن المجموعة الخالية  $\emptyset$  محتواة في أي مجموعة أخرى ( $\emptyset \subset A$  حيث  $A$  أي مجموعة غير خالية).

## المجموعتان المنفصلتان

إذا كان تقاطع المجموعتين  $A$ ،  $B$  خاليا، أي  $A \cap B = \emptyset$ ، قلنا إن المجموعتين منفصلتان.

## الفرق بين مجموعتين

الفرق بين مجموعتين  $A$ ،  $B$ ، ونرمز له بـ  $A - B$  (أو  $A/B$ ) هو مجموعة تتضمن كافة العناصر التي تنتمي إلى  $A$  ولا تنتمي إلى  $B$ .

## مكملة مجموعة

مكملة مجموعة  $A$  هي مجموعة تتضمن كافة عناصر المجموعة الشاملة التي لا تنتمي إلى  $A$ . ونرمز لها بـ  $\bar{A}$  (أو  $A^c$ ).

ومن الواضح أن  $\bar{\bar{A}}$  تشكل نفي  $A$ . ولذلك نقرؤها أحيانا «ليس  $A$ ». ومكملة مجموعة  $A$  ليست إلا الفرق بين المجموعة الشاملة، ولنرمز لها بـ  $S$ ، وبين  $A$ ، أي أن  $A = S - A$ . وهذا بالإضافة إلى نص التعريف (٢-٥-٧) يوضحان أنه يمكن التعبير عن الفرق بين مجموعتين  $A$ ،  $B$  كتقاطع بين  $A$  ومكملة  $B$ . وهكذا نكتب:

$$A - B = A \cap \bar{B}$$

## قانون دي مورغان

ومن الخواص المهمة لعمليتي الاتحاد والتقاطع أن كلا منهما تتوزع على الأخرى بمعنى أن:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

و

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

وأن

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

و

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

وتسمى العلاقتان الأخيرتان «قانوني دي مورغان». وتقول الأولى منهما إن مكملة اتحاد مجموعتين هي تقاطع مكملتيهما. وتقول الثانية إن مكملة تقاطع مجموعتين هي اتحاد مكملتيهما. وتسهيلا لحفظ هاتين العلاقتين نلاحظ أنه للانتقال من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن في كل منهما تتبع القاعدة التالية:

نقلب اتجاه الرمز الفاصل بين المجموعتين (إذا كانت الفتحة إلى الأعلى تصبح إلى الأسفل والعكس) ثم نستعيض عن كل مجموعة بمكملتها.

مثال (٦)

لتكن المجموعة الشاملة مجموعة الحروف في الكلمات أبجد، هوز، حطي .

ولنرمز لها بـ  $S$ . ولتكن  $A = \{أ، ب، ه، د، ط\}$

$B = \{أ، ه، ز، ج، ط، ي\}$

$S = \{أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي\}$

(i) هل  $A$  محتواة في  $B$ ؟

(ii) اكتب  $\bar{B}$ ،  $\bar{A}$ ،  $B-A$ ،  $A-B$ ،  $A \cap B$ ،  $A \cup B$

(iii) اكتب  $A \cap \bar{B}$  وقارنها مع  $A-B$ ، واكتب  $B \cap \bar{A}$  وقارنها مع  $B-A$ .

(iv) لتعرف المجموعة  $C = \{أ، و\}$ . تحقق من قانوني التوزيع.

(v) اكتب  $\overline{A \cup B}$ ،  $\overline{A \cap B}$ ،  $\overline{A \cap B}$ ،  $\overline{A \cup B}$ ، ثم تحقق من صحة قانوني دي مورغان.

الحل

(i)  $A$  غير محتواة في  $B$  لوجود عنصر  $D$  ينتمي إلى  $A$  ولكنه لا ينتمي إلى  $B$ .

$D \in A$  ولكن  $D \notin B$

(ii)  $A \cup B = \{أ، ب، ه، د، ط، ز، ج، ي\}$

لكتابة اتحاد  $A$ ،  $B$  نكتب عناصر  $A$  ثم نضيف إليها عناصر  $B$  ما لم تكن ذكرت سابقا، لأنه عند التعبير عن مجموعة، لا نكرر ذكر أي عنصر من عناصرها.

$A \cap B = \{أ، ه، ط\}$

ولكتابة تقاطع  $A$ ،  $B$  نستعرض عناصر  $A$  واحدا فآخر ونضع في  $A \cap B$  ما نجده

منها واردا في  $B$ .

$A - B = \{د، ب\}$

وللحصول على  $A - B$  نلغي من عناصر  $A$  كل ما كان منها مشتركا مع  $B$ . وبصورة

مماثلة نجد:

$B - A = \{ز، ج، ي\}$

$$\bar{A} = S - A = \{أ، ب، هـ، د، ط\} - \{أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي\} \\ = \{ج، و، ز، ح، ي\}$$

ولكتابة  $\bar{A}$  نلغي عناصر  $A$  من المجموعة الشاملة ونأخذ كل ما تبقى منها.  
وبصورة مماثلة نجد:

$$\bar{B} = \{ب، د، و، ح\}$$

(iii)

$$A \cap \bar{B} = \{ب، د\} = A - B$$

$$B \cap \bar{A} = \{ز، ج، ي\} = B - A$$

(iv) نحسب الطرف الأيمن فنجد

$$B \cup C = \{أ، هـ، ز، ج، ط، ي، و\}$$

$$A \cap (B \cup C) = \{أ، ب، هـ، د، ط\} \cap \{أ، هـ، ز، ج، ط، ي، و\} \\ = \{أ، هـ، ط\}$$

نحسب الطرف الأيسر فنجد

$$A \cap C = \{أ\}$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{أ، هـ، ط\}$$

وهو يساوي الطرف الأيمن.

(v) بالعودة إلى النتائج في ب نجد:

$$\overline{A \cup B} = \{أ، ب، هـ، د، ط، ز، ج، ي\}^c = \{و، ح\}$$

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \{ج، و، ز، ح، ي\} \cap \{ب، د، و، ح\} = \{و، ح\} = (A \cup B)^c$$

مما يحقق قانون دي مورغان الأول.  
ولدينا أيضا:

$$\overline{A \cap B} = \{أ، هـ، ط\}^c = \{ب، ج، د، و، ز، ح، ي\}$$

و

$$\bar{A} \cup \bar{B} = \{ج، و، ز، ح، ي\} \cup \{ب، د، و، ح\}$$

$$\bar{A} \cup \bar{B} = \{ب، د، و، ح، ج، ز، ي\} = \overline{A \cap B}$$

مما يحقق قانون دي مورغان الثاني.

## حاصل الضرب الديكارتي

الحاصل الديكارتي لمجموعتين  $A$ ،  $B$  هو مجموعة كل الأزواج المرتبة التي يمكن تشكيلها بأخذ العنصر الأول من  $A$  والعنصر الثاني من  $B$ . ونرمز له عادة بـ  $A \times B$ .

مثال (٧)

لدينا  $A = \{a, b, c\}$ ،  $B = \{1, 2, 3\}$ . اكتب الحاصل الديكارتي  $A \times B$ .


الحل

$$A \times B = \{(a,1), (a,2), (a,3), (b,1), (b,2), (b,3), (c,1), (c,2), (c,3)\}$$

ونلاحظ أنه إذا كان عدد عناصر  $A$  مساويا  $n$  وعدد عناصر  $B$  مساويا  $m$  فإن عدد عناصر الحاصل الديكارتي  $A \times B$  يساوي  $n \times m$ . ويمكن تمثيل كل زوج مرتب بنقطة في المستوى الاحداثي، حيث يشكل العنصر الأول من الزوج المرتب الاحداثي السيني للنقطة ويمثل العنصر الثاني الاحداثي الصادي لها. ونحصل عندئذ على ما يسمى «بيان الحاصل الديكارتي».

مثال (٨)

ارسم بيان الحاصل الديكارتي للمجموعتين  $A$ ،  $B$  في المثال (٧).



شكل (١): بيان الحاصل الديكارتي  $A \times B$ .

## ٥ - التطبيق والصورة العكسية

## تعريف التطبيق

التطبيق  $f$  المعروف على مجموعة  $A$  إلى مجموعة  $B$  هو توافق يقابل بموجبه كل عنصر من  $A$  عنصر واحد وواحد فقط من  $B$ . ونكتب رمزياً

$$A \xrightarrow{f} B$$

وتسمى المجموعة  $A$  مجال التطبيق (أو ساحة التطبيق) وتسمى المجموعة  $B$  المجال المصاحب. ونكتب  $f(a) = b$  للدلالة على أن العنصر  $a$  من المجال  $A$  يوافق العنصر  $b$  من المجال المصاحب  $B$ . ونقول إن  $b$  هو صورة  $a$  وفق التطبيق  $f$ .

(٩) مثال

في المثال (٧) عرف تطبيق  $f_1, f_2$  على  $A$  إلى  $B$ .

## الحل

أي قاعدة توافق يقترن بموجبه كل عنصر من  $A$  بعنصر واحد من  $B$  تشكل

تطبيقاً. وعلى سبيل المثال يمكننا تعريف  $f_1$  كما يلي:

$$f_1 = \{(a,2), (b,1), (c,3)\}$$

وتقول قاعدة التوافق أو التطبيق الذي رمزنا له بـ  $f_1$  إن العنصر  $a$  من  $A$  يقابله أو

يوافقه العنصر 2 من  $B$ ؛ والعنصر  $b$  من  $A$  يوافقه العنصر 1 من  $B$ ؛ وأخيراً يوافق العنصر  $c$

من  $A$  العنصر 3 من  $B$ . أو أن صورة  $a$  وفق  $f_1$  هي 2 وصورة  $b$  هي 1 وصورة  $c$  هي 3.

ويمكن تعريف تطبيق آخر  $f_2$  كما يلي:


$$f_2 = \{(a,1), (b,2), (c,2)\}$$

ونلاحظ أن شرطي التعريف محققان. فلكل من عناصر  $A$  الثلاثة عنصر مقابل

واحد من  $B$ . هنا  $a$  يقابله 1؛ و  $b$  يقابله 2؛ و  $c$  يقابله 2 أيضاً. أي أن 1 هي صورة لـ  $a$

و 2 صورة لكل من  $b$  و  $c$ . أما 3 فليست صورة لأي عنصر من  $A$ .

ويمكن توضيح التطبيق بمخطط سهمي ينطلق فيه من كل عنصر من المجال سهم واحد ينتهي بالعنصر المقابل (بصورته) من المجال المصاحب. وفي الشكل (٢) نجد المخطط السهمي لكل من  $f_1$  و  $f_2$  في المثال (٥).



وتجدر ملاحظة أن التطبيق هو مجموعة من الأزواج المرتبة التي لا يتكرر فيها أبدا العنصر الأول. وتشكل العناصر الأولى مجتمعة مجموعة المجال دون زيادة أو نقصان. وعلى المخطط السهمي نقول إنه ينطلق من كل عنصر من عناصر المجال سهم واحد وواحد فقط.

### تعريف الصورة العكسية

الصورة العكسية لعنصر  $d$ ، مثلا، من المجال المصاحب، هي مجموعة عناصر المجال التي صورتها وفق  $f$  هي  $d$ . (أي مجموعة عناصر المجال التي انطلق منها سهم إلى  $d$ ) ونرمز لها بـ  $f^{-1}(d)$ .

مثال (١٠)

في المثال السابق اكتب الصورة العكسية لكل عنصر من عناصر  $B$  وفق  $f_1^{-1}$  ووفق  $f_2^{-1}$ .

الحل

$$f_1^{-1}(3) = c, f_1^{-1}(2) = a, f_1^{-1}(1) = b$$

ونلاحظ أن  $f_1^{-1}$  يمثل بدوره تطبيقاً من  $B$  إلى  $A$  يسمى التطبيق المعاكس. ولا يصح هذا إلا عندما يكون  $f$  تقابلاً. أي الحالة التي يكون فيها كل عنصر من  $B$  صورة لعنصر واحد وواحد فقط من  $A$  وبصورة مماثلة نجد أن

$$f_2^{-1}(2) = \{b, c\}, f_2^{-1}(1) = a$$

ونلاحظ أن الصورة العكسية للعنصر 2 من  $B$  هو مجموعة مؤلفة من عنصرين  $b, c$  من عناصر  $A$  ذلك لأن 2 هي صورة لكل من  $b$  و  $c$  وفق  $f_2$ . أما  $f_2^{-1}(3)$  فهي خالية ونكتب  $f_2^{-1}(3) = \phi$ ، ولا يمثل  $f_2^{-1}$  تطبيقاً لأنه لا يحقق شرطي التعريف، إذ يقابل العنصر 2 من  $B$  عنصران من  $A$  هي  $b$  و  $c$ ، وكذلك لا صورة للعنصر 3 من  $B$ .

### تعريف الدالة العددية

إذا عُرف تطبيق  $f$  من مجموعة جزئية من  $R$ ، مجموعة الأعداد الحقيقية، إلى مجموعة جزئية أخرى منها، فإننا نسمي مثل هذا التطبيق دالة عددية ذات متغير حقيقي. وكثيراً ما نهمل عند تعريف دالة عددية، المجال والمجال المصاحب، ونعطي فقط قاعدة الربط بشكل علاقة رياضية،  $y = f(x)$ ، ونعتبر في هذه الحالة أن مجال الدالة هو أوسع مجموعة جزئية من  $R$  يمكننا أن نُجري عليها العمليات الداخلة في القاعدة  $f$ . ويسمى المجال في هذه الحالة مجموعة التعريف أو ساحة التعريف ويسمى المجال المصاحب مدى الدالة.

### ٦- رمز المجموع $\Sigma$ وخواصه

تستخدم العلوم الرياضية ومختلف العلوم التجريبية الرموز للدلالة على مقادير أو مسميات وأشياء من طبائع مختلفة. فمثلاً نرمز لمقدار أو لقياس عددي بـ  $x$ ، ونرمز لمجموعة بـ  $A$ . ونرمز لعنصر من مجموعة بـ  $a$ ، الخ. وفي بحث أو دراسة معينة ينبغي أن نستخدم رموزاً مختلفة للدلالة على قياسات أو أشياء مختلفة، وذلك تجنباً للالتباس. وفي دراسة فيزيائية، مثلاً، لو رمزنا لشدة التيار بـ  $x$ ، فيجب المحافظة على هذا الرمز في الدراسة بأكملها. وحيثما وردت  $x$  ضمن هذه الدراسة فإنها تعني شدة التيار. وقد



نحتاج في دراسة واحدة إلى عدد هائل من الرموز، وربما ما لا نهاية له من الرموز، ولا يمكن لحروف أبجدية أو حروف مختلف الأبجديات المعروفة في العالم أن تفي بالحاجة. ولذلك نلجأ إلى استخدام الحرف نفسه  $x$ ، مثلا، عددا هائلا من المرات دون أن نقع في التباس، وذلك بإضافة دليل رقمي تحت الحرف، فنكتب  $x_1$  و  $x_2$ ، مثلا، كرمزين مختلفين. ومع أننا استخدمنا هنا الحرف الأبجدي نفسه، إلا أننا ميزنا بين  $x$  وآخر بالدليل 1 ملحقا بالأول وبدليل آخر ملحقا بالثاني ونقرؤه  $x$  واحد،  $x$  اثنان، الخ. ويفتح لنا استخدام الحرف مع دليل رقمي ملحق به آفاقا واسعة، بحيث يمكن استخدام الحرف  $x$  نفسه عددا لانهاثيا من المرات، لنكتب، مثلا، المتوالية اللانهائية من المقادير:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

يسمى  $x_n$  الحد العام للمتوالية. وعندما يتغير  $n$  متخذنا عناصر مجموعة الأعداد الطبيعية  $\{1, 2, 3, \dots\}$ ، كقيم له نحصل على متوالية لانهاثية من المقادير لكل منها رمز مختلف. ولم نستخدم فيها إلا حرفا واحدا من حروف الأبجدية هو  $x$ . ويمكن أن نكتب متوالية أخرى

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$$

ومتوالية أخرى

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

وهكذا.

لنفرض الآن أننا نريد التعبير عن مجموع ستة مقادير هي  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ ، فمن الطبيعي كتابة:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

وستتفق الآن على التعبير عن هذا المجموع بصورة مختصرة فنكتب:

$$\sum_{i=1}^6 x_i$$

ونقرؤها «مجموع  $x_i$  من  $i=1$  إلى  $i=6$ ». ونستخدم هنا الحرف اليوناني الكبير  $\Sigma$ ، ويسمى «سيجما»، ليبدل على كلمة «مجموع». والدليل  $i$  يسمى «متغير الجمع» وهو

يتغير هنا من  $i=1$  إلى  $i=6$  . ويسمى  $x_i$  «الحد العام» . وللحصول على الحد الأول في المجموع نضع  $i=1$  في الحد العام، وفي الحد الثاني نضع  $i=2$  . وهكذا . وتفصل بين الحدود المختلفة إشارة + بالطبع مادامنا نعبر عن مجموع عدد من المقادير .

مثال (١١)

أ- اكتب بالتفصيل ما تعنيه الرموز:

$$\sum_{i=1}^3 i x_i^i , \quad \sum_{j=1}^4 j(j-1) , \quad \sum_{i=1}^3 i(y_i-1) , \quad \sum_{i=1}^5 x^i$$

ب- استخدم إشارة المجموع  $\sum$  للتعبير عن كل من الجاميع التالية:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4 + x_5 y_5$$

الحل  
أ-

$$\sum_{i=1}^5 x^i = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 ,$$

$$\sum_{i=1}^3 i(y_i-1) = (y_1-1) + 2(y_2-1) + 3(y_3-1)$$

$$\sum_{j=1}^4 j(j-1) = 1(1-1) + 2(2-1) + 3(3-1) + 4(4-1) ,$$

$$\sum_{i=1}^3 i x_i^i = x_1 + 2x_2^2 + 3x_3^3$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i , \quad \sum_{i=1}^5 y^i , \quad \sum_{i=1}^4 x_i \quad \text{ب-}$$

وتنبغي ملاحظة أن الشيء الوحيد من عبارة الحد العام الذي يتغير من حد إلى آخر من حدود المجموع هو متغير الجمع  $i$  . وبهذا المعنى يمكن اعتبار أي كمية لا

تتضمن متغير الجمع في حكم الثابتة. ويمكن أن يرد متغير الجمع دليلاً أو معاملاً أو قوة أو مقداراً قائماً بذاته الخ.

خواص رمز المجموع  $\Sigma$   
الخاصة الأولى

$$\sum_{i=1}^n cx_i = c \sum_{i=1}^n x_i$$

وهو واضح من كون:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n cx_i &= cx_1 + cx_2 + \dots + cx_n \\ &= c(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \\ &= c \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

الخاصة الثانية

$$\sum_{i=1}^n (x_i + y_i + z_i) = \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n z_i$$

وهو واضح أيضاً من الخاصتين التبادلية والتجميعية لعملية جمع الأعداد الحقيقية. فلدينا

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i + z_i) &= (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) + \dots + (x_n + y_n + z_n) \\ &= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (y_1 + y_2 + \dots + y_n) + (z_1 + z_2 + \dots + z_n) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n z_i \end{aligned}$$

الخاصة الثالثة

$$\sum_{i=1}^n c = nc$$

وهذا واضح من حقيقة أن الحد العام  $c$  لا يتضمن متغير الجمع  $i$ ، فهو ثابت من حد إلى آخر. أي أن:

$$\sum_{i=1}^n c = \underbrace{c + c + \dots + c}_{\text{مرة } n} = nc$$

مثال (١٢)

تطبيقا لخواص الرمز  $\sum$  يمكن كتابة ما يلي :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i + c)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 + 2cx_i + c^2) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n 2cx_i + \sum_{i=1}^n c^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2c \sum_{i=1}^n x_i + nc^2 . \end{aligned}$$


ونجد أيضا :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - 3y_i)^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 6x_i y_i + 9y_i^2) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n 6x_i y_i + 9 \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 6 \sum_{i=1}^n x_i y_i + 9 \sum_{i=1}^n y_i^2 \end{aligned}$$

## ٧ - محور الأعداد الحقيقية - الانسحاب وتغيير سلم القياس

يمكن تمثيل الأعداد كنقاط على مستقيم موجه نسميه محورا . ولهذا الغرض نرسم مستقيما كما في الشكل (٣) ، نتخذ عليه اتجاهها موجبا إلى اليمين ، ثم نحدد عليه نقطة تدعى عادة مبدأ الفصول ، وتقابل العدد «صفر» وتقع الأعداد الموجبة إلى اليمين من مبدأ الفصول والأعداد السالبة إلى اليسار منه . ومع تبني طول معين ليمثل وحدة قياس (الستمر، مثلا، كما في الشكل (٣)) تصبح كل نقطة من المحور ممثلة لعدد حقيقي واحد هو عدد وحدات القياس التي تفصل بينها وبين مبدأ الفصول مسبقا بإشارة موجبة إذا كانت النقطة إلى اليمين من مبدأ الفصول . أما إذا وقعت النقطة إلى اليسار

من مبدأ الفصول فالعدد الحقيقي الذي تمثله هو عدد وحدات القياس الفاصلة بينها وبين المبدأ مسبقاً بإشارة سالبة. وبالعكس كل عدد حقيقي تقابله نقطة واحدة على هذا المحور. وبذلك نستكمل تمثيل مجموعة الأعداد الحقيقية هندسياً، ويسمى المحور المدرج الناتج محور الأعداد الحقيقية. ونلاحظ أن تحديد المحور، في الشكل (٣)، كمحور للأعداد الحقيقية قد استُكمل بعد تحديد اتجاه عليه واتخاذ نقطة من نقاطه كمبدأ للفصول وتبني السمت كوحدة للقياس.



شكل (٣): محور الأعداد الحقيقية

ولو أننا أضفنا إلى كل عدد المقدار 2 فإن النقطة التي تمثل العدد «صفر»، أي تشكل مبدأ الفصول في الشكل (٣)، ستصبح ممثلة للعدد 2، والنقطة التي تمثل العدد -2 ستصبح ممثلة للعدد «صفر»، أي مبدأ الفصول الجديد، والنقطة التي تمثل العدد 4 ستصبح ممثلة للعدد 6، وهكذا... ويبدو بوضوح أن هذا التغيير في تمثيل النقاط للأعداد يكافئ تماماً انسحاباً إلى اليمين بمقدار وحدتي قياس. فكأن النقطة -2 قد زحفت لتحتل موقع نقطة الأصل. وفي المقابل، لو طرحنا من كل عدد المقدار 2 (أي أضفنا إلى كل عدد -2) فإن النقطة التي كانت تمثل العدد 2 ستصبح الآن ممثلة للعدد «صفر» (نقطة الأصل)، والنقطة التي كانت تمثل الصفر (نقطة الأصل) ستصبح ممثلة للعدد -2، وقس على ذلك. وهذه التغييرات في تمثيل النقاط للأعداد تكافئ تماماً انسحاباً إلى اليسار بمقدار 2.

وبصورة عامة، نقول إن إضافة أو طرح عدد ثابت  $b$ ، مثلاً، إلى كل عدد يكافئ انسحاب التدرج بكامله مسافة  $b$  وحدة قياس إلى اليمين، إذا كان  $b$  موجباً، ومسافة  $b$  - وحدة قياس إلى اليسار إذا كان  $b$  سالباً. وإن إضافة أو طرح عدد ثابت تبدو وكأنها تغيير في اختيار نقطة الأصل.

لنفرض الآن أن لدينا مجموعة من القياسات (2, 3, 4, 5) فهي تحتل مواقع معينة على محور الأعداد في الشكل (٣)، ولو أضفنا إلى كل منها العدد 4 فإنها ستصبح

(6, 7, 8, 9) وتحتل مواقع جديدة في الشكل (٣) هي المواقع الناتجة عن انسحاب المواقع الأساسية بمقدار 4 وحدات قياس إلى اليمين . وإضافة العدد 4 - (أي طرح العدد 4) إلى كل منها يؤدي إلى انسحابها يسارا بمقدار 4. ونلاحظ أن المواقع النسبية للقياسات الأربعة من بعضها البعض لم تتغير بعد عملية الانسحاب .

لنضرب الآن كل عدد بالمقدار 2، مثلاً ، فالنقطة التي تمثل العدد صفر ستبقى في مكانها بدون تغيير، ولكن النقطة التي كانت تمثل العدد 2 ستصبح الآن ممثلة للعدد 4، والنقطة التي تمثل 4 - ستصبح الآن ممثلة للعدد 8 -، وهكذا . . . وهذه التغييرات في تمثيل النقاط للأعداد هي بالضبط ما سنحصل عليه لو أننا غيرنا وحدة القياس من الستمتر إلى نصف الستمتر (أي ضربنا وحدة القياس بـ  $1/2$ ). إذ لو اتخذنا نصف الستمتر وحدة لقياس المسافة في الشكل (٣) لكانت النقطة التي تمثل العدد 1 حالياً ممثلة للعدد 2، ولكانت النقطة الممثلة للعدد 3 - حالياً ممثلة للعدد 6 -، وهكذا . . . وفي المقابل لو أننا قسمنا كل عدد على 2 (أي ضربنا كل عدد بـ  $1/2$ ) فإن النقطة التي كانت تمثل العدد 2 ستصبح الآن ممثلة للعدد 1، والنقطة التي كانت تمثل العدد 4 - ستصبح الآن ممثلة للعدد 2 -، وهكذا . . . وهذه التغييرات في تمثيل النقاط للأعداد تكافئ تماماً ما سنحصل عليه لو أننا غيرنا وحدة القياس إلى 2 ستمتر بدلاً من الستمتر الواحد (أي ضربنا وحدة القياس بـ 2). وفي الحالتين نقول إننا غيرنا سلم القياس .

وبصورة عامة، نقول إن ضرب كل عدد بمقدار ثابت موجب  $a$  يكافئ تغيير سلم القياس بضرب وحدة القياس بـ  $1/a$  (تصغيراً لها إذا كان  $a$  أكبر من الواحد وتكبيراً لها إذا كان  $a$  أصغر من الواحد). وتسمى عملية الضرب بعدد موجب عملية تغيير في سلم القياس .

لنعد إلى مجموعة القياسات {2, 3, 4, 5} فإذا ضربنا كلا منها بـ 2 فإنها ستحتل مواقع جديدة هي النقاط المقابلة لـ {4, 6, 8, 10} وتجدر ملاحظة أن المواقع النسبية للقياسات الأربعة بعضها من بعض قد تغيرت الآن . فتغيير سلم القياس يغير من المواقع النسبية لجملة من القياسات بعضها من بعض، ولكن عملية الانسحاب لا تؤثر في تلك المواقع النسبية .

ولو افترضنا الآن أن الرمز  $x$  يمثل عددا دارجا على محور الأعداد فإن إجراء التحويل من  $x$  إلى  $y$  وفق العلاقة:

$$y = x + b$$

هو تعبير جبري عن عملية انسحاب بمقدار  $b$  . وإجراء التحويل من  $x$  إلى  $y$  وفق العلاقة:

$$y = ax$$

هو تعبير جبري عن عملية تغيير في سلم القياس . ومن الواضح الآن أن إجراء تحويل من  $x$  إلى  $y$  وفق العلاقة:

$$y = ax + b$$

تعني القيام بعملية تغيير في سلم القياس (الضرب بمقدار  $a$ ) ثم القيام بعملية انسحاب للنقاط الناتجة بمقدار  $b$ .

مثال (١٣)

لدينا الأعداد

$$9200, 8200, 7200, 6200, 5200, 4200, 3200, 2200, 1200$$

إذا حولنا وفقا للعلاقة:

$$y = \frac{x - 5100}{1000} = \frac{1}{1000} x - \frac{5200}{1000} = 0.001 x - 5.2$$

فإن الأعداد المعطاة تتغير، على الترتيب، إلى:

$$4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4$$

مثال (١٤)

لدينا الأعداد

$$0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017$$

إذا حولنا وفقا للعلاقة:

$$y = 1000x - 14$$

فإن الأعداد المعطاة تتغير، على الترتيب، إلى:

$$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

## ٨- أنواع القياسات

يتعامل الإنسان مع ثلاثة أنواع من المتغيرات . وسنصطلح ، بصورة عامة ، على تسمية القيم التي يفترضها متغير «قياسا» . ومجموعة من القياسات هي ، على وجه العموم ، مجموعة من القيم لمتغير أو أكثر.

والنوع الأول من المتغيرات هو المتغير الوصفي ، وهو متغير يصنف جملة من العناصر وفق صفات محددة ، كأن نصنف السكان في مدينة الرياض وفقا للصفات التالية :

سعودي ، عربي غير سعودي ، غير عربي

والمتغير هنا هو متغير الجنسية وهذه الصفات الثلاث هي قيمه الممكنة ، إذ يأخذ بالنسبة لكل فرد يسكن الرياض واحدة وواحدة فقط من هذه القيم الثلاث (هنا الصفات الثلاث) . وإذا رمزنا لهذا المتغير بالرمز  $x$  ، واقتفينا جنسية شخص يسكن الرياض فوجدناه «غير عربي» قلنا إن المتغير  $x$  أخذ عند هذا الشخص القيمة «غير عربي» . وإذا سألنا شخصا ثانيا وثالثا ووجدناهما سعوديين نقول إن قيمة المتغير  $x$  لكل منهما هي «سعودي» وهكذا . وإحدى الصفات المميزة للمتغير الوصفي هي أن مجموعة القيم التي يأخذها تصنف جملة من العناصر أو الأشياء إلى أصناف بحيث ينتمي كل عنصر (أو شيء) منها إلى صنف واحد وواحد فقط . أو بعبارة أخرى لابد أن ينتمي كل عنصر (أو شيء) منها إلى صنف من تلك الأصناف ولا يمكنه أن ينتمي إلى صنفين أو أكثر في آن واحد . وهكذا تجزئ قيم المتغير الوصفي جملة من العناصر (أو الأشياء) إلى أجزاء منفصلة بعضها عن بعض ، انفصالا تاما . وفي المثال السابق لا يمكن وجود مقيم في الرياض يتصف بأنه «سعودي» و«غير عربي» . أو أنه «عربي غير سعودي» و«غير عربي» الخ .

والنوع الثاني من المتغيرات هو متغير ترتيبي . والمتغير الترتيبي يتميز بكل ما يتميز به المتغير الوصفي بالإضافة إلى توفر نوع من الترتيب الذي يمكن إضفاءه على



الصفات التي تشكل قيم المتغير الممكنة. فلو فرضنا، مثلا، أن متغيرا  $y$  يمثل التقدير الذي ناله طالب من طلاب فصل معين. فالقيم الممكنة لهذا المتغير هي ممتاز، جيد جدا مرتفع، جيد جدا، جيد مرتفع، جيد، مقبول مرتفع، مقبول، ضعيف. وبما أن هذه الصفات مرتبطة بمقياس كمي هو الدرجة العددية التي نالها الطالب فإن هذا يمنح ترتيبا لهذه الصفات من الأعلى إلى الأدنى أو العكس، فنقول إن أعلى هذه القيم هي صفة «ممتاز» يليها «جيد جدا مرتفع» وهكذا حتى نصل إلى أدناها وهي صفة «ضعيف».

والنوع الثالث من المتغيرات هو متغير عددي. والمتغير العددي يتميز بكل ما يتميز به المتغيران الوصفي والترتيبي، أي أنه يصنف، ويُقيم ترتيبا ولكنه بالإضافة إلى ذلك ينبئنا، في مجال الترتيب، بجواب واحد دقيق عن الفارق بين صفة أعلى وصفة أدنى، أو قيمة أعلى وقيمة أدنى. ومع معرفتنا في مثال التقديرات بأن قيمة «ممتاز» أعلى من قيمة «جيد» لو أننا سألنا ما هو الفارق بينهما تماما لما أمكن الإجابة، إذ لا نعلم أي معنى أو جواب محدد لـ «ممتاز - جيد». ولكننا في المتغير العددي يمكن الإجابة على مثل هذا السؤال بدقة تامة. لنصنف، مثلا، فصلا من عشرة طلاب، وفقا لمعدلاتهم العامة، ولنفرض أننا وجدنا الجدول التالي:

45	60	71	73	85	87	91	المعدل العام
1	2	2	2	1	1	1	عدد الطلاب

لنرمز للمعدل العام بالرمز  $Z$ ، فالمتغير  $Z$  هو متغير عددي لأن قيمه الممكنة أعداد حقيقية. وقد صنف المتغير  $Z$  طلاب الفصل وفق معدلاتهم فظهر معنا سبعة أصناف هي «ذوو المعدل 91»، «ذوو المعدل 87» الخ. وبالطبع يمكن ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر أو بالعكس، بالإضافة إلى أن الفرق بين أي قيمتين محسوب تماما وبدقة. والفارق بين الصنف 91 والصنف 71 هو 20 درجة. والبيانات الإحصائية التي تتضمن قياسات متغير وصفي تسمى بيانات وصفية، وتلك التي تتضمن قياسات متغير ترتيبي تسمى بيانات ترتيبية، أما التي تتضمن قياسات متغير عددي فتسمى بيانات عددية.

ويجب ألا يختلط علينا الأمر عندما نقوم بترميز بيانات وصفية أو ترتيبية وفق نظام رموز عددي معين، فلو رمزنا لصفة «سعودي» بالرقم 3 ولصفة «عربي غير سعودي» بالرقم 2 ولصفة «غير عربي» بالرقم 1 فإن هذا لا يعني أن بيانا حصلنا عليه يتعلق بجنسيات جماعة من المقيمين في الرياض أصبح بيانا عدديا، ومع أنه سيقصر على الأرقام 1,2,3 إلا أننا يجب أن نتذكر بأن هذه الأرقام هي رموز لصفات وصفية وأن البيان لا يزال بيانا وصفيا.

وتنقسم البيانات العددية بدورها إلى نوعين، بيانات عددية منفصلة وبيانات عددية مستمرة. والبيانات المنفصلة تتضمن قياسات ناتجة عن عملية عد أو تعداد. وعندما نسجل، مثلا، عدد الولادات التي تمت في مستشفى للتوليد في كل يوم من أيام شهر معين سنحصل على بيان إحصائي عددي من النوع المنفصل جميع قياساته أعداد صحيحة. وكذلك الأمر عندما نعد الكريات البيض الظاهرة على منطقة محددة من زجاجة فحص مجهري، وعدد المراجعين الذين زاروا مركزا للرعاية الأولية في يوم معين، وعدد وقوعات الزواج أو الطلاق أو الوفاة خلال فترة محددة في منطقة معينة. وعدد حوادث المرور اليومية في مدينة الرياض الخ. أما النوع الآخر من البيانات العددية وهو البيانات المستمرة فإنها تتضمن قياسات ناتجة عن استخدام جهاز للقياس مثل مسطرة أو ميزان لقياس وزن أو درجة حرارة أو ضغط الدم أو الضغط الجوي، أو اختبار (أورائز) لقياس حاصل الذكاء أو اختبار لقياس معلومات طالب في مقرر معين الخ. ويسمى المتغير العددي الذي تكون قيمه الممكنة من النوع المنفصل أي نحصل عليها بطريقة التعداد، متغيرا عدديا منفصلا، كما يسمى ذلك الذي تكون قيمه الممكنة من النوع المستمر، أي نحصل عليها باستخدام جهاز للقياس، متغيرا عدديا مستمرا. ونلاحظ بسهولة أن القيم الممكنة لمتغير عددي منفصل قابلة للعد، بمعنى أنه يمكننا القول إن هذه القيمة هي القيمة الأولى الممكنة تليها القيمة كذا كقيمة ثانية، تليها القيمة كذا كقيمة ثالثة، وهكذا. ونطمئن إلى أننا عند الانتقال من قيمة إلى القيمة التي تليها لم نغفل بينهما أي من القيم الممكنة للمتغير. فمثلا، لو رمزنا بـ  $x$  لعدد الولادات اليومية في مستشفى للتوليد، فإن القيم الممكنة لـ  $x$  هي إما صفر، أو 1 أو 2 أو 3 إلخ. ولا يمكن أن يكون هناك نصف ولادة أو ولادة ونصف إلخ. وعندما نتقل من الصفر


كقيمة ممكنة إلى الواحد كقيمة ممكنة تالية لها، لم نخلف وراءنا أيًا من قيم  $x$  الممكنة. وإذا حاولنا تطبيق الفكرة ذاتها في مجموعة القيم الممكنة لمتغير مستمر، أي نحاول عدّها، فنسجد أن ذلك مستعص. لنرمز بـ  $y$ ، مثلا، لطول إنسان ذكر بالغ من رعايا المملكة. فعند قياس طوله بمسطرة مدرجة مرتفعة ومناسبة، كتلك التي نجدها في المستشفيات لقياس الطول، سنجد أن طوله يكافئ نقطة على تدريج المسطرة، لنفرض أن هذه النقطة واقعة بين 171 سم و 172 سم، فطول الرجل، واقع إذا، في مكان ما بين 171 سم و 172 سم. أي أنه يمكن أن يكون أي نقطة من الفترة  $[171, 172]$  من محور الأعداد الحقيقية. ولو كلف المرء نفسه بعد هذه القيم الممكنة فيقول إن 171 سم هي قيمة ممكنة أولى ثم يتوقف عاجزا تماما عن تحديد القيمة التي تليها. إذ مهما اتخذ عددا قريبا من الـ 171 فبين الـ 171 وبين هذه القيمة، على قريها الشديد من 171، ما لا يحصى ولا يُعد من القيم. ونقول إن مجموعة القيم الممكنة لمتغير مستمر هي مجموعة غير قابلة للعد. وقابلية العد هي الخاصة الرياضية التي نميز بموجبها بين النوعين من البيانات العددية، النوع المنفصل والنوع المستمر.

#### ٩- تدوير الأرقام العشرية - أخطاء القياسات

رأينا أن قياس طول شخص يقابل نقطة على المسطرة المدرجة التي نستخدمها في قياس الطول. وهذه النقطة من المسطرة المدرجة (نقطة من محور الأعداد) تقابل أو تمثل عددا حقيقيا هو طول الشخص. ولكن هب أن المسطرة التي نقيس بها مدرجة بالسنتيمتر، وليس فيها تدريج ميليمتر. وكل ما في الأمر أن هناك نقطة تشير إلى منتصف المسافة بين رقم والرغم الذي يليه، شكل (٤)، ولنفرض أن النقطة  $c$  على حرف المسطرة هي النقطة المقابلة لقمة رأس الشخص. فالمسطرة بما أوتيت به من دقة في التدريج تخبرنا أن طول الشخص هو عدد حقيقي واقع بين 171 سم و 172 سم إلا أنه أقرب إلى 172 سم منه إلى 171 سم (النقطة  $c$  واقعة بعد منتصف المسافة بين 171 و 172) ومن المنطقي جدا، في غياب أية معلومات أخرى، أن نصلح على القول إن طول الشخص مقرب إلى أقرب سنتيمتر هو 172 سم. وكذلك النتيجة ستكون لو أن النقطة  $c$  وقعت في أي مكان من المنطقة المظللة على المحور، التي تمتد بين 171.5 سم إلى 172.5 سم. ولكن

ماذا لو وقعت  $c$  عند الـ 171.5 سم تماما أو عند الـ 172.5 تماما؟ في مثل هذه الحالة نتفق على تقريب الـ 171.5 سم إلى 172 سم ، وتقريب الـ 172.5 سم إلى 173 سم . لنفرض الآن وجود تدريج ميلليمي ، فما اصطلاحنا عليه سابقا يكافئ ما يلي :

إذا كان القياس 171.5 سم أو 171.6 سم أو 171.7 سم أو 171.8 سم أو 117.9 سم اعتبره 172 سم وكذلك نعتبره 172 سم إذا كان القياس 172.1 سم أو 172.2 سم أو 172.3 سم أو 172.4 سم . وهذا يُعني علينا ، بصورة عامة ، القاعدة التالية لتدوير الأرقام العشرية :



شكل (٤)

## قاعدة

لتدوير عدد عشري إلى منزلة معينة ننظر في الرقم الذي يحتل المنزلة التي تليها فإذا كان 5 أو أكثر نضيف واحدا إلى المنزلة المطلوبة ونلغي جميع الأرقام العشرية التي تليها . وإذا كان 4 أو أقل نبقى المنزلة المطلوبة كما وردت ونستغني كذلك عن جميع الأرقام العشرية التي تليها .

## مثال (١٥)

كيف تصبح الأعداد التالية بعد تدويرها إلى أقرب جزء من عشرة .

9.1701 ، 0.0532 ، 0.9808 ، 7.3198 ، 314.0621 ، 181.253

## الحل

وفقا للقاعدة المذكورة أعلاه ، ننظر إلى الرقم العشري الثاني فإذا كان 5 أو أكثر نضيف 1 إلى الرقم العشري الأول (وهو الرقم الذي يحتل منزلة الجزء من عشرة) وإذا كان أقل من 5 ، نحتفظ بالرقم العشري الأول كما ورد . وهكذا نجد ، على الترتيب ، 9.2 ، 0.1 ، 1.0 ، 7.3 ، 314.1 ، 181.3 .

مثال (١٦)

فيما يلي عدد الزيارات التي قام بها المرضى المراجعون للعيادات الخارجية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق الأربع عشرة في المملكة لعام ١٤٠٦ هـ: 11168617، 4330131، 4870214، 3028921، 2049754، 4801820، 1577160، 6374554، 6034118، 1479722، 3875879، 3464826، 2825761، 1793849.

والمطلوب التعبير عن هذا البيان العددي بآلاف الأشخاص ثم تدوير الرقم الناتج إلى أقرب ألف.

الحل

التعبير عن البيان بآلاف الأشخاص يعني أن وحدة القياس أصبحت «ألف شخص» فكل ألف مراجع يشكلون جماعة واحدة تتضمن ألف شخص. وللتعبير عن هذه الأعداد بآلاف الأشخاص يجب أن نقسم كل عدد على ألف. وتدوير الأعداد الناتجة إلى أقرب ألف يعني تدويرها إلى الرقم الذي يحتمل منزلة الآحاد. وهكذا نجد الأعداد معبراً عنها بآلاف الأشخاص كما يلي:

11168.617، 4330.131، 4870.214، 3028.921، 2049.754، 4801.820، 1577.160، 6374.554، 6034.118، 1479.722، 3875.879، 3464.826، 2825.761، 1793.849.

وبعد تدويرها إلى أقرب ألف نجد:

11169، 4330، 4870، 3029، 2050، 4802، 1577، 6375، 6034، 1480، 3876، 3465، 2826، 1794.

ونلاحظ أنه من الأسر على القارىء متابعة البيان عندما يُعطى بهذا الشكل.

وفي الوقت الذي لا تخضع فيه قياسات بيان عددي من النوع المنفصل لأخطاء فإن القياسات في بيان عددي من النوع المستمر تخضع دائماً لخطأ يسمى خطأ القياس. ويعود السبب في ذلك إلى أننا نستخدم للوصول إلى مثل ذلك القياس جهازاً أو أداة

للقياس ، ولا يمكن للإنسان أن يبتكر جهازا للقياس لا يخطئ . لقد توصل الإنسان إلى ابتكار أجهزة قياس في علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها تقيس بدقة هائلة إلا أنها مع ذلك تخطئ . وبالطبع يضاف إلى هذا السبب أو المصدر مصادر أخرى نذكر منها أن الإنسان الذي يقيس مُعرض أيضا لارتكاب خطأ ، ومهما أحسن استخدام الجهاز الذي يقيس به فسيرتكب أيضا نوعا من الخطأ .

وعندما نطلع على بيان إحصائي عددي من النوع المستمر ينبغي أن نفهم من القياس المقدم لنا شيئين ، أولهما فكرة عن مقدار الشيء المقيس وثانيهما درجة الدقة التي يتمتع بها القياس . وإذا قيل لنا إن طول شخص هو 168.7 سم فإن هذا الرقم يعطينا فكرة عن قامته الشخص ولكنه يعطينا أيضا أن دقة هذا القياس تصل إلى أقرب جزء من عشرة من السنتيمتر، أي إلى أقرب ميلليمتر . وكقاعدة عامة ، يكون الرقم الأخير المعطى على اليمين رقما مشكوكا في صحته . وعندما نقيس ، بطريقة علمية ، طول شخص ونفيد بأن طوله 168.7 سم فهذا يعني أن الطول الحقيقي لهذا الشخص واقع في مكان ما بين 168.65 سم و 168.75 سم . ولتوضيح الفكرة نقول إننا لو استخدمنا جهازا أكثر دقة لقياس الطول لأعطانا الطول صحيحا حتى منزلة الجزء من مائة ، أي حتى الرقم العشري الثاني بعد الفاصلة ، وفي هذه الحالة سيكون الرقم العشري الأول بعد الفاصلة صحيحا والشك لا يتطرق إلا إلى الرقم الذي يليه ، ولو أن دقة الجهاز سمحت بإعطاء ثلاثة أرقام عشرية بعد الفاصلة أي بدقة تصل إلى أقرب جزء من ألف من السنتيمتر، فسيكون الرقمان العشريان الأول والثاني بعد الفاصلة صحيحين ويتطرق الشك إلى الرقم العشري الثالث ، وهكذا . وبصرف النظر عن مقدار هذه الأرقام (الرقم العشري الثاني والثالث والرابع الخ . بعد الفاصلة) فإن تدوير العدد الذي نحصل عليه إلى أقرب جزء من عشرة لن يعطينا 168.7 سم إلا إذا كان العدد الذي نقوم بتدويره واقعا بين 168.65 سم ، و 168.749999 (ويمكن أن يتكرر الرقم 9 إلى ما لا نهاية له) وذلك وفقا لقاعدة تدوير الأرقام العشرية ، ونصطلح هنا ، توخيا للسهولة ، أن القيمة الفعلية للقياس تقع بين 168.65 سم و 168.75 سم .

وبصورة عامة، للوصول إلى الحدين الأدنى والأعلى للقيمة الفعلية لقياس من النوع المستمر، معطى على شكل عدد صحيح (أي مقرب إلى أقرب واحد صحيح)، نطرح منه 0.5 فنحصل على الحد الأدنى ونضيف إليه 0.5 فنحصل على الحد الأعلى. أما إذا كان القياس معطى كعدد عشري فنضع صفراً بعد آخر رقم معطى في القياس (أي آخر رقم على اليمين بعد الفاصلة العشرية) ثم نضع الرقم 5 تحت هذا الصفر ونطرح فنحصل على الحد الأدنى ثم نجمع للحصول على الحد الأعلى. (محتفظين بالفاصلة في موقعها تماماً عند الجمع أو الطرح) ونوضح الطريقة بالمثال التالي:

مثال (١٧)

ما هو الحد الحقيقي الأدنى والأعلى لكل من القياسات التالية:

12 سم ، 1517 سم ، 18.4 سم ، 125.05 سم ، 34.70 سم ، 4.3208 سم؟

الحل

الحدود المطلوبة هي على الترتيب:

$$\begin{array}{r} 12.0 \\ 0.5+ \\ \hline 12.5 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12.0 \\ 0.5- \\ \hline 11.5 \end{array}$$

فالقياس الأول واقع فعلا بين 11.5 سم و 12.5 سم:

وبصورة مماثلة نجد أن القياس الثاني واقع فعلا بين 1516.5 سم و 1517.5 سم.

ومن أجل القياس الثالث نكتب:

$$\begin{array}{r} 18.40 \\ 0.05+ \\ \hline 18.45 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 18.40 \\ 0.05- \\ \hline 18.35 \end{array}$$

والقياس الثالث واقع فعلا بين 18.35 سم و 18.45 سم.

وبصورة مماثلة نكتب من أجل القياسات الثلاثة الباقية، على الترتيب،

$$\begin{array}{r} 125.050 \\ + 0.005 \\ \hline 125.055 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 125.050 \\ - 0.005 \\ \hline 125.045 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 34.700 \\ + 0.005 \\ \hline 34.705 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 34.700 \\ - 0.005 \\ \hline 34.695 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.32080 \\ + 0.00005 \\ \hline 4.32085 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4.32080 \\ - 0.00005 \\ \hline 4.32075 \end{array}$$

وفي كل حالة إنما نطرح ونضيف، في الواقع، نصف وحدة دقة. حيث وحدة الدقة هي الواحد في منزلة الرقم المشكوك فيه.

### ١٠ - التناسب الطردي

نقول إن المتغيرين  $x$  و  $y$  متناسبان طرديا إذا بقيت نسبتها ثابتة. أي  $\frac{y}{x} = c$ ، أو  $y = cx$  حيث  $c$  عدد ثابت يسمى ثابت التناسب.

لنفرض الآن أن المقدارين  $x$  و  $y$  يتغيران متناسبين طرديا. ولنفرض أن  $x$  تغير من  $x$  إلى  $x + \Delta x$ ، وفي مقابل ذلك تغير  $y$  من  $y$  إلى  $y + \Delta y$ . ما هي العلاقة بين  $\Delta x$  تغير  $x$  و  $\Delta y$  تغير  $y$ ؟ وللإجابة نفترض أن ثابت التناسب  $c$ ، فيكون:

$$\frac{y}{x} = c, \quad \frac{y + \Delta y}{x + \Delta x} = c$$

ومنه

$$\frac{y + \Delta y}{x + \Delta x} = \frac{y}{x}$$



ومن خواص التناسب يمكن أن نكتب:

$$\frac{y + \Delta y}{x + \Delta x} = \frac{-y}{-x} = \frac{(y + \Delta y) - y}{(x + \Delta x) - x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta x = c \Delta y \text{ أو } \frac{\Delta y}{\Delta x} = c \text{ أي أن } c$$

فالتغيران في  $x$  و  $y$  يحافظان دائماً على علاقة التناسب الطردي ذاتها القائمة بين  $x$  و  $y$ . ونلجأ إلى هذه الحقيقة البسيطة في كثير من التطبيقات. فإذا علمنا مثلاً أنه عندما ازدادت قيمة  $x$  بمقدار 5، ازدادت قيمة  $y$  بمقدار 3؛ فكيف سيزداد  $y$  مقابل زيادة  $x$  في مقدارها 7؟ ولحساب المطلوب نكتب:

$$\frac{3}{5} = \frac{\Delta y}{7}$$

ومن خواص التناسب نعلم أن

$$5 \times \Delta y = 3 \times 7$$

$$\Delta y = \frac{3 \times 7}{5} = 4.2$$

ونلخص عادة هذه العمليات في مخطط بسيط كما يلي:


$\Delta x$	$\Delta y$
5	3
7	?

وتكون الزيادة المطلوبة في  $y$  مساوية  $\frac{3 \times 7}{5} = 4.2$

### ١١ - معادلة مستقيم

لندرس أولاً معادلة مستقيم يمر من مبدأ الاحداثيات. ويتحدد المستقيم تماماً عند معرفة نقطتين منه. وفي حالتنا هنا نعلم سلفاً أن المستقيم يمر من النقطة (0,0) وهي مبدأ الاحداثيات، فتكفي معرفة نقطة واحدة أخرى لكي يكون ممكناً تحديد معادلة المستقيم. لنفرض أن النقطة (1,2) واقعة على المستقيم فكيف نحدد معادلته؟

إذا رسمنا محورين للاحداثيات وحددنا النقطة (1,2) ثم وصلنا بينها وبين المبدأ نحصل على بيان المستقيم. وعلى هذا البيان نأخذ نقطة ما، نرمز لاحداثياتها بـ  $x$  و  $y$ ، وتكون المعادلة المطلوبة هي علاقة بين  $x$  و  $y$ . ومن تشابه المثلثين  $ABC$  و  $ADE$  نكتب:



شكل (٥)

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE} \quad \text{أو}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{y} \quad \text{ومنه}$$

$$y = 2x$$

وهي ذات العلاقة التي تربط بين مقدارين متناسين طرديا، حيث ثابت التناسب يساوي 2. وتنبغي ملاحظة أن ثابت التناسب 2 يمثل ظل الزاوية  $\theta$  (حرف يوناني منطوقه ثيتا) التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. (انظر الشكل ٥) ويسمى ظل الزاوية  $\theta$  ميل المستقيم. وكل مستقيم آخر في المستوى ميله 2، أي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية تساوي زاوية المستقيم  $AE$ ، سيقطع المحور الصادي في نقطة غير نقطة المبدأ. لنفرض مستقيما  $MT$  موازيا لـ  $AE$  ويقطع المحور

الصادي في نقطة  $(0, b)$ . فما معادلته؟ يمكن الحصول على نقاط المستقيم  $MT$  بإضافة مقدار ثابت  $b$  إلى الاحداثي الصادي للنقاط الموافقة من المستقيم  $y = 2x$ ، وهي النقاط التي تقع على الخط الرأسي نفسه. فإذا أضفنا إلى الاحداثي الصادي للنقطة  $N$  مقدار  $b$  حصلنا على  $M$  وإذا أضفنا المقدار  $b$  إلى الاحداثي الصادي لكل من  $c$  و  $F$  وجدنا، على الترتيب،  $T$  و  $S$ . وهذا يعني أن معادلة المستقيم الجديد هي

$$y = (نقطة على المستقيم AE) y + b \text{ (نقطة على المستقيم الجديد)}$$


أو

$$y = 2x + b$$

وبصورة عامة نجد أن معادلة المستقيم  $AE$  (انظر الشكل ٦) هي

$$y = (ظل الزاوية \theta) x + b$$

حيث  $b$  إحداثي نقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات.



شكل (٦)

ولو انتقلت نقطة على المستقيم من الوضع  $B$  إلى الوضع  $C$  فإن  $x$  سيتغير بمقدار سميناه «اندفاع  $x$ » وسيقابلة تغير في  $y$  سميناه «صعود  $y$ ». وكذلك عند انتقال نقطة من

الوضع  $D$  إلى الوضع  $E$ ، فإن  $x$  سيتغير بمقدار سميناه «اندفاع  $x$ » وسيقابله تغير في  $y$  سميناه أيضا «صعود  $y$ ». ومن خواص الشكل الهندسية نلاحظ بسهولة أن

$$\text{ثابت} = \text{ظل} = \theta = \frac{\text{صعود } y}{\text{اندفاع } x}$$

أي أن نسبة تغير  $y$  إلى تغير  $x$  تبقى ثابتة باستمرار، في حالة مستقيم. وهي الخاصة نفسها التي رأيناها في حالة مقدارين متناسبين طرديا.

وأخيرا، إذا كانت العلاقة بين متغيرين  $x$  و  $y$  علاقة خط مستقيم قلنا إنها علاقة خطية. وبصورة عامة، معادلة أي مستقيم هي علاقة خطية وبالعكس كل علاقة خطية تمثل مستقيما.

## ١٢ - تصميم الجداول

نحتاج إلى تنظيم نتائج التجارب والملاحظات العلمية في شكل جداول، وذلك في مختلف ميادين المعرفة. وفي أبسط الحالات نجد جدولا ثنائيا، يتضمن في كل خلية من خلاياه قياسا أو مشاهدة مرتبطة بمتغيرين، ثبتنا كلا منهما عند مستوى معين من مستوياته الممكنة. فنفرض، مثلاً، أن لمتغير  $x$  ثلاثة مستويات، سنرمز لها بـ  $x_1, x_2, x_3$ ؛ وأن لمتغير آخر  $y$  أربعة مستويات، سنرمز لها بـ  $y_1, y_2, y_3, y_4$ ؛ وإذا حصلنا عند كل زوج مختلف من المستويات للمتغيرين  $x$  و  $y$  على قياس أو مشاهدة، فسيوفر لدينا اثنا عشر قياسا نضعها في جدول كما في الشكل (٧).

حيث أشير بـ  $x$  للقياس وبـ  $y$  لمجاميع السطور أو الأعمدة وبـ  $n$  للمجموع الكلي. وبصورة عامة، إذا كان عدد مستويات المتغير  $x$  مساويا لـ  $n$ ، وعدد مستويات المتغير  $y$  مساويا لـ  $m$  فإن عدد خلايا الجدول سيكون  $n \times m$ .

وفي حال وجود ثلاثة متغيرات  $x$  وله  $n$  من المستويات،  $y$  وله  $r$  من المستويات، و  $z$  وله  $q$  من المستويات، نحتاج إلى تصميم جدول ثلاثي يتضمن  $n \times r \times q$  خلية. ونلاحظ بوضوح أننا نحتاج إلى جدول ثنائي مؤلف من  $n \times r$  خلية ليستوعب المتغيرين  $x$

$x \backslash y$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_4$	المجموع
$x_1$	×	×	×	×	-
$x_2$	×	×	×	×	-
$x_3$	×	×	×	×	-
المجموع	-	-	-	-	=

شكل (٧)

و  $y$  . ثم نعيد هذا الجدول  $q$  مرة وذلك عند كل مستوى من مستويات المتغير الثالث  $z$  . ولتقديم مثال عن تصميم جدول ثلاثي نفترض أن  $n=3$  ،  $r=4$  ،  $q=3$  . فنجد جدولا كما في الشكل (٨) .

	$Z_1$			المجموع	$Z_2$			المجموع	$Z_3$			المجموع
	$x_1$	$x_2$	$x_3$		$x_1$	$x_2$	$x_3$		$x_1$	$x_2$	$x_3$	
$y_1$	×	×	×	-	×	×	×	-	×	×	×	-
$y_2$	×	×	×	-	×	×	×	-	×	×	×	-
$y_3$	×	×	×	-	×	×	×	-	×	×	×	-
$y_4$	×	×	×	-	×	×	×	-	×	×	×	-
	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-	=

شكل (٨)

ومن الواضح أنه يمكن تنظيم الجدول بطريقة ثانية تستوعب فيها الجداول الثنائية المكررة مستويات  $Z$  و  $Y$ . (انظر الشكل ٩) أو بطريقة ثالثة تستوعب فيها الجداول الثنائية المكررة مستويات  $X$  و  $Z$ . (انظر الشكل ١٠).

	$x_1$			الجموع	$x_2$			الجموع	$x_3$			الجموع
	$z_1$	$z_2$	$z_3$		$z_1$	$z_2$	$z_3$		$z_1$	$z_2$	$z_3$	
$y_1$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
$y_2$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
$y_3$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
$y_4$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-	=

شكل (٩)

	$y_1$			الجموع	$y_2$			الجموع	$y_3$			الجموع	$y_4$			الجموع
	$x_1$	$x_2$	$x_3$		$x_1$	$x_2$	$x_3$		$x_1$	$x_2$	$x_3$		$x_1$	$x_2$	$x_3$	
$z_1$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
$z_2$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
$z_3$	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-	=

شكل (١٠)

وعلى سبيل المثال، لنفرض أن لدينا أربعة أنواع من الأبقار نرسم لها  $C_1, C_2, C_3, C_4$ . أخضعناها في محطة للتجارب الزراعية تابعة لكلية الزراعة، إلى ثلاثة أشكال من النظام الغذائي هي  $N_1, N_2, N_3$ . وذلك لدراسة أثر النظام الغذائي في إنتاج الحليب اليومي بالكغ لكل من الأنواع الأربعة. وكانت النتائج كما في الجدول الثنائي التالي:

أنواع البقر النظام الغذائي	$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$	المجموع
$N_1$	25	28	30	35	118
$N_2$	28	29	31	35	123
$N_3$	27	28	31	34	120
المجموع	80	85	92	104	361

وإذا فرضنا أن التجربة نفسها قد أجريت في محطة للتجارب الزراعية في أبها وذلك لدراسة أثر عامل البيئة والمناخ. إذا رمزنا لعامل البيئة بـ  $V$  فلدينا هنا مستويان  $V_1$  وترمز لبيئة المنطقة الوسطى و  $V_2$  وترمز لبيئة المرتفعات الجنوبية الغربية من 'ملكة'. وأن تجربة أبها أعطت النتائج التالية:

أنواع البقر النظام الغذائي	$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$	المجموع
$N_1$	27	30	29	38	124
$N_2$	29	33	30	36	128
$N_3$	30	31	29	38	128
المجموع	86	94	88	112	380

فيمكن جمع هذه النتائج في جدول واحد يلخص العوامل الثلاثة  $N, C$  و  $V$ . وذلك بأشكال مختلفة، منها، على سبيل المثال، الشكل التالي:

	$V_1$				المجموع	$V_2$				المجموع
	$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$		$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$	
$N_1$	25	28	30	35	118	27	30	29	38	124
$N_2$	28	29	31	35	123	29	33	30	36	128
$N_3$	27	28	31	34	120	30	31	29	38	128
المجموع	80	85	92	104	361	86	94	88	112	380

أو يمكن تنظيمه على الشكل التالي :

	$V_1$			المجموع	$V_2$			المجموع
	$N_1$	$N_2$	$N_3$		$N_1$	$N_2$	$N_3$	
$C_1$	25	28	27	80	27	29	30	86
$C_2$	28	29	28	85	31	33	31	94
$C_3$	30	31	31	92	29	30	29	88
$C_4$	35	35	34	104	38	36	38	112
المجموع	118	123	120	361	124	128	128	380



كما يمكن كتابته على الشكل:

	$N_1$		المجموع	$N_2$		المجموع	$N_3$		المجموع
	$V_1$	$V_2$		$V_1$	$V_2$		$V_1$	$V_2$	
$C_1$	25	27	52	28	29	57	27	30	57
$C_2$	28	30	58	29	33	62	28	31	59
$C_3$	30	29	59	31	30	61	31	29	60
$C_4$	35	38	73	35	36	71	34	38	72
المجموع	118	124	242	123	128	251	120	128	248

تمرين: اقترح أشكالاً أخرى.  
ويمكن كتابة جدول ثنائي يتضمن العاملين  $C$  و  $V$ ، مثلاً، بالجمع فوق مستويات العامل  $N$  فنجد:

	$V_1$	$V_2$	المجموع
$C_1$	80	86	166
$C_2$	85	94	179
$C_3$	92	88	180
$C_4$	104	112	216
المجموع	361	380	741

وكذلك يمكن كتابة جدول ثنائي يتضمن العاملين  $C$  و  $N$ ، مثلاً، بالجمع فوق مستويات العامل  $V$  فنجد:

	$N_1$	$N_2$	$N_3$	المجموع
$C_1$	52	57	57	166
$C_2$	58	62	59	179
$C_3$	59	61	60	180
$C_4$	73	71	72	216
المجموع	242	251	248	741

وبصورة مماثلة يمكن كتابة جدول ثنائي يتضمن العاملين  $N$  و  $V$ .

ومن المجماميع الفرعية في الشكل (V) يمكن تشكيل جدولين ثنائيين. فإذا أخذنا المجماميع الفرعية الواردة في وضع شاقولي نجد جدولا  $4 \times 3$  يمثل نتائج التجربة لو أنها تضمنت  $z$  و  $y$  فقط. أي نتائج التجربة لو أننا أغفلنا المتغير  $x$  أو جمعنا فوق مستويات  $X$ . ويسمى هذا الجدول «الجدول الثنائي  $z \times y$ »، وكذلك لو أخذنا المجماميع الفرعية الواردة في وضع أفقي نجد جدولا  $3 \times 3$  يمثل نتائج التجربة لو أنها تضمنت  $Z$  و  $X$  فقط. أي نتائج التجربة لو أننا أغفلنا المتغير  $y$  أو جمعنا فوق مستويات  $Y$ . ويسمى هذا الجدول «الجدول الثنائي  $x \times z$ ». ولو أخذنا في الشكل (V) المجماميع الفرعية الواردة في وضع شاقولي لوجدنا جدولا  $4 \times 3$  يمثل نتائج التجربة لو أنها تضمنت  $x$  و  $y$  فقط. أي نتائج التجربة لو أننا أغفلنا المتغير  $Z$ ، أو جمعنا فوق مستويات  $Z$ . ويسمى هذا الجدول «الجدول الثنائي  $x \times y$ ». (ضع جداول ثنائية في مثال الأبقار تمثل  $(C \times V, N \times V, N \times C)$ ).

ولتوضيح حالة أربعة متغيرات نأخذ المثال التالي. فلنفرض أن لدينا أربعة متغيرات هي  $x$  ويقع في ثلاثة مستويات؛  $y$  ويقع في 3 مستويات؛  $Z$  ويقع في 3 مستويات؛  $T$  ويقع في مستويين. فعندئذ يمكن تصميم جدول  $3 \times 3 \times 3 \times 2$  أبعاده  $4 \times 3 \times 3 \times 2$  ويتضمن 72 خلية. هي في الواقع ستة جداول كل منها  $4 \times 3$ . (انظر الشكل (١١)).

		Z <sub>1</sub>			Z <sub>2</sub>			Z <sub>3</sub>		
		x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	x <sub>3</sub>
T <sub>1</sub>	y <sub>1</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>2</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>3</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>4</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>2</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>3</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y <sub>4</sub>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

شكل (١١)

## تمارين الملحق الأول

١) قم بالعمليات الحسابية والجبرية التالية إن أمكن :

أ - في الفصل أربعون طالبا وخمسون مقعدا وثلاثة نوافذ . كم طالبا ومقعدا ونافذة في الفصل؟

ب - في الغرفة أربعون طالبا وخمسون مقعدا، وفي الغرفة المجاورة ب ثلاثون طالبا وخمسة وأربعون مقعدا . ما هو عدد الطلاب وعدد المقاعد في الغرفتين معا؟

ج -  $3xy^2z + 0.5xy^2z + 1.2xy^2z - 2.2xy^2z = ?$

د -  $5x^2yz^2 + 3xyz^2 - x^2yz = ?$

هـ -  $5\sqrt{3} - 7\sqrt{3} + \frac{3}{2}\sqrt{3} = ?$

و -  $\sqrt{15} - 3\sqrt{5} = ?$

ز -  $8F(3) + 3F(3) - 0.5F(3) - F(3) = ?$

ح -  $7F(2) - 3F(1) = ?$

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{7} - \frac{5}{21} = ? \quad \text{ط-}$$

$$\frac{3}{32} + \frac{5}{16} + \frac{1}{2} + \frac{7}{8} - \frac{13}{32} - 1 = ? \quad \text{ك-}$$

$$0.5403 + 1.0279 + 12.03 - 3.0101 - 14.123 = ? \quad \text{ل-}$$

(٢) في صندوق ثلاث كرات حمراء وخمس كرات سود وثمانية كرات بيضاء ما هي النسبة المئوية في الصندوق لكل من الكرات الحمراء والكرات السوداء والكرات البيضاء؟

(٣) في الفصل 25 طالبا من طلاب كلية العلوم و 10 من طلاب الحاسب الآلي وإثنان من الهندسة وطالب من العلوم الصحية. ما هي النسبة المئوية لوجود طلاب كليات العلوم والحاسب الآلي والهندسة والعلوم الصحية في الفصل علما أن مجموع طلاب الفصل 38 طالبا؟

(٤) احسب ما يلي :  $12.025 \times 0.19 = ?$

$$\frac{4}{5} \times 0.61 = ? \quad ; \quad \frac{2}{9} \times \frac{7}{5} = ? \quad ; \quad \frac{7}{3} \times \frac{7}{9} = ?$$

$$130.576 + 1.2 \quad ; \quad 0.7895 + 0.05$$

(٥) مستخدما خواص التناسب فيما يلي :

$$\text{ا- أحسب } x \text{ إذا كان } \frac{x}{5} = \frac{3}{2}$$

$$\text{ب- أحسب } x \text{ و } y \text{ إذا كان } \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \text{ ، و } x + y = 10$$

ج- في صندوق كرات بيضاء وسود نسبة 2 إلى 1 ، على الترتيب ، أحسب عدد الكرات من كل نوع إذا علمت أن الصندوق يتضمن 12 كرة.

$$\text{د- إذا كان } \frac{x}{y} = \frac{1}{3} \text{ و } x^2 - y^2 = 32 \text{ فاحسب } x \text{ و } y$$

$$\text{هـ- إذا كان } \frac{x}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z}{3} \text{ و } x + y + z = 30$$

فاحسب  $x, y, z$ .

(٦)  $A = \{x \text{ طالب في جامعة الملك سعود} : x\}$  ;  $B = \{y \text{ طالب متزوج} : y\}$

$C = \{Z \text{ طالب لا يدخن} : Z\}$

عبر كلامياً عن  $A \cap B \cap C, A \cap C, B \cap C, A \cap B$ .

(٧) أوجد  $A \cup B$  في كل من الحالات التالية:

أ-  $B = \{b, c, d\}, A = \{a, b, c\}$

ب-  $B = \{a, b\}, A = \{a, b, c\}$

ج-  $B = \{+, -\}, A = \{0, \star\}$

(٨) لتكن المجموعة الشاملة  $S$  هي مجموعة سكان شبه الجزيرة العربية:

$A = \{a \text{ مواطن سعودي} : a\}$  ،  $B = \{b \text{ شخص متعلم} : b\}$

$C = \{c \text{ شخص مغترب} : c\}$

عبر كلامياً عن المجموعات التالية:

$\bar{A} \cup (B \cap C)$  ،  $A \cap B \cap C$  ،  $B \cup C$  ،  $\bar{B} \cap \bar{C}$  ،  $A \cap B$  ،  $\bar{A}$

$B - \bar{C}$  ،  $B - C$  ،  $A \cup B$  ،  $B \cup \bar{B}$

(٩) يمثل الشكل (١٢) المقابل ثلاث مجموعات  $X, Y, Z$ . ظلل المنطقة التي تمثل

المجموعات التالية، كل واحدة في رسم مستقل.


أ-  $X \cup (Z \cup Y)$

ب-  $(X \cup Z) \cup Y$  ، وقارن النتائج مع أ.

ج-  $(X \cap Y) \cap Z$

د-  $X \cap (Y \cap Z)$  وقارن النتائج مع ج.

ه-  $X \cap (Y \cup Z)$ .



شكل (١٢)





و-  $(X \cap Y) \cup (X \cap Z)$  وقارن الناتج مع هـ .

ز-  $X \cup (Y \cap Z)$  .

ح-  $(X \cup Y) \cap (X \cup Z)$  وقارن النتائج مع ز .

لخص النتائج التي حصلت عليها من هذا التمرين بالنسبة إلى قابلية توزيع عملية التقاطع على عملية الاتحاد وتوزيع عملية الاتحاد على عملية التقاطع .

١٠ ظلل  $X - Y$  في كل من الأشكال التالية :



شكل (١٣)

(١١) في الشكل (١٤) ، المقابل ، أكتب المجموعات :

أ -  $X$  ،

ب -  $Y$  ،

ج -  $X \cap Y$  ،


د -  $X - (X \cap Y)$  ،  $X - Y$  ،

هـ -  $Y - (X \cap Y)$  ،  $Y - X$  ،

و -  $X \cup Y$  ،

ز -  $(X \cup Y) - X$  ،

لاحظ أن الناتج لا يساوي  $Y$  ، متى يكون الناتج مساويا لـ  $Y$  ؟



شكل (١٤)

(١٢) اكتب الجداء الديكارتي  $X \times Y$  إذا كان  $X = \{b, c, d\}$  ؛  $Y = \{m, n, t\}$  ، أكتب أيضا  $X \times X$  و  $Y \times Y$  .

(١٣) لتكن الدالة المعرفة بالقاعدة

$$y = \frac{2x + 5}{x - 3}$$

أ - حدد مجموعة تعريف الدالة ومداهما ،

ب - احسب  $f(-1)$  ،  $f(0)$  ،  $f(4)$  ،  $f(5)$  ،  $f(1)$  ،  $f^{-1}(7)$  .

(١٤) التطبيق  $Z \rightarrow Z$  :  $f$  حيث  $Z$  مجموعة الأعداد الصحيحة . معرف كما يلي :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{إذا كان } x \text{ عددا يقبل القسمة على 2} \\ 1 & \text{إذا كان } x \text{ لا يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 3} \\ 2 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

ما هي صور الأعداد 8، -6، -5، 0، 3، 7، 11، 16؟

(١٦) لتكن الدالة العددية  $f$  المعرفة بالقاعدة:

$$f(x) = \begin{cases} x & , \quad x \leq 0 & \text{إذا كان} \\ 0 & , \quad 0 < x \leq 1 & \text{إذا كان} \\ 1 & , \quad x > 1 & \text{إذا كان} \end{cases}$$

- أ- أحسب  $f(-5)$ ،  $f(1/2)$ ،  $f(1)$ ،  $f(3)$ ،  $f(1000)$ .  
 ب- أرسم بيان هذه الدالة وعين مداها.

(١٧) لتكن الدالة العددية  $f$  المعرفة بالقاعدة:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , \quad x < -1 & \text{إذا كان} \\ 1 & , \quad 1 < x < 2 & \text{إذا كان} \\ -2x+3 & , \quad x > 3 & \text{إذا كان} \end{cases}$$

- أ- عين مجموعة تعريف هذه الدالة (ساحة الدالة).  
 ب- أحسب  $f(-3)$ ،  $f(-2)$ ،  $f(3/2)$ ،  $f(5)$ .  
 ج- ما هي الصورة العكسية للعدد (-2).  
 د- أرسم بيان هذه الدالة.

(١٨) أكتب بالتفصيل ما تمثله المجاميع التالية:

$$\sum_{i=1}^4 f_i x_i^2, \quad \sum_{i=1}^4 (x_i + 3) x_i, \quad \sum_{i=1}^3 (x_i - 2)^2, \quad \sum_{i=2}^6 x_i$$



(١٩) أكتب كلا من العبارات التالية مستخدماً إشارة المجموع  $\sum$  :

$$y_9^2 + y_{10}^2 + y_{11}^2 + y_{12}^2 + y_{13}^2 , x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 , x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$r_0 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4 , (x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + (x_3 - m)^2 ,$$

$$kn_1 + kn_2 + kn_3 + kn_4 + kn_5 , 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 ,$$

$$y_1 + y_2 + y_3 - a - a^2 - a^3 , ay_1 + a^2 y_2 + a^3 y_3 + a^4 y_4 ,$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 , x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4$$

(٢٠) إذا كان  $x_5 = -3, x_4 = 0, x_3 = 1, x_2 = 2, x_1 = 3$  حيث

أحسب قيمة كل من العبارات التالية :  $\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 23$  و  $\sum_{i=1}^5 x_i = 3$

(i) باستخدام تعريف  $\sum$  ،

(ii) تبسيط العبارة أولاً مستخدماً خواص  $\sum$  ثم حساب القيمة .

أ-  $\sum_{i=1}^5 (x_i + 10)$

ب-  $\sum_{i=1}^5 (2x_i + 3)$

ج-  $\sum_{i=1}^4 (x_i + x_{i+1})$

د-  $\sum_{i=1}^4 (x_i - x_{i+1})$

هـ-  $\sum_{i=1}^5 (x_i - 1)(x_i + 1)$

(٢١) (i) بين أن

$$\sum_{r=0}^n [(r+1)^2 - r^2] = (n+1)^2$$

(أكتب أول حدين وآخر حدين ولاحظ اختصار الحدود السالبة مع الحدود

الموجبة).

(ii) بين أن

$$\sum_{r=0}^n [(r+1)^2 - r^2] = 2 \sum_{r=0}^n r + n$$

(باستخدام خواص  $\Sigma$ ).

$$\sum_{r=0}^n r = \frac{1}{2} n(n+1) \text{ بين أن (i) و (ii) بين أن (iii) من (i) و (ii) بين أن}$$

(٢٢) إذا كانت النقطة  $(x, 11)$  واقعة على المستقيم  $y = 3x + 5$  فاحسب قيمة  $x$ .

(٢٣) بين أن النقاط الثلاثة  $(2, 5)$ ،  $(4, 9)$ ،  $(1, 3)$  واقعة على استقامة واحدة.

(٢٤) في مسح لالتهاب الكبد الفيروسي في مدينة معينة، جرى تسجيل الحالات التي أخبر عنها من المستشفيات، ومن العيادات الطبية، ومن السلطات الصحية المحلية. ويبين الجدول التالي أعداد المرضى الموجودين في مستشفى وغير الموجودين في مستشفى، مصنفين وفقاً للجنس، العمر، ولما إذا كانت الحالة من النوع HBSAG أم لا.

أكتب جداول مختصرة تبين تغير نسبة المرضى في المستشفيات مع كل من العمر، الجنس، وحالة الـ HBSAG.

العمر بالسنوات	HBSAG إيجابي				HBSAG سلبي			
	ليس في مستشفى		في مستشفى		ليس في مستشفى		في مستشفى	
	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
0 - 14	43	42	25	9	0	0	0	0
15 - 29	41	39	39	20	18	10	16	7
≥ 30	48	25	21	10	17	3	18	4

(٢٥) يتألف فصل الإحصاء من 40 طالبا. صنفوا وفق ثلاثة متغيرات هي الجنسية (سعودي، غير سعودي)، والسكن (يعيش في سكن الطلاب، لا يعيش في سكن الطلاب)، والكلية التي ينتسب إليها (علوم، حاسب آلي، هندسة). إذا علمت أن:

15 طالب سعودي يسكنون في سكن الطلاب ومن العلوم؛ 5 سعوديون لا يسكنون ومن العلوم، 3 طلاب سعوديون يسكنون في سكن الطلاب ومن الحاسب؛ 2 غير سعوديين يسكنون ومن العلوم، 4 طلاب سعوديون يسكنون في سكن الطلاب ومن الهندسة؛ 1 غير سعودي يسكن ومن الحاسب، 1 غير سعودي لا يسكن ومن الحاسب. فاعرض هذه المعلومات في جدول علما أن ربع طلاب الفصل من غير السعوديين وأن طلاب الهندسة هم حصرا من السعوديين وجميعهم يعيشون في سكن الطلاب.

obeikandi.com

## الملحق الثاني

### بعض الجداول الإحصائية

١ - جدول التوزيع الطبيعي المتجمع

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7743	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9023	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9734	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

جدول توزيع ستودنت المتجمع

$$F(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma(n/2) \sqrt{\pi n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{(n+1)/2}} dx$$

F n	F						
	.75	.90	.95	.975	.99	.995	.9995
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.888
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	.683	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	.667	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

## ثبت المصطلحات

● عربي - إنجليزي

● إنجليزي - عربي

أولاً: عربي - إنجليزي

Interval value data

عددية

Nominal data

وصفية

Graphic

بياني

Variance

تباين

Experiment

تجربة

Ascending order

ترتيب تصاعدي

Natural order

طبيعي

Coding

ترميز

Kurtosis

تفرطح

Intersection

تقاطع

Estimate

تقدير

Interval estimation

بفترة

Approximation

تقريب

Normal approximation

الثنائي بالطبيعي

to binomial

Union

اتحاد

Conditional probability

احتمال شرطي

Statistics

إحصاء

Descriptive statistics

وصفي

Hypothesis testing

اختبار فرضية

Correlation

ارتباط

Independence

استقلال

Original

أصلي

Deviation

انحراف

Mean deviation

متوسط

Standard deviation

معياري

Data

بيانات

Ordinal data

ترتيبية

	( ر )	
First quadrant		ربع أول
Lower quarter		ربع أدنى
Upper quarter		أعلى

	( ع )	
Random		عشوائي
Decile		عُشير
Operation		عملية
Element		عنصر
Sample		عينة

	( ف )	
Confidence interval		فترة ثقة
Hypothesis		فرضية
Null hypothesis		إبتدائية
Space		فضاء
Sample space		العينة

	( ق )	
Bayes law		قانون بايز
Measurement		قياس
Absolute value		قيمة مطلقة

	( ك )	
Inspection		كشف (تفتيش)
Sampling inspection		بطريقة العينة

Frequency	تكرار
Independent trials	تكرارات مستقلة
Cumulative frequency	تكرار متجمع
Graphic presentation	تمثيل بياني
Distribution	توزيع
Discrete probability distribution	احتمالي منفصل
Frequency distribution	التكرار
Binomial distribution	ثنائي
Student's t-distribution	ستيوذنت (التوزيع t)
Normal distribution	طبيعي
Standard normal distribution	طبيعي معياري
Hypergeometric distribution	فوق الهندسي
Sampling distribution	المعاينة
Expectation	توقع
Mathematical expectation	رياضي

	( ج )	
Frequency distribution		جدول التكرار

	( ح )	
Event		حادثة
Mutually exclusive events		حادثتان متنافيتان
Disjoint events		منفصلتان
Simple event		حادثة بسيطة
Empty event		خالية
Compound event		مركبة
Sample size		حجم العينة
Lower confidence bound		حد الشقة الأدنى
Independent events		حوادث مستقلة



Coefficient	معامل
Correlation coefficient	ارتباط
Coefficient of variation	تغير
Confidence coefficient	ثقة
Sampling	معاينة
Stratified sampling	طباقية
Standard	معياري
Measures of dispersion	مقاييس التشتت
Measures of central tendency	النزعة المركزية
Introduction	مقدمة
Measure	مقياس
Curve	منحنى
Frequency curve	التكرار
Normal curve	طبيعي
Critical region	منطقة حرجة
Discrete	منفصل
Mode	منوال

ن

Outcome	نتيجة
Central limit theorem	نظرية النهاية المركزية
Model	نموذج
Equal probability model	الاحتمالات المتساوية

و

Median	وسيط
Description of data	وصف بيانات

٢

Counting Principal	مبدأ العدّ
Inequality	متباينة
Variable	متغير
Continuous random variable	عشوائي متصل (مستمر)
Discrete random variable	عشوائي منفصل
Complement	متمة (مكملة)
Combinations	متوافقات (توافيق)
Mean	متوسط
Mean deviation	الانحراف
Arithmetic mean	حسابي
Sample mean	عينة
Weighted mean	مربّح (موزون)
Set	مجموعة
Subset	جزئية
Universal set	شاملة
Scatter diagram	مخطط الانتثار
Venn - diagram	فن
Range	مدى
Interquartile range	ربيعي
Histogram	مدرج
Frequency histogram	التكرار
Equality	مساواة
Level of significance	مستوى الدلالة
Axioms of probability	مسلّمات الاحتمال
Observation	مشاهدة (ملاحظة أو قياس)
Frequency polygon	مضلع التكرار
Cumulative frequency polygon	التجمع

obeikandi.com

ثبت المصطلحات

ثانياً : إنجليزي - عربي

(A)

Absolute value	قيمة مطلقة
Approximation	تقريب
Arithmetic mean	متوسط حسابي
Ascending order	ترتيب تصاعدي
Axioms of probability	مسلّمات الاحتمال

(B)

Bayes law	قانون بايز
Binomial distribution	توزيع ثنائي

(C)

Central limit theorem	نظرية النهاية المركزية
Coding	ترميز
Coefficient	معامل
of variation	معامل التغيّر
Combinations	متوافقات (توافيق)
Complement	متممة
Compound event	حادثة مركبة

Conditional probability	احتمال شرطي
Confidence coefficient	معامل الثقة
interval	فترة ثقة
Continuous random	متغيّر عشوائي متصل
variable	مستمر
Correlation	ارتباط
coefficient	معامل ارتباط
Counting principle	مبدأ العدّ
Critical region	منطقة حرجة
Cumulative frequency	تكرار متجمع
polygon	مضلع التكرار المتجمع
Curve	منحنى

(D)

Data	بيانات
Deciles	عشيرات
Description of data	وصف بيانات
Descriptive statistics	إحصاء وصفي
Deviation	انحراف
mean	متوسط الانحراف

Discrete	منفصل
probability distribution	توزيع احتمالي منفصل
random variable	متغير عشوائي منفصل
Disjoint events	حادثتان منفصلتان
Distribution	توزيع

**E**

Element	عنصر
Empty event	الحادثة الخالية
Equality	مساواة
Equal probability model	نموذج الاحتمالات المتساوية
Estimate	تقدير
Event	حادثة
Expectation	توقع
Experiment	تجربة

**F**

First quadrant	الربع الأول
Frequency	تكرار
curve	منحنى التكرار
distribution	توزيع التكرار
histogram	مدرج التكرار
polygon	مضلع التكرار
table	جدول التكرار

**G**

Graphic	بياني
presentation	تمثيل بياني

**H**

Histogram	مدرج
-----------	------

Hypergeometric	فوق الهندسي
distribution	توزيع فوق الهندسي
Hypothesis	فرضية
testing	اختبار فرضية

**I**

Independence	استقلال
Independent events	حوادث مستقلة
trials	تكرارات مستقلة
Inequality	متباينة
Inspection	كشف (تفتيش)
Interquartile range	المدى الربيعي
Intersection	تقاطع
Interval estimation	تقدير بفترة
valued data	بيانات عددية
Introduction	مقدمة

**K**

Kurtosis	تفرطح
----------	-------

**L**

Level of significance	مستوى الدلالة
Lower confidence bound	حد الثقة الأدنى
quartile	الربيع الأدنى

**M**

Mathematical expectation	توقع رياضي
Mean	متوسط
deviation	الانحراف المتوسط
Measure	قياس (مقياس)
Measurement	قياس

Measures	مقاييس
of central tendency	مقاييس النزعة المركزية
of dispersion	مقاييس التشتت
Median	وسيط
Mode	منوال
Model	نموذج
Mutually exclusive events	حادثتان متنافيتان

N

Natural order	ترتيب طبيعي
Nominal data	بيانات وصفية
Normal approximation to binomial	
	تقريب التوزيع الثنائي بالتوزيع الطبيعي
curve	المنحنى الطبيعي
distribution	توزيع طبيعي
Null hypothesis	الفرضية الابتدائية

O

Observation	مشاهدة (ملاحظة) (قياس)
Operation	عملية
Ordinal data	بيانات ترتيبية
Original	أصلي
Outcome	نتيجة

P

Parameter	وسيط (معلمة)
Partial	جزئي
Partition	تجزئة
Percentage	نسبة مئوية

Percentiles	المئينات
Permutations	متبادلات (تباديل)
Point	نقطة
estimation	تقدير نقطي
Poisson distribution	توزيع بواسون
Population	مجتمع
Presentation of data	عرض البيانات
Probability	احتمال
Properties	خواص
Proportion	نسبة

Q

Quartiles	الربيعات
-----------	----------

R

Random	عشوائي
experiment	تجربة عشوائية
number	رقم عشوائي
sample	عينة عشوائية
variable	متغير عشوائي
Range	مدى
Rank correlation	ارتباط الرتب
Ratio	نسبة
Raw data	البيانات الخام
Real	حقيقي
numbers	أعداد حقيقية
numbers axis	محور الأعداد الحقيقية
Relative frequency	تكرار نسبي
Rule	قاعدة
Rules of probability	قواعد الاحتمال

**S**

Sample	عينة
mean	متوسط عينة
size	حجم العينة
space	فضاء العينة
Sampling	معاينة
distribution	توزيع المعاينة
inspection	الكشف بطريقة العينة
Scatter diagram	مخطط الانتثار
Set	مجموعة
Simple event	حادثة بسيطة
Space	فضاء
Standard	معياري
deviation	انحراف معياري
normal distribution	التوزيع الطبيعي المعياري

Stratified sampling	معاينة طبقية
Student's t-distribution	توزيع ستودنت (توزيع $t$ -)
Subset	مجموعة جزئية
	<b>U</b>
Union	اتحاد
Universal set	مجموعة شاملة
	<b>V</b>
Variable	متغير
Variance	تباين
Venn-diagram	مخطط فن
	<b>W</b>
Weighted mean	المتوسط المرجح
Weights	أوزان

## المراجع

- Cramer, H. *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton: Princeton University Press, 1961.
- Clarke, G.M. and Cooke, D. *A Basic Course In Statistics*. England, Bath: Edward Arnold, 1982.
- Campbell, R.C. *Statistics for Biologists*, 2nd ed. England: Cambridge Univ. Press, 1974
- Dunn, O.J. *Basic Statistics: A Primer for the Biomedical Science*, 2nd ed. New York: John Wiley, 1977.
- Daniel, W.W. *Biostatistics- A Foundation for Analysis in the Health Sciences*. Singapore: John Wiley, 1987
- Feller, F. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. I, 3rd ed. New York: John Wiley, 1967.
- Freund, J.E. *Modern Elementary Statistics*, 5th ed. New Jersey: Prentice Hall, 1979.
- Hodge, S.F. and Seed, M.L. *Statistics and Probability*, 2nd ed. Edinburgh: Blackie & Chambers, 1977.
- Huntsburger, H. *Elements of Statistical Inference*. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1981
- Handel, D.J. *Introductory Statistics for Sociology*. New Jersey Prentice-Hall Inc., 1978.
- Kendall, M. and Stuart, A. *Advanced Theory of Statistics*, vol. 1, 4th ed. London: Charles Griffin & Company, 1977.
- Levin, J. *Elementary Statistics in Social Research*. New York: Harper and Row Publishers, 1977.
- Mendenhall, W. *Introduction to Probability and Statistics*, 6th ed. Boston: Duxbury press, 1983
- Osborn, J. F. *Statistical Exercises in Medical Research*. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1979.
- أنيس كنجو. الإحصاء وطرق تطبيقه في ميادين البحث العلمي (الجزء الأول). بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م.

obeikandi.com



## كشاف الموضوعات

عددية منفصلة ٨، ٤١٤

وصفية ١١، ٤١٢

ت

تباديل ١٨٥

تباين ٨٣، ٨٤

تجربة ١٢٧

ثنائية ٢٦١، ٢٦٢

عشوائية ١٢٨

تدوير الأرقام العشرية ٤١٦

ترتيب طبيعي ١١٩

تصميم الجداول ٤٢٤

تطبيق ٤٠٢

تغيير سلم القياس ٤١٠، ٤١١

تقدير ٨٤

بفترة ٣٦٧، ٣٦٩

نقطي ٣٧١

تقريب التوزيع الثنائي بالطبيعي ٣٥٩،

٣٦٠، ٣٦١

تكرارات مستقلة ٢١٠، ٢٩٧، ٢٩٨

١

احتمال

إحصائي ١٧٨

حادثة ١٦٨

شرطي ١٩٥

إحصاء

وصفي ١

اختبار فرضية ٢٨٣

ارتباط ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩

انحراف متوسط ٨٢، ٨٣

معياري ٨٣، ٨٤

انسحاب ٤٠٩

أنواع القياسات ٤١٢

أوزان ٤٩، ٥٠

ب

بيانات

ترتيبية ١١، ٤١٢

عددية متصلة (مستمرة) ٨، ٤١٤

خ

خطأ

- القياس ٤١٧ ، ٤١٨  
 من النوع الأول ٢٨٥  
 من النوع الثاني ٢٨٦  
 خواص  
 التباين ٩١  
 التوزيع الطبيعي ٣١٤ ، ٣٤٢  
 التوقع الرياضي ٢٥٠  
 رمز المجموع  $\Sigma$  ٤٠٤  
 المتوسط الحسابي ٤٦  
 متوسط عينة عشوائية ٣٠٧

تكرار نسبي ٧ ، ١٥ ، ١٣٠

تمثيل بياني ١٠ ، ١١

تناسب ٣٩٣ ، ٤٢٠

توافق ١٨٧

توزيع

احتمالي ٢٣٥

بواسون ٢٨٨

تكراري ٢ ، ٧

ثنائي ٢٦٣

طبيعي ٣١٣

طبيعي معياري ٣٠٨ ، ٣١٩

فوق الهندسي ٢٩٨

توقع رياضي ٢٤٧

ح

حادثة ١٣٣

بسيطة ١٣٤

مركبة ١٣٤

مكاملة (متممة) ١٤٦

حدود حقيقية

لفئة ٩

لقياس ٤٠٩

حوادث

اتحاد (حوادث) ١٤٥

تقاطع (حوادث) ١٤٥

حقن (حوادث) ١٥١

مستقلة ١٩٥ ، ٢٠٣

د

دالة ٤٠٤

احتمال ٢٤٤

توزيع احتمالي متجمع ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦

كثافة احتمالية ٢٤٢

كثافة توزيع طبيعي ٣١٥

ر

رُبَّيع

أدنى ٧٩

أعلى ٧٩

ك

كشف بطريقة العينة ٢٧٨

م

مئينات ٧٩

متباينة تشيبيشيف ٩٥

متغير ٣٩، ٤٠٥

عشوائي ٢٣٢

عشوائي متصل (مستمر) ٢٣٥

عشوائي منفصل ٢٣٤

متوسط

بيان مصنف ٤٥، ٤٦

توزيع ثنائي ٢٧٠

حسابي بسيط ٤٤

مرجح ٤٩

مجتمع ٢٣٩

مجموعة ٣٩٦

جزئية ٣٩٦

خالية ٣٩٧

محور الأعداد الحقيقية ٤٠٨

مسدى

بيان إحصائي ٧٨

ربيعي ٧٩

مدرج تكراري ١٢

مساحة تحت منحنى الكثافة الطبيعي ٣١٦

مستوى الدلالة ٢٨٥

مسلمات الاحتمال ٥٥

ش

شجرة الاحتمال ٢١٤، ٢١٥

شكل الانتثار ١٠٨، ١٠٩

ص

صورة عكسية ٤٠٣

ع

عشيرات ٨٧

عمليات على المجموعات ٣٦٩

عينة عشوائية ٢٩٧

ف

فئات ٦، ٧

فترة ثقة

لمتوسط توزيع طبيعي ٣٦٧، ٣٧٤، ٣٧٩

نسبة ٣٨٤

فرضية

ابتدائية ٢٨٣، ٢٨٤

بدلية ٢٨٦

فضاء احتمالي ١٥٣

فضاء عينة ١٣٢

متصل ٢٣٤

منفصل ٢٣٤

ق

قانونا دي مورغان ٣٩٨

قانون الجداء في الاحتمال ٢٠٦

قانون الجمع في الاحتمال ٢٠٦

منطقة	مضلع
الرفض ٢٨٥	تكرار متجمع ١٧
القبول ٢٨٥	تكراري ١٧
منوال ٦٣	معادلة متقيم ٤٢١
	معامل
	بيرسون للارتباط ١١٠
	التغير ٩٧
	الثقة ٣٦٩
	سيرمان لارتباط الرتب ١١٧
	معايينة
	بدون إعادة (إرجاع) ٢٩٨
	مع إعادة (الإرجاع) ٢٩٨
	معياري ٨٤ ، ٩٩ ، ٣٢١
	مقاييس
	التشتت ٧٧
	النزعة المركزية ٤٢
	منحنى
	تكراري ٢٢
	طبيعي ٣١٥ ، ٣١٦
	عملياتي مميز ٢٧٩

ن

منطقة	مضلع
نتائج احتمالية ١٥٧	
نسبة	
مئوية ٣٩١	
نظرية بايز ٢١٦ ، ٢١٧	
نظرية النهاية المركزية ٣٥٢	
نموذج	
الاحتمالات المتساوية ١٧٤	
احتمالي ١٦٧	

و

وسيط	مضلع
بيان بسيط ٥٩	
بيان مصنف ٦١	